





36.24 B 3
E P I T O M E S

Omnium Galeni

PERGAMENI OPE,

RAM VNIVERSAM IL-
LIVS VIRI DOCTRINAM,
& methodū, quàm accu-
ratissimè continētis,

SECTIO TERTIA.

PER ANDREAM LACVNAM SECO-
*biensem, Doctorem Medicum, atq; ex sacro mi-
litum Sancti Petri apud Urbem collegio,
Auratum Equitem, summa fide
atq; studio collecta.*

CAVTVM EST PONTIFICIA, CAESAREA, ET
Christianissimi Regis, Augustissimiq; Senatus Veneti
authoritate & decreto, ne quis impunè hoc
opus aut cudat, aut ab alio excusum,
quàm à Hieronymo Scoto,
exponat venale.

Venetiis apud Hieronymum Scotum.

EPITOME

Quintus Gellius

PERGAMENI ORBIS

LIBRARIUS

IN VINDOBONA

IN VINDOBONA

IN VINDOBONA

SECTIO TERTIA

PER ANTONIUM LACINAE SECTIO

PER ANTONIUM LACINAE SECTIO

PER ANTONIUM LACINAE SECTIO

PER ANTONIUM LACINAE SECTIO

PER ANTONIUM LACINAE SECTIO

CAVATRE ET FORTITUDINE, CAVATRE, ET

CAVATRE ET FORTITUDINE, CAVATRE, ET

CAVATRE ET FORTITUDINE, CAVATRE, ET

CAVATRE ET FORTITUDINE, CAVATRE, ET

CAVATRE ET FORTITUDINE, CAVATRE, ET

CAVATRE ET FORTITUDINE, CAVATRE, ET

ILLVSTRISSIMO, ET CLEMENTIS-
simo Principi, Cosmo Medices, Tuscorum Duci
Optimo & Maximo, Andreas Lacuna,
Secobiensis, Doctor Medicus,
Miles Sancti Petri.
S. P. D.



VMANI CORPO-
ris fabricam ciuitati opti-
mè institutæ esse similem,
Diuinus ille Plato profes-
sus est, Clementissime Prin-
ceps, neq; id iniuria. Nam
si constitutionem utriusq;,
dispensationemq; accuratè
expendamus, nihil pla-
nè reperiemus in ciuitate, quod longè cumulatius abso-
lutiusq; humano etiam non insit corpori. Etenim fortis-
sima quæq; ciuitas, solet esse ualido cincta muro, quo in-
cursiones hostium atq; insultus arceantur. Vice muri cu-
iusdam est corpori etiam extrema cutis, quæ tuetur ip-
sum ab iniurijs extrinsecis. Ciuitatem qui uolunt in ex-
pugnabilem reddere, minimeq; insidijs obnoxiam, so-
lent semper optimi duces unam tantum illi portam am-
plam relinquere, excipiendis commeatibus peruiam.
plures autem ueluti canales & aquæductus, ad illius
expurganda excrementa. Similiter etiã Natura os uni-

cum corpori humano indidit, per quod nimirum ingre-
derentur quidem omnia quæ ad partes eius alendas per-
tinent: sermo autem elideretur, instruendis animis ho-
minum pietate & doctrina, maxime necessarius: ac præ-
terea uarios meatus, per quos excernerentur quæ non
erant futura ex usu. Optima quæq; ciuitas, præsertim si
duratura sit, unico tantum, sed Prudentissimo, Iustissi-
mo, & Clementissimo debet esse Principi subdita: quan-
doquidem Polyarchia semper fuit seditioni opportuna:
Princeps autem ipse, à ciuium commercio abstractus, à
fidisq; stipatoribus custoditus, in sublimiori fortiori-
q; urbis parte, se continere: ut illinc, ueluti ex quadam spe-
cula, uniuersos ciues suos contueri, et si qua coniuratio
oriatur, eam facile restinguere possit. Non aliter, dubio
procul, ratio ipsa in homine, quæ reliquarum omnium
facultatum est imperatrix, in cerebro, sublimiori cor-
poris parte, ueluti in arce quadam consistens, membris
uniuersis sibi subditis imperat, eisq; uiuendi leges im-
ponit. Eius autem stipatores, ac ueluti incorrupti qui-
dam satellites, sensus exteriores existunt: qui nunquam
non facientes excubias, explorantesq; singula, quæ aut
rationi ipsi, aut cuiuspiam subiectorum illi membrorum,
obesse aliqua ex parte possint, quicquid tandem perce-
perint, actutum sensui communi renunciant: qui ceu dux
quidam, ipsi rationi coniunctus, illis præfectus est. Iam
uerò ut Principibus adsunt nonnulli Viri à secretis, qui
eos in expediendis negotijs magna sollicitudine liberat:

2
sic adest Rationi Memoria, uuiuersa quæ illi occurrunt, si alicuius ponderis sint, q̄ fidelissimè asseruans: eaq; dum occasio postulat, subito, ueluti ex promptuario quodam, suppeditans. Solent habere Principes & pace & bello, milites quosdam sacramentarios, tum ad repellendas iniurias extrinsecas: tum ad continēdos in obsequio & fide ipsos animos ciuium. Non secus profecto Diuinus ille Architectus noster, Rationi uim irascibilem, à Platone θυμοειδῆ uocatam, adiūxit: ut si quando ratio immeritò ab aliquo infestaretur, confestim hæc excandescens, illi ferret manus auxiliatrices, omnemq; uim propulsaret. Collocauit autem Natura hanc ipsam, qua irascimur, facultatem, in corde: ut media exquisitè esset inter Rationem atq; Cupiditates, quæ in iecinore sitæ, atq; illinc uarias excursionses facientes, admodum seditiosæ existunt, Rationiq; plurimū negotij facessunt. Quocirca inter ipsas & uim irascibilem, Natura etiam uallum quoddam firmissimum, diaphragma nempe, interiecit, ne uidelicet imparatam illæ iracundiam opprimerent, insurgentesq; postea contra Rationem, arcem illius expugnarent. Reperiuntur in ciuitate opificia hominum uaria: quum alij, gratia exempli, conficiant panes: alij culinariam exerceant: alij retrimēta omnia expurgent: alij deniq; diuersas merces per totam urbem in communem usum traducant. An non etiam in corpore humano uentriculus cibos concoquit, hepar sanguinem gignit, melancholicum succum expurgat liē, uesica uri-

nam, uenæ per uniuersum corporis habitum (ueluti ba-
iuli quidam) sanguinem copiosissimum riuant, arteriæ
uitalem spiritum, ac breuiter, nerui animalem, qui au-
thor est motus & sensus? Corporis itaq; nostri harmo-
nia ciuitatis optimam refert constitutionem: imò uerò
Respublicæ, ciuitatesq; uniuersæ, ad exemplum corpo-
ris humani sunt conditæ: quum arti Natura ipsa tem-
pore & dignitate antecellat. Quemadmodum igitur si
in aliqua ciuitate princeps quidem, ut par est, domine-
tur: ciues autem omnes, militesq;, eius decretis audiant:
atq; unusquisq; opifex suo rectè fungatur munere, salus
Reipublicæ constat: labefactatur uerò, si contraria ac-
cidant: sic etiam quādiu in nostro corpusculo Ratio ipsa
gesserit habenas imperij: affectus autem omnes atq; cu-
piditates obtemperauerint: singuleq; particule pro di-
gnitate sua munia exercuerint: nec interim praua ali-
menta ingerantur: tandiu certè integra sanitate corpo-
ris, animiq;, perfruemur. Si uerò aut Ratio ipsa in con-
siliū admittat cupiditates: aut irascibilis facultas in
unum cum his aduersus Rationem conspiret: aut ex or-
ganis quæ usui communi inferuiunt, unum, plura, uel
omnia, prauè suas obeant functiones: uel deniq; materiæ
unde particule aluntur sint cachochymæ: pro concursu
harum causarum necessum est, aut mentis, aut corporis,
aut utriusq;, morbum contrahamus. Atq; ita sanè ua-
ria in corpore morborum genera oriuntur, dissoluta ui-
delicet, alterataq; uarijs modis habitudine illa & tem-

4
perie, quàm inter se mutuò uniuersa membra, dum naturali ordini responderent, tuebantur. Quorum uniuersa curatio eadem adhibetur methodo, qua curari solent etiam morbi Reipub. Quippe ut in hac peccata leuiora nunc uinculis, nunc uirgis, nunc exilio, nunc succisa auricula coercetur: in grauiora autem laqueo, securi, flammâ, atq; feruenti oleo, acerbissimè animaduertitur: sic exiguos quidem affectus corporis, leuiusculis quibusdam præsidijs, ut puta purgatione, atq; interdum sola tenui uictus ratione, curamus: contumaces uerò, immedicabilesq; (cuiusmodi tum sphaceli, tum cæcri existunt) ferro, cauterioq; ne in sanas partes grassentur, exterminamus. Ceterum quemadmodum ad stabiliendam Rempub. plectendosq; facinorosos homines, leges fuerunt inuenta: sic ad cõseruandam temperiem corporis, rescindendosq; morbos, è cœlo delapsa nobis est **MEDICINA**. Quo munere nullum hactenus mortalium generi à Deo ipso datum est maius: nec (si Galeno credendum sit) dabitur unquam. At uerò quum hanc ipsam artem, atq; industriam medendi, olim sola experientia constantem, Hippocrates primus omnium methodo tradidisset: reliquisset tamen incultam, imperfectamq;: postea superueniens Galenus, multis illam modis excoluit, eiq; extremum ornatum addidit. Qui quum ob illam quidem admirandam doctrinam, ac sermonis fecunditatem, quâ planè refertus est, magno exciperetur omnium fere studiosorum applausu: ob prolixitatem autem immensam

(quæ in tanta uitæ breuitate est exosa) nonnulli à lectio-
ne illius abhorrent: equidem ut ad uotū omnes eo frue-
rentur, uniuerſa Viri illius opera in breuiusculā quan-
dam periochen, uerū a modum succulentam, ea fide &
diligentia contraxi, ut ex ijs quæ iuuare lectores pote-
rant, nihil prorsus omiserim: multa autem quæ depraua-
ta & peruerſa in codicibus tam Latinis, q̃ Græcis, erāt,
accuratiſſimè reſtituerim. Ex quibus noſtris lucubrati-
onibus placuit ſub ſplendore Excellentiæ Tuæ, Illuſtriſ-
ſime Princeps, partem maximam ædere, nempe quadra-
ginta commentarios Galeni, qui in ſe omnes differentias
morborum, atq; eorum curā dorum generales methodos
continent: utiq; ſperans fore, ut quum ipſe inter omnes
Italiæ Principes optimorum ingeniorum ſis promotor
& altor, eiſq; ſemper ceu propitium quoddam ſyduſ af-
fulgeas, uel ex ſola tui nominis præſatione, ſtudioſi om-
nēs ad eorum lectionem inflammarentur. Adeò ſiquidem
Tuam Celſitudinem, quum ob alias planè regias uirtu-
tes, tum uel maximè ob ardentiffimum iſtum ſapientiæ
amorem, quo ſemper accenſa eſt, docti omnes ubiq; loco-
rum ſuſpiciunt, colunt, & uenerantur, ut ſe non minus
debere tibi, quàm ipſis Muſis, uniuerſi uno ore pronun-
cient: qua (ut ego reor) opinione minimè hallucinantur.
Siquidem non modò ſtudioſi, ſed artes etiam, atq; ſcien-
tiæ uniuerſæ, ſi non maiorem, at certè non minorem ijs
gratiam debent, qui ſua munificentia fouendo ipſas, ut
ſubinde creſcerent, ſummumq; ſuæ dignitatis faſtigium

1
attingerent, effecerunt: quàm illis, quorum industria pri-
mum inuenta, ac in usus hominum ædita sunt. In maxi-
mam itaq; sibi felicitàtem ascribunt omnia bonarum li-
terarum studia, q; hisce turbulentis calamitosissq; tempo-
ribus, dum Italia penè uniuersa uarijs æstuat disidijs,
uersaturq; in assiduo strepitu armorum: dum optima
quæq; instituta infirmis titubant pedibus: dum uirtus,
pudorq; exulat omnis: nacta sint Clementissimum & Se-
renissimum Principem, qui explosa undiq; ea in suos si-
nus excipiat, exceptaq; aduersus iniurias omneis tuea-
tur. Haud ab re igitur Illustrissimus & Reuerendiss. D.
D. Franciscus à Bouadilla & Mendoza, Sanctæ Ro-
manæ Ecclesiæ Senator uigilantissimus, meusq; Patro-
nus unicus, necnon Illustrissimus & Sapientiss. D. D.
Ioannes Furtadus à Mendoza, apud Venetos Orator
Cæsareus, Vterq; Celsitudini T. addictissimus, nunquam
desinunt heroicas istas tui animi dotes magnificis enco-
mijs efferre: Florentiamq; tuam istam florentissimam ur-
bem, nimium felicitàtem uocare, q; obtigerit illi Princeps
Iustissimus, Clemētissimus, Sapientiaq; simul & pietate
integerrimus. Ergo si, Illustrissime Heros, hasce nostras
uigilias tuo patrocínio dignaberis, ego quidem uidebor
haud luisse meam operā: Galenus autem, ad pristinam
dignitatem quam gerebat olim, dum in summa esset au-
thoritate apud priscos Impatores, deesse sibi nihil pror-
sus existimabit: quin potius hærens apud. C. T. auctam

plurimis modis beatitudinem suam arbitrabitur. Va=
le. Venetijs, ex aedibus Illustrissimi Viri, D. D. Ioan
nis Furtadi à Medozza, in hac Republica Caesarei Ora
toris longè Dignissimi. IIII. Idus Aprilis.

M. D. XLVIII.

INDEX COMMENTARIO

rum Galeni, qui in hac tertia sectio-

ne habentur : nominaq; Doctis-

simorum Virorum, quorum

sumus usi uersionibus,

dum Epitomen

conderemus.



E DIFFERENTIIS

Morborum liber. I. Gui-

lielmo Copo Basiliens. &

Thoma Linacro inter-

pretibus.

De causis morborum, lib. I. Guil. Cop. &

Thoma Linacro interpret.

De sympt. diff. lib. I. Guil. Cop. & Thom.

Linac. interpret.

De symptomatum causis lib. III. Guiliel-

mo Copo, & Thoma Linacro inter-

pretibus.

De causis procatarepticis lib. I. ex antiqua

restitutus uersione.

De plenitudine lib. I. Victore Trincaue
lio interprete.

De atrabile liber. I. Augustino Ricco Lu
cenci interprete.

De tumoribus præter naturam, lib. I. Au
gustino Ricco interprete.

De tremore, palpitatione, cōuulsione &
rigore, liber. I. Dominico Montesauro
interprete.

De morborum temporibus, lib. I. Ioanne
Guinterio Andernaco interprete.

De totius morbi temporibus, lib. I. Ioan
ne Guint. And. interprete.

De locis affectis, lib. VI. Guilielmo Copo
Basilienſi interprete.

De differentiis febrium liber. II. Nicolao
Leoniceno interprete.

De Marasmo lib. I. Victore Trincauelio
interprete.

Contra eos qui de typis scripserunt, lib. I.
Victore Trincauelio interprete.

De typis lib. I. Augustino Ricco interpr.

Ars medicinalis, Nicolao Leonicensi interprete.

De Methodo medendi lib. XIII. Thoma Linacro interprete.

De arte curatiua ad Glauconem, liber. II. Nicolao Leonicensi interprete.

De uenæ sectione aduersus Erasistratum lib. I. Iosepho Tectandro interprete.

De uenæ sec. aduersus Erasistrataeos Romæ degentes, lib. I. Iosepho Tectandro interprete.

De curandi ratione per uenæ sectionem, lib. I. Theodorico Gerardo interprete.

De hirudinibus, reuulsione, cucurbitula & scarificatione, lib. I. Theodorico Gerardo interprete.

De purgantium medicamentorum facultatibus, lib. I. Ioanne Guinterio Andernaco interprete.


Quos purgare, quando, & qualibus medicamentis oporteat, lib. I. Ioanne Guinterio Andernaco interprete.

De ptisana, liber. I. Augustino Ricco in
terprete.

Consilium puero comitali morbo labor
ranti, Augustino Ricco interprete.

THE LIBRARY OF THE
 UNIVERSITY OF CHICAGO
 540 EAST 57TH STREET
 CHICAGO, ILL. 60637

13. The first of these is the
 fact that the system is not
 self-sufficient. It is necessary
 to have a large number of
 people to maintain it. The
 second is that the system is
 not very flexible. It is not
 possible to change the system
 without a great deal of
 trouble. The third is that the
 system is not very reliable.
 It is possible that the system
 will break down at any time.
 The fourth is that the system
 is not very secure. It is
 possible that the system will
 be stolen or destroyed. The
 fifth is that the system is not
 very efficient. It is possible
 that the system will be slow
 or inaccurate. The sixth is
 that the system is not very
 easy to use. It is possible
 that the system will be difficult
 to learn or to operate. The
 seventh is that the system is
 not very cheap. It is possible
 that the system will be expensive
 to buy or to maintain. The
 eighth is that the system is
 not very safe. It is possible
 that the system will be dangerous
 to use. The ninth is that the
 system is not very reliable.
 It is possible that the system
 will break down at any time.
 The tenth is that the system
 is not very secure. It is
 possible that the system will
 be stolen or destroyed. The
 eleventh is that the system
 is not very efficient. It is
 possible that the system will be
 slow or inaccurate. The
 twelfth is that the system
 is not very easy to use. It
 is possible that the system
 will be difficult to learn or
 to operate. The thirteenth
 is that the system is not very
 cheap. It is possible that the
 system will be expensive to
 buy or to maintain. The
 fourteenth is that the system
 is not very safe. It is possible
 that the system will be
 dangerous to use. The
 fifteenth is that the system
 is not very reliable. It is
 possible that the system will
 break down at any time.



G A L E N I P E R G A

M E N I D E D I F F E R E N T I I S

M O R B O R V M , L I B E R V N V S .



V I V E R S I T V N C

se sanos existimant, quum optimè ad vitæ functiones ministerio particularū vr̃tur. At eam partem ægro-
tare arbitrātur, cuius ope-
ratio sit læsa. Quum igitur
sanitas inuestiganda sit, aut
in ipsis operationibus, aut
in fabrica instrumentorū:

Sanitas in quibus inuestiganda.

manifestum utiq; est, mor-
bum esse, vel operationis, vel structuræ oblationem. Cæterum sanitas non operationis actu, sed aptitudine potius est definienda. Sanitas itaq; moderatio quædam existit: morbus autem, utpote, sanitati cōtrarius, in im-
moderatione eorum consistit, quorum sanitas est mo-
deratio. At verò, quum animalium corpora magis &
minus suscipiant, pati q; & alterascere possint (id quod
fieri non posset, si ex elemento constarent vnico, aut
ex atomis nulli alterationi obnoxiiis) tot nimirum ge-
nera morborum simplicium contrahent, quot sunt
elementa ex quibus constantur. Etenim compositio &
formatio triplex reperitur i corpore. Prima quidem,
similarium particularū est: vt arteriæ, venæ, ossis, ner-
ui, chartilaginis, ligamenti, membranæ, & carnis: secū-
da autem, instrumentalium: vt cerebri, cordis, & consi-
milium: tertia deniq; totius corporis. Corpus siquidē,
ex instrumentalibus cōstat: instrumentales autem par-
tes, ex similaribus: illæ deniq; ex simplicissimis elemē-

*Morbus estuel operationis, uel structuræ ob-
læsiō.*

*Sanitas defini-
tur aptitudine
operationis, mo-
deratioq; exi-
stet.*

*Morbus quom-
immoderatio
dicatur.*

*Morborū sim-
plicium gene-
ra tot sūt, quot
simplicia ele-
menta.*

*Cōpositio cor-
poris nostri est
triplex.*

tis constituuntur. Porro si elementa constituamus im-
 passibilia esse (vt nonnulli autumant) duobus tantū
 morbis particulæ similes prementur: meatuum vide-
 licet astrictione, & eorūdem relaxatione. Fruentur autē
 sanitate absoluta, dum eorum elementorum constru-
 ctio fuerit cōmoderata. At si nostri corporis elementa
 mutuò inter se patiantur, & tota per tota implicentur
 (id quod inconcussè est tenendum) totidem simplices
 morbi dicendi sunt, quot primaria elementa censent.
 Primaria autem elementa sunt quatuor, calidum scili-
 cet, frigidum, humidum, siccum: ex quibus moderatè
 confusis, oritur sanitas: immoderatè verò, ægritudo.
 Erunt itaq; similium particularum simplices morbi
 quatuor numero: caliditas videlicet, frigiditas, humidi-
 tas, atq; siccitas, vbi earum qualitatum singulæ, natu-
 ræ modum exceßerint. At morbi partium instrumen-
 talium, tum illis qui ex impartibilibus cōstare corpora
 dicūt: tum nobis, q̄ ex elementis affectioni subiectis, ea
 constari arbitramur, prorsus existunt cōmunes. Sunt
 autem eorum genera quatuor. Primum enim est, vbi
 forma conueniens membro fuerit vitata: secundum,
 vbi in numero reperitur vitium: vt si quid desit, quod
 haberi erat opportunum: aut redūdat aliquid minime
 necessarium. Tertium genus consistit in organi magni-
 tudine, vbi aliquid impensius adultum sit, aut similiter
 diminutum. At quartum genus refertur deprauatæ cō-
 positioni: quæ fieri solet aut naturali positu variato, aut
 mutata partis copula. Porro prima instrumenta dicun-
 tur, quæ quum p̄sentur ex particulis similibus, vnius
 operationis gratia sunt constituta: vt musculus, atq; ve-
 na. At quæ rursus ex his cōstantur, vt digitus, atq; hoc
 magis pes, instrumenta secunda dicuntur. Vex vtriusq;
 instrumentis erunt ipsi morbi cōes. Aliud autem genus
 morbi, præter iam dicta, nullum est reperire, quod sit
 proprium vel simplicibus, vel compositis partibus. Est

Elementa cor-
 poris nri mu-
 tuo inter se pa-
 tiuntur, ac tota
 per tota mi-
 scentur.

Elementa pri-
 maria sunt qua-
 tuor.

Sanitas et mor-
 bus unde ex-
 oriuntur.

Similiū par-
 ticularum sim-
 plices morbi,
 quatuor.

Dissimilium
 partium mor-
 bi, quatuor ge-
 neribus conti-
 nentur.

Instrumēta pri-
 ma sunt quæ
 ex similibus
 partibus, vnius
 functionis gra-
 tia sunt consti-
 tuta.

Instrumenta se-
 cunda quæ.

tamen vnus morbus communis corporibus similari-
bus iuxta & dissimilaribus, nempe vnitatis diuer-
tium. Ad reliquas tamen simpliciū morborum in par-
tibus similibus differentias examinandas nos conuer-
tamur. Igitur impatibilium elementorū authores, duas
in similibus corporibus ægritudines statuebant: nem-
pe aut astrictionem, aut relaxationem meatuum: qua-
rum singulæ, in alias rursus differentias secantur. Astri-
ctio siquidem fit, quum aut totum corpus simul cōtra-
hitur: aut soli obstruuntur meatus: relaxatio autem, vbi
vniuersum corpus simul i omniem partem laxatur: aut
soli aperiuntur meatus. Similiter iuxta opinionem se-
cundā, morborum partium similiarium duplex differen-
tia nobis oritur. Nam interdum quidem solis qualitati-
bus alterantur: interdum autem, cum humorum afflu-
xu: qui sanè secundus modus, tumorem conspicuū ex-
citāt. Cæterum vna & item altera harum differenti-
arum, varias differētiās sortitur. Vt autem ad partium
instrumentalium (quarū sanè imbecillitas vel ob mea-
tuum ametriam, vel ob intemperiem nascitur) discutiē-
dos morbos nos cōuertamus, Totius instrumenti fun-
ctio tunc p̄cipuè vitiabitur, vbi pars ipsa, quæ functio-
nis ē causa, ægrotarit. Quāq̃ & reliquarum partium,
illi inservientium, vehementiores affectus, actionem
ipsam impediunt. Oblæsiones igitur quæ omnino pro-
pria ratione, immediatēq; operationem totius organi
offendunt, aut saltem impediunt, ægritudines sunt pu-
tandæ. At si minimè id per seipsas noliuntur, sed ea so-
lū ratione, q̃ primi instrumenti officiunt operationi,
causæ morborum sunt, non itē morbi. Dupliciter autē
solet vnusquisq; morbus contingere in partibus instru-
mentalibus. Nam aut sequitur alios morbosos affectus:
aut contrahitur à prima generatione, Porro vbi pars
aliqua in tumorem attollitur, atq; iccirco meatus illius
occluduntur, si quidem talis particula nullam habeat

Solutio conti-
nui est morbus
cōmuns tam
similibus, q̃
dissimilaribus
partibus.

Similiarū par-
tium morbi, se-
cundū cōstituē-
tes impatibilia
elemēta, astri-
ctio et laxatio.

Similiarū par-
ticularum sin-
guli morbi sūt
duplices: qua-
tenus aut solis
q̃litatibus, aut
accidente hu-
morū affluxu,
afficiunt.

Instrumenti fun-
ctio quando vi-
tiatur.

Affectus pri-
mario lādētes
functionē, sunt
morbi.

Causæ morbo-
rū quæ dicēdæ.

Instrumentalis
morbus dupli-
citer accidit,

**Morbus in for-
matione.**

**Functionis læ-
sio, nō morbus
sed passio aut
symptoma vo-
catur.**

**Causa morbi
quæ sit dicēda.
Morbus in nu-
mero duplex:
cuius utraque
differentia bi-
fariā scinditur.**

**Gurgulio præ-
cisus præbat
uocē pectusq;
& pulmonem
refrigerat.**

propriam operationem, obstructio ipsa meatuum dice-
tur morbus dūtaxat: tumor verò nequaquā, sed obstru-
ctionis causa. Cæterum si affecta pars aliqd munus pro-
prium obtineat, hac ratione tum obstructio ipsa, tum
particulæ tumor, morbus est appellādus. Quemadmo-
dum, exempli gratia, si tunica alicuius venæ, quæ i gib-
bis hepatis est, adeò itumescat, vt eius cavitās obstrua-
tur: tumor quidem ipse, morbus dicetur, q̃ sanguifica-
tionem oblādāt: obstructio autem similiter, quod im-
pediat distributionem. Siquidem qui affectus primò læ-
dunt operationē, ii et sunt, & verè dici morbi merent.
At opationis oblæsio, passio aut symptoma, non mor-
bus, est appellanda. Qui verò ipsam induxit affectus,
morbus absolutè vocatur: sicuti & causa morbifica, q̃
quid ipsum morbum pepererit, si aliam læsionem non
adferat. Attulimus itaq; exemplum morbi, quod in ge-
nere formationis consistit. At in numero, duas differē-
tias morborum assignaueramus: quum scilicet aliqua
particula crescit, aut superabundat. Quarum differen-
tiarum vtraq; rursus in binas alias secatur. Siquidē co-
rum quæ superfluunt, nonnulla planè sunt ex genere
naturalis: vt si cui sextus adnascatur digitus: nōnulla ve-
rò toto genere præter naturam: veluti si in ventre gi-
gnantur vermes, aut in vesica lapis. Similiter deficienti-
um particularum, nonnullæ quidem penitus abolitæ
sunt, nonnullæ verò ex diuinitudo præcisæ: vtrunq; autē,
aut natura, aut morbo. Ex his tamen, quæcūq; functio-
nem impediunt, eadem ratione in morborum genere
continentur. Quæcūq; verò partem aliquam opera-
tioni dicatam, vel refrigerant, vel non satis ei alimen-
ti transmittunt, causæ morborum dicuntur. Quædam
tamen & morbi, & morborum causæ censentur: vt si
gurgulio radicitus præcidatur. Nam & vocem pertur-
bat, & pectus & pulmonem refrigerat. In magnitudi-
ne etiam variū morbi contingunt: vbi scilicet ro-

tum corpus vel pars aliqua, aut in prima generatione aut ob aliquem affectum præter naturā, vel prodigiosam contraxit molem, vel præter modum est immunita. Qui morbi in deprauata compositura cōsistunt, varias differentias sortiuntur. Alii siquidem fiunt, vbi naturalis partium situs variatur. Alii vbi ligamēta nimis soluuntur, ac relaxantur. Alii vbi illa impense fuerint assecta. Quippe imodica linguæ vincula, loquendi mādendiq; impediunt functionem: pudēdorum verò, ob auersum meatū, impedimēto sunt, quo minus procul rectaq; excutiat semē. Reliquum autē est quintum ægritudinis genus, nempe vnitatis solutio, quæ tam similibus q̄ dissimilaribus partibus accidere potest. Nam si in manu, gratia exempli, nervus aliquis præcidatur oīno, talis solutio erit communis, & toti instrumento, & ipsi præcisæ particulæ. Quod si non integrè, sed aliqua ex parte præcisus fuerit, solius nervi propria iudicatur affectio, instrumenti verò nequaq; nisi ex accidenti. Sed pro differentia particularum, continui solutio varia sibi nomina vendicat. Siquidem quæ in osse fit, ab omnibus fractura vocatur. Quæ verò in carne contingit, vulcus, vulnus, atq; ruptura. Quæ nervosis particulis accidit, conuulsio nominari consuevit. Diximus itaq; simplicium differentias morborum. Superest autem nūc, vt ad compositorum dignotionem veniamus. Erit igit iuxta hæresim priorem i particula similari morbus cōpositus, dum illius, hi qui dem adstringuntur: hi verò relaxantur, meatus. At iuxta eos, qui elementa esse alterationi obiecta contendunt, quatuor numero compositi morbi cēsentur: nempe calidus simul & humidus: calidus simul & siccus: frigidus iuxta & humidus: frigidus atq; siccus: dum vtracq; videlicet qualitas excellit plus q̄ naturæ conueniat. Quod si etiā qualitatibus illis plus iusto auctis, accedat pariter humorum affluxus, totidē morbi nascuntur, differentes nimirum ab illis, qui inua-

Morbus in magnitudine.

Morbi in deprauata compositione.

Vnitatis solutio utrisq; partibus existit morbus cōis.

Solutionis continui species diuersæ, pro differentia particularum

Similariū morborū cōpositorum differentiarum quatuor, iuxta cōstituētes partibilia elementa

Affluxus humorum gignit quatuor differentias morborum compositorum.

Solito continui. dunt sine humorum colluuiæ. Similiter solutio cōtinui miscetur morbis compositis secundum vnam & alteram sectam, necnon simplicibus, quorum à principio mentionem fecimus. Porro omnes inflammatae simul & exulceratae particulae, tres quidem necessariorum: nunquā quattuor morbos patiuntur. Voco autē impraesentiax inflammationem, rubentem renitentemq; tumorem, & qui dolorem inferat. Quia verò omnes ferè id genus tumores, mutuo inter se commiscuntur, raroq; reperire aliquē ipsorum purum atq; syncera licet, necessariorum dicendum est, Erysipelas, herpetem, carbunculum, cancrum, atq; alios id genus tumores, esse compositas ægritudines. E quibus carbūculus quidem, semper cum vlcere innadir: cætera verò, iterdum citra vlcus infestant. Gignitur autem erysipelas à ruffa bile: ab atra cancer: inflammatio à sanguine: à pituita deniq; oedema, existens tumor laxus & cedens. Qui humores tametsi specie sint humidi, potentia tamen non omnes humidi sunt. Quippe atra bilis sicca est & frigida: flaua, calida & sicca: vt pituita frigida & humida: ac sanguis deniq; humidus simul & calidus. Igitur de morbis compositis simularium particularum dictum nobis quū sit, ad eos qui instrumenta discruciant, sermonem iam conuertamus. Proprii dissimilariū partium morbi compositi, qui plures atq; diuersas partes simul affligerint: ex accidenti autem, qui vnicam tantum instrumentorum particulam occupauerint: Etenim si lippitudine obsideatur tunica incumbens corneæ, quum lippitudo quidē sit inflāmatio ipsius partis: inflāmatio autē oīs existat cōpositus morbus, nemini dubiū est, lippitudinē futurā ēt morbum cōpositū, tunicae quidē ipsi proprium, ex accidenti verò vniuerso instrumento. Cæterum si pterygium, suffusio, ac deniq; angulorum contractio simul ipsum oculum presserint, constitutio talis, totius oculi dicetur ægritudo composita: quum ni-

Inflammatæ simul et exulceratæ particulae, quor morbos si mul patiantur. Inflāmatio qd,

Carbunculus innadit semper cum ulcere. Tumorū præter naturā singulis sui humores tribuuntur. Humorum quatuor, quali qsq; reperiē sit præditus.

Dissimilariū partium morbi compositi, qui sunt dicendi

Lippitudo est inflammatio tunicae incumbēis corneæ.

mirum vno eodemq; tempore diuersæ particulæ con-
tristentur. Nihil autem refert si dixeris vnicam esse cõ-
positam ægritudinē, an plures, sed in diuersis partibus
constitutas.

GALENI PERGAMENI DE

causis morborum, Liber vnus.

Nunc verò ad morborum qui secundum sectam
generosiores partes similes inuadunt, causas
discutiendas nos conuertamus, idq; à calore immode-
rato auspiciati. Vniuersa corpora plus æquo incalesce-
re solent, vel ex motu improbo, vel ex putredine, vel
ex consortio alterius corporis feruidioris, vel ex astri-
ctione, vel ex alimento ad accendendam caliditatem ac
cõmodo. Cæterum vbi quis immodica exercitatione
vsus fuerit, si calor inde ortus non occupauerit totum
corpus, lassitudinem tantum inducit: videlicet, articu-
lorum & musculorum, ad quos præcipuè mouedi mu-
nus spectat. Si verò extēdatur per vniuersum corpus,
febrim accendit. Ex ira etiam, quæ caloris iuxta cor ē
veluti quidam feruor, vbi is per totum corpus disper-
gitur, solet febris succendi. In tumorib⁹ etiam præter
naturam, vbi humores patrescunt, calor interdum cor-
di sensim cõmunicatur, ac deniq; excitatur febris. Qua
re hîc venit intelligenda secunda & tertia causa caloris
præter naturam. Nam ob putredinem, & ob viciniam
partis contabescentis in iis tumoribus febrilis calor ac-
cenditur. Quarta species causæ consistebat in astrictio-
ne, & quidem meritò. Nam si ob astrictam cutim cohi-
beantur diffilari ea, quæ prius diffilari consueuerant, si
quidem fuliginosa fuerint, in specus cordis conuersa,
eos exurunt, protinusq; febrim accendunt. Calidorū
etiam alimentorum vsus, (in eo enim quintum genus
constituebanus) interdum febrim accendit: sicuti &
acria medicamenta, siue remedia sint, siue deleteria &
contraria. Non autem ex æquo omnes hæc ob causas

Calor immodi-
cus a quibus ac-
cendi occasio-
nibus possit.

Mouendi mu-
nus ad articu-
los et musculos
pertinet.

Ira est caloris
qui iuxta cor
est, veluti qui-
dam feruor.

Febris ex astri-
ctione quomo-
do oriatur.

8
Febrire cum nō
contingat ex
æquo oibus.
Febri gignen-
dæ quæ requi-
santur.

Causas antece-
dentes dici, quæ
in corpore oriū-
tur: vt pro ca-
sarticis, quæ
adueniunt ex-
trinsæcus.
Frigiditatis im-
modicæ, causæ.

Apoplexia vn-
de interdū con-
trahatur.

Epilepsiam vn-
de fieri contin-
gat.

Vinum modi-
ce sumptū, mi-
re calorem au-
get.

Cibi oēs alen-
tes plurimū, im-
modice sumpti
frigidus mor-
bos gignunt.

febricitant: q̄ nec semper illis contingat par quantitas
aut actiuitas causæ: quodq̄; animantium corpora pluri-
mum alterum ab altero differant. Etenim ad hoc vt ac-
cendatur febris in corpore, oportet vt corpus ipsum
sit accomodatū & habile, ad excipiendam febrilem
caliditatem: causa aut̄ efficiens existat valida, tempusq̄;
& patientis proximitatē sortiatur: vt videlicet i actio-
ne immoretur diuti⁹, & passuro corpore superior eua-
dat. Porro causæ quæ in corpore humano præter na-
turam oriuntur, causæ antecedentes vocantur: proca-
sarticæ verò, siue euidentes, quæ extrinsæcus adueniē-
tes occurrant. Frigiditatis etiam plurimæ existunt cau-
sæ: veluti frigidorum propinquitas, alimentorum quā-
titas atq̄ qualitas, astrictio etiam atq̄ laxatio, ociū de-
niq̄ & motus immoderatus: quibus ex occasiōibus cō-
stat etiam ipsum ignem extinguī. Prima igitur species
causæ, occurrans extrinsæcus, siue contactu ipso, siue ēt
potentia, solet frigiditatis morbum inducere. Ob secū-
dam verò, nēpe ob frigidiora alimenta, nonnullos cor-
reptos vidim⁹ attonito aut epileptico morbo, aut alio
quopiam modo refrigeratos, id quod ex ebrietate vel
maximè accidere solet. Quāq̄ vinum modicè haustū,
quum familiare alimentum sit, mirè calorem auget.
In vniuersum autem, omnes optimi cibi, qui animali
plurimum nutrimenti adferunt, si supra modum sumā-
tur, frigidos morbos generāt: sicuti & cætera, quæ na-
tura refrigeratoria quum sint, similiter ingerūtur. Iux-
ta tertium genus causæ, nempe astrictionem, sæpis-
simè corporis habitus etiam refrigeratur: vt quæ inter-
dum sopores graues, veterumq̄; & apoplexiam indu-
cat. Astrictione autem tunc præcipuè torquetur cor-
pus, dum venæ ipsæ & arteriæ, adeò turgēt & intume-
scunt sanguine, vt nullus relinquatur locus inanis, in
quem, vbi dilatantur, ambientem aerem possint exci-
pere. Quo quidē dū defraudantur, natius calor in

bitò ferè extinguitur. Proinde qui sic sunt affecti, actum destituuntur motu sinul & sensu: id quod Hippocrates significasse videtur, dicens: venarum (hoc è arte riarum) interceptiones statim vocem eripere. Igitur cordis calor per meatum gutturis, cum ambiente nos aere commercium habet. Quam viam si præcluseris, illico præfocaueris animal. Calor autem qui in omnibus est arteriis, per cor quidem, quatenus viam habet ad fauces, & per vniuersam cutem, in circūfluum aerē transpirat: ac ventilatur quidem, dum attolluntur arteriæ: purgatur verò à fuligine, dum contrahuntur. Atq; utroq; horum, naturalis ipsius modus seruetur. Si igitur tali motionis vicissitudine ob astrictiōē destituatur arteriæ, necessum est calorē extingui, corpusq; omnino refrigeratum emori. Cæterum si corpus referat fuliginoso excremento astringatur, aut excitabitur febris, aut extinguetur calor natiuus: sin verò halituofo vapore sanguinis, aut fiet corpus ipsum plethoricū, aut eius calor increfcet. Sed quemadmodum astrictio sæpius frigefactionis est causa; sic etiam & rarefactio, vbi plus q̃ ex vsu sit, dissipat dispergitq; natiuum calorem, frigidius efficit corpus. At verò, perinde ac astrictio ipsa interdum vniuerso corpori, nonnunq̃ alicui eius parti accidere solet: eodem etiam modo habet & rarefactio. Porro quæ extrinsecus admouetur, partem ipsam raram, vel constipatam reddere possunt. At vincula arctissima, & vita membrum priuāt, & ipsum impensè refrigerant. Sed iam de siccis affectibus opportunum est vt dicam⁹. Si quis multo magis diffletur, q̃ pro modo alimenti assumpti, vtaturq; cibis siccioribus, facillè in siccam ægritudinem delabetur: præsertim si curis & anxietatibus, necnō vigiliis torqueatur. Sicca èt tēperies aeris, balnea quæ desiccandi vī obtinēt, necnon medicamēta, quæ itus & foris administrata, exiccandi possidēt facultatē, sicut corpora exiccāt. Humidorq; mor

Arteriarū interceptiones cur vocē eripiant. Suffocatio q̃ accadat.

Calorem cordis vētilatū dilatatione arteriarū: purgari cōtractione eorundem.

Astrictio sæpe frigefactionis est causa. Rarefactio quæ ratione refrigeret.

Admotæ extrinsecus. Vincula arctissima, vita membrum priuāt.

Siccæ intemperies cause.

Humidæ intemperatiæ causæ.

Compositorum morborum causæ compositiæ sunt.

Contrariis intemperantiis corpus nostrum si mul posse affici.
Inæqualis intemperies quæ sit dicenda.

Humorum singulorum temperies.

Tumores partium variari, partium humorum differentius fluentium.
Facultates naturales sunt quatuor.

Excrementum omne qualitate aut quantitate infestare: semperque a fortioribus ad partes imbecilliores protrudi.
Cutis est omnium imbecillima pars.

box oēs sunt causæ contrariæ: nepe maxima ciborum humectantiū colluuiēs, molliuscula viuendiro, animi summa trāquillitas, ac deniq; balneæ dulciū vltus immoderatus, maximeq; post cibum. Ad idem facit desidiōsa vita, pluuiarum copia, humida temporis cōstitutio, ac breuiter, humectantia medicamenta. Iam verò causæ compositorum morborum, similiter compositiæ sunt. Si enim calida simul & sicca in vnum aliquando conspiciant, calidus simul & siccus sequetur morbus. Idem ē cogitandum & in aliis combinatiōibus. At sæpius causæ natura similes corpus ipsum immutant. Plerumq; tamen viribus pugnant contrariis: ita vt aliquando contingat corpus simul fieri calidum atq; frigidum, sicuti & siccum & humidum, plusq; naturæ conueniat: etiā si minimè id fieri posse videatur: quæ inæqualis intemperies vocatur. Aduertendum autem est rursus, corpora ipsa interdum à solis qualitatibus alterari, quandoque etiam, ab illis quidem, sed accedente aliquo affluxu, humido quidem specie, facultate verò non item. Flaua si quidem bilis potestate est calida & sicca: atra, sicca & frigida: sanguis, humidus atq; calidus: pituita, deniq; frigida & humida. Quorum humorum singuli, interdum synceri & puri, interdum inuicem misti, solent in imbecilliore partem confluere: ob idq; tumores partium variantur. Etenim quum quatuor sint facultates, quibus quælibet pars tum animalis, tum plātæ prædita est, attractrix, retentrix, alteratrix, expultrix: excrementūq; omne aut qualitate, aut quantitate offendat: nec sit par robur omnium particularum: semper quæ fortior est, excrementum ipsum ad imbecilliores propellit. Omnium autem imbecillima est cutis, totius corporis excrementa recipiens. Assignatis iam causis morborum similiarium particularū, ad organicos deinceps nos cōuertamus, exordium à formatione vitiata sumentes. Euariat enim interdum naturalis figura, dum ob ma-

ximam materiæ colluuiem, aut ob qualitatem incōmo-
 dā, impedito seminis motu, in vtero deprauatur ipsius
 fœtus formatio. Secūdo autem potest vitari alicuius
 particulæ forma, dū ifantes nō rectē ab obstetricibus
 excipiuntur (facile siquidem peruertuntur, molles flu-
 xilesq; quum sint) aut ruditer inuoluuntur fasciis, aut
 lac tabefactum sugunt, aut perperam educantur, siue
 inepta victus ratione, siue exercitiis intempestiuis. Cru-
 ra quippe, ob incumbentium eis corporum pondus, in-
 terdum in exteriorem, nōnunq; in iteriorem partē tor-
 quentur: idq; pro natua ipsorum inclinatione. Nā qui-
 bus rectiora sunt, q̄ ordo naturæ postulet, magna ex
 parte fiunt vatii: vari autē, quibus magis curuata. Vo-
 co enim vatum, cui in exteriorem partem crus verti-
 tur: varum cui econuerso. At postea q̄ adoleuerint, sæ-
 pe ob repletionem immodicam, aut ob alimenti penu-
 riam, figuram naturalem permutant, idq; primaria ra-
 tione. Illud enim in elephantiasis: hoc in tabe perspicuū
 est. At ob resolutionem neruorum, distentionem, inflā-
 mationem, aut scirrhum, naturalis membri figura ex
 accidenti vitatur. Siquidem in iis qui altera parte sunt
 resoluti, membrū trahitur a musculis actionem facien-
 tibus: at in iis quos in altera parte conuulsio exercet,
 aut phlegmone, aut scirrhus, aut dura cicatrix, pars sa-
 na trahitur ab affectis musculis. Cavitates partium atq;
 meatus pereunt, vel offenduntur, q̄ nimirū coalescāt,
 aut constipentur, aut obstruantur, aut confringantur,
 aut in sese concidant. At facultatis retentricis motus i-
 moderatus solet esse causa constipationis: quemadmo-
 dum laxitatis, operatio expultricis immodica, retētri-
 cisq; languor. Exasperantur læuia, & læuigantur aspe-
 ra (nam hæc ad formam vitiatam pertinent) illa qui-
 dem ob acres humores, aut inedicamenta abstergētia:
 hæc verò ob pinguitudinem succi, viscositatem ue-
 Secundi generis, hoc est vitiati numeri, causæ sunt, si

Formā mēbro
 conueniens a
 quibus causis
 possit vitari.

Vatii qui fiāt.

Vari qui fiant,
& qui dicātur.

Elephantiasis.
Tabes.

Resolutis alte-
ra parte muscu-
lis, membrum
trahitur a reli-
quis, q̄ in actio-
ne versantur.
Conuulsi alte-
rius partis mu-
sculi, ad se par-
tem valentē al-
teram trahunt.
Constipationis
causa.

Laxitatis cau-
sa.

Numeri deprauati causæ.

quidem numerus sit diminutus, sectio, aut putrefactio, aut immodica refrigeratio: sin autem aliquid supercreuerit, quod non sit e numero partium natura constans, formamq; naturalem sortiatur, abundantia optimæ materiæ erit causa. Quod si id ipsum præ se formam non naturalem ferat, materiæ qualitas non naturalis etiam erit in causa. Vtrobique tamen vires validas esse oportet. Alioqui nec conformari poterit quod est vitale: nec extrudi quod vitiosum existit. Natura enim vtriusque molitur. Magnitudo partium augetur (i ea enim oblatum tertium genus constituebamus) à copia materiæ benignæ, necnon à potentia robore: imminuitur autem à causis contrariis: vel ob sectionem, vel exustionem, vel putrefactionem, vel denique ob frigectionem ingentem. Quartum verò morborum instrumentalium genus, quod in praua compositione consistit, iterdum ob repentinam improbamq; agitationem contingit: iterdum ob articulorum humiditatem immodicam: quæ doque ob euersionem superciliorum in ipsis articulis: est quum ob relaxationem compositio vitietur, quemadmodum in intestinorum lapsu, quæ laxato peritoneo: in scrotum descendunt. Ex his itaq; & aliis plurimis occasionibus, organorum compositio peruertitur. Nunc verò alteri generis causas examinemus, quod vtriusque, tam corporibus similaribus, q̃ instrumentalibus communiter accidit: id enim est vnitatis solutio. Quæ quidem si carni accidat, vlcus aut vulnus vocatur: sin autem ossi, dicitur vel fractura, vel caries: quæ ab erodentibus oritur humoribus. Ad capitis ossa, complura instituta sunt nomina. Collisio, magna ex parte accidit carni: quæ & in osse nonnunquam etiam contingit, idque maxime in pueris, sub irruente extrinsecus aliquo violento, valido, ac duro corpore. Ad solutionem etiam continui pertinent & ruptio, & conuulsio, hæc in nervis, illa in carne consistens: quæ causam suæ generationis habent.

Magnitudinē
partis quæ cau-
se possint auge-
re, ac minuire.

Compositio par-
tis vitiosa vn-
de accidat.

Enterocæces ge-
neratio.

Solutæ vnitatis
causæ.

Caries vnde
gignatur.
Collisionis
causæ.

Ruptio.
Conuulsio.

repentinum, validum, atq; inæqualem motum. Vt igitur paucis expediam, omnium huiusce generis ægritudinum causæ, nonnullæ quidem occurrunt extrinsecus: nonnullæ ab ipso corpore emanant. Porro extrinsecæ sunt, ea omnia quæ percutere, collidereq; sunt apta. Quæ verò à corpore emergunt, sunt immodicæ inordinateq; animalis motiones, ac præterea humores vitiosi, erodendi vim possidentes. Hæ itaq; sunt simplices ægritudines similaribus partibus, organicisq; communes: ac præterea ipsarum simplices causæ. Compositas autem ægritudinum causas, non est admodum inuenire difficile, quàm nimis ex his quas diximus, constituant.

G A L E N I P E R G A M E N I

de Symptomatum differentiis, Liber vnus.

OMnis præter naturam affectus, aut morbus est, aut morbi causa, aut illius synaptonia. Est autem morbus, affectus quidam præter naturam, functionem lædens. Cæterum differt affectus à morbo, nam ille quidem extenditur etiam ad sanos & neutros: hic verò solum circa ægrotantes versatur: quum nimirum sanitati contrarius existat. At ab utrisq; dissidet, quod Græci pathos, Latini passionem appellant. Est enim passio motus qui ab altero fit in alterum: ita ut agentis motus dicatur actio: motus verò eius quod affectum est, passio. In summa, ipsum affici, quodammodo idem quod pati est. Differt itaq; ab affectu passio, ipsius tantum motionis ratione. Quandoquidem in ipso verti & mutari, præterea alterari, & moueri, passio habet generationem: in eo verò quod manet, prorsus affectus consistit. Proprie igitur affectus dicitur passio ià facta: nō autem quæ etiamnum fit. Sed quemadmodum ad sanos & ægros ipse affectus extenditur, sic etiam & passio: quo quidem nomine à morbo similiter differt. Rursus affectus ipse, alius quidem naturalem actionem efficit: alia verò euertit & labefactat. Est igitur sanitas,

Affectus præter naturā est triplex.

Morbus est affectus præter naturā functionem lædens.

Affectus & morbus ut differant.

Passio quid.

Actio quid.

Affici quoddammodo est idem quod pati.

Passio versatur in motu.

Affectus consistit in permanentia.

Passio, ut affectus, ad sanos extenditur.

Sanitas quid.

naturalis quidam affectus functionis author : morbus autem, affectus præter naturam, oblatæ functionis causa. At passio, motus est in materia, q ab agente fit, actio

Causa quid.

Causa multiplicitè dicitur.

Causæ rationem eius sine quo non, obtinētes. Fieri per se, & ex accidenti, quid sit.

Morborum causæ.

Morbi primo lædūt functionem.

Symptoma est quod sequitur morbum.

Symptoma largè sumptū quid sit.

Symptoma ab actione & morbo quo differat.

Symptoma, propriè dictum, est triplex.

verò, ipse motus agentis. Quod autem suapte natura aliquid confert ad eius quod fit generationem, causa vocatur: quæ quidem & ipsa multiplex est. Nam materia, utilitas, scopus, instrumentum, initium deniq; unde proficiscitur motus, hæc omnia causæ dicunt. Quæ verò nihil conferunt, sed tamen ab iis quæ conferunt seiungi non possunt, hæc eius sine quo non, rationem obtinent. Aduerte autem, aliquid fieri per se, idem esse quod primò: ex accidenti verò, quod secundò. Ut si quis digito vnum calculum moueat, à quo moueatur & alius: per se quidem dicetur mouere primum: ex accidenti autem secundum. Ad eundem igitur modum, qui affectus præter naturam suapte ratione actionem non labefaciunt, sed per morbos à se productos, ii non morbi, sed morborum causæ, sunt appellandi. Morbi enim sunt, qui primò lædunt actionem. Porro quod morbum veluti vmbra, sequitur, id morbi symptoma vocatur: quemadmodum functionis læsio. Est autem symptoma largè sumptū, omnis à naturali statu mutatio: ob idq; quicquid animali præter naturam accidit, ea significatione est symptoma. Quamobrem morbus quadantenus etiam symptoma dicitur: sicuti & causa præter naturam. Differt autem à passione symptoma (tamen si interdum in idem coeant) quæ passio quidem, omnino in motu versetur, sitq; interim secundum naturam: Symptoma verò, non in motu tantum, sed in habitu etiam & permanetia esse possit, omnino præter naturam. A morbo verò differt, quoniam neq; affectus necessariò est, neq; actionem ex necessitate lædit: quæ sanè ad constituendum morbum desiderantur. Porro symptoma tria propriè stricteq; sumpta (de quibus agere est animus) differentia triplici continentur. Alia siquidem no

stri corporis sunt affectus: alia functionum læsiones: alia ambo hæc comitantur: ut sunt excrementorum immodicæ tum excretiones, tum suppressiones. Cæterum sub actionis læsione, priuatio quoque mihi inaudiat, quæ admodum immobilitas, insensibilitas, atque cruditas: quæ quidem actionum læsiones sunt. Has igitur symptoma tum differentias deinceps examinemus, ab actionis læsione auspiciati. Actionum læsio duplex est. Altera enim ad animalem: altera verò ad naturalem functionem pertinet: Actiones siquidem duplices potissimum numerantur: naturalis videlicet & animalis. Rursus animalis diuiditur in sensibilem, motiuam, atque gubernatricem. Quorum membrorum singula rursus in alia secantur. Sensibilis quippe animæ functio, quinque differentias sortitur, visuam scilicet, olfactoriam, gustatoriam, auditoriam, atque tactricem. Motiua autem facultas, quum vnicum instrumentum habeat, vnum tantum habet motionis modum: variatur tamen pro particularium instrumentorum diuersitate: Vltima functio animæ, quam diximus esse gubernatricem, in imaginatricem, ratiocinatricem, ac denique memoratricem diducitur. Igitur noxæ omnium actionum sentiendi, communes quidem, vniuersalesque sunt, insensibilitas, & difficultas sensus: particulares autem, quæ in singulis sensibus reperiuntur: quemadmodum in oculis cæcitas, & caligo: in auribus surditas & hebetatio: atque in aliis similiter, vbi videlicet actio abolita est, aut deprauata, aut diminuta. Cæterum tactus in actione sua, quæ reliqui sensus, multo grauius symptoma, quam ab extrinsecus occurrentibus, tum vel maxime ab affectibus interioribus, solet recipere. Etenim alii sensus, non ab internis, sed ab externis affectibus, in functionibus suis præstantur: ac ne id quidem per se, sed ex accidenti, quæ videlicet in se habeant facultatem tangendi. Est enim tactus omnibus sensoriis sensus quidam communis: reliqui verò quatuor,

Actiōnū læsio est duplex: altera ad animā, altera ad naturā functionē pertinet.

Actio animalis est triplex.

Sensibilis animæ functio est quintuplex.

Motrix functio variatur, pro instrumentorum diuersitate.

Gubernatrix animæ functio est triplex.

Sentiendi actionum læsiones communes & particulares.

Tactus quæ reliqui sensus, multo grauius afficit. Sensus reliqui a tactu, ab externis contristantur dumtaxat: idcirco ratione tactus quem possident.

Tactus est omnibus sensoriis cōis sensus.

Sensus conuulsi symptoma est vigilia, vternusq.

Motricis facultatis symptoma est triplex.

Motus deprauati species.

Epilepsia quid.

Apoplexia quid.

Imaginatricis facultatis symptoma.

Ratio cinatricis facultatis symptoma.

Amentia quid.

Fatuitas quid.

Delirium quid.

Ratione interdu vitiatur, imaginatione atq.

memoria illæsis: sicuti contra

Naturalium facultatum singulis duplex tribuitur symptoma: nempe & abolitæ functionis, &

non rite obiq.

suo quisq; tantum est proprius. Quamobrem oculi sæpissime graui dolore cruciantur, contristato sensu tangendi. At verò vigilia & vternus sunt ipsius cōmunis sensus symptomata. Motricis facultatis triplex reperitur symptoma: immobilitas: diminutus motus: ac deniq; deprauatus. Cæterum deprauatus motus, alius tremulus est, alius conuulsus, alius palpitans, alius deniq; vibrans. Porro si conuellatur vniuersum corpus, aiaq; princeps potentia simul sit impedita, id symptoma epilepsia vocatur: apoplexia autem, dum totius corporis perit omnino motus, simulq; principes actiones cohibentur. Hæc itaq; motuæ actionum sunt vitia. Proximum est, vt gubernatricium functionum iam offensas tradamus, ac primum imaginatricis. Hæc enim interdum tota corrumpitur, exoluiturq; , quemadmodum in catalepsi: interdum autem vitiatur, vt in delirio: est quum deficit atq; debilitatur, quod in lethargo contingit. Sic etiã ratiocinatio, nunc exoluit penitus, ipsumq; symptoma est amentia: nunc deficit atq; remittitur, vocaturq; id symptoma fatuitas: nunc læditur ac deprauatur, quod symptoma vocant delirium. Plerumq; siquidem in vtriusq; simul cōsistit delirium, tum parum probe imaginando, tum parum aptè ratiocinando. Est quãdo dñtaxat in altero. Interdum quippe ratio vitiatur, imaginatione simul atq; memoria illæsa. Quemadmodum etiam ratione integra, contingit tunc imaginatio nem, tum memoriam vitiari. Quod autem in memoriã di potentia consistant vitia, nemini opinor obscurum. De animalium itaq; actionum symptomatis dictum nobis quum sit, ad naturalium symptomata examinanda nos conuertamus. Methodus autem eorum inueniendorum est, naturalium facultatum cognitio: in quarum singulis duplex reperitur symptoma, alterum abolitæ functionis: alterum non rite obitæ, quod quidem hoc est duplex: alterum quod in diminuta, alterum quod in vitiata

vitiata actione consistit. Exemplum autem ponamus in concoctione ventriculi, quæ interdum quidē tota corrumpitur: interdum remittitur ob imbecillitatem: interdum vitiatur. Quorum primum symptoma dicitur cruditas: secundum, concoctionis tarditas: tertium prauitas & vitium vocatur. Porro appetitricis functionis symptomata sunt abolita appetentia, & inmodica cibi cupiditas. Circa nutritionis actionem, si scopum minimè attigerit, atrophia & phthisis accidunt. Vitiata verò nutritionem sequitur leuce, ophialis, aloppecia, & reliqua id gen^o symptomata. Quum igitur naturales facultates sint quatuor, attractrix, retentrix, alteratrix, expultrix, sanè in singulis naturalib⁹ organis, quatenus naturalia sunt, duodecim oriri possunt symptomata: tribus videlicet in vnāquāq^{ue} facultatem congestis: in animalibus verò, quindecim. Quod si animale instrumentum simul & mouendi, & sentiendi vires obtineat, duodeviginti symptomatum formas habere poterit. Ventriculus igitur, duodecim sortis symptomata, quatenus est cōcoctionis organum: totidēq^{ue}; quatenus pars similis, quæ nutriri desiderat. Siquidē omnes particulæ quæ nutrimentum suscipiunt, duodecim recipiunt symptomata, nempe tria (vt diximus) secundum singulas facultates. Vbi videlicet aut nihil trahunt, aut languidè, aut vitiosè: vbi id quod attractum est, aut non retinent, aut lāguidè, aut vitiosè: vbi quod iam retinuerunt, aut penitus crudum relinquunt, aut diminutè concoquunt, aut in alienam qualitatem conuertunt: vbi excrementa ipsa expellere nequeunt, aut lāguidè, aut perperam, hoc est, citius aut tardius, q̄ animali expediat. Ex quibus vtiq^{ue} accidit particularis, non nutriri, aut imbecilliter, aut perperā & vitiosè. Quod verò ī facultatibus similarium particularum dicimus, id etiam intelligendum est, in iis quæ ad instrumentales spectant. Porro alteratrix facultas in ventre tunc

Ventriculi actio
nis symptoma
ta sūt, cruditas
cōcoctionis tar
ditas, prauitasq^{ue}.
Appetitricis fa
cultatis sym
ptomata.
Nutritrix ac
tionis sympto
mata.
Facultates na
turales sunt
quatuor.
Naturaliū in
strumentorum
singulis, duode
cim attribut
symptomata.
Animali instru
mento quindecim
esse posse
symptomata.

Similariū par
ticularū singu
lis quæ nutri
mentum susci
piūt, duodecim
attribuuntur
symptomata.

Alteratrix fa
cultas, ventri
culi, quando
abolita, & im
becilla, & de
praua dicat^{ur}.

abolita censetur, vbi cibus talis relinquit, qualis assumptus est. Imbecilla autem dicitur, quæ tardè concoctionem absoluit, sicuti deprauata, quæ in malignam qualitatem cibos ipsos permutat. At absoluta concoctio dicitur, vbi cibus in qualitatem animati familiarem mutatur. Aduertendum tamē hoc loco magnopere est, alteri symptomati, alterum nonnunquam succedere. Siquidē iniustum complectendi tempus cōtinuò sequitur diuinuta concoctio. Præterea celeris deiectionis ciborum inseparabilia symptomata sunt excrementorum humiditas, alimentiq; per corpus inminuta digestio. Corruptelam cibi sequitur necessariò quidem, excremento & fœtor: non necessariò verò mordicatio & inflatio. Atq; horum sanè omnium iam dictorum symptomatum, quæ in actione oblæsa consistunt, sicuti & aliorum duorum generum, sciendum est, morbos causas existere. Symptomatum quæ in corporū consistunt affectibus, primæ differentię sunt quatuor. Siquidē alia ad visum, alia ad odoratum, alia ad gustum, alia deniq; ad tactum pertinent. Etenim quæ ad visum spectant, ea sunt quæ consistunt in colore præter naturam: siue is vniuersum corpus occupet, vt in arcuatis: siue aliquam eius partem, vt in carbunculis. At quæ pertinent ad odoratū, ea in respiratu ac perspiratu deprehenduntur: vt si, gratia exempli, quod indies expirat è corpore, siue per arteriam asperam, siue per vniuersam cutim, graueolens ac putre sentiatur. In gustu autem symptomata sunt, omnes saporēs qui ægris præter solitum accidunt: vt si alienas qualitates percipere sibi videantur. Tangibiles differentię sunt, vbi ea quæ subiiciuntur tactui, genuinam mutarunt constitutionem: vt si cutis quæ antea erat mollis, deprehendatur dura, rigidaq;: aut è cōuerso. Quum igitur omne quod naturale est, ex cōmoda temperatura nascatur: vtiq; id quod præter naturā existit, ex aliqua intemperie orietur. Quamobrē, quæ

Symptoma
vnum succedit
alteri.

Deiectionē ci-
borū celerem
quæ sequant.

Corruptelam
ciborum quæ
sequantur.

Merbi, quorū
sint causæ sym-
ptomatum.

Symptomatum
quæ in corpo-
rum cōsistūt af-
fectibus, prima
differentia est
quadruplex.

Naturalia om-
nia ex cōmo-
da temperie na-
suntur.

hæc omnia quæ diximus, prorsus præter naturam sint, merito intemperiei feruntur accepta. Atqui intemperies omnis est morbus: ergo liquido constat, has quatuor symptomatum differentias, à morbis generatione contrahere. Quæ verò vel excernuntur à corpore, vel retinentur in eo præter naturam (hæc enim ad tertium pertinebant genus symptomatum) aut tota quidem substantia, aut qualitatibus tantum, aut denique quantitativis, à naturæ ordine digrediuntur. Atque ipsa etiam vel immediatè sequuntur morbos, vel mediatè: intercedentibus scilicet symptomatibus aliis. Iam verò hæmorrhagia, quod ad excretam substantiam pertinet, toto è genere præter naturam, fitque; aut aperto vasis osculo, aut rupto vase, aut erosio. Etenim vulnus, ruptura, erosio, proprii similium partium sunt morbi: at apertio osculorum, ad instrumenta pertinet. Accidit enim interdum ipse sanguinis fluor ob retentricis facultatis infirmitatem: interdum quia expultrix immodicè movetur: nonnunquam ob utriusque functionis noxam. Sic fit etiam muliebri profluvium, aut ob dictarum functionum symptomata, aut quia sanguis est nimis serosus atque subtilis redditus. Sciendum tamen est, nihil eorum quæ tempestivè, hoc est ad animalis commodum, circa corpus contingunt, etiam si toto genere præter naturam sint, verè dici symptoma (quale utique est id quod sequitur morbum, atque in læsione actionis consistit) quum nimirum unumquodque eorum sit elegans & absolutum opus naturæ, tametsi ad alterum symptomatum genus, nepe ad affectum præter naturam reduci possit: ut si sanguis per nares, aut hæmorrhoidas, commodè erumpat.

Intemperies omnis est morbus,

Hæmorrhagia quibus modis fiat.

Symptomata dici non debent quæ tempestive atque ad animalis commodum circa corpus contingunt, vel si toto sint genere præter naturam.

GALENI PER GAMEMI DE
symptomatum causis. Liber primus.

IN sensili actione triplex symptomatum genus comprehenditur. Vnum, quum primum sensus instrumentum quippiam perpeffum est: alterum, quum sen-

Sentiendi actio triplex symptomatum generum triplex ipsa admittit.


terum oculum claudimus, dilatatur alterius pupilla, & spiritus antea ambobus particulatim distributus, vniuersus in vnum confluat. Idcirco quibus suffusus altero oculo clauso pupilla clarior apparet, ii sperare debent fore aliquando, vt visum, punctione facta, recuperent. Quibus autem non dilatatur, ii omni spe recuperandi vilus sunt destituti. Vnde liquidò constat, spiritum aliquem animale a cerebro demitti ad oculos. Si igitur pupilla amplior fuerit, spiritus implere illà non potest: quare diffundi ipsum, dissolui, dissipariq; est necesse. Si verò angustior, cogitur, & cōstringitur, ac densior fit spiritus. At coactus spiritus cōstrictusq; ad facilitatem sensus conducit plurimum. Ediuerso dissolutus dissipatusq; sentiendi difficultatem inducit. Est autem albugineus humor veluti propugnaculum crystallini, cuius et non nihil essentiam iuuat. Quamobrem, si inminuatur quodammodo, ipse crystallinus arefcit ac super ipsum rhagoides tunica corrugatur & cōcidit: sic vt visio ipsa oblādatur: nimirum externo lumine, per exiguum medium, humori crystallino occurrente. Iam verò instrumentum visionis, citra tædium tolerare splendorē nō potest. Ob idq; rhagoides tunica illi est obiecta, nigra existens simul atq; cœrulea, quibus coloribus ocul' potissimum recreatur, quem infestauit splendor. Verum eo arctatio pupillæ, quēadmodum amplitudo, si quidē ab humiditate superflua trahat ortum, facilem: sin verò à siccitate quadam inexpugnabili, desperatam curationem sortitur. Porro si rhagoides tunica ita sua continuitate soluator, vt tenuis ille humor prolabatur ad exteriora, maxime visio labefacta. Ad hæc si humor ille albugineus se ipso crassior sit redditus, exactam cernendi aciem multo obtusiozem reddet. Quod si plurimum aucta sit crassitudo, visum omnino prohibebit. At si non totum foramen à contento ibi crasso corpore obtenebretur, sed relinquatur eius aliqua particula

Oculo altero clauso, cur dilatetur alterius pupilla. Suffusorū, qui nā possint visum recipere, & qui minime spiritū animale a cerebro demitti ad oculos.

Spiritus cōstrictus, coactusq; plurimū cōducit ad sensus facilitatē: at dissolutus, contra obest. Albugineici humoris usus.

Rhagoidis tunice usus.

Pupillæ coarctatio quando facile, & quando ægre curationē recipiat. Rhagoidis solutio quādo visum exoluat.



Obiecta quando fenestrata videantur.

Videre plane distantia obiecta, quibus contingat.

Ceratoides tunica.

Ictericis putant omnia obiecta pallere.

pura, videre licebit per illam externas res, idque nihil deterius quam antea: sed vnamquamlibet solam. At si in pupillæ centro exigua consistat suffusio, maneatque partes quæ in circuitu sunt, puræ, qui sic sunt affecti, quicquid aspiciunt, id veluti fenestratum putant. Vbi verò humor iter crystalloidem atque tagoidem medius, proprium colorem mutarit, si quidem ad fuscum declinet, arbitrabitur quis se per nebulam, vel per fumum etiam videre. Sin alio quouis colore inficiatur, huius quoque imaginem, ea quæ spectant, referet. Præterea, quibus adeo absoluta est cernendi facultas, ut ne minimum quidè visibile eos latere possit, si vapores à vetriculo sursum ferantur, hos symptomata suffusioni similia infestabunt. In vniuersum autem, vel parua, vel magna symptomata accedent, pro ipsius magnitudine affectus. Cui spiritus animalis simul & multus fuerit, & æthereus, is, res quæ porro distant, & videre, & discernere potest. Cui verò paucus quidem fuerit, sed purus, is ut res propin quas planè discernit, sic distantes haudquam videt. Quod si humidior simul fuerit & multus, res distantes videt quidem, sed non ad vnguem discernit: quemadmodum cui humidior simul fuerit & exiguus, is neque exactè, neque porro videre potest. Ceratoidis tunicæ pars illa quæ pupillæ est obiecta, si crassior densiorque sit, aciem hebetem reddit. Si verò humidior densiorque fuerit, non modo reddit visum obtusum, sed etiam efficit, ut qui sic est affectus, putet se per tenebras, aut nebulam, aut vaporem aliquem, aut per fumum res ipsas cernere. At si humores non multitudine sed colore peccauerint, securi dum eiusdem coloris naturam ipsa cœcutiētia oborietur. Proinde qui morbo regio laborat, quicquid videt, id pallere arbitratur. Quibus autem ea ceratoidis pars insigniter ulcerata est, aut vulnerata usque adeo, ut ipsū vulnus ad interiora pertingat, ii magna ex parte obocantur. Vidi tamen equidem puerum, quum iuxta pu-

pillam pūctus fuisset stylo, sic ut aquosus humor efflueret, ac tota omnino cornea corrugaretur, visum (icredibile quippiam) recuperasse: instaurato scilicet paulatim humore qui per vulnus effluxerat. Solius etiā corneæ ipsius corrugatio (qualis senectute confectis solet semper accidere) similiter visum offendit. Cæterum si pupilla simul sit imminuta, scire licet, aquosum quoque humorem imminutum existere: sin verò æqualis permanferit, ad solam ceratoidem affectus pertinet. Corneæ igitur morbi, si fuerint magni, in totum visionem impediunt: maximè si vel phlegmone, vel suppuratione, vel scirrho (quatenus instrumentum est) iſeſterur. Inhærens verò membrana phlegmone obſeſſa, ex accidenti quoque impedire potest visionem. At chymosis, vnguisque, non ex accidenti, sed primaria ratione pupillam ipsam obscurant: quemadmodum genarum ingentes tumores præter naturam.

Gravis auditio surditasque; animanti euenire solent, aut ob auris partem aliquam; aut ob neruū à cerebro descendentem: aut ob cerebrum ipsum, si ea in parte, vnde neruus oritur, affectum fuerit. Igitur nerui cerebrique offensa in his, haud aliter quàm in oculorum affectibus, accidit. Reliquarum verò partiū noxæ, illis ad portionem respondent: verum non omnino similis læsio existit. Partes itaque ad auditum pertinentes, quatenus similes sunt, octo intemperaturis vexantur, ac præterea solutione continui: quatenus autem instrumentales, tum hac, tum obstructionibus inuaduntur, ob tumorem aliquem præter naturam, aut ob sordem obturantem auditorium meatum.

Quum autem lingua sit duplici facultate prædita, ac per vnam quidem sentiat, per alteram voluntariè moueatur: contingit sanè ipsam, aut minimè sapes percipere, aut deprauatè: idque ob tunicæ, quæ illam inuoluit, vel corporis ipsius, vel mollium neruorum, vel ei-

Visum recuperare puerum, cui albugineus humor effluebat, corneaque oino corrugabatur. Galenus vidit.

Chymosis.

Vnguis oculi.

Auditus symptomata vnde proficiantur.

Linguae inesse duplicem facultatem: sensitiuam, atque motricem.

titudinem, aut solitæ secretionis suppressionem antecessisse necesse est. Igitur eius causa coniuncta, affectus nervi est talis, ut facultatem illi à præcipe parte missam, impedire possit. Atqui impeditur, si nervus meatu aliquo præditus, vel obstructus sit, vel compressus. Si verò meatum non habeat, sed uti Solis radii per aquam, aerem vè, transeunt, eodem modo facultas à principio per nervorum corpora permeet, ipsa in transitu præpedietur, si ad immodicam crassitudinem nervus ipse pervenerit: id quod illi continget, aut crassis viscidisq; succis nutrito, aut violento frigore perfrigerato.

Nervi ipsi sine neferaminibus præditi, an minime, Galenus hæret.

Torpescent etiam nervi, ubi vel læqueo, vel manibus constringuntur: aut extrinsecus à vicinæ partis phlegmone, vel scirrho comprimuntur: aut ubi luxatis fractis' uæ ossibus fiunt arctiores. Præcipio igitur stupidi fiunt, deinde omnino & sensum et motum amittunt: quod vitium ipsorum, dicitur paralyssis: à torpore sola magnitudine differens. Quod si omnes occupaverit nervos, repente uniuersum corpus sensu & motu priuabit, succedetq; citissima mors, quæ prohibita sit respiratio. Si spiritus præcipium lædat, solæ partes capitis, quo ad vixerit animans, & sentire & moveri possunt. Si tamen cerebro quoque noxa ipsa acciderit, qui sic afficiuntur, his omnium partium perit simul & * motus & sensus. Vivere autem possunt utriusque tanto tempore, quanto viuunt ii qui præfocati strangulantur.

Paralyssis à torpore sola magnitudine differt.

Spina verò in inferiori loco affecta, nepe sub ea nervorum propagine, à quibus thorax attollitur, si quidē ingens fuerit affectus, partes inferiores omnes subito & sentiendi & mouendi facultate priuantur. Si verò non ita vehemens affectus videatur, stuporem inducet. Atque ii sanè mortem effugiunt, quandoquidem in ipsis respiratio seruatur. At quibus quinta spinæ vertebra affecta est, eorum manus omnino & sensum & motum amittunt. Vox autem omnibus illis perit, quibus ea spi

Spinæ quinta vertebra affecta, resoluti manent.

Vox quibus
pereat.

Motum quarū
dam partiū vo-
luntarium ex-
olui, prorsus il-
læso sensu, sicu-
ti econtra: id
quod accidit i
omnibus parti-
bus quę per di-
uerfos nervos
vtramq; facul-
tatē recipiunt.

Tactus pati vi-
detur potius q̃
agere.

Tangendi fun-
ctio cur ab exi-
gua facultate
perfici possit.
Motus cur plu-
rima facultate
indigeat.

Delectatio &
dolor quibus
sensibus ma-
ior, & quibus
minor adfit.

Doloris causa,
Voluptas quā
do fit.

næ pars quæ in ceruice est, fuerit insigniter læsa. Porro
qui nervi, dū rectè valēt, facultatē sentiēdi suppeditāt,
iudē lædūt ipsam si affecti fuerint. Cæterę quū partes ali-
quæ p̃ quē nervū voluntariē mouent, p̃ eundē sentiēdi
quoq; vī hēant, duplex necessariò noxa oriet̃ ex ipsius
nervi affectu: quæ altera qdē sensum, altera motū ipe-
diēt. Interdum tñ quarundā partiū motus voluntarius
exoluitur, sensu prorsus illæso: sicuti econverso etiam
contingit sensum perire, incolumi functione mouēdi:
vt in lingua & oculis planè videre licet, ac breuiter in
oibus partibus, quæ p̃ diuersos nervos, hoc ē molles &
duros, illas facultates recipiunt. At i quibus mēbris du-
ri duntaxat nervi inueniuntur, per quos vtraq; facul-
tas defertur: ex ipsorum vehementi læsione functiōes
ambæ labefactantur. Nam si ablata cute subiectus mu-
sculus, qui nudus est, videatur immobilis, sentiat tamē
tangentes, exiguam ei accidisse noxam putādum est:
nempe q̃ tantam animalis facultatis partem suscepe-
rit, quanta ad sensum excitandum sufficiat: ad muscu-
li verò motum, non item. Quippe tangendi sensus, pa-
ti aliquid, potius q̃ agere, deprehēditur, proinde ab exi-
gua facultate functio eius perfici potest. At musculoꝝ
motus in agendo, non in patiēdo, actionis efficaciam
posidet. Is enim totum corpus transferre debet: quā-
obrem plurima indiget facultate animali. Delectatio
autem & dolor omnibus accidit sensibus: sed in oculis
minus q̃ in cæteris euidenter perspicitur: in tactu & gu-
stu, luculentissimè: ab iis deinceps in odoratu: atq; hūc
tandem auditus sequitur. Iam verò affectio præter na-
turam violenter affatimq; incidens, doloris (vt Plato
inquit) est causa. Vbi verò corpus ad naturalem habi-
tum redit, idq; rursus affatim, oboritur voluptas. Por-
rò vehementes eueniunt in tactu à naturali habitu trās-
mutationes, ob violentem calidi frigidiq; occursum:
atq; ob eas res, quæ contundere, secare, extēdere, aut

erodere possunt. Nam siccitas humorū, nisi calori frigoriue iungant, occurſu suo inferre vim minimè conſueuerunt. Cæterum ſectio & ruptio dolorem inferit, non ubi facta eſt: niſi fortè ex accidenti aliquo: ſed ubi etiamnum ſit. Iam inſtrumentum guſtandi, quatenus habet facultatem tangendi, à iam dictis cauſis diuellit: quatenus verò ad guſtum propriè pertinet, ab amariſ, acidiſ, acerbis atq; acribus: quandoquidem horum ſingula continuū diuidere poſſunt. At ab humoribus acribus reſoluti vapores, vim olfactricem infeſtant: nani & ipſi continuum diuellunt. Auditum vox turbat aſpera, grauiſ, maximaq; & celerrima: quemadmodū omniſ violentuſ ſtrepituſ. Viſum autem, illuſtriſſimi ſplendoreſ offendunt corrumpuntq; eo q̄ nimium diſſurgent. Paſſio itaq; moleſta quatenus dictum eſt, oriri in omniſ ſenſibus ſolet: delectatio autem illi aduerſa, à contrariis naſcitur cauſis. Etenim vt cœruleuſ color iucundiſſimuſ eſt oculiſ ſpectaculuſ, ita ſplendor candicans, qualiſ i Sole cernitur, maximum ipſiſ doloreſ inferre poteſt. Poſt hoſ ſecundo loco moleſtuſ quidem eſt color albuſ: delectat verò ſcuſcuſ: nam ille viſificam eſſentiam diſſoluit: hic eam cogit, citra violēciam. Color ſiquidem niger hoc nomine viſionis eſſentiæ aduerſatur, q̄ cogat ipſam violentiſ, q̄ vt eam reducat ad naturalē habitum. Cæterum id quod nigerrimuſ eſt, ſplendidiſſimo minus viſum offendit, quia craſſiori conſtat ſubſtantia, ob idq; minus efficaciter agit. Quum nimirum omniſ reſ tenuiſ craſſiani actiuitate ſuperet. Sic igitur ſol ualde tenuiſ quum ſit, protinuſ viſum diſſipat. Quare ſi quiſ diu i deſiſſimiſ tenebriſ ubi verſatuſ fuerit, poſtea luci reſtituatur, occœcabitur iſ quodammodo. Merito itaq; cœruleuſ color, vt viſio ni iucundiſſimuſ eſt, ita maximam quoq; præbet utilitatē: ſed non illi quæ à ſole diſcuſſa fuerit. Huic enim utpote iam ægrotanti, contrariuſ remediū (vide-

Dolorem nec ſiccitas nec humiditas inferit, propria ratioe.

Guſtandi ſenſorium a quibuſ nam afficiatur. Olfactū acres vapores infeſtant. Auditum quæ obtundant: Viſum quæ ofſendant.

Ceruleuſ color eſt optatiſſimuſ oculiſ.

Niger color quæ ratione viſui aduerſetur.

Tenuiſ reſ omniſ, craſſā actiuitate ſuperat. Sol cur viſum diſſipet.

adferunt, gustandi facultati proportionē respōdet: At vapores qui intrinsecus continētur, si molesti fuerint, possunt sensu percipi: suaues verò & omnino delectabiles, sensum latent: quemadmodum in visu quoque, & auditu, qui in se nullum patiuntur vehemētē affectū. Delectamur in id genus sensibus, ad naturalem habitū redeuntēs: hoc autem fit per idonea contraria: idoneū autem voco id, quod primariò & per se, non per medium alterius rei interuentū, fuerit effectus causa. Quare procatarcticæ causæ impræsentiarum spectandæ nō sunt. Iam verò genitales partes proprio quodā & eximio sensu afficiuntur, vnde & validissima p̄dita sunt facultate, expultrice quidem seminis genitalis, in masculis: in foeminis autem tum hac, in testiculis & seminariis vasibus: tum attractrice per totum vterum. At genitalis seminis tum excretionem, tum comprehensionē ingens comitatur & cupiditas, & voluptas. Molestia autem quæ ex redundatē atq; intus retento semine oritur, paulatim & longo temporis tractu increfcit. Nulla autem est pars, quæ vel adeò exactē sentiat, vel principum partium vtrinq; pro suarum affectionum modo perinde afficiat, atq; orificium ventriculi, qui stomachus appellatur. Siquidem syncope, cardialgia, dyspnœa, apnœa, morsus, epilepsia, delirium, isania, huius partis occasione euenire solent: idq; cōsortii lege Abolitam verò, difficilem, & deprauatam appetentiā, ipsa per se sustinet. Abolitam voco appetentiā, dum quis nihil omnino appetit: difficilem eam quæ est imbecilla. At deprauata, partim ad immoderatā cibi portionisq; exhibitionem vertitur: partim ad alienæ qualitatis desiderium. Etenim quum nutritoria functio nō vitalis, sed naturalis sit: haud aliter in animalibus q̄ in plantis p̄ficitur. Idcirco animalibus vice terræ subrefecit natura ventriculum, veluti promptuarium cibi. Addidit in super facultatem, qua penuriam sentiret: vt animalia

Odorandi vis, vapores quidē internos vbi sunt graues, sentit: qui vero delectabiles sunt eam latent. Sensus intra se nullū affectum vehemētē patiuntur.

Genitaliū m̄brorum vires.

Seminis excretionem cōprehensionēq; comitatur ingens cupiditas, voluptasq;. Molestia ex retento semine. Os ventriculi exquisitissimo est sensu p̄ditum. Os ventriculi quorum affectum conforti lege & ppriatione, sit causa.

Nutriticiā functionem nō aliter p̄ficere i animalibus, quam in plantis. Vētricul' promptuarium cibi.

Appetētia qd.

Fames quid.

Appetentiam
quādo aboleri,
uel imbecillam
reddi, vel vitia
ri contingat.

Canina appe-
tētia a quibus
causis profici-
scatur.

Frigidi succi ap-
petentiam ex-
citant.

Sitim falsi hu-
mores atq; bi-
liosi gignunt.

Fames cur a ca-
lore impediā.

Citta morbus
quos maxime
infestet.

ad cibum portionemq; excitata, eodem implerentur tē-
pore: vocaturq; huiusmodi plenitudinis desyderiū ap-
petentia. Hæc ortum habet a penuriæ sensu, quum ve-
næ ex ipso ventriculo trahunt, veluti mulgentes, su-
gentesq;. Igitur suctionis sensus est fames. Primū itaq;
symptoma omnium est inanitio. Secundum est inanita-
rum partium naturalis appetentia. Hanc sequitur per-
venas, quæ porriguntur in vētriculum, suction: Deinde
suctionis sensus. Postremo ipsa aīalis appetentia omniū
ultima, Quam sanè functionem aboleri contingit, si
vel suctionis sensus pereat, vel suctus non fiat, vel cor-
pus non inaniatur. Imbecilla verò erit, si iam dictæ af-
fectiones accedere proximè ad abolitionem videātur.
At deprauata sit appetentia, si vehemētiae modum ex-
cedat: vocaturq; a nonnullis canina, vbi vel ob aci-
di humoris vitium ventriculus mordicus infestatur:
vel dum totum corpus exhaustum, assidua nutritatio-
ne idiget. Quippe frigidi humoris vitium, rosionē quæ
suctui proportionē respondeat, inducit: ac appetentiā,
non aliter q̄ naturale pathema, excitat: magis tamen
cibi q̄ potionis desyderium affert: idq; propter refrige-
rationem. Si verò falsi aut biliosi humoris vitio ventri-
culus mordicationem senserit, potionem magis q̄ cibū
desyderabit. Itaq; ad excitandam famem frigus in ven-
triculo non parum cōfert. Inter potissimas autem cau-
sas, quibus fames impeditur, calor annumeratur: vt q̄
solida quidem corpora laxando dissoluat, atq; ad attra-
ctionis functionem reddat imbecilliora: humida verò
fundendo, supra modum extendat. Præuas autem qua-
litates appetunt ii, quibus ventriculi tunicæ sunt prauo
aliquo excremento imbutæ. Qui affectus citta, seu pi-
ca dicitur, & mulieres vitiosis succis refertas infestare
consuevit, præcipuè vbi vtero gestant: quanq̄ uiris et
nonnunq̄ accidit, vbi ipsis quoque vitiiati humores ad
osculum vētriculi cōfluunt. Similiter circa potum ac-

cidit quasi priuatio appetentiæ, vbi corpus nulla omnino eget portione, ob frigoris atq; humoris excessum: vel ventriculus propriam affectionem non sentit. Deficiens verò appetentia apparet, vbi hæc eadem fuerint imbecilliora. At deprauata portionis cupiditas, deprauatæ appetentiæ ciborum proportionem respondet. Siquidem immoderata potio appetitur, quando cõtentum in ventriculi tunicis vitiosi humores, aut falsi sunt, aut biliosi: interdum etiam, quum veluti feruet in eo natua ipsius humiditas. At prauas portiones nonnulli appetunt, pro vitiosi humoris, qui in ipsis vincit, ratione. Est præterea & aliud symptoma nonnunquam osculum ventriculi infestans, nempe cardialgia uocata: quæ à mordacibus succis oritur. Bulimos etiam, siue inexplibilis famines, symptoma est eiusdem particulæ, ubi penuria, imbecillitate, atq; refrigeratione afficitur. Mirandum autem non est, si ob oris ventriculi affectus, animalia maximis iisdemq; uehementissimis affectibus affligantur, quum nimirum pars illa per nervos quidem cerebro, per arterias autem cordi, uicino sibi, suas offensiones cõmunicet. At uerò singuli sensus in singulis particulatim instrumentis à sensibilibus alterati, perficiuntur. Hanc uerò alterationem pars alterata sentit, eo quod à cerebro suscipit facultatem, quæ ad ipsam per nervum deriuatur. Quippe cerebrum non ut sit sentiendi instrumentum, sed ut sensuum instrumentis uim sentiendi largiatur, à natura institutum est. Nam quod singulis animalis partibus per nervos sentiendi facultatem transmittat, liquido patet, ubi nervus aliquis est dissectus. Siquidem pars ea in quam nervus ille distributus est, protinus sensum amittit. Taceo sensus inter dormiendum, aut otiosos omnino esse, aut debiliter agere: quod tunc exigua facultas à cerebro in reliquas partes defluat. Quiescit itaque per somnum animalis facultas, naturalis autem ualidius operari uidetur: quum tunc cibus multo melius coqua-

Appetentia portionis quibus de causis aut pereat, aut minuat, aut deprauetur.

Cardialgia ualde exoritur
Bulimos quando accidat.

Oris ventriculi cum principibus membris connexio.

Sensationes quomodo fiant.

Cerebrum quorsum conditum.
Cerebrum uim sentiendi partibus per nervos largitur.

Facultas animalis per somnum quiescit: Naturalis operatur uehementius.

nus sentiendi functiones: ita apoplexia eas actiões quæ pendent à voluntatis imperio, offendit. Ad hæc qualis est insomnietas sentiendi functionibus: talis est conuulsio per morbum comitalem motibus voluntariis. Porro conuulsio quæ per totum corpus fit citra delirium, aut soporem, à spinalis medullæ, quæ in ceruice continetur, morbo depēdet. Si verò vel manus, vel crus, vel musculus distendatur, aut conuellatur violēter, ad illū semper neruum, qui partē mouet, referenda est noxa.

Apoplexia quæ
lis affectus sit.

Epilepsia quæ
lis cōuulsio sit.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E S Y M P T O M A

T V M C A V S I S L I B. I I.



QUANDOQV IDEM Iam exposuimus symptomata quæ circa sensum versantur, operæpretium fuerit, deinceps illa etiam examinare, quæ sub deprauato motu, seu cōmuni genere, continentur. Cuiusmodi sunt con-

Sensus deprauati symptomata

Symptomata quæ ad motū deprauatū spectant, alia quæ de naturæ, alia morbi sūt opera: sicuti alia vtriusq;

uulsio, tremor, palpitatio, singultus, tussis, ructus, sternutatio, pandiculatio, & stridor dentium. Quorum sane nonnulla quidem, naturæ sunt opera, sed coactæ ab aliqua causa præter naturam: alia morbidos sequuntur affectus, nihil ad ipsorum generationem cōferente natura: alia deniq; à natura & morbo simul coeūtib; ducunt originē. Porro naturæ opera sunt sternutatio, tussis, oscitatio, pādiculatio, & singultus. Solius morbi palpitatio, conuulsio, resolutioq;. Sicuti amborum coeuntium, omnis torpor, & tremor. Ad quorum sanè omnium particulares propriasq; differentias inuestigandas, sciendum est, quatuor eē facultates, quibus omnia quæ aluntur corpora gubernantur: attractricem videlicet, retentricem, alteratricem, & expultricem. Quum

Facultates naturales sunt quatuor.

igitur iuxta naturæ leges animæ gubernat, nullus ipsa
 rum motus esse symptoma cēsetur. Quod si quippiam
 in corpore præter naturā cōsistat, insurgatq; ad ipsum
 deiiciendum expultricium facultatum aliqua, sit iterini,
 ut ipsarum motus sensu minimè percipiantur: interim
 ut non lateant sensum: utriq; tamen in naturam sym-
 ptomatis transeant. Igitur functionis à voluntatis im-
 perio prodeuntis noxa est, nervorum resolutio, cōuul-
 sio, tremor, stupor. Cæterum si instrumentorum qui-
 bus respiratio perficit, resoluti sint nervi, apnoea, hoc
 est abolita spiratio: si verò vocales nervi, aphonia, id
 est vocis priuatio: vocatur. At linguæ paralyssis, & si ser-
 monem, voluntatis opus, omnino tollat, nullum tamē
 proprium obtinuit nomen. Rursus ischuria, hoc est vri-
 næ suppressio, haud absimile quiddam apnoeæ signifi-
 care videtur: quāuis per ipsam functio, à natura, non à
 voluntatis imperio pendens, tollatur. Sed si quis iuitus
 cogatur meiere, volūtariæ functionis offensa est. Haud
 aliter alui excrementa, si supprimantur, ad naturalem:
 sin deiiciantur, idq; homine inuito, ad voluntariam
 functionem noxa referri debet. At si paralyssis totum
 corpus inuadat, symptoma ipsum apoplexia vocatur.
 Conuulsio etiam ipsa pro varietate particularum, va-
 rias appellationes sortitur. Nam si mandibularum mu-
 sculi conuellantur, stridor dentiuni: si verò oculorum,
 tum peruersio, tum strabilissimus, symptoma dicitur. Iā
 verò si rigido pene semen effluat, veluti cōuulsio quæ-
 dam ipsa gonorrhœa existit: si non rigeat penis, refer-
 ri debet ad retentricis facultatis imbecillitatem. Non
 desunt & quibus videantur tum singultus, tum duplex
 inspirandi aeris refractio, aliquando ex cōuulsione mu-
 sculorum qui inspirationi inseruiunt, procedere. Epile-
 psia autem est conuulsio vniuersi corporis. At stupor
 imperfecta quædam est resolutio nervorum: estq; fe-
 re mistum symptoma, cocuntibus in vnum pugnantib;

Motus volun-
tarii noxæ.

Apnoea quid.
Aphonia quid.
Lin. uæ par-
alyssis.
Ischuria natu-
ralem functio-
nem cohibet.

Excretiones in
volūtariæ quo
referendæ sint

Apoplexia est
paralyssis vni-
uersi corporis.

Dentiū stridor.
Strabilissim.
Gonorrhœa.
Singultus.
Respirationis
duplex refra-
ctio.

Epilepsia.
Stupor quo si-
at modo.

Busq; morbo simul & facultate. Oēs autē affectus qui nervos intendere possunt, in duo capita reducūtur: plenitudinem scilicet atq; etiam inanitionem. Ac phlegmonæ quidem, plenitudinem pariunt; ardētissimæ autem & aridissimæ febres, inanitionem. Quod verò ad motum in mobilitatemq; pertinet naturalem, si manum extendere, extentamq; immobilem servare valeamus, animalis facultatis hæc functio est: qui status, & motus & immobilitas dici potest. Sin autem supra rem aliquam solidam, rectè valentem manū deponēs, omnes musculorum actiones laxaveris, hæc manus quæ rem, neq; ad morbum, neq; ad facultatem, sed ad innatam animalibus gravitatem referre oportet. Quemadmodum autem extenta manus duobus æquè valentibus regitur motibus, sursum quidem ferēte facultate: trahente verò deorsum insita gravitate: sic etiam tremor perficitur duabus motionibus: una, qua cogitur membrum ob gravitatem ad inferiora dehiscere: altera, qua sursum fertur à facultate. Pugnat itaq; per tremorem manifeste facultas cum gravitate: vicissimq; facultas nunc vincit, nunc imbecilla vincitur. Quamobrem contrariorum semper inter se motuum successione, tremor fieri videtur: quā sit motus compositus, quemadmodum arteriarum pulsatio. Patet ergo huius quoq; symptomatis generatio, & q; oīno cū conatu sit movēdi, scdmq; volūtatis iperū cū facultatis tñ īfirmi-
tate. Porro maximū onus validā deiicit facultatem: in-
validam verò, non solum hoc, sed parva quoq; proster-
nit sarcina. Quòd si ad multā imbecillitatē de venerit,
vel sub proprio opprimeat corpore. Quemadmodū autē
animi affectus, qui motricem facultatem imbecilliorē
reddunt, tremulas functiones efficiunt (vt in timore vi-
dere licet) sic morbi corporis, incōmodantes viribus,
tremoris symptomata inducunt. In primis itaq; & om-
nium maximè officit facultati, quicquid in intemperie

Tentio omnis
fit, aut a pleni-
tudine aut ab
inanitione.

Tremor fit, ip-
sius mēbri pō-
dere pugnante
cum facultate.

Tremorē esse
voluntariam
actionem, sed
imbecillam.

Animi affectus
tremulas fun-
ctiōes efficiūt,
ac similiter
morbi corporis

**Senectus est in
temperies.**

**Tremore cur
senes, nonnulli-
que ex iuveni-
bus, corripiantur.**

cōsistit. At senectus quoq; intemperies quædam est, ad
frigus & siccitatem procliuior. Quamobrem senes fa-
cile tremore vexantur. Ex iuuenibus verò corripun-
tur ii, qui vehementer fuerunt refrigerati: & qui mul-
to meraco vino se replenere, aut multas subinde crudi-
tates congefserunt, aut qui diu multis cibis ingestis, nul-
lo vsi sunt exercitio, sed ignavi in otio vixerūt: aut qui
intempestiuè frigidam aquam biberunt. Præterea cras-
si lentiq; succi, facultatis meatus obstruentes, tremorē
efficere possunt. Palpitatio autē est dilatatio præter na-
turam, oī parti, quæ dilatationē suapte natura admit-
tit, accidere potens aliaq; verò nulli. At dilatari sunt na-
ta, omnia quæ naturaliter mollia existunt. Palpitatio-
nem itaq; nonnunq; cuti subiectisq; illi musculis, & vi-
sceribus accidere cernimus: quemadmodum ipsi cordi
& arteriis: alio in eis præter pulsū (qui ab insita facul-
tate fit) deprehēso motu. Quin autem palpitatio ipsa
celeriter oriatur & euascat, necessum est illius cau-
sam esse aeream essentiam. Quæ quidem si pauca fuerit
& tenuis, illico à corpore defluet. Proinde videtur esse
vapor crassus ac multus, idq; pro capto spatii in quo
continetur. Dilatat igitur, attollit, atq; inflat partē, do-
nec violēter explosus, in cognatū sibi aerem expiret.
Verisimile autem est, refrigeratis quomodolibet par-
tibus, atq; interdum etiam obstructis, palpitationes
accidere. Porrò vniuersus palpitationis motus, quo
in vtrancq; partem agi videtur membrum, existit præ-
ter naturam: qua ratione à tremore distinguitur, & q̃
etiam maiora iterualla, q̃ tremor ipse, sortiatur. At vo-
rò, vt in membrorum palpitatione fit motus paucus,
parvus, & rarus: ita in rigore fit multus, citus, & fre-
quens. Atqui multum, voco ex ipso motionum nume-
rō: citum, ex motionis impetu: frequentem, ex breui
tempore quietis. Cæterum motus hic nō est vniuersus
præter naturam, vt palpitatio & conuulsio: sed potius

**Palpitatio qd
fit, & quibus
partibus acci-
dat.**

**Palpitationem
esse diuersum
motū a pulsu.**

**Palpitationem
fieri a vapore
crasso simul &
multo incluso
in palpitante
particula.**

**Palpitationis
motus exilit
præter naturā.**

**Palpitatio a
tremore quo
differt.**

**Rigori adesse
morum multū,
citum, atq; fre-
quentem.**

totus ad expultricem facultatem est referendus: & si ipsam irritans causa, cogensq; vt violenter moueat, præter naturam esse censeatur. Est itaq; rigor motus quidam compositus ex causa præter naturam, & facultate animantis, sed in quo virtus, q̄ in tremore est vegetior. Vt aut̄ exempla facultatis expultricis proponam, vterus non alio pacto ad foetus æditionem insurgit, q̄ vt retentam expellat moleni. Quum enim nouem mēsis sibus sustineat tum foetus grauitatem, tum suam ipsius extensionem, atq; toto hoc tempore osculum ipsius adeò exactè clauditur, vt ne specilli quidē aculeum admittat: absoluto foetu, ad ipsius secretionem accedit, diuersa omnino constitutione affectus. Nam fauces quidem ipsius antea clausæ, adeò patēt, vt facilè per ipsas totus foetus erumpat. Tunica verò plurimū antea extēta, & contrahuntur vndiq; , & foetum explodunt, vt q̄ celeriter ab vteri ceruice decidat. Corruptum verò foetum eiicit illa facultas expultrix, aut tertio, aut quarto, aut alio quolibet mēse, haud aliter q̄ instante pariendi tempore, matricis fauces aperiens. Similiter etiam ventriculus, ingestis cibis, claudit inferius osculum: ac nihil egredi sinit, priusq̄ accuratè concoctum fuerit: si modo nihil aliud intercideret ipsam cogat functionem: quemadmodum corruptela foetus in vtero. Sic si quidem solet ventriculus natantes cibos euomere: ad inferiora verò tendentes, per inferiora deicere. Sine cibis etiam insurgit sæpe ventriculi facultas ad vomitum: idq; ob prauam aut bilem, aut pituitā, aut aliū huiusmodi succum, aut sanie. Iam verò, qualis est per vomitiones in ventriculo expultricis actio, eiusmodi etiam per tusses, est in pectore, & in pulmonibus, beneficio spiritus qui ad exteriora vehementer mouetur. Nullum autem animal, aut nauseare, aut vomere, aut tussire didicit. Verum, si causa præter naturam, aut vetriculi osculum, aut respirationis meatū obsederit, pro

Rigor est referendus ad vim expultricem.

Rigor est motus cōpositus ex causa præter naturam & facultate animali.

Vteri cōiunctia & relaxatio opportunæ

Ventriculi re-tentrix, expultrixq; facultas.

Vomitus.

Tussis.

Sternutatio.

Nares sunt me-
atus respiratio-
nis.

Tussis quid sit.

Humores, qui a
pectore educi
tur facile.

Sternutamēta,
quam tussis, ua-
lidius a pecto-
re in partes hu-
mores euellūt.

Tussis nihil cō-
ducit capiti.
Sternutatio iu-
uat plurimum
caput, nisi ob
destillationem
accidat.

Nausea præce-
dit vomitum.
Cernuus præce-
dit tussim.
Tussi reiicien-
da esse, quæ spi-
ritum, interci-
piunt.

finus animal vel vomitione, vel tussi vexabitur. Ad ho-
rum genus refertur etiam sternutatio, qua expelluntur
quæ retenta in naribus hærent: quæ & ipsæ, meatus re-
spirationis existunt. Spiritus igitur vehemēter motus,
earum meatus expurgat, tibicinum exemplo, tibias, si
stulasq; expurgantium. Ita q; huiusmodi motus, natu-
ræ opera existunt: annumerantur tamen symptoma-
tis præter naturam, ob causas naturā ipsam vt sic mo-
ueatur cogentes. Tussis porrò nihil est aliud, q̃ vehemē-
tissima effusio, qua plurimus spiritus celerrimè foras
erumpens, impetu suo extrahit, exploditq; excremen-
ta, meatum ipsius obstruentia. Expelluntur autem faci-
lè, quorum nec nimis aquosa, nec lenta essentia fuerit.
Cæterum illos humores qui in arteria contumaciter
hærent, & qui difficulter expectorantur, magis euellūt
sternutamenta: utpote quæ ualidiorem, q̃ tussis, habēt
spiritus impetum, licet aliam generationis suæ causam
fortiant. Quippè non ob ea quæ asperis arteriis, sed na-
ribus molesta sunt, spiritus uiolenter emittitur: cū quo
ex prioribus ventriculis cerebri explodi nō nihil solet.
Proinde tussis capiti nihil conducit. Sternutatio verò,
nisi ob destillationem acciderit, haud mediocre præsi-
dium affert capiti repleto uaporibus. Nec mirum uide-
ri debet, spiritum unico impetu & ex pulmone & ex
capite emitti: nam quum principium insurgit, ut expel-
lat quæ infestant nares, utroq; utitur expirationis mea-
tu. Hæc igit sunt facultatis à uoluntate pendentes, sym-
ptomata. Vomitum uerò, quod illis proportionem quadā
respondeat, ad facultatem naturalem refertur. Vt au-
tem uomitum nausea præcedit, sic tussim cernuus,
exiguus ad tussendum impetus. Porrò quicquid spiri-
tum interceperit, id tussi rescicere oportet: siue humor
sit à capite defluens, siue illapsa portio cibi uel potus, si
ue aliquid in asperis arteriis collectum, ut in peripneu-
monia, pleuritide, & in cōuexarum iecinoris partium

phlegmone, aut in gutturi ipsius asperitatibus. Est & aliud tussis genus, quod accidit respirationis organo refrigeratis. Sed ita affecti nihil inter tusiendū expuunt: adeoq; est exigua ea tussis, ut spiritus cohibitione suppressi, & ne eueniat, prohiberi possit. Quippe augetur in instrumentis respirationis calor, ob cohibitam animam: spiritusq; sub thorace uolēter oppressus, in omnes arctos meatus penetrat. Hæc autem utraq; dum sunt, omnia læuigant, ad temperamentiq; æquabilitatem perducunt. Iam uerò intemperies ipsa, interdum simplici qualitate, interdum duplici constat: nonnunq; eiusmodi qualitates comitatur id quod intemperatum est: ueluti ros quidam. Sed enim æqualis intemperies nullo dolore affligit, quum nimirum particulæ affectæ adsit iam ueluti acquisititia quædam natura. Nullum autem corpus à sua ipsius natura infestatur. Nam si quorum natura mutatur, corrumpiturq; dolore afficiuntur: non quorum iam mutata aut corrupta est. Vbi uerò in corpore quopiam sentiendi vi prædito, inæqualis suboritur intemperantia, quanta fuerit intemperiei magnitudo, tanta etiam erit molestia. Quare per tales intemperantias inæqualitatem quandā sentire se sentiunt ægri, & pandiculantur, omnesq; partes distendūt, sese tuendi gratia. Distenduntur autem maxime à somno experfecti, utpote carnibus uaporantia excrementa sentientes: tum ob congesti cibi coctionem: tum ob huiusmodi motionum quietem. Triplex autem in lassitudine potest oriri sensus: contundens scilicet, tensiuus, & ulcerosus, idq; à causis præter naturam, omnes corporis partes quassantibus, distendentibus, exulcerantibus. Igitur ubi tendi uidet corporis moles citra quampiā exercitationem, affectus is lassitudo tensionis spontanea uocatur: quemadmodū ulcerosa, ubi ulceris sensus transcurrere per corpus apparet: id quod motis ma-

Tussis ob refrigerata organa, spiritus cohibitione prohibetur.

Spiritus cohibitione calorem in organo respirationis adauget.

Æqualis intemperies cur nullo afficiat dolore.

Dolor quando accidat.

Inæquales intemperies dolores secum inducunt.

Experfecti à somno cur se distendant. Lassitudini triplex potest oriri sensus.

Lassitudo tensionis spontanea, quæ

Lassitudo ulce-
rosa motis ma-
gis accidit, q̄
quiescentibus.

Lassitudo con-
tundens.

Horror transit
in rigorem, si
motus adit.

gis accidit, q̄ quiescentibus, nisi admodum magna sit
lassitudo. Per tertium uerò lassitudinis genus, quo aiunt
sibi quassa esse ossa, ne minimum quidem motum tole-
rare ægri possunt: sicuti nec per lassitudinē ulcerosam,
ubi nimium increuerit. Cæterum quemadmodum ubi
ulcerosus sit sensus horrent ægri, si commoueātur: ita
horroris affectus, si aliquis motus accesserit, i rigorem
transit. Atqui hæc omnia oriuntur ab excrementis mor-
dacibus. Differunt uerò inter se excrementorum mul-
titudine & motu: propterea q̄ alia magis, alia min⁹ ero-
dant: quodq̄; ex corporib⁹ ipsis alia sint imbecilla, alia
facilius, alia ægrius, & afficiantur, & sentiant: facit etiā
discrimen causa, ubi citius, uel tardi⁹ mouetur. Adhæc
idem etiam homo, dum quiescit, solam interdum sen-
tit inæqualitatem: dum mouet, horrorē: dū uerò exer-
citur, rigorem. Quamobrem sic affectis consulūt me-
dici, ut ab omni motu se abstineant. Quin etiā sol, bal-
neum, exercitatio, ad motum excitant excrementa,
alioqui quiescentia: quemadmodum & ex animi affecti-
bus ira. Porro à seipsis ad motum excrementa insur-
gunt si uel calfiant, uel extenuentur, uel in spiritum dis-
soluantur. Causa itaq; emota longè est molestior quie-
scente, præsertim ubi defertur per corpora sensibilia.
Quum enim quippiam per hæc transiens, uiolenter ad-
cutim fertur, in ipso per carnem cutemq̄; transitu, ne-
cesse est, ut stimulet, pūgat, diuidat, uulneretq̄; eas par-
tes omnes, quibus obuium fuerit. Omnis autem causa
mordax, motaq̄; siue frigidissima, siue calidissima fue-
rit, & horrorem, & rigorem animati inducere potest.
Cæterum febres tertianæ; ut omnium maximè bilio-
sæ, calidæq̄; sunt, ita præ cæteris maximè horrorem
possunt efficere: & quo fuerint synceriores, eò in ipsis
uehementior fit rigor. Porro ardentem febrem rigor
superueniens soluit q̄ bilis quæ interim in uenis conti-

Excrementa a
quibus causis
moueantur.

Causa emota
longe est mo-
lestior quiescente.

Mordax mota
que omnis cau-
sa, siue frigi-
da siue calida
fuerit, horrore,
rigoremq̄; in-
ducere potest.

nebat, à natura per carnes ad cutem decretoriè excu-
ciatur. Quare motionis eius rigor & symptoma est &
signum. Nam huiusmodi rigore affecti, postea sudant
& liberantur à febre, nimirum eiecta bile. Quæ inter-
dum etiam non ad cutem, sed ad internas partes impe-
tum faciens, vel vomitione, vel alui solutione deiicit.
Sæpenumero & intrò & foras eadem die defertur, vt
simul & sudore & vomitu, & alui deiectione bilis ua-
cuetur. Vbi igitur erodens quippiam in particulis con-
tinetur, contristatur sanè, præcipuè si illud moueatur:
quare maximè ad eius expulsionem festinant. Contra
hunc itaq; atq; constringunt sese: mox quælibet im-
pellit eam quam cõtinet excrementi portionem. Atq;
in hunc sanè modum motis vniuersis particulis, totum
corpus concussione quassationeq; vexatur: qualis vide-
tur in iis, qui sunt rigore correpti. Similiter etiam con-
cutiuntur thoracis muscoli, ea quæ carnibus ipsorum
molesta sunt, per pulmonum arterias expellere prope-
rantes. At verò nonnulli ægri quum egeant reiectione
sputi per regionem pulmonis, nec eam ob imbecillum
thoracem moliri queant, sibi sternutationem prouo-
cant, naribus irritatis: vt ob violentum motionis impe-
tum, ea expuant, quæ tussiendo antea reiicere haud-
quaquã poterant. Illa autem tussis, quæ ob intemperiem
organorum respirationis accidit, ad horrois rigorisq;
genus pertinere videtur. Vbi verò quæ corpus infe-
stant, humida suapte natura fuerint, per tussim ac rigo-
rem ab expultrice facultate impulsæ, vltro citroq; fe-
runtur, donec applicuerint ad conuenientem euacua-
tioni locum. Sin autem solus spiritus sine humore, imo
dicè vel calidus vel frigidus per corpus transeat, is tunc
horrorem excitat, ac nonnunq; rigorem: nulla tamen
sequitur conspicua euacuatio. Quum igitur & frigida
& calida causa possit excitare rigorem, calidæ quidè, si
aërea fuerit, refrigeratio satis efficaciter auxiliatur. Si

Rigor ardente
febrem, illi su-
perueniens, cur
soluat.

Concussio quo
modo corpori
accidat.

Sternutatione
interdum ea
expui, quæ rei-
ci per tussim
non poterant

Rigor oriri à
causa calida &
frigida potest.

Rigoris mede-
læ.

verò sit humor, eam febris necessario sequetur. Cura-
tur autem euacuatione. At frigidæ, si aerea fuerit, re-
medium est calfactio. Sin verò sit humor, interdum so-
la concoctio sufficit: interdum vacuatio: nonnunq̃ am-
bæ conueniunt. Etenim citra febrem nonnunq̃ oriunt̃

Rigores citra
febrem, quādo
gignantur.

Intemperatius
vivi nunc, quā
superiori seculo.

Rigor quando
est letalis.

riores ob pessimam victus rationem: vbi quis per otium
se impleuerit, & subinde à cibo lauerit. Quam rigoris
speciem veteres ignorarunt medici, q̃ homines supe-
riori illo seculo, nec tam intemperanter viuerent, nec
tam crebro lauarent. At tamen rigor ille quo partes ue-
hementer quatuntur, & concutuntur, ob frigidos suc-
cos nunq̃ excitari videtur: q̃ ii ob crassitudinem vehe-
menter moueri non possint. Iam verò si rigor per fe-
brem non intermittentem acciderit, idq̃ ægro imbe-

Atra bilis in
quartanis qua
ratione rigore
gignat.

cillo, est letalis, vt inquit Hippocrates. Siquidem i eius-
modi rigoribus isurgit natura contra res noxias, quo
eas expellat: sed victa cadit, extinguiturq̃; atq̃ hanc
ob rem redditur p̃nitiosum symptoma. Porro in quar-
tanis febribus succus ex calido frigidoq̃; mixtus, rigo-
rem excitat. Quippe atra bilis suapte natura, frigidus
succus censetur. Vbi verò adeò putris effecta est, vt fe-
brim inducat, quanta adfuerit illi putredo, tantus &
calor inerit. Quum autem rigor à calidis simul & rodē-
tibus succis fiat, mirari haudquaq̃ oportet, si partes ex-
tremæ omnes refrigerantur, declinante animali facul-
tate vnā cum sanguine ad interiora. Qualem motum
videre licet i compluribus animæ affectibus. Quod ve-
rò ad animæ essentiam pertinet, quæcunq̃ illa fuerit, è
duobus alterum fateri oportet: aut q̃ ad omnes fun-
ctiones, vt primis instrumentis vtitur & spiritu & san-
guine, ac vel alterius, vel vtriusq̃ calore: aut quòd i his
ipsis consistit. Per timorem etiam & spiritus & sanguis
intus sese recipiunt: quo fit vt algeant partes in super-
ficie positæ. idq̃; adeò interdum vehementer, vt non-
nulli rigore quoq̃ arripiant, Per iram verò soluunt ac

R' gente homi-
ne solę partes
extremæ refri-
gerantur, recur-
rit te sanguine
ad interiora.
Animæ substā-
tiam Galenus
definire non
audet.

Timere p̃fisi
gerati extrema
calore ad inter-
na se recipiēte.

disparguntur, proindeq; exteriora incalescunt. At agonia, affectus ex vtriusq; conflatus, inæquales habet motiones. Iam & cordis & arteriarum pulsationes, & minimæ & per q̄ debiles in trepidantibus esse videntur: sicuti in iratis maximæ & validissimæ. At in agonia sunt inæquales. Per verecundiam, animalis facultas in primis quidem ad interiora mouetur: sed rursus affatim redit ad exteriora. Nam si non redierit, non verecundia, sed timor censeri debet. Vt autem in timore confertim, sic in tristitia paulatim ad interiora fit motus: magnitudine dūtaxat ac vehementia, non toto genere differentibus inter se pathematis. Atqui nonnulli ob subitum timorem perierunt: id quod solet contingere vbi debilis suapte natura animula, sub valida perturbatione enofertim, & extinguitur, & suffocatur. Et enim extinctio, affectum ex refrigeratione ortum cōsequitur: suffocatio autem, cōcursum sanguinis vniuersi ad ipsum principium. At ex iratis nemo mortuus est unq̄: utpote quibus neq; calor refrigeratur: neq; robur dissoluitur. Præ gaudio autem nonnulli supra modum pusillanimes animam exhalauerunt, quemadmodū & timentes. Iam dolor è diuerso cogēs moueri animā, haud leniora symptomata q̄ maximus timor inducit. Quippe laborantes decolores fiunt, refrigerantur, concutuntur rigore, tremūt, pulsus habent minores, exolutosq; ac tandem similiter iis qui perterrentur, moriuntur. Nam & in iis fugit insitus calor ad suum principium: animaq; simul & soluitur, & extinguitur. Per rigorem itaq; frigus nō interiorum, sed exteriorum partium sentitur. Quamobrem tunc nonnulli vehementi siti cruciantur: nimirum ipsis interno calore seruato. Consistatur igitur pugnatq; per rigores cōtra ea quæ infestant, facultas: donec radicitus euellantur, excutianturq;. * Ob incursiones autem vehementes, & quia etiam in intimo corpore cogitur, rursus magna vi ca-

fra calfacit partes extremas.

Agonia quid.

Verecundia, vt moucatur.

Tristitia quam motionem fortiaur.

Timor subitus quando pimat.

Extinctio quid. Suffocatio qd.

Iratorum cur nullus obierit. Gaudio fuisse nonnullos exanimatos.

Dolor qualia inducat symptomata.

Rigenti exteriora refrigerantur, & interna incalescunt.

Rigori febris cur superueniat.

Pruritus quid,
& quos infesta
re soleat.

Pruritus causa.
Vicerose lassitudinis causa.
Lepræ pforeque causa.
Horroris causa.
Rigoris causa.

Sternutatio nõ
nunquã ex acci-
denti conducit
excremētis pe-
ctoris educēdis
purgatque ven-
trem & gulam.

Stultitia oritur
a frigore.
Obliuio a fri-
gore gignitur.

loris reuertitur, febrimque à rigore accendit, in eo certa mine materiam habens auxiliatricem: vnde, & febris euadit vehementior. Quòd si aliquando in pugna defatigetur, antea quàm dimouere res noxias possit, necessario mors subsequetur. At pruritus, qui excrementorum lo- uiter mordicantium est sensus, eos vexare solet, qui aut balneum negligunt, aut strigmentis redūdant, aut cruditatibus sunt referti, aut prauis succi cibis vescunt: sed præcipuè affligit infestis plora vel lepra. Vt autem prædictorum symptomatum causas accuratius exponam, exigua quidem est, tenuis, salsa, & immota in pruritu. Exigua, tenuis, erodens, immotaque; in lassitudine vicerose. Multa, salsa, crassa, & immota, in lepra, psoraque. Pauca, tenuis, mordax, ac breuè motum possidens, in horrore. Si verò aut vehementius moueatur, aut multum ab- det, aut sit mordacior, iam non horrorem, sed excita- re rigorem est nata. Pro intensiōe autem aut remissiōe ipsius causæ, intenduntur aut remittuntur symptomata. Iam tussis causa, in pulmone, gutture, ac tho- race consistit: Sternutamenti, in naribus: singultus ve- rò, in ventriculo & gula. Atque in his omnibus expul- trix facultas, quo excutiat molesta, se ad motus vehe- mentissimos excitat. Porro sternutamentum ipsum, nonnunquam ex accidenti, humorum in pectore delitescē- tium, remedium existit, licet eius rei gratia excitatum non fuerit. Similiter purgat ventrem & gulam: qua ra- tione etiam singultui auxiliatur. Sed iam opportunum est ut de iis dicam⁹ symptomatis, quæ circa principes functiones versantur. Quorum sanè tria genera depre- henduntur. Primum, ubi perit omnino functio. Secun- dum, ubi illa oblæditur. Tertium, quando in alienam speciem degenerat. At perit quidem functio in stultitia, obliuioneque, qui affectus à frigore oriuntur. Quippe me- dicamentis quæ huiusmodi symptomata facere possunt, refrigerandi facultas inest. Hæc itaque symptomata ce-

rebri corpus esse refrigeratum declarant. Apoplexia
 verò, epilepsiaq; ex subitanea colluuiione pituitæ, re-
 plentis ventriculos cerebri, nasci videntur. Proinde ho-
 rum symptomatum subita est generatio & discussio,
 qualis esse per corporum intemperies non posset. At
 modica offendicula, ac veluti torpores tum rationis,
 tum memoriæ, ob minorem refrigerationē eueniunt.
 Porro delirium omne, deprauatus est principis facultatis
 motus, à prauis succis, aut cerebri intemperie ortū
 habens. Cæterum phrenitis dicitur, si febris adsit: vt
 niania, si absq; febris, accidat. Solæ autem melancholi-
 cæ alienationes, à frigidiori succo produci solent. Nam
 phrenitis non simpliciter ob calidos succos accidit: sed
 quum phlegmonem vel in cerebro, vel in ipsius mem-
 branis producant. At quæ deliria in acutissimarum fe-
 brium vigore oriuntur, mordacem calidumq; vaporē
 habent, cerebrum occupātem. In omnibus autem ani-
 mi alienationibus, si timor atq; tristitia diu perseuerēt,
 atram bilē in causa esse est indicium. Quod verò atra
 bilis rationalē animæ arcem occupans, timorem, mœ-
 stitiam, ac mortis expectationem inducat, nihil miran-
 dum est: quum videamus in rebus externis nihil magis
 nos, q̃ tenebras ipsas, perterrefacere. Si igitur quip-
 iam tenebris simile rationali parti animæ circun-
 fundatur, hominem semper timere est neces-
 se: vt qui timoris causam semper in cor-
 pore secum ferat, vt in flatulento il-
 lo morbo, quem hypochondria-
 cum nominant, in dies vi-
 dere licet.

Apoplexiæ cā.
 Epilepsix cā

Deliriū quid est
 vide ortum
 habens.

Phrenitis qd
 Mania.

Melancholicæ
 alienationes.

Phrenitidi gi-
 gnendæ requi-
 rit phlegmone
 in cerebro, aut
 in membranis
 illius.

Atra bilis sedē
 rationis occu-
 pans, timorem,
 mœstitiam, ac
 mortis expe-
 ctationē iducit
 Tenebræ per-
 terrefaciunt.
 Hypochondria-
 cu. affectus.

GALENI PERGA

MENI DE SYMPTOMA-
TVM CAUSIS.

LIBER III.



EINCEPS Autem de symptoma-
tis quæ circa tum actiones, tum facul-
tates naturales versantur, dicendum
est. Quandoquidem igitur concoctio
nihil est aliud q̄ alteratio secundum
qualitatem, quam ventriculus nimi-

rum molitur, dum sibi cibos assimilât: nemo sanè ne-
gauerit alterationis errorem fore concoctionis sym-
ptoma. Cæterum si nulla penitus alteratio fiat, hoc
symptoma absolutè vocatur cruditas. Si verò fiat qui-
dem alteratio, sed non qualem fieri expedit, vocabitur
& hæc cruditas, non quidem tanq̄ priuatio, sed ceu vi-
tium concoctionis existens. At vitium ipsum, bifariam
accidere solet. Aut enim tardè alterantur cibi, vt vix
propriam transmutationem suscipiant: aut corruptū-
tur omnino, vt nullam concoctionem admittere pos-
sint. Atq; huiusmodi sunt cōcoctionis noxæ. Quarum
causa communis quidem est alteratricis potētiae ab ſco
po aberratio. Cuius aberrationis duo prima sunt gene-
ra. Vnum, qđ in potentia læsa: alteræ, qđ in externo ali-
quo errore cōsistit. Cæteræ potētia bifariam lædit: aut
p̄ suā ipsius essentiam: aut per aliquem morbum instru-
mētorum. Error aut̄ externus tripliciter accidit. Nam
aut ab excrementis ventriculi, aut à cibis, aut à somni
tempore oritur. Iam in propria essentia noxæ, intem-
peries quædam agētium qualitatum existunt. Ad mor-
bos instrumentorū pertinent tumores præter na-
turam, abscessusq; & alii affectus consimiles, quibus si

Concoctio qđ.

Alterationis er-
ror est conco-
ctionis sym-
ptoma.
Cruditas quid.

Concoctionis
vitium contin-
git bifariam.

Facultas bifa-
riam læditur.
Essentiæ facul-
tatis, læsiones
propriæ, sunt
intemperies.
Instrumentorū
morbi.

crucietur ventriculus, impeditur facultas eius concoctrix. Quod si cum intemperie coeant ipsi instrumentorum affectus, utroque modo facultas illa patietur noxam. Atque ob hæc omnes causas ventriculus male coquit, uel nullo extrinseco errore incidente. Ecceuerso autem ventriculo non male affecto, interdum non coquit animal, aut propter ciborum portionumque immodicam quantitatem, aut qualitatem alienam, aut quia intempestiue, aut non recto ingeruntur ordine, aut propter excrementum inutile, aut somnum breuem. Ordinem præposterum voco, ubi quis aut cydonia, aut punica mala in primis ingesserit: mox olera sumat ex oleo & garo. Intempestius autem dicitur ut sin aurora antequam hesternus cibus descenderit, aut corpus fuerit modicè exercitatum, prandium sumatur. Porro corruptelæ ipsæ, quæ quidem fumosæ sunt, ex calidioribus, magisque fumosis oriuntur cibis: acidæ verò, ex iis qui frigidiores natura sunt, magisque pituitosi. Similiter etiam & in excrementis contingit. Acidæ si quidem creant, quæ pituitosa sunt & frigida: fumosæ, quæ biliosa & calida. Nec secus venter, sub frigidioribus quidem morbis, acidæ: sub calidioribus, fumosæ mutationes efficit. Tarda concoctio fit, quia cibi difficulter corrumuntur, vel quia illos facultas non superat, vel quia somnus fuit breuior, quam ut eos vincere posset. Vbi verò citra corruptelam cibus omnino concoctione priuatur, sciendum est, ventriculum planè esse uictum, vel ab immodica multitudine, vel ab ingenti frigore. Ad eosdem reducuntur modos, quæ in vasis cruditates contingunt: illæque etiam quæ in tertia concoctione gignantur. Atque hæc omnia indicauit nobis præcognita concoctionis ratio. Quum enim temperiem humorum, quæ ex quatuor elementis conflatur, & quæ corporis ventriculi proprietatem constituit, sciuerimus esse causam alterationis ciborum: quodque ad hanc rem non mediocriter co-

Cruditatis, aut concoctionis uisiois cause, illico Ventriculo

Cydonia esse edenda in ultimis.

Intempestius ciborum usus.

Corruptelæ fumosæ, acidæque a quibus cibis gignantur.

Concoctionis tarditas unde.

Alterationis ciborum causa est temperies ventriculi.

Symptomatum genera, tria reperiri in vniuersis actionibus: nempe abolitionem functionem remissam, & deprauatam.

Succi vitiosi quos affectus producant. Atrophia. Gracilitas. Leuce. Elephantiasis.

Imbecillitates facultatis quos morbos sequantur.

Intemperies omnis vehemens delicit vicia.

fert calidum elementum, facile nobis via ostendetur, qua cruditatis causas quoque inueniamus. Igitur in vniuersis actionibus tria symptomatum genera reperiuntur. Quorum quidem primum est, abolita actio. Secundum, imperfecta, diminutaque; tertium denique, vitiosa, seu deprauata. Ventriculus itaque actione priuatur, ubi ne minimum quidem immutat cibos. Imperfecte concoquit, ubi tarde concoquit. Deprauate vero, ubi cibos corrumpit. Eadem etiam habenda est ratio, & in coctione quae fit in venis, & in vniuerso corpore. Porro ex vitiatissimis succis gignuntur erysipelata, cancri, gangrenae, phagedaenae, carbones, herpes, alique id genus affectus. Circa nutritoriam autem actionem, priuatio quidem actionis, atrophia est: deficiens nutritio, gracilitas: at vitiosa, in leucis, & elephantiasis consistit. Quorum sane causarum, aliae ad potentiae imbecillitatem: aliae ad errorem qui circa cibos committitur: aliae ad studia, sine exercitia & ea quae extrinsecus animali accidunt, referuntur. At vero imbecillitates potentiae, quae quidem propriae sunt, simularum intemperiem: quae vero non propriae, instrumentales sequuntur morbos. Error autem circa cibos exhibitos, ad multitudinem, succorumque qualitatem refertur. Quemadmodum & studia, & ea quae extrinsecus occurrunt, ad ordinem praeposterum, & intempestiuum usum pertinere videntur. Oportet autem non modo symptoma nosse, verum eius semper causam inuestigare. Nam si ventriculus ciborum causa nihil omnino concoxerit, facile id symptoma corrigitur. Si vero ob extremum potentiae lapsum, in lienteriam, aut in tympanitem mutabitur. Similis etiam & in sanguificatione, & in concoctione illa quae per totum corporis habitum fit, est inquisitio facienda. Omnis autem intemperies, si vehemens fuerit, vires deiecit. Quod si frigus vicerit, frigidos affectus efficiet: contra, si calor: nec secus in reliqua oppositione. Si itaque ventriculus calore immodico

re immōdico æstuet, illico corrumpentur. Quæ quidem corruptela nidorem communiter refert: priuatim verò quilibet cibus id nidoris genus reddit, quod naturæ suæ proprium existit. Nullus autem cibus, si immodicè fuerit excafactus, putredinè effugere potest. At qui sic sunt affecti, siti cruciantur: atq; interdum paruis tenuibusq; hæcticis corripuntur. Si ob frigoris vehementem intemperiem cibus omnino crudus permanserit, ita affecti nec sitiunt, nec febriunt: sed ciborum qualitatem percipiunt, siue ad ructum, siue ad vomitum prouocentur. Quòd si leue aliquod cibus impriatur coctionis vestigium, fueritq; ciborū natura aut modicè temperata, aut frigidior, acidi ructus incitabuntur. Si verò calidiore itemperie fuerint, aut suapte natura flatum excitare possint, vapore spirituq; ventriculus replent. Atq; in huiusmodi intemperies facillè ventriculus labitur. Ad tantam autem vel siccitatis, vel humiditatis intemperiem, vt actio eius aboleatur, ventriculus nisi in multo tempore, peruenire non potest. In retentrice potentia, triplex etiā reperitur symptoma. Nam aut nihil omnino complectitur: aut debilitè: aut deprauatè. Quum igitur, vel nihil penit°, vel debilitè retinet, tum inflationes, tum fluctuationes sequuntur. Porro vltimæ imbecillitatis ventriculi causa aliquis morbus existit. Morborum autem qui accidunt illi, alii veluti similem, alii tanquam instrumentalem partem, ipsum solèt affligere. Miscentur autem interdum & morbi, & symptomata tum retentricis, tum expultricis potentia, vt in ea ventriculi commotiōe, quæ veluti conuulsio illius est, eiq; per singultum accidit. Ventriculus siquidem per singultum, prauè cibos complectitur: conaturq; deprauato illo conuulsioq; motu, etiam molesta expellere. Etenim quemadmodum per vomitiones expelluntur ea quæ in capacitāte fluctuant, sic per singultum illa, quæ imbuerunt ipsius ventriculi corpore.

Ventriculus æstuat, cibos in vapores nidorosos corrumpit.

Acidi a quibus edantur ructus.

Retentrici potentia triplex symptoma tribuitur.

Ventriculi morbi duplices.

Singultus est.

Singultu expelli illa, quæ bibita sunt in ipsius ventriculi corpore.

Piper si tenue
sumat, postmo-
dumq; bibat
calida potio,
singultum ex-
citatur.

Nausea, expul-
tricis faculta-
tis est deprau-
atus motus.

Lienteria cā.

Cholera mor-
bus.

Attractrix fa-
cultatis sym-
ptomata.

Voluulo mor-
bo affligente,
uentriculus ab
intestinalis excre-
menta suppressa
faciepit.

Voluulus un-
de solet oriri.

triculi corpus. Quamobrem piper, si in tenuissima cō-
minutū (vt possit penetrare ipsius ventriculi corpus)
sumatur, bibaturq; postmodum calida potio, singul-
tum vel maximè excitat. In vniuersum autem, siue
calida sint, siue frigida, quæ permeant ventriculi cor-
pus, excitabūt singultum: qui primū quidem expul-
tricis, dein rerētricis facultatis est motus. Nausea quo-
q; expultricis facultatis est deprauatus motus, quo g-
gulam celerrimè vacuetur, quod os vētriculi infestat.
Inter hæc numeratur lienteria: vbi à re quapiam sic ir-
ritatur ventriculus, vt eam per inferius osculum ex-
pellere cupiat. Illo si quidem ad expulsionē vtitur orifi-
cio, in quod humores contristantes inclinant. Quod si
in vtrunq; repant, vt in cholera morbo, vtrunq; orifi-
cium accommodat. Attractrix ē facultas, aut omnino
nequit cibos attrahere (quod symptoma dicitur gulæ
paralysis) aut difficulter trahit, vbi incipit gula resolui:
aut deprauatè trahit: de quo motu iam sæpe diximus.
Est quum ob iniuriam carunculam tota gula aut eius
pars obstruatur: qui morbus instrumentalis vocatur.
Quum igitur ventriculus naturaliter habet, supernis
partibus ad sese trahit: atq; per inferiores deiicit. Vbi
verò præter naturam affectus est, etiam ab infernis assu-
mit aliquid. Siquidem nonnullis clysmi vomitiōe sunt
redditi: sicuti & sterces, per letales voluulos. Satiū ta-
men est dicere, ventriculum per id genus affectus, non
trahere, sed recipere ab intestinis excrementa violen-
ter compressa. Id quod solet contingere iis, quibus ob
negotia non licuit, quando expediens erat, deiicere.
Nonnunq; etiam fit voluulus, vbi intestina suo illo na-
turali constitutionis motu priuantur. Quin etiam indu-
ratum sterces, tumoresq; præter naturā, obstant ali-
quando, vt vel nihil excrementorum feratur deor-
sum: vel nō satis copiosè deiiciant. In summa verò oīa
symptomata intestinox, ad ea quæ de vētriculo dixi-

thus, referunt. Alimenti p corpus digestio (que & ipsa naturale opus existit) tunc adamusim perficitur, vbi qualibet pars peculiarem sibi allicit cibum. Accidunt autem illi tria symptomatum genera. Nam vel imbecilla est: vel deprauata: vel omnino cessat. Quorum sane symptomatum causæ dicuntur, aut trahetium partium intemperies, aut instrumentorum morbi, aut digerendi alimeni prauitas. Ac per intemperies quidem, facultas redditur imbecilla. Instrumentorum verò morbi, alimenti meatus cōstringunt. Prauitas autem dicitur, si vel crassior, vel glutinosior sit cibus. Similiter impeditæ expulsionis excrementorum, triplices causæ inueniuntur. Vna, quum partes quæ excrementa expurgant, sunt imbecillæ. Altera, viarum angustia. Postrema est excrementi malitia. Imbecillitatē intemperies parit: angustiam verò, vel obturatio, vel aliquis instrumentorum tumor. Atqui tumorum causa est humorum affluxus. Obturationem facit humorum vel crassitudo, vel lentor, vel innatum tuberculum. Excrementorum autem malitia, est multitudo, crassitudo, & viscositas. Per concoctionem in venis factam, tria redundant excrementorum genera. Vnut bilis amara, quæ ab hepatis vesica expurgatur: alterū atra bilis quæ à liene: tertiam veluti serum, quod attrahitur à renibus. Quum autem viarum duo sint genera: vnum per quod excrementum trahitur: alterum per quod expellitur: vtriuslibet angustia excretionem lædere potest. Nōnunq̃ etiam horum nullum est læsum, sed excrementi multitudo quum immodica est, vt tota expurgari non possit, vnā cum sanguine, per totū corpus defertur. Huius verò immoderationis duplex affertur causa: nempe alteratrix potētia male affecta, & alimentorum prauitas. Iam verò pallida bilis, si redundet per vniuersum corporis habitum, regiū morbum: sin autem in vna tantū parte consistat, erysipe

alimenti p corpus digestio.

Digestionis d bonū symptoma, atq; ipsorum symptomatum causæ.

Expulsionis excrementorum nō respondētis, cā triplex.

Excrementorum peruegantium uenas cum sanguine, tria genera.

Excrementorum uix duplices.

Bilis pallida quos morbos signat, per corpus fusa.

Atra bilis quos morbos pariat
Pituita quos morbos gignat.

Serum sanguinis quos affectus producat.

Nutritio est naturalium actionum prima.
Assimilatio alteratio est.

Nutritoria facultatis symptomata.

Atrophia.

Elephas quid.

Alphi.

Alimenta ad suam naturam immutant carnem & immutatur ab illa.
Perlicaplania.
Coniuncta afficiuntur.

lata & **herpetes** excitat. **Atram bilem**, si in vniuerso adsit corpore, **elephas**: si in vna aliqua parte, **cancer** sequitur. **Pituitam**, si per vniuersum corpus increuerit, **leucophlegmatia** comitatur. Sin autem in vna parte, **oedema**. **Serosa excrementa** si redundant, **ascitis** aqua inter cutim inducitur. Quae si vnam aliquam partem inuaserint, in ea **pustulas** gignunt. Pro **miscella** autem ipsorum excrementorum, variari solent & morbi, & symptomata. Porro nutritio, ut naturalium actio nunc est prima, sic per quam necessaria existit: quippe quae species alteratricis facultatis censetur. Assimilatio siquidem alteratio est: quae quidem, licet nomen diuersum a nutritione sortiatur, idem tamen vtriusque est opus. Nutritio autem ab scopo aberrat, si vel nihil omnino agit, vel ab actione perfecta deficit, vel vitiose agit, idque ob altericam facultatem, quae sub alterationis genere continetur, vel ob materiae tum defectum, tum praetinitatem. Ob defectum quidem, ut in atrophis: siue haec ex defectu, siue ex priuatione dicantur. Hic autem in atrophis defectus, non proprie ad cibum qui ingeritur, sed ad materiam membro dicatam, est referendus. At prauitas cibi, leucas & elephantiasim eiusque generis alios affectus gignit. Verum ubi caro nigra pallidaque fuerit, **elephas** nominatur. Nec aliter affectus hic gigni solet, quam leuce: iam alphi haud diuersam a praedictis habent generationem. Ceterum per hos non caro vniuersa afficitur, sed corporis superficies duntaxat, veluti squamis quibusdam ispergitur. Atque albi quidem ex pituita: nigri vero ex melancholico humore prodeunt. Si quidem alimenta carnem, maxime permutare ad suam ipsorum naturam possunt (Etenim Persica plantata, quum in Persia fuisset leralis, postea in Aegyptum translata, quod inerat noxium amisit) quanquam a carne etiam, alimenta ipsa immutantur. Omnis siquidem res, vel si longe potentior sit, ab illa cum qua uersatur: affi-

citur. At nō solū ob alteratricis facultatis imbecillitatem, pars aliqua alimento priuatur: sed etiam vbi attrahendi vis imbecillior fuerit: aut expultrix immodicē mouerit. Atqui tunc immodicē mouet expellendi vis, vbi retentrix potentia grauatur, vel ob extremētorum multitudinem, vel acrimoniā, vel ob propriā imbecillitatem. Tunc siquidem necesse est, vt cum eo quod redundat, simul etiam id quod vtile est, excernatur: vt in lienteria, dysenteria, choleraq; fieri cōtingit. Quod si expultrix facultas sit imbecilla, necesse est carnem tunc humidiores fieri, pluribusq; excrementis impleri. At redundantia multorum excrementorum, ob alteratricis facultatis imbecillitatem accidit. Pro ipsorum autem excrementorum tum quātitate, tum qualitate, alias aliter caro immutatur. Quod verō ad sanguinis excretiones pertinet, si excipias eam quæ fœminis per singulos menses accidit, reliquæ omnes toto genere præter naturam existunt. profluua autem vteri, vbi modum in quantitate exceßerint, tunc solū præter naturam cēleātur. Omnium autem sanguinis fluorum causa, trifariam potest accidere. Quippe vel facultas ora vasorum aperit, vt i sanguinis fluore è naribus est videre: vel sanguis ē male affectus, vel vasorum aliquod etiam malè affectum, vel ruptum. Etenim vasa rumpi contingit, aut ob plagam acceptā extrinsecus, aut ob saltum, aut ob casum ab alto, aut ob vociferationem vehementem. Sanguinem malè affectum dico, vel quum adeò vitiosus est, vt vasa quibus continetur, erodat: vel adeò auctus, vt à vasis contineri non possit. Vasa malè affecta dicuntur, si vel molliora, vel duriora, vel tenuiora fuerint. Siquidem quod immodicē molle est, faciliè ob imbecillitatem rumpitur: sicuti & valde durum, quia non faciliè multum extendi potest. At tenue, ob huiusmodi has vtrasq; affectiones, non solū ab internis causis, verū etiam ab

Alimenti priuatio vnde accidat.

Expultrix vis quando immodice moueat.

Expultrice facultate existente imbecilla, quid accidat.

Sanguinis excretiones omnes, menstrua excepta, præter naturā existūt.

Sanguis quotupliciter effluere possit.

Vasa quibus modis dirumpi possint. Sanguis autē quātitate, aut qualitate immodicus.

Vasa quotupliciter male affecta dicantur.

externis vt rumpatur facillè, est habile. Verùm non omnia uasa erodi similiter possunt. Nam durum crassumq; erosu est contumax. Similiter de refectione è dicendum. Nam uasa imbecilla, mollia, & tenuia, propria sunt vt oscula ipsorū pateant: robusta verò, & crassa, & dura, sunt ad talem refectionem inepta. Ceterè refectionis accidit ab iis quæ ora vasorum irritant, & à plenitudine grauant: sicuti quandoq; à natura, quum excernit ea quæ sibi molesta sunt. Sed iam de iis quæ vomitu reiciuntur dicamus. Excernuntur igitur hæc interdum q̃ quantitate & mole sua ventriculum grauent, vt quum plurimum cibi est ingestum: interdū, q̃ sua mordacitate contristant: vt si nutrimentum assumptum vel acidum, vel nidorosum, vel aniax, vel acre, ob vitium concoctionis euaserit. Eodem genere continentur & biliosa, & pituitosa, & serosa excrementa, vel inibi nata, vel ex vniuerso corpore illuc confluentia. Tertium causarum genus ventriculum ad vomitum incitans, est quod haudquaquā irritans, in illo cōtinetur præter naturam: vt videlicet sanguis. Cōiuniter autē dicuntur esse præter naturam, quæ etiam si sint concocta, minimè possunt alere. Iam verò recrementorum ad infernas partes expulsio, nonnunq̃ solitum tempus præuenit, vel quia uenter copia multi cibi grauatur; vel pungitur, vellicaturq; vt à re mordente: quam vt alienam expellere nititur. At dicimus multum cibum, vel quia facultas seipsa imbecillior è reddita: vel quia existit assumptum alimentum immodicū: vel ob utrāq; causam. Præter iam dictas causas, alimenta tum humidiore, tum viscosiora ingesta, ipsam deiectionem accelerant. Quæ tum celerius delabuntur, quum leuiter post eorum assumptionem deambulaueris. * Quū autem complura sint intestinorum volumina, per quæ deferri alimenta est necesse, cibi sanè ipsi, ob grauitatem diu immorari non possunt: q̃ si eorum quippiam

Refectionis vasorum unde accidat.

Vomitum a quibus causis mori possit.

Sanguis in ventriculo, continetur præter naturam.

Deiectionem ciuitantes causas. Cibus multus quotupluciter dicitur.

in ipsis circumuolutionibus fixum inhæreat, id subito ab actione intestinorum (quibus inest vis expellendi in festantia) propellitur. Tardius quàm pro consuetudine excernit venter, aut ob intestinorum vel imbecillitatem, vel obtusum sensum: aut ob alimentorum tum paucitatem, tum qualitatem: Sed musculorum abdominis imbecillitas etiam deiectiones retardat: præsertim si duriora sint excremeta: quo tempore thoracis musculi etiam auxilio sunt. Pauciora quàm pro ratione assumptorum excremeta excernuntur, ubi plus ex cibis per corpus digeritur. Econtrario plura deiciuntur quàm pro portione ingestorum, interdum ob defectum digestionis per corpus: interdum ob excremeta quædam è supernis ad regionem ventris defluxa. Porro assiduæ excretiões, uel ob imbecillitatem, uel ob morbum eueniunt. Imbecillitatem intemperies inducit. At mordicant humores contenti. Est & alius assiduæ deiectionis modus, quæ fit ob sedis musculos resolutos. Quippe huiusmodi deiectiones à voluntatis imperio non pendunt: proinde & intempestivæ, & inordinatæ, & assiduæ sunt: Iam verò solet status in ventriculi spatiis oriri, quum vel humores pituitosi illic contenti, uel cibi, in vapores ab imbecillo calore solvuntur. Etenim ut ab solutum frigus vaporem haudquaquam excitat, sic uehemens calor exactius magna ex parte cibum ipsum comminuit, quàm vaporis generationi conueniat: nisi fortè is suapte natura sit flatulentus. Quemadmodum enim frigidissima constitutio, maximè spirante borea, aerem sereniorē reddit: ac rursus calidissima constitutio æstatis, efficit aerem nos ambientem purissimum: mediæ verò constitutiones nebulas pariunt: sic in animalium corporibus à solo moderato, imbecilloque calore flatulentum gigni excrementum contingit. Hoc igitur si per os excutiat, ructum efficit: sin autem per sedem, flatum molitur, interim strepentem, interim sine strepi-

Alium tardius deicere quæ compellant.

Excremeta cum nunc plura, nunc pauciora quàm pro ratione cibi assumpti excernantur. Fluxionis assidue, cause.

Deiectiones intempestivæ, sunt præter voluntatis imperium. Status in ventris gigni à pituitosis humoribus, et calore imbecillo.

Serenissimum reddi aerem, Borea spirante.

Flatum in ventriculo genitum, quæ sequantur symptomata.

Streptu a flatu profectū eo acutiorē edī, quo status ipse tenuiora intestina magis percutit: grauiorem autem, quo magis ille crassiora versus descenderit.

Streptus murmurillus, purus stridensq; quid indicent.

Defluxus vnde in ventriculum accidat.

Excretio quibus fiat modis.

Excrementum sola quantitate alienum, quod sit.

Hepatici qui dicantur.

tu. Quum uerò per neutram defertur partem, inflationem, symptoma uentriculi imbecilli, producit: quæ etiam mota per vacua intestina, in illis uarios gignit strepitus: qui quidem eo acutius atq; tenuius resonant, quo purior spiritus fuerit, magisque per intestina tenuiora & superiora delatus: eo autem minor, sed grauior resonatio sentietur, quo spiritus magis ad inferiora intestina descenderit. Quod si intestina ipsa aliquam humiditatem contineant, strepitus murmurillus dictus gignetur: qui humidi excrementi deiectionem nunciabit. Si uerò strepitus æditus, purus & clarus resonet, aut intestini ipsius inanitionem, aut in superiori eius parte excrementa dura contineri significabit. Qui strepitus cum stridore fit, is ab instrumentorum angustia, & inflante spiritu, atq; pauca humiditate procedit. Defluxus à supernis partibus in uentriculum fit, ubi facultas præualida, redundantia excrementa expellit: interdum ubi adeò imbecilla existit, ut ne id quidem quod utile est, ferre possit. Excernitur id quod redudat, tum per crisis, tum per integram ualitudinem, ut in mulieribus singulis mensibus, & in iis quibus aliquod membrum est mutilatum: id quod etiam per definitos circuitus contingere in aliis multis uidemus, qui prioris uitæ exercitia, cum ignauo otio mutarunt. Atq; excrementum huiusmodi sola quantitate est alienum. Aliter qualitate aberrat: magnaq; ex parte in acutis morbis solet excerni per crisin. Inter hæc duo excrementorum genera, est aliud tertium genus medium, ut in uentriculo semicoctus cibus. Hoc autem per hepaticas affectiones maximè excernitur. Cæteræ nominantur hepatici, quos ob iecinoris imbecillitatem infestat morbus, etiam si nulla adsit phlegmone. Hepar igitur, si quā alimētum, quod per meseraicas uenas attraxerat nequeat conficere, per easdem rursus id semicoctum ac simile aquæ in qua fuerunt ablutæ carnes nuper ma-

statæ, respuit. Quod si alimentum in hepate accuratè
concoctum fuerit, ob aliquod autem in impedimentum
distribui in corpus non possit, vt ad * ventrem redeat
est necessarium. Quo tempore excretus sanguis appa-
ret nigrior, splēdidiōr q̃; illo, qui naturalis existit: utpo-
te ex sanguine & atra bile commistus. Etenim sanguis
solus per se ob refrigerationē nigricans, tantū abest
vt splendorem ullum acquirat, ut etiam eum quem ab
initio habuit amittat. Atra autem bilis eo splēdidiōr
existit: quale maris mortui bitumen iudaicum. Siqui-
dem non ex refrigerato sanguine, ut grumus, sed ex
immodicē affato, feruido q̃; veluti quidam cinis, gi-
gnitur atra bilis. Cæteræ ipsa est frigida, quia terrestris:
non tamen caloris expers: quemadmodum nec cinis,
nec etiam acetum. Igitur cruentorum excrementorū
quatuor sunt differentiæ. Prima est, vbi sanguis qua-
tenus dictum est, per circuitus quosdam emanat. Secū-
da, quum ob imbecillitatem iecinoris, haud absimilis
lauacro ablutæ carniū sanguis deiicit. Tertia (quam
nuper diximus) ex melancholico splēdente q̃; sangui-
ne constat. Ac per has tres differentias, & multum est
excrementum, & affatim excernitur. Per quartam ve-
rò (quæ exulcere intestinoꝝ oritur, præcipue q̃; dysen-
teria vocatur) paulatim & breuib. intervallis deie-
ctionē fieri contingit: nonnunq̃ synceri sanguinis: nō-
nunq̃ grumosi: cum quo interdum puris quoq̃ nonni-
hil excerni solet: quēadmodum & ramenta, & partes
quædam membranarū intestinorum cōsimiles. Sæpenu-
mero densum quoq̃ stercus excernitur, cruentis gut-
tis respersum. Eiusdem generis cum prædicta dysen-
teria est tinessmos vocatus, ob recti intestini vlcus eue-
niens. Qui quidem cætera symptomata dysentericæ si-
milia habet: tensionis verò vehementia, dysenteriam
longè superat. Vrinæ tum suppressiones, tum deprava-
tæ expulsionēs, excrementis quæ uel in uentre reti-

Alimentum ab
hepate in ven-
trē regeri, quan-
do processū sit,

Atrā bilē esse
excreto sangui-
ne splēdidiōrē.
Atram bilē gi-
gni ex sangui-
ne immodice
affato, esseq̃
frigidam, non
tamen caloris
expertem.
Cruentorum ex-
crementorum
differentiæ qua-
tuor.

Dysentericæ &
gna.

Tinessmos orit̃
ab ulcere inte-
stini recti.

**Vrinam unde
supprimi acci-
dat.**

**Ischuria, quorū
symptoma exi-
stat, /**

**Vrinæ meatus
ex quibus ob-
strui occasione-
bus possit.**

**Vesicæ osculū,
qua ex causa
conniueat.**

**Stranguria fit
vel ob imbecil-
litatem vesicæ
vel ob lotii a-
crimoniam.
Colliquationes
partium qui-
bus modis sel-
uantur.**

Renū facultas.

mentur, vel præter morem naturæ eiiciuntur, propor-
tione respondent. Supprimitur igit, vel ob vesicæ im-
becillitatem excernere non potentis, vel ob ostioli ipsi-
us angustiam. Quorū duorū morborū ischuria est unum
commune symptoma. Est & aliud symptoma quum
nihil penitus urinæ in vesicam delabatur, abolita nimi-
rum renum actione. Alius itaq; affectus censendus est,
quum oppleta vesica, alius quā uacua, nihil urinæ red-
ditur. Nam in ea affectione qua vesica est plena, opor-
tet aut oriñcium eius angustum, aut naturam imbecil-
lam existere. Os igitur fit angustum, quia obstruitur et
pniuet. Atq; obstruitur quidē, à grumo, uel crasso pu-
re, uel lapide, uel callo, uel tuberculo, quod in meatu
creuit: cuiusmodi in externis partibus omnibus accide-
re cernimus. Conniuet autem, aut ob tumorem præ-
ter naturam, cuiusmodi est phlegmone: aut ob siccita-
tem ingentem: qualis per febres ardentissimas gignit.
Sunt verò deprehensi quidam vesicam oppletam habē-
tes, qui veriti surgere à cœna, vt illam exonerarent,
postea meiere nequiverunt: qualis etiam affectus ven-
tri & intestinis solet interdum accidere. Igitur iam di-
cti affectus, vim excernendi vrinam, sua functione de-
fraudent. Qui verò ab iis magnitudine relinquuntur;
actiones efficiunt obtusas, torpidasq;. Reliquos affe-
ctus tertium genus symptomatum (qd in moribus de-
prauatis consistit) comitari cōsuevit: cuius multæ spe-
cies habentur. Primam stranguriam appellant, quæ
vel ob imbecillitatem vesicæ, vel ob acre lotium fieri
videtur. Secunda species profluuii ventris est similis.
Solet aut fieri quædam veluti resolutio, colliquatiōue;
interim vniuersi corporis: interim succorum tantum;
quos venæ continent. Deinde quod ita liquatum est,
modo in ventrem, modo cum vrina defluit: nonnunq;
in sudorem degenerat. Igitur venarū succos in sero-
sam sanienem solutos, renes ad sese trahunt, vbi integrē

valent, continenterq; ad vesicam transmittunt. Si vero invalidi fuerint, ut ipsos trahere nequeant, tunc venæ eiusmodi serum aut in ventrem demittunt, nimirum si crassius sit: aut in universum corpus pellentes illud, ubi est tenuius, subito totum habitum ad aquam iter cutem transmutant. Quod si caro liquata sit, tum vel venter suscipit ipsam fluxionem, si sit crassiuscula, vel sudores profluent, si in vapores solvatur. Reliquorum loci symptomatum, alia quidem vesicæ aut renū quosdam affectus indicant: alia quantum vel cruditatis vel concoctionis accesserit sanguini, ostendunt. Ut vero ad sudores transeamus, ubi in resolutio corporis habitu eveniunt, affectus vocatur syncope: cuius sane rei contrarium, per sudores creticos accidit: quippe qui robustas vires annunciant. Eis autem sudores sunt similes, quos modica exercitatio, & balneum, & calor æstivus evocat. Per exercitationes autem immodicas, nonnihil utilis humoris excernitur. Odorem vero & colorem excrementi quod expurgant, sudores obtinent. Cæterum multus sudor effluit, aut ob corporis raritatem, aut excrementi tenuitatem, aut abundantiam. At detinetur, si paucum, viscidum, crassumq; excrementum fuerit, aut constipati meatus: id quod accidit ipsis, quia vel obturantur, vel constringuntur. Ac obturantur quidem a succis crassis & viscidis. Constringuntur ob nutritionem pleniorē, vel ob refrigerationem, vel ob mollitiem. Adhæc sudoris tum excretio, tum suppressio, ob viriū in carne imbellitatē interdū accidere solet. Porro nulli⁹ partis functio, manere ipsius essentia illæsa, impediri potest. Nulla autem qualitatum agentium, res vicinas perinde alterare videtur, ac calor. Quare corpus calidum simul & humidum, quod celerim proprium sibi alimentum concoquet, assimilabitq;. Quod vero ita sit dux, ut & flectatur facile & firmiter innitatur, id & trahere vehementer quidlibet, potest.

Aqua inter cūtem quomodo generetur.

Syncope quid, Sudores cretici robustas vires annunciant.

Sudores retinent odorem & colorem eius, quod purgant, humoris.

Sudoris tū nimis fluentis, tū suppressi causæ.

Essentia partis illæsa, functio impediri non potest.

Calor vicinas res omniū maxime alterare potest.

Calidū & humidum corpus quā celerrime proprium sibi alimentum assimilare.

Frigida & sicca corpora cur nutriantur inefficissime.

Concoctio.

Nutritio.

Appositio.

Adhæsiō.

& ipellere uolēter, & detinere fortiter poterit. Optimè itaq; nutriuntur calida & humida corpora: ut quæ & celerrimè immutent, alliciantq; ad se, reponantq; & assimilent alimentum. Pessimè omnium frigida, & sicca: ut quæ nec alterare, nec suscipere, nec apponere, nec assimilare sint apta. Quod verò humidiora corpora tum facilius, tū celerius adhæreant, coalescātq; duriorum autem, alia nequaquā, alia non facile id perperantur, nemini obscurum existimo. Cæterum concoctio & nutritio, alterationes esse censentur. Appositio fit, quum cibus in roris speciem redactus, à nutrito suscipitur. Adhæsiō est, alimenti cum alito cōglutinatio quædam: dum in vnum coalescunt. Atq; in his omnibus pueri, aliiq; quorum temperamentum calidius est & humidius, optimè degunt: nec infeliciter in illis distributio perficitur. Retentricem tamen facultatem pueri habent imbecilliores, ob idq; excernunt celeriter. Similiter etiam expellendi facultas, ut retentrix, modicè illis est imbecilla. Eget autem longiori tempore facultas retentrix, quo suo fungatur munere: expultrix verò breuiori. Pueri igitur, ut alteratricis facultatis robore iuuenes superant, sic attrahendi visunt ipsis longè inferiores: atq; ab eis etiam in duabus reliquis facultatibus supantur. Quāq; expultricis imbecillitas in eis minimè deprehenditur, idq; ob temporis breuitatem, quo suo fungitur munere. Quippe crebrius & deiciunt & vomunt, q̄ iuuenes, non ob expultricis potentiz robur, sed ob retentricis imbecillitatem. Atq; in concoctionibus quæ ad ventriculum pertinent, si humida molliaq; sumpserint, ea perinde ac iuuenes concoquunt: dura verò, deterius conficiunt. Si quidem puerorum calor, ad vaporis naturam: iunenum, ad siccitatem magis accedit. Atqui humidiora corpora humidioribus indigent alimentis: sicciora siccioribus. Senes ad omnes ferè actiōes corpus malè as-

Pueri vim retentricem habent imbecilliores: expultricemq; non admodum fortem.

Pueri quibus facultatibus superēt iuuenes, & quibus ab eis superentur.

Pueris iuuenilibusq; caloris discernimen.

Nutriuntur omnia similibus.

fectum sortiuntur: quippe qui iuuenib⁹ aridiores sint, præterea etiam frigidi. Quare nec probe concoquant, ob caloris penuriam: nec rite nutriuntur, partim ob siccitatem, partim ob imbecilitatem alteratricis potentiae. Iam digestio per corpus ipsis & tarda, & imbecilla est, nimirum instrumentis veluti torpentibus ob frigiditatem. Porro ad functiones actiuas calidum instrumentum & siccum, magis idoneum est: frigidum verò & humidum, imbecillius. Reliquæ duæ coniugationes medium inter has locum obtinent. At verò si ætates ipsas spectes, naturaliter frigidum & humidum corpus, minimè deprehenderis: quanquā ob affectum præter naturam, talia reperiri contingat. In vniuersum igitur, frigidum ubique est debilius, & torpidum, siue humori, siue siccitati iungatur. Haud aliter inter naturales potentias, retentrix robustior quidem videtur in aridioribus calidioribusque instrumentis: imbecillior verò, in humidioribus frigidioribusque. Similiter nervi, tendones, syndesmi, & muscoli, quanto sicciores, tanto robustiores euadent: nisi adeò modum excesserint, ut ob duritiem vix flecti possint. Nam si sic sint affecti, corripientur spasmo. Contrà naturalia instrumenta, quo sunt humidiiora, eo sunt ad nutritionem magis idonea: vel si ad extremam humiditatem peruenerint: ad concoctionem verò non sunt aptiora, nec se ipsis, nec aridioribus, quibus similis adsit calor: nisi siccum aliquando cibum exhibeas instrumento sicco & squalido, non liberaliter ei tribuens humiditatem. Cæterum & ad digestionem per corpus, & ad excretionem, corpora admodum dura, ineptissima existunt: & haud facile vel dilatantur, vel contrahuntur. Quod alterum attractiōem: alterum excretionem intolitur. In summa verò, calor auctus ad omnem alterationem efficacissimus est, nisi ad tantam, ut colliquet, vehementiam increuerit. Siccitas ad robur & firmitudinem co-

Senes cur fere ad vniuersas functiones corpus male affectum sortiatur.

Actiuis functionibus quæ instrumenta sunt commodiora. Frigidum & humidum naturaliter nullum corpus reperiri in ætatibus. Frigidum ubique esse debilius, torpidumque.

Naturalia instrumenta, quo sunt humidiora, eo sunt ad nutritionem magis idonea: ad concoctionem verò, ineptiora aridioribus, quibus adsit similis calor.

*Qualitatū quæ
in quibus sunt
efficaciores. sū
efficiētibz et quæ
inutiles.*

*Coryza.
Catharus.*

*Destillatio est
defluxus in os.
Grauedo est de
fluxus ad nares
Raucedo est ad
fauces deflu-
xus.
Vn.
Antiades
Paristhmia.*

*Vteri corpus a
quibus causis
durari possit.
Menses vnde
retineri contin-
gat.*

*Menses quibus
ex causis plus
æquo fluant.
Muliebze pro-
fluvium.*

fert, nisi adeò sit cruda, vt corpora rigida, immobilia, ac friabilia efficiat. Humiditas ad nutritionem quidē mirificè facit: cæteris verò functionibus omnibus aduersatur, excepta quia corpus angetur. Deinceps autē de fluxionibus à cerebro oriundis aliquid etiam dicamus. Destillationis igitur & grauedinis (hæc coryza, illa Græcis catharrhus dicitur) cerebrum causa existit: vt pars quidem similis, vel à frigore, vel à Solis ardore in intemperiem, adactum: vt instrumentum verò, quatenus infestatur à plenitudine. Cæterum destillatio fit, si ad os excrementum defluerit: grauedo si ad nares: quemadmodum & rancedo, si ad fauces decumbat. Quod si fluxio gurgulionem inuadat, aut vñ pariet, aut ipsum in tumore attollet. In glandulas quæ ad finem oris vtrinque adiacent, si decumbat, antiadas procreat: Sicuti & paristhmia, inuadēs ea quæ illis proxima sunt. Ac defertur quidem fluxio à capite nonnūq̃ in ventrem: nonnūq̃ in asperam arteriam, vtrilibet maxime nocens. Quod verò ad vteri corpus spectat, si solidum fuerit, aut durum, causa est, cur supprimantur menses. Duratur autem, vel illico à primo ortu: aut tractu temporis, post ipsam generationē: videlicet ob intemperiem, aut affectus alios præter naturam. Ac in temperies vteri, interdum à natura oritur: interdum sequitur morbos, perinde ac densitas. Detinentur etiā nonnūq̃ menses, ob materiam ipsam vacuādam, vbi vel crassa est, vel viscida: necnon vbi à crassis humoribus vasa quæ ad vterum descendunt, obstruuntur. Ad hæc vterius nihil omnino excernit, ob multas exercitationes, & victum tenuem, & quum ad alias partes reputent humores. Minus excernit æquo, ob easdem causas, sed remissiores. Plus autem ob diuturnum otium, & victum opiparum. Cæterum deprauatæ vteri fluxiones (quod symptoma fluxus muliebris dicitur) sunt expurgato per hanc partem vniuerso corpore. Ac talē

semper speciem refert id quod excernitur, quale est quod in animali redundat. Est & aliud ex utero deprauatum profluuium, ob affectum aliquem ipsum infestantem eueniens. Insuper interdum cohibentur menses, sanguine, ob robustas vires, in alias partes irruent. Ad hunc autem sermonem pertinet meminisse mulierum minime foratarum, quibus uteri meatus coaluit. Iam priapismus est, quum inuito intumescit inflaturque masculinum pudendum: cuius symptomatis causa existit flatulentus spiritus. Porro gonorrhœa, si pudendo non intento acciderit, retentricis facultatis in semina riis vasis imbecillitatem sequitur. Si verò intento pudendo eueniat, conuulsioni quodammodo erit affectus similis. Colorum vicissitudinem (ut summatim dicam) faciunt succi à sua naturali specie aberrantes, aut in profundum subeuntes, aut cutem veluti illuentes. Particulatim verò, causæ, ob quas succos ad huiusmodi tum motus, tum affectus peruenire oportet, sunt affectiones animi: aeris nos ambientis vel ad calorem, vel ad frigus mutatio, corporis affectus, vel calidiores, vel frigidiore; item sanguis vel paucus, vel plurimus: tum foras elatus, tum intrò reuulsus. Huc accedit etiã quodlibet humorum vitium, ad suam ipsius speciem vniuersi corporis colorem permutare potens. A naturali autem figura deflectunt partes, immodicè vel replete, vel inanite, vel à propriis sedibus deturbate, aut reuulsæ. Ut autem hunc iam commentariũ claudamus, operæpretium mihi videtur addere, quæ nam symptomata sibi mutuo & necessariò succedant: & quæ item non necessariò. Igitur id quod fit, vnâ nunc ex causa fiat, an ex pluribus, considerandum. Nam si ab vnica tantum fiat, necessariò causæ efficienti succedet. Si à pluribus, non necessariò. Symptomata itaque quod ab vno alio dependet, necessariò consequitur illud. Vbi verò aliarum quædam causæ ad secundi symptomatis genera-

Causæ mulierum.

Priapismus est inuoluntarius tumor virilis pudendi à flatulento spiritu ortus.

Gonorrhœæ species. Colorum vicissitudines vnde oriuntur.

Figura partium à quibus causis vitietur.

Symptomata quæ nam sese mutuo ac necessario sequantur, et quæ minime.

alium videri

p. 200. 100

Cruditatē nul-
lum necessario
symptoma se-
quitur.

Atrophia sequi
tur necessario
alimenti defe-
ctum.

tionem accedunt, ipsum non necessario ad primum consequitur. Neque enim cruditatem, gratia exēpli, inflatio ex necessitate sequitur, vel mordicatio, uel nauſea, quā tum horum, tum reliquorum symptomatum ferē omnium nullum est, quod non aliquando cruditates sequi videatur. Verū & cruditatis magnitudo, & differētia, tum hominis natura, tum sensus, uel acutus, uel obtusus, itē singularum corporis partiū & robur & imbecillitas faciūt, ut aliās aliud symptoma cruditatem sequatur. In summa, uerō quaecumque pars cruditatē fecerit, illa noxam percipiet, quæ maximē imbecilla fuerit. Proinde nullum symptoma necessario sequi cruditatem, possumus asseuerare. Vbi autem alimentum minimē per corpus digeritur, siue priuatio, siue imbecillitas fuerit actionis, atrophiam necessario inducet, quēadmodum in singulis partibus alteratricis potentiae noxa. Præterea expultricis facultatis circa excrementa, aut sanguificæ potētiae, aberratio, necessario producit prauī coloris symptoma.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E C A V S I S P R O C A T A R C T I C I S.

L I B E R V N V S.

Procatartice
causæ inuolida
tantum corpo-
ra immutant.



Q V A S Procatarticas, siue exte-
nas, siue præincipientes appellant, ut
magnus calor, frigusue ambientis,
aut etiam aliquis animi affectus, inua-
lida solum corpora commouent: ac
proinde à nonnullis nō causæ sed mor-
borum occasiones uocantur. Videmus etenim mille-
simul in theatro sedentes, ē quorum numero quatuor-
dūtaxat æstuant: & in eis à febre unus solus arripitur,
quod nuper

quod nuper familiari nostro Menandro contigit: quē nos secunda die inuisentes, iussimus caput rosaceo foueri: mox dormire: postmodum impensē lauari, ac sic tandem est restitutus. Alios etiam complures, ob æstū & labores febrientes, reclamantibus cæteris medicis, plurimis balneis ac uictu humidiori usus, similiter perfunui. Non desunt tamen, qui varia connectentes sophisinata, quas nuper causas procatarticas diximus eas morborum causas esse inficiantur: quæ uidelicet nec semper, nec omnia corpora lædāt. Qui quidem nō secus habendi sunt odio, ac illi, qui spinas & hamos, in viis, per quas sunt transitori homines, semināt. Nos itaq; horum impedimentorum nonnulla iam rescindamus: aliqua emendemus: alia conteramus: ut antiquā viam, quæ non ad ciuitatem, sed ad artē omnibus ciuitatibus vtilissimam ducit, purgemus. Quod igitur tū frigus, tum immoderatus calor, & contristare, & morbos gignere soleant, id idies natura rerum nos docet: quum nimirum vel ipsa animalia bruta, soleant loca & regiones, mutare, ut æstate quidem calorem: frigus verò hyeme declinent. Quod si hæc noxia quidem, nō tamen morborum esse causas fateātur, quæ nec semper, nec omnibus noceant, iam non de re, sed de nominibus disputant: quanquā ne sic quidem effugere poterunt, quin cōuincant, saltem illas esse causas nocuenti iis, quibus nocent corporibus. Sūt porro duæ primæ causæ ac maximè principales in vniuersum: scopus videlicet, siue finis, cuius gratia sunt omnia quæ fiunt: ac præterea id, à quo ea fiunt. Has dignitate sequuntur tertia & quarta, instrumenta nimirum quibus, & materia ex qua. Etenim in humanis artibus, nisi causæ omnes conspirent, nullus vnquā effectus absolui poterit. Nā nisi aliqua esset lecticæ utilitas, nunquā faber illam cōstrueret. Sed si aliqua sit illius utilitas, careat autem dolabra, serpa, cerebello, aliāquē supellectili instrumentorum, nec

Menandru
infolatu febrilē
tē, qua ratione
sanari Gale-
nus.

Bruta mutant
regiōes, ut æstū
& frigus vitent.

Causæ primæ
& maxime pri-
cipales in vni-
uersum, sunt fi-
nis cuius gratia
fiūt omnia quæ
fiunt: & præter-
ea id a quo
fiunt: quas pos-
tea sequuntur
reli quæ, nēque
instrumenta si-
mul atque ma-
teria.

Effectus nullus
absolutus, oterit
in humanis ar-
tibus, nisi cau-
se in unum oēs
cōspirēt. id ē
in iis quæ for-
tuito cōtingūt
minime neces-
sariū videntur.
Oia egere ma-
teria ex qua,
& efficiente a
quo fiant.

sic lecticā coagmentabit. Et si hæc illi oia præsto sint,
& mox ligna deficient, neq; ita componetur lectica.
Sed nec si instrumenta & materia parata sint, & vtili-
tas vrgeat, absit autem artifex, quicq; unq; compingē
possit. In iis tamen artibus quæ casu fiunt, interdum fi-
nalis causa desyderatur: quum ea nullius gratia fiant:
est etiam vbi id per quod fiunt, abest. At nihil inuenire
licebit, quod materia non egeat, ex qua constet, & ef-
ficiente, a quo fiat. Semper siquidem est necesse, vt sit
conuentus alicuius patiētis, quod vicem materiæ sub-
eat: & alterius quod circa ipsum agat, & efficientis ra-
tionem obtineat. Hoc autem nonnūquā instrumento
eget, si alicuius gratia operetur. Interdum sine instru-
mento agit, vbi nullius gratia neq; ex proposito agit.
Vbi igitur ex frigore vel æstu aeris ambientis, aliquis
læditur, aer ambiens dicitur causa effectrix: materia,
corpus affectum. Nullus itaq; effectus oriri poterit, nisi
efficientis & materia iungantur. Vnde oportet vt hæc
vtraq; aliquid ad generationem rei conferat. Quæ au-
tem ad rei generationem cōducunt, meritò causæ ap-
pellandæ sunt. Reperire autem licet præter iā dictas,
etiam & alias causas, accidentales tamen: veluti inter-
medium spatium minimè impediens, quo faber indi-
get, vt circa lignum agere possit: idq; non qua artifex
est, sed qua corpus, quod alium ab eo qui continet ma-
teriā circa quam operatur, occupat locum. Hæc siq;
dem ex accidenti dicuntur: & tanq; ea sine quibus non.
Solidum quippe corpus interiectum inter fabrum & li-
gnum, impedimento est, quo minus operari artifex
possit. Quod si de medio tollatur, ex accidenti conseq-
tur, vt aer in illius locum succedat: quum nusq; in hoc
orbe vacuum possit consistere. Proinde constat fabrū
acre ex accidenti indigere. Similiter ambulationis cau-
sæ sunt: ipsius vtilitas: vis animalis: atq; etiam crura:
at causæ sine quibus id fieri nequit, aer circūfusus ce-

Causæ appellā-
de sunt, quæ ad
rei generatio-
nē conducunt.

Causæ accide-
ntis sine quibus
operari non li-
cet.

Vacuum nūq;
duri.

dem: pauimentūq; renitens. Quod autem ait Erasistratus. Si refrigerari febricitandi causa est, qui magis refrigeruerit, ille magis febricitabit: maximè absurdū videtur. Nam si effectrix causa ipsa id absq; patiēte apto efficere posset, qui magis refrigerarēt, magis quoq; febricitarent. At si frigus non omni corpori febrem adferre potest, sed illi tantum, quod ad eam excipiendam est habile, utiq; non amplius erit necesse, ut qui frigerunt magis, magis quoq; febricitent: immò facile nonnullos reperiās, qui ne senium quidem febris concipiant: sicut tamē a troniti, vel torpidi, vel tremuli, vel conuulsi, ut accidit Alexandro, dum æstiuo tempore in Cydno, Ciliciæ Flumine, se lauaret. At verò, nec illud etiam reuera confici potest, ut qui magis, frigescit, magis quoq; lædatur: sicuti neq; hoc etiam, ut si magis lædatur, magis febricitet: quum aliquando contingat aliquem magis lædi, qui tamen non modo non magis, sed nec omnino febricitet. Idem etiam dicendum est, de labore plenitudineq; & aliis id genus causis, quas eodem paralogismo, ab ordine procatartica rum febris causarum, exterminabat. Sed cur interim operam ludimus, dum hæresim Erasistratorum conuellimus, qui asserunt patriam potius prodendam esse, q̃ proprium dogma? Adeò enim stupidi simul & pertinaces sunt, ut etiam omnes febres à phlegmone exoriri contendunt: ob idq; nec potum frigida, iis qui ardenti febre tenentur, concedant: quum tamen ea opportunè exhibita, nisi obster viscerum inflatio, ægri confestim sudant, liberiq; à morbo reddantur. At si in discernenda hypostasi purulenta, ab ea quæ in sanis, & post solutas febres conspicitur, essent exercitati, conuincerentur. Quippe in sanis, & ubi febres solutæ fuerint, id quod residet, album est, nec foetorem habet, nec colorem, nec lentorem, qualis cernitur, ubi phlegmone in suppurationem conuersa soluitur. Sed

Frigus illi corpori febrem adferre potest, qđ ad eā excipiendā est habile.

Alexander fuit torpore correptus, dū in Cydno, Ciliciæ flumine, se lauaret.

Erasistrati cōsebant, patriā potius prodendam esse, q̃ proprium dogma.

Frigida opportune exhibita iis qui ardenti febre tenentur nisi viscerum inflatio ebillet ab affectu conliberat.

Puris hypostasis discimē.

hæc etiam est summa inipudentia Erasistrati, q̄ quum fateatur repletionem plethoram efficere: hanc verò, sanguinis paremptiosim ad arterias: atq; hanc deniq; phlegmonem: nolit tñ concedere repletionem phlegmonis causam existere. Nā & nos pari modo dicim⁹, q̄ qui plaga homini illata venas colli secuit, non extitit illi causa mortis: quoniam causa proxima fuit, non ille qui percussit, sed potius effusio sanguinis.

G A L E N I P E R G A M E N I

De plenitudine. Liber vnus.

Sicuti nullum est quod nostra tempestate in ore ferè omnium medicorum crebrius versetur, q̄ plenitudinis vocabulum: ita nec aliud facillè inuenias, quod magis ab eis ignoretur. Vt autem eos qui ignorantia tenebris occæcant, quiq; absurda tuetur dogmata, im præsentiarum missos faciamus, cum ingenuis verò ac veritatis amore flagrantibus, confabulemur: duas i vniuersum notiones, relationes ue plenitudinis proponamus: vnā quidem, secundum robur, viresq; illius q̄ talem plenitudinem defert: alterā, secundum excipientis vasis capacitatem. Dein verò, sedulo perscrutemur, quæ nam sint vniuersæ animantis vires, & quomodo plenitudo, quæ secundum earum vnāquāq; consistere potest, sit & agnoscenda, & curāda. Postmodum, quot sint eorum humorum species, qui vel vires aggrauent, vel à vasis contineri non possint. Igitur in libris de Placitis Hippocratis & Platonis satis à nobis monstratum est, q̄ alia ea vis sit, quæ in venis cōsistit, alia quæ per arterias, sicuti & alia quæ p̄ nervos diffunditur. Vbi etiam docuimus cor * facultatis arteriarū fontem atq; originem esse: nervorum autem, cerebrū sicuti iecur venarum. At in libris de Elementis ostendimus, substantiam eorum omnium quæ generationi & interitui obnoxia sunt, à quatuor primis qualitatibus

Plenitudo est duplex: una iuxta vires illius q̄ eā defert, altera iuxta vasis illā cōtinentis, capacitatē.

Cor est arteriarum origo.
Cerebrum est fons nervorū.
Hepar ē venarū pricipium.

immutari: & ex earum certa quadam temperatura,
 omnium corporum substantiam, ac proinde viriū ca-
 rum essentiam, quæ corpus nostrum dispensant, con-
 stare: quippe quæ non sit, nisi ipsius temperamēti quæ-
 dam proprietates. Porro vis ipsa siue facultas, causa effe-
 catrix existit, non materialis substantia, patibilis uel. Fa-
 cultas itaq; erit alicuius actionis causa, quam mox ne-
 cesse est esse motum ab agente in id quod patitur. Sicut
 tri & affectus qui in patiente est, motus erit ab agente,
 in rem patientem. Vnde vires suam quidem ex alterius
 comparatione notionem habent: essentiam verò, *
 ex habitudine ad alterum. Quod autē in se ipsum aut
 agat, aut aliquid efficiat, omnem mentis captum exce-
 dit: sicuti etiam, quod se ipsum aliquid contineat. Qua-
 re non modo ex Herophyleis multi, sed & ex Stoicis
 iuniores, dum contendunt ostendere, q; spiritus atq;
 ignis & sese, & cetera elementa contineant, terra ve-
 rō & aqua ab iis contineantur, nullam demonstratio-
 nem adferunt. Nos quippe euidentissimè cernimus, ita
 nihil ab igne contineri, ut potius ab eo vniuersa sol-
 uantur. Etenim quod durum est, renitensq; , ac den-
 sum, vel primo aspectu potius continere videri possit:
 contra verò, quod molle, cedens, rarumq; est, altero i-
 digere à quo contineatur. Dicamus igitur, quoties-
 cunq; præ multitudinem aliquid nimis distēditur, aut dis-
 rumpitur, affectum talem, ad continentia vasa specta-
 re, non verò ad aliquas vires: quum verò grauatur, ad
 sensutricem potentiam. Nam neq; id ipsum omnino ad
 vires pertinet omnes. * quum naturalis potentia hæc
 grauitas affectus non sit. At verò plenitudinis genus,
 quod ex loci continentis capacitate commensuratur,
 non modò in animantibus reperitur, verū etiam in re-
 bus inanimis, quemadmodum i vestibulis, vinculis, pel-
 libus, vasisq; fictilibus. Rumpuntur siquidem omnia
 hæc, ubi multa replentur statiosa substantia. Porro

Essentiā facul-
 tatū corpus no-
 strum regitū,
 extēperie qua
 tuor qualitātū
 cōstare: effe-
 ctū proprietatē tē-
 peramenti.
 Facultas ē cau-
 sa effectrix.

Agere in se ip-
 sum, nihil pōt:
 sicuti nec se cō-
 tinere.

Ignis oīa dis-
 soluit.

Cōtinere vidē-
 tur dura, reni-
 tētia: ut cōti-
 neri, quæ mol-
 lia & cedentia
 existunt.

Plenitudo di-
 stēdēs aliquid,
 dē iuxta vasa.

Plenitudo gra-
 uans, ēt si non
 distēdat, ad vi-
 res sensutrices
 refert: minime
 autem ad natu-
 rales.

Plenitudinē iux-
 ta vasa repe-
 riri ēt in rebus
 inanimis.

quum quatuor sint naturales potentia, attractrix, retentrix, alteratrix, expultrix, alia sunt inquirenda indicia ad cognoscendam plenitudinem quæ secundum earum singulas accidit: nam nec grauitas in istis sufficere poterit. Etenim imbecillus ventriculus, vi sensitrice maxima est præditus, qua sibi grauius sentire possit. Iam quibus signis arteriarum plenitudinem, quæ ex collatione ad earum vires constat, probè deprehendere liceat, in commentariis de pulsibus exposuimus. Venarum vero,

Plenitudo iuxta venarum vires, quæ ratione deprehendi queat, neque scripsit Galenus, neque ab aliis scriptum reperit.

nec ego signum aliquod vnquam, quo id ex scientia haberi possit, præscripsi: neque ab alio quopiam literis mandatum reperire potui. Vt autem de plenitudine agamus, quæ sigillatim quascunque particulas occupat, sciendum est, ea membra quæ parum sentiunt, vel sunt sensus omnino expertia, nequaquam parem cum ventriculo aut vesica, excrementorum, quæ in ipsis cõgesta sunt, sensum habere: sed aut omnino exiguum, aut penitus nullum: exiguum quidem, vbi maxima plenitudo adfuerit: nullum, vbi illa non multa fuerit. Nam in pulmone, iecore, renibus, atque in nonnullis ossibus, aliquis nonnunquam oboritur alicuius poderis sensus: quod is certè, potius ad membranas referri debet, quam ad eorum viscerum carnes. At secundum cerebrum, per quod manifestum sui sensum grauitas interdum excitat. In partibus autem seu suuacuis, nullus potest non modo grauitatis, sed nec alterius etiam symptomatis sensus haberi. Atqui sensu

Sensu vacuas particulas, nec grauitatis, nec prorsus ullius symptomatis posse sensum percipere.

Medullæ omnes insensiles.

Iecoris gibba insensibilis esse.

carere videntur nonnulla ossa, adeps, & glandulae quaedam: præterea medullæ omnes, sensus expertes sunt. Cerebrum tamen atque spinalem medullam, nonnulli in sentientibus particulis collocant. Tutius tamen poterit quispiam de carne, qua gibba iecoris pars constat, asserere, quod absque vlllo sit sensu: quum nervus illi nulla ex parte inferatur. De parte autem illius caua, facile dubitatio exorietur, quum nervi qui iecori iuxta portas distribuuntur, adeo sint exiles, ut cõtèxere solam

membranam videantur. Grauitas igitur, cuiusvismodi signum illius est plenitudinis, quæ ad vim sensitricem spectat. Nā si in aliqua particula quæ sensu prædita sit, vlla humorum multitudo aggregetur, i ea statim grauitatis sensus quoque excitatur. Nec tamen quotiescunque pondus loco alicui insederit, ibi etiam humorum multitudo aggregabitur: quandoquidem si facultas sit imbecillior, poterit vel ex ipsismet solidioribus membris grauari: quemadmodum in corporibus resolutis contingit. Si quidem præ resolutione imbecillioribus reditis musculis, sentit ille qui resolutus est, in motu grauitatem insignem: ita tamen, ut infirmus musculus sibi ipsi minimè grauis videatur. Grauitas quippe ab altero, & in altero, gignitur. Potest itaque musculus fieri se ipso inualidior, imbecilliorque: ut verò sibi ipsi sit grauis id fieri nequit. Age igitur, maioris perspicuitatis gratia, ponamus nunc ab spiritu per nervum delato, moueri musculum: à musculo verò, tibiam primum, cui is inseritur. Qua mota, articulus in genu, ubi crus vniuersum committitur, subinde etiam moueatur. Qui bus sic constitutis, quisque verè asserere poterit, & musculum, & totam tibiam, inualido spiritui esse oneri. Quocirca minimè potest exquisitè dignosci, quid sit id quod primum grauet, quodque primum grauet, nisi prius sciat, id quod primum in nobis vnaquaque mouet particulam. Ad quod quidem vir tum in discernendis potentiis quæ nos gubernant, peritus: tum in anatome exercitatus, desideratur. Iam verò, ut nulla est necessitas, illis qui in obeis dis functionibus, valentiores quam prius forent, effecti sunt, humores aliqua ex parte accreuisse (quod Erasistratus existimabat) ita per necessarium videtur, ut si qui validiores actiones habeant, eis virium robur accesserit. Actionum siquidem fortitudo, ad virium robur consequtur: sicuti & robur virium, fortitudinem comitatur functionis. At à sanguinis multitudine, consequtio nul-

Grauitas est certum indicium illius plenitudinis quæ ad vim sensitricem spectat.

Plenitudini ad vires non requiritur necessitas magna humorum: colluuias

Grauitas ab altero & in altero gignitur.

Actionum fortitudo ad virium robur consequitur.

Robur virium, fortitudinem comitatur functionis.

la necessariò est futura: quò neq; si is maiori sit copia
 q̃ antea, validior ex necessitate futurus sit homo: neq;
 si minori, imbecillior: sicuti nec si æqualis sit, necessum
 est illum viribus eodem se habere modo. Liquet itaq;
 actiones validas propriam esse ac inseparabilem viriũ
 vigentium notam: sanguinis verò aucti nequaquã. Por-
 rò vbi adest tensionis sensus, nec tamen exercitatio p̃-
 cesserit, ibi necesse est, plethoram esse congestam. San-
 guis autem auctus, non tamen eò, vt venæ adhuc ten-
 sæ sint, nondum plethoram absoluit. Vt verò tensio,
 copix humorum propria vasa tendentium affinis est,
 ita vlcerosus sensus, acrem sequitur qualitatem humo-
 rum, potestq; vel ex solis quãdoq; motionibus gigni.
 Si igitur particula quæ distenditur, particeps sensus fue-
 rit, necessum est, vt quæcunq; fuerit ea res, quæ eo ip-
 sam distendit, vt capi nequeat, tensionis sensum in ani-
 mante excitet. Atq; is affectus qui tunc membra occu-
 pat, tensio appellatur. Quæ si plurimum augeatur, erit
 etiam necesse, vt quod tenditur disrumpatur. Cæterũ
 non tantũ ex ipso sanguine, sed ex quacunq; substã-
 tia humida & flatulenta, possunt partes tensuo affectu
 occupari. In vniuersum autem, id quod grauat, mul-
 tum: quod verò pungit, aut mordet, molestum esse di-
 cemus. At plures reperiri humores mordaces, qui par-
 tim in nobis gignantur, partim accedant extrinsecus,
 omnibus ē compertum. Quorum quatuor penes ma-
 gis & minus differentix extant. Etenim qui modicè
 mordent, pruritum inferunt, vti scilla: qui verò ma-
 gis, rodunt, vt cæpa. Sed si aliqua præterea adhuc his
 fuerint acriora, horrorem excitabunt: præcipuè qui-
 dem, si particulis admoucantur exulceratis: proroga-
 to verò, atq; aucto horrore, symptoma illud, rigor vo-
 catur. In nobis quoq; mordaces gignantur succi eadẽ
 ratione, per has quatuor ideas distincti. Quorum sanè
 pruriginosi illi sunt, qui modicè existunt acres: vlcero-

**Actiones vali-
 dx, nō aucti sã
 guis, sed uigẽ
 tiũ virium sunt
 inseparabilis no-
 ta,**

**Vlcerosus sen-
 sus acrẽ sequi-
 tur qualitatem
 humorum.**

**Tendi p̃nt par-
 ticulæ a quauis
 substãtia humi-
 da & flatulenta.**

**Mordicãtium
 humorum, qua-
 tuor, secũdum
 magis: & mi-
 nus differentie
 habentur.**

**Acres humo-
 res particulis
 exulceratis, ad
 mori horrore
 atq; rigore ex-
 citant.**

sum verò sensum pariunt, qui his sunt mordaciores: q
autem hos quoq; mordacitate superant; horrorem:
sicuti qui præterea iam mordacissimi sunt, hi rigorem
inducunt. Affectio igitur vlcerosa, ex succis mordaci-
bus gignitur. Grauitas autem, à multitudine pro viriū
comparatione. At tensionis affectio, & ipsa quidem hu-
morum multitudinem sequitur, non tamen per colla-
tionem ad vires corporum continentium, sed tantum
ad capacitatem qua continentur illi. Ad hanc ergo affe-
ctionem vltimam, tensio tantummodo pertinet: vt ad
secundam grauitas. Vlcerosus verò sensus, neutrius ē
propria nota: nec plenitudinis nuper dictæ, nec secun-
dæ, quæ vires respicit. Ex symptomatis itaq; , alia ad
plenitudinem pertinent, quæ respicit vires: alia ad eā
quæ in infusione consistit: nonnulla præterea non sunt
* simpliciter plenitudinis notæ, sed huiusce plenitudi-
nis. Quædam verò, nullius quidē plenitudinis, sed hu-
morum potius prauitatis & corruptionis sunt signa:
aut virium imbecillium, aut tumoris solidoꝝ corpoꝝ.
Ergo affectio tensiua, nisi exercitationis sit comes¹, plu-
rimam omnino substantiam in corpore quod sensu p-
ditum est, contineri insinuat: non tamen qualis sit ipsa
substantia, ostendit: nisi alia etiam indicia accedant.
Actionum verò imbecillitas, vires inualidiores osten-
dit: * q; mouens causa impediatur: quēadmodum ac-
cidit in languidiori manuum motione: id quod plures
constitutiones consequi potest. Nā si in aliquo carneū
ac adiposum particularum genus, viribus tamen eos-
dem fines seruantibus, adaugeatur, necesse fuerit mo-
tiones imbecilliores fieri: moto nimirum aucto: mouē-
te verò æquali pmanente. Sed si aut vnus qspiā ex hu-
morib², aut oēs ēt simul excreścāt, nec vires alioqn sūt
vnā augeant: sic quoq; necesse erit actiōes inualidas red-
di: nec sec² si humores simul & effusiōes creuerint, nul-
lo aut in viribus incremēto facto: quēadmodū & si pa-

*ulcerosa affe-
unde gignat*

Vlcerosus sen-
sus neutri: ple-
nitudinis est p-
pria nota.

Symptomati-
differentiæ ua-
riæ.

Tensiua affe-
ctio quid indi-
cet.

Actionis lan-
guor, vires in-
ualidiores ostēdit

res illi se habuerint, vires verò imbecilliores euadant. Fieri et pōt, vt & demat de viriū robore, & humores vnā cū parēchymate, seu trāsfusionē (quæ impſentiax molē carnis, pinguitudinisq; ſignat) vel plures fiāt, vel pauciores. Horum itaq; vtrumuis eueniat, neceſſario auadent * functiones imbecilliores. * Arbitrari autē q̄din ſolida corpora optimē nutricantur, poſſe nōnūq; edi imbecillioſiorem motum, hominum planē eſt, minime perpendentium, facultates per vniuerſa ſolidiora corpora permeare: ſed perinde ac fiſtulas, aut canales quosdam, ſic ſpiritui venas & arterias conſtituētium. Hallucinantur etiam, qui inter plethorica indicia, corporis tumorem reponūt. Quippe venarum tumor poterit forſam eſſe plethoricum ſignum, inſeparabileq; vbi corpus ita ſe habuerit, vt neq; interna externis ne hæc illis, caleant magisq; nec præterea calor immodicus vniuerſum corpus detineat. Carnis autem & adipis moles, eorundem multitudine indicabit: non tamen plethoricæ plenitudinis quæ deſyderat euacuationem, ſignum exiſtet. Quum autem ſyncer⁹ ſanguis nunq; ita reperiatur in venis, quin illi aliquid aut bilis, aut pituitæ, aut ſeroſi excrementi permiſtum ſit: perinde ſanè erit dicere, ſanguinem ipſum augeri, ac ſi etiā humores dixeris. Venarū itaq; tumor, ſanguinis plenitudinem indicat, ſi tamen iſ à nulla gignatur externa conſtitutione prorsus inualeſcente, aut ex fuſione, aut ex ebullitione. Cauendum præterea erit, ne particula illa decliuiſ fuerit: ne ſue paulo ante cæteris vehementius mōta. In ſumma verò, plenitudo à venarum tumore indicabitur, ſi omnes corporis partēs eandem conſtitutionem ſeruarint, idq; cum mediocri calore. Cæterum tum tumor ipſe, tum tenſio, quum à ſingulis humoribus, necnon à ſtatu excitari poſſint, plenitudinis quantitatem, potius q̄ ſpecificas differentias declarant. Siue igitur ſanguis eō incrementi peruene-

Facultates per
uniuerſa ſoli-
diora corpora
permeare.

Tumorē corpo-
ris nō oēm eē
ſignum pletho-
ricum.

*syncera sa-
guinis, non
periti tumores*

Venarū tumor
qñ ſanguinis
plenitudinē in-
dicet.

rit, vt citra tunicarum tensionem, naturæ modum excedat, corporiq; grauis videatur: siue ita sit auctus, vt vasa continentia distendat: vt runq; certè & multū, & plenitudo dicitur: sed prior illa, secundum vires: hæc penes vasa vocetur. Iam rubor, si nec ex sole, nec ex balneo, nec ex immoderato exercitio, neq; ex calor, nec ex ira verecundia ue, neq; ex alia deniq; occasione extrinseca oriatur, sed vndequaq; corp^o æqualiter fuerit affectum, sanguinæ plenitudinis nobis indicium existit. Omnem autem plenitudinem, quæ in venis congesta est, facile motus arteriæ ostendit, ob mutuā vasorum confluentiam: nisi vbi humores contenti in venis, q̄ maximè sunt crassi & tenaces. Plenitudinis autē species, vbi in vniuersum illa corpus dispergit, his notis sunt distinguendæ. Rubor plenitudini sanguinæ attestatur: color verò suppallidus, flauæ bili. Quum autem pituita nimis excreuerit, i album magis q̄ pro naturæ modo, color ipse mutatur: quemadmodum in atrum, si bilis atra. Opus tamen est, vt cum singulis horum humorum simul sanguis augeatur: alioqui nō plenitudo aut plethora, sed cacochymia potius dicenda venit. Cæterum si grauitas vel tumor præter naturæ modum accesserit, affectio talis, plethora appellabitur: ipsiusq; humoris vincentis species, ex colore iudicabitur. Sola tamen bilis, nec tumorem, nec pondus (quæ à plenitudine seiungi nequeunt) inferre potest. Nam ante q̄ ita ea increseat, alia illi superuentura est affectio. At si sola pituita augeatur (inter cuius species annumeratur humor qui crud^o dicitur, fabāq; imitatur elixam, q̄ alia pituita, crassior, ac minus flatu lentus existens) dūtaxat in leucophlegmatia solet per vniuersum corpus exuberare. Sunt enim & aliæ pituitæ species: dulcis nempe, acida, & salsa. Verū ex dulci fiunt somnolenti: ex acida quum redundat, fameliciti: quemadmodum siticulosi ex salsa. A cruda autem,

Plenitudo fecundum vires.

Plenitudo secundum vasa. Rubor insans, sanguinis plenitudinem indicat.

Arteriæ motus, vena plenitudinem indicat.

Plenitudinis spēs quibus notis sunt distinguendæ.

Cacochymia quid.

Plenitudini petuo adesse tumorem & pondus.

Pituita i leucophlegmatia dūtaxat solet per vniuersum corpus exuberare. Pituitæ spēs diuersæ, earūque usus & facultates.

Sopor unde,
Vigiliarū cau-
sæ.
Melancholici
sunt difficiles,
& præter oēm
rationē tristes.

Pituita in ore
uētris collecta,
appetentiam
facit
Bilis utriusque
facultates.

Melancholicus
succus

Pulsuū dñæ p
uarietate hu-
morū exupe-
rantium.

Sanguinis tem-
peries a diuer-
sis causis varia-
tur.

deficitur appetentia, somnolentiq; etiam sunt. Si-
quidem si humefcat, refrigereturq; cerebrum, quod
est sentiendi principium, statim soporosa affectio obo-
ritur: quemadmodum si siccescat, atq; incalescat, in vi-
gilias illabitur. Proinde omnes qui utraq; bile, redun-
dant, insomnes degūt: id tamen peculiare habent, qui
atra bile cruciantur, q̄ difficiles sunt, atq; præter oēm
rationem, tristes. Vigiliæ itaq; & somni causa, in cere-
bro ipso consistit. appetentiæ autem & illius defectus,
ad os ventriculi pertinet. In quo quidem si colligatur
pituita, appetitiones excitat: si flava bilis, tum sitim, tū
cibi fastidium pariet, osq; fiet amarulētum. At si atra,
morosi, tristes * atq; formidabiles fiunt, & sine siti: sa-
liuacq; plurimum illis scatet: atq; nonnulli eorum satis
videntur famelicis: in quibus nimirum atra bilis, acida
qualitate fuerit affecta: id quod sanè cōtingit, vbi ipsa
malignior est reddita. Porro vbi ea veluti fæx sangui-
nis permanet, neq; exactè est acida, satius fuerit illam
appellare melancholicum succum: non autem melan-
choliā, siue atram bilem. Quodd verò ad pulsus perti-
net, si in plenitudine flava bilis redundet, tales necesse
est reddi pulsus, qualis vbi cor calfit simul & exiccat.
Si atra bilis, quales quum frigescit & exiccat. Si pitui-
ta, quales edi solent in humida frigidaq; constitutio-
ne. Vbi verò sanguis se omnino secundum naturam
habuerit, nulla fiet in pulsu ab antiquo statu mutatio:
alterantur autem, secundum ipsius sanguinis mutatio-
nem. At verò ex otio & humido victu sanguis humi-
dior seipso redditur: ex ira autem, exercitatiōe, æstu,
frictione, medicamento, alimentoq; calfacientibus,
nec nō meraciori antiquiori q; vino, calidior efficitur:
quemadmodum frigidior, ex recenti frigore. Quodd si
quispiam alimentis temperaturæ siccioris diutius uta-
tur, quæ tamen alia nulla intemperie teneantur, san-
guis siccior euadet. Sed secundum etiam varias com-

plicationes causarum, in diuersas incidet sanguis compositas intemperies: idq; citra miscellam aliam in eo superantis humoris. Quod si ob aliorum quoq; humorum misturam, illabatur in intemperiem, certè absq; cacochymia constare talis Idyscrasia non poterit: alias tamen octo differentias fortietur, sed diuerso modo, q̄ ubi ille solus & per se fuerit talis. Verum an intemperies ad solum pertineat sanguinem, an ad aliquem aliū illi humorē permistum, ex iis quæ diximus, & ex aliis multis signis, facilè deprehendi potest. Fingamus igit homini qui febre est vacuus, venas in tumorem attolli, ac totum corpus rubicundius euadere. Statim enim est expendendum num et causæ aliquæ occurrerint, ex illis quæ vim calefaciendi habent: & si hoc fortè videatur, præstiterit huiusce rei dignotionem tantisper differre, donec morio ab illis in corpore vniuerso excitata, conquieuerit. Tunc autem, si qualem diximus, talis appareat, sanguinem sanè in eo abundare, indicium erit. Mox verò grauitatē, tensionem, pigritiam ad nortum, pulsus, vigiliam, soninum, appetentiam, fastidiū, præcedētēq; vitæ rationem, expedit reuocare ad examen, expēdereq; an aliqua excretio solita, illi suppressa sit, aut exercitatio neglecta: & an alimentis plurib⁹, aut plurimi nutrimenti sit vsus: vel si post cibum se præter morem lauerit: solitusq; sit plethoricis morbis corripī. Quibus addenda est temporis & regionis consideratio. Nam hyeme & vere, locisq; tum frigidis, tum temperatis, maior colligitur plenitudo: minor verò locis & temporibus calidis atq; siccis. Sic etiam qui densa sunt cuti, frequentius plenitudinem colligunt. Sicuti rarius, qui rara.

Plenitudo maior colligitur hyeme & vere

G A L E N I P E R G A M E N I

De atra bile. Liber vnus.

Sanguis (qui humor omnibus hominibus est notissimus) ubi vel arteria, vel vena fuerit conuulnera-

Sanguis extra
sua uasa, subi-
to in grumum
concrefcit.

ta, illico effundi videtur: rubens sanè magis è venis: fla-
uior autem ex arteriis manuum. Vndecumq; autem
exeat, subito concrefcit in grumum: idq; nò solum ex
tra corpus, sed intra illud etiam: in quouis ipsius lo-
co præter naturam contentus. Igitur magna ex parte
in hoc humore rubeus color exuperat: & talis exactè
optimus sanguis existit. Apparet autem nonnunq; hoc
ipso flauior & nigrior: sicuti etiam et consistentia cra-
ssior atq; tenuior. Quin et videtur quandoq; in con-
creto sanguine tenuis quædam humiditas, contracta
à potu innatare. Interdum & pituitosus humor cum
sanguine per venas defertur. Cæterum hæ differentie
humorum nò mutant sanguinis appellationem. Est &
alius quidam humor sanguini crasso & nigro persimi-
lis, qui tum per vomitum, tum per deiectionem excer-
nitur: non tamen etsi diutius aeri ambienti expositus
fuerit, omnino densatur. Atq; hic ipse humor aliquan-
do à vomentibus acidus simul & acerbus sentitur: quã-
doq; verò nullam qualitatem manifestã præ sese fert.

Salfos humo-
res esse morbi-
ficos.

Pituita ois eẽ
debet colore
albo, minime-
q; concrefcere.
Flauis bilis spe-
cies.

Quum autem sanguis maiori ex parte dulcis eẽ videa-
tur: pituita autem insipida, veluti aqua: certè si quãdo
hi humores sentiantur salfi, morbofi erunt. Euadit au-
tem interdum ipsa pituita dulcis. Porrò pituita omnis
esse debet colore albo, minimeq; concrefcere. Est &
alius humor, qui dum vomitur, semper amarus appa-
ret: non semper tamen flauus: sed quandoq; pallidus.
At semper qui flauus est, pallido crassior videtur. Iam
verò, vt flaua bilis tenui serosq; humiditari cõmixta,
& pallidior, & aquosior euadit: sic vbi resoluitur pluri-
mum, vitellis crudorum ouorum apparet similis: ob
idq; vitellina appellat. Igitur hæc bilis, siue pallida sit,
siue flaua, siue vitellina, i vasis habet suã generationẽ.
At in ventriculo quædã alia gignit bilis, quæ porri colo-
rem refert: Alia quæ ab æruginis similitudine, ærugi-
nosa vocatur. Alia, quæ isatidis imitatur colorem. Qui

Bilis porri co-
lorem referẽs,
in utrículo gi-
gnitur.
Bilis ærugino-
sa.

bus omnibus ē commune, vt quales sunt, tales permanant. Vt verò ad atram bilem redeamus, ea, quia nō concrefcit, à sanguine nigro distinguitur: non tamē ab iis quæ propriè excrementa nigra appellantur, eo nomine differt. Hæc si quidem, quum talia sæpius vomantur ac deiciantur, ab atra bile quæ plurimum & facultate & qualitatibus differunt. Nam neque acerbum saporem, neque acidum manifestè participant: quum atra bilis tū gustui, tum olfactui talis esse videatur. Ad hæc, excrementa nigra minime terram fermentāt, vt atra bilis. Quæ quidem * hac in re quum sit aceto quæ acer rimo si milis, partium tamē crassitie ab eo quæ maxime dissidet. Quamobrem, quibus corporis partibus pura & impermixta adhæret, eas exedēdo exulcerat. Acetum etenim, quæ tenuium sit partium, permeat: atra bilis atræ crassities, quum illi sedem firmam exhibeat, corrosioni sit causa. Taceo quæ nullum animal atram bilem gustare sustinet, sicuti nec meram sanguinem: in qua nullū animal degere potest. Cuius rei mare mortuum firmum indicium præbet. Perniciosa itaque illius generatio censet, quum ex humore atro supra modum assato cōingat. Cæterum ea bilis atra quæ ex flaua bile immodicè assata ortum habet, tanto hac perniciosior est æstimanda, quanto flaua bilis efficacior est sanguinis sedimento, quod amurcæ aut fecis instar generari est proditū. Igitur vt exactæ bilis atræ humorem semper excerni ad perniciem animaduerti, sic eorum quæ nigra apellantur euacuationē, non raro salubrem exituisse conperi. Porro sanguis qui vena secta mittitur, nigrior esse videtur in siccis calidisque temperamētis corporum: sicuti & in huiusmodi anni temporibus, & regionibus, cōstitutionibus, vitæ studiis, victus ratione, ac denique cibis crassis & siccis: quales sunt, lens, cochleæ, et carnes taurinæ, hircinæque, præsertim sale asseruatæ. Consimilis etiam naturæ est vinum nigrū, crassumque,

Nigra excrementa quō ab atra differant bile.

Atra bilis est acida, terram fermentat.

Atra bilis differt crassitie ab aceto.

Atra bilis cum exedat, corrodat.

Atram bilem gustare nullum animal sustinet.

Mare mortuū nullum in se piscem alit.

Atra bilis quæ flaua præassata oritur, est omnium perniciosissima. Atra bilis semper ad perniciem excernitur.

Sanguis niger quibus secta vena vacuetur.

Melancholicū succum gignit.

& austerum. Pari etiam ratione quæcūq; ægritudines sunt ex calida siccaq; intemperie, cuiusmodi sunt febres ardentes, crassum & nigrum sanguinem gignūt. Vbi igitur per febres ardentes melancholicus humor in cutim ipsam propellitur, carbunculus appellatus producit. Si verò ad eam, citra febrim, decumbat, fueritq; permistus sanguini, elephantem gignere est aptus. Sin autem solus existat, ab initio quidem nigrū tumorem gignit, qui procedēte tempore terminatur in cancrum. Rursus, vbi acrior & contumacior hic humor fuerit, cācrum exulceratum: vbi autem maturior, latentem & citra vlcus producit. Quippe omnes huiusmodi affectus, & præsertim cancer, ab humore melancholico oriuntur: cæterum vt à calidiori carbunculus, ita ab eo qui minus calidus est, oriri cancer consuevit. At vbi is humor niger qualitates obtinuerit mitiones, nimirū permistus sanguini, subrubeos elephantas progignit: qui tamen processu temporis longè nigriores euadunt. Sæpius autem natura, vasorum quæ ad sedem sunt, referans venam, huiusmodi humorem excernit, commistum sanguini: ob idq; excretio ipsa hæmorrhœis appellatur. Sæpè numero etiam eundem humorem ad crurium venas transmittit, à quo dilatata & distenta, varicosæ redduntur, & cutis quæ huiusmodi venas attingit, temporis processu nigrescit. Quod si venas illas turgentes melancholico humore quis moliatur excidere, periculum imminet, ne homo corripitur melācholia: id quod fieri sæpius est visum, non in varicibus modo, verum etiam in hæmorrhœidibus, quæ ex huiusmodi humore cōsistunt. Quod igitur in venis & arteriis humores omnes vnā cum sanguine continentur, ostendit ipsius varietas, tum in colore, tum in consistentia: id quod etiam ex iis quæ diximus, & quæ in libro de Natura humana, ab Hippocrate prodita sunt, liquidò constat. Qui humores quādiu tēperamenti

Tumores ab
atra bile orti.
Carbunculus.
Elephantiasis.

Cancer.
Cancer exulceratus.

Hæmorrhœis.

Varices.
Varices hæmorrhœoidesq;
siquis cohibere conetur, periculum est ne homo corripitur, melācholia.

temperamenti obtinuerint mediocritatem, animal erit sanum: ægrotabit autem, vbi vel in omnibus vasis, vel in parte aliqua, eorum aliquis à naturæ modo recesserit. Rationi autem est consentaneum, similes affectus oriri in partibus quæ profundo in corpore delitescunt, iis qui in cute consistunt. Quum itaq; flaua quidem bilis in vnam quampiam decumbens partem, generet erysipelas: atra verò, carbunculum atq; cancer: mirū sanè esse non debet, si vtraq; in intestina descendens (quandoquidem internæ partes nō sortiuntur cōstitutionem adamantinam) aliās aliud ipsorum erodant, ac nonnunq; prorsus insanabilem dysenteria efficiant. Omnes siquidem exulceratiōes ab atra bile sunt insanabiles, nisi quis curationem appellet, vbi affecta pars tota circūquaq; ad partem sanam vsq; dissecta, abscindatur. Queniammodum igitur intestina citra alicuius auxilii spem vlcerantur ab atra bile: à flaua autem, difficulter curationem admittunt: sic in profundo sitis accidit cæteris partibus, atq; iis præcipuè, quæ intestinis sunt nobiliores. Adde q; intestinorum curatio facilius est, eo q; medicamenta quæ iniiciuntur per sedem, statim locis affectis occurrūt: quod sanè in cæteris partibus fieri facile nequit. Porro lien malè affectus, vel ex inflammatione, vel scirrho, vel imbecillitate, ad nigrius conuersus, colorem vitiosum in toto corpore efficit. Quin & ipse semper iecore nigrior existit: & præsertim in animalibus calidioribus & siccioribus: qualia sunt ferratos dentes habentia. Hoc viscus etiam vel elixum, gustui quippiam acerbum refert, vt iecori nihil simile appareat. Vnde liquet iecur expurgari à liene: qui nimium attrahit quicquid in ipso sanguine fœculētum existit: quale vtiq; est fæx in vino, & in oleo amurca. Ex hoc verò q; medicamenta flauam bilem trahentia, auxiliantur eis qui regio morbo laborant: quæ autem aqua educunt, hydropes ascitas euacuant: sicuti & quæ

Erysipelas.
Carbunculus.
Cancer.

Dysenteria.

Exulceratio
omnis ab atra
bile est insana
bilis.

Intestinarū
curatio, cur facili-
or sit, q̃ alia-
rum internarū
particularum:
Lien malè af-
fectus colorem
totius corporis
vitiat.

Lien elixus gu-
stui quippiam
acerbū refert.

Hepar a liene
expurgatur.

Purgantiū me-
dicamentorum
singula sibi fa-
miliares succos
attrahere.
Lienem nutri-
ri ab acido hu-
more, quem re-
cipit.

Ventriculo de-
mitti aliquan-
do humores, p-
easdem venas,
per quas solet
suggeri alimē-
tum hepari.

Mēstruum san-
guinem quan-
titate & quali-
tate esse inuri-
lem.

Pituitam in
ventriculo gi-
gnit, at postea
coctā a iecore,
in sanguinem
venit.

Pituitæ purgā-
dæ cur nullum
datum instru-
mentum sit a
natura, vt reli-
quis excremē-
tis.

nigra expurgāt, elephātos & caneros augeri prohibēt:
in confesso est etiam, vnumquodq; purgantium medi-
camentorum familiarem sibi humorem attrahere. Vt
autem ad lienem reuertar, quandoquidem vnāquāq;
corporis partem proprius alit humor, animalium ve-
rò ferratos habentium dētes lien acerbā acidāq; exhi-
bet qualitātē, manifestū est, humorem qui illū nutrit,
talem etiam existere. Non igitur erit aliam particulā
excogitare, quæ melancholico humori excipiēdo sic
destinata. Iam verò, per quas venas à ventriculo in he-
par alimentum suggeritur, per easdem à toto corpore
in illum etiam humor demittitur: tum in purgationi-
bus quas moliuntur medicamēta: tum in iis quas natu-
ra in morborum crisi-
bus efficit. Quin etiam i rectē va-
lentibus, nōnunq; optimus sanguis ad ventriculum cō-
meat, ipsum videlicet nutriturus: id quod in lōgis ine-
diis accidit. Porro quum natura quæ foetum format
& auget, pgnatiōis tempore optimum sanguinem at-
trahat, in venis relinquitur vitiosissimus: qui post par-
tum tandem excernitur, quemadmodum singulis mē-
sibus, qui non solum quantitate, sed qualitate etiam
superfluous atq; inutilis est. At pituitosus humor, ex pi-
tuitosis cibariis, in prima concoctione, quæ in ventri-
culo fit, generationem obtinet: veluti biliosus melan-
cholicusq; in iecore. In cuius quidem coctione pitui-
tosus humor etiam in sanguinem vertitur. Quam ob
causam nullum ipsi proprium instrumentum molita ē
natura, ad sanguinis expurgationem, quemadmodum
est vtrāq; vesica & lien. Siquidem hæ sanguinem à bi-
lioso humore & seroso expurgant: lien verò, à melan-
cholico humore. Itaq; pituitosus humor, qui in ventri-
culo gignitur, quum deferatur in iecur simul cum hu-
moribus genitis ex comestis & bibitis, vnā cum illis
concoquitur, in sanguinemq; mutatur. In vniuersum
igitur, omnes qui ab humore melācholico proueniūt

affectus, statim inter initia medicamenti cum humorem vacuantibus validè purgans, quo minus augeant prohibebis: vsq; etiam ad caneros. Non est autem eadem bilis atra in iis qui integra sanitate fruuntur, & in nonnullis eorum, qui olim naturalem habitum sunt egredi. Porro medicamenta singula proprium quendam similèq; sibi succum eliciunt: non autem in naturam suam corporis humores permutant. Nam si medicamenta morbo regio laborantibus propinaueris: quæ verò bilem educūt, his qui infestantur aqua intercutim: quoniam minimum proprii humoris videbis utrobique vacuari. Atq; inde non solum nihil iuueris ægrotantes, verū etiam quoniam maxime læseris: haud aliter, quā si ipsis venas incideres. Aduerte autem columbas, atq; alia animalia pleraq; destituta esse vesica fellis.

Melancholicus affectus quomodo inhibēdi sint

Medicamenta purgantia, familiares sibi succos atrahere.

Columbæ ceteris fellis vesica

GALENI PERGA

MENI DE TVMORIBVS PRAETER NATVRAM. LIBER VNVS.

INter ea corpora quæ naturaliter, & quæ præter naturam se habent, tertia quædam est constitutio eorum corporum, quæ non secundum naturam affecta sunt. Siquidem qui crassior vel gracilior est factus, non adhuc naturalis habitus fines egreditur: sed tantum alter supra naturæ modum, alter verò infra inuenitur: uterq; autem secundum naturam est minimè affectus: quanquā certè horum affectuum non naturalium, excessus quidem, præter naturam existunt: terminus autem eorum excessuum, est actionis oblatio. At qui tumorem ex aqua inter cutem contraxit, & qui ex tabe euasit gracilior, præter naturam sanè uterq; est affectus. Igitur in præsentī libro, de tumoribus præter naturā, qui tum corpus vniuersum, tum quālibet illius partem occupant, nobis differere est animus, sumpto ap̄ phlegmone initio. Phlegmone dicitur tumor carno

phlegmone
sic

Phlegmōnes
accurata de-
scriptio.

Phlegmōnes
curatio.

Putrescere ca-
lida & humi-
da, vbi in cali-
dum locū im-
pacta, nec va-
cuantur, nec re-
frigerantur.

Ossa interdū
fluxionē ipsam
inscipere.

Phlegmonis
generatio.

farrum particularum, vbi cum tensione, renitentiaq; necnon dolore pulsatili & calido, ruboreq; maiorem sibi tumorem contrahūt. Ex quibus quidem signis sanguinem redundare in inflammatione ipsa, existimandum est. Cuius sanè defluxus priusq; sit impactus, facilis hīs quæ refrigerant atq; astringunt, repellitur: p̄sertim si tumor fuerit exiguus. Vbi autē fluxio impacta iā tenaciter hæserit, nullum ab astringentibus & refrigerantibus auxilium admittit: indiget autem vacuari. Iam verò pars phlegmone oblecta, nō statim ab initio sit immodicè calida: sed procedere tempore: pristina nimirum perspiratione impedita, ex obstructione omnium meatuum. Idcirco si inibi sanguis diu immoretur, necessum ē, vt omnino putrescat. Siquidem omnia corpora simul calida & humida, in calidum locum coacta, putrescunt promptè, si nec euacuentur, neq; refrigerentur. Quare & quæ ex ipsius putredine caliditas nascit, ei supervenit, quā ante habebat. In uniuersum autē, nihil in inflammata particula permanere potest exactè secundum naturam se habens, inflammatione perseverante diutius: sed omnia simul cum carne, cutis videlicet, nervi, tendones, membranæ, atq; vasorum tunica, fluxionem ipsam suscipiunt. Quare & ossa interdum fluxio ipsa inuadit: sicuti & ab ipsis primò affectis, nonnunq; oritur: quemadmodum etiam à nervis, vbi scilicet, vulnerantur. Cutis igitur, vbi secundū naturam se habet, laxa est, in iis qui crassi non admodum sunt: & locus medius, cui ipsa incumbit, existit vacuus: nec secus ea quæ in carne sunt spatia, conspiciuntur inania. Omnia autem hæc per inflammationes replentur sanguine: ex vasis quidem, per eorum tunicas resudante: in quacunq; autem carnis particula, ad modum roris permixto. Vbi verò procedente tempore viderit quidem natura: fluxio autem omnis coacta fuerit, ac genitum pus: extra carnem id pellitur à faculta

te, quæ in ea est, expultrice. Quòd si vel meatus naturalis còspicius sit, vel locus rarus existat, pus sanè partim perspirat: partim sensibilibiter effluit. At si incubens cutis densa duraq; extiterit, ibi pus detinetur, atq; eà à subiecta ipsi carne dirimit: deinceps & sui acrimonia corrodit, & foras egreditur, nisi quis eam præuertat scarificare. Cæterùm natura à fluxione victa, non amplius ad pus, sed ad alienam quampiam mutationem, aliàs diuersam, proficiscitur sanguis. Porro dū pus corpora excoriat, continentiaq; à subiectis diducit, ac deinceps eo utcunq; vacuato, quæ dissident inter se, pristinam constitutionē nequeunt recuperare, is affectus vocatur sinus. Qui nimirum nisi quàm celerrimè percureretur, callum contrahit, procedenteq; tempore durus euadit, nec amplius subiectis ipsi partibus agglutinari potest. Astringitur tamen medicamentis, & vict^o ratione exsiccat, ita ut particula integrè esse sana videatur. Non solum tamen ex inflammatione gignuntur abscessus, hoc est diductiones particularum: sed & statim à principio iterdū proueniunt, pp humorem aliquem, qui temporis processu excoriet, atq; à contētis continentia dispescat. Proinde & incisi omnimodam speciem humidorum ac solidorum corporum itus habere apparent: & non rarò etiam animantia in ipsis repta sunt, omnibus ferè quæ ex putredine ortum habent, simillima. Fistula, sinus est angustus & lōgus, alijs sinibus similis. Qui sanè astringitur, & rursum diducit etiam ob excrementorum effluxum. Iam in atheromatibus reperitur quiddam pulci consimile: in melice ridibus, mellis: ut seuo, in steatomatibus. Plerunq; autem quædam tunica membranosa singula hæc continet. At gangræna carbunculiq; excitantur, quum sanguis tanq; feruens & inflammationi propinquus, exurit currim. Proinde & cum crusta fiunt, & bullæ vlcus præcedunt, quemadmodum in ambustis. Quin & acutissimā

Abcessus quomodo fiant.

Sinus quid.

Animalcula interdum reperi in abscessibus.

Fistula quid.

Atheromata.
Meliceris.
Steatomata.

Gangræna:

Carbunculi.

Carbunculorū
descriptio.

Atra bilis,
qualis,

Cæcos gignit
atra bilis non
feruida: quæ si
acrior fuerit, il-
los pducit ex-
ulceratos.

Gangræna gd.

Dolor pulsati-
lis affligit in-
flammatas par-
ticulas, ob ar-
teriarum mo-
tionem.

Erysipelas.
Herpes.

febrim inferunt, atq; in discrimen vitam trahunt. Ni-
gra autem prorsus, ac cinerulenta apparet crusta car-
bunculorum vlceris: nec tamen inflammationis circū
stantis color, sicuti in aliis, ruber conspicitur: sed ad ni-
grius vergit, alio sanè modo q̃ in suggillatis, vel à gelu
përfrigeratis. Non enim vehementer liuet, veluti in il-
lis tumor: verum habet quippiam splendidum, quem-
admodum bitumen Iudaicum. Huiusmodi siquidē est
exquisita atra bilis: vnde & malignitas vlcerum quæ ī
carbunculis sunt, accidit. Siquidem sanguis, vel statim
ab initio, vel in ipso feruore superassatus, melancholi-
cus fieri videtur. Verum citra feruorem atra bilis can-
cros constituit: atq; eos cum vlcere, vbi acriorem il-
lam esse contigerit. Quamobrem & nigriores sunt co-
lore omnibus quæ inflammatione infestantur, & mi-
nus calidi. Venæ autē in his replentur & tēdunt magis,
q̃ in ipsis inflāmatioib⁹. Ad hæc gāgræna maximis luc-
cedit inflammationibus: quæ sanè mortificatio quædā
affectæ partis existit: & nisi curet celerrimè, vsq; adeo
pars affecta extabescit, vt inuadat alias cōtinuas, atq;
sic hominē perimat. Porro in naturali statu, insensibi-
lis nobis est arteriarum motus: in inflāmationibus au-
tem, is cum dolore sentitur. Arteria siquidem dum dā
latatur, corpora circūiacentia percutit: atq; ex eorū
plaga ob inflāmationē dolemus. Quod si arteriæ tu-
nica inflammatione vrgeatur, tunc ratione percutien-
tis simul & percussæ, geminat ut dolor. Si fluxio bilio-
sa in aliquam partem decumbat, idq; ab exquisita bile
profecta, cutem exulcerat: si verò sanies aquosas, vel
etiam sanguinem habeat, minus erit acris, sed particu-
lam magis ī tumorem attollit, q̃ exulceret. Hoc igitur
erysipelas nominatur: alterum verò herpes. Humor
autem à quo vnumquodq; horum gignitur, tū ex co-
lore, tum ex caliditate partis affectæ, facillè dignosce-
tur. Rursum, quum fluxio acris, hæc quidē min⁹, hæc

verò magis, talis existat: sciendum est, ab acriori fieri
 herpetem exedentem: ab altera verò miliarem. Atq; hæc sanè fluxio pituitam habere mistam mihi planè
 videtur: ut illa proficisci à meracissima bile: quare &
 cum erosione oritur, affectu semper proximam inua-
 dente cutem. Verùm si ex æquo sanguis & bilis cōmi-
 sta fuerint, huius affectus forma & natura, in medio
 erysipelatis & inflammationis consistet. Quod si alter
 ex humoribus longè exuperet, ab exuperante affectus
 nomen sortietur: cum adiectione tamen humoris ad-
 misti. Dicitur itaq; erysipelas inflammationis parti-
 ceps, flaua bile superāte: inflammatio verò erysipela-
 tosa, vincente sanguine. Similis quoq; erit aliarum mi-
 stionum interpretatio. Quatuor enim sunt affectiōes,
 quæ assiduè ex humorum fluxione oriuntur: erysipe-
 las, œdema, inflāmatio, & scyrrhus. Erysipelas igitur,
 vt dictum est, biliola fluxione exuperante oritur: inflā-
 matio, sanguinea: œdema verò, tenui pituita: quemad-
 modum & crassa & lenta, altera quædam scirrhorum
 species consistit: namq; alteram fæx sanguinis efficit:
 quæ ipsa rursus sanguinis fæx, est duplex: alterā enim
 speciem Hippocrates nigram nominat: altera verò &
 ipsa quidem est nigra: propriè tamen atra bilis vocat.
 Istius itaq; canceri soboles sunt: alterius verò nigræ,
 vna quædam scirrhosæ species: quæ sanè ab altera quæ
 ex pituita consistit, colore distinguitur. Atq; vtriusq; cō-
 munia sunt, maior q̄ sit pro naturæ ratione tumor, tū
 dolore vacans, tū durus: & q̄ vtraq; species quandoq;
 ab initio gignatur: quandoq; ex permutatione alicu-
 ius tumoris immoderati refrigerati. Scirrhis propin-
 qua sunt tum ecchymomata, hoc est trāsfusiones: tū
 melasmata, siue denigrationes. Qui affectus fiunt san-
 guine ex ipsis venis effuso: nunc tunicis earum contu-
 sis: nunc ipsarum finibus reſeratis. Quod si arteria ad-
 aperta fuerit, affectus hic aneurisma vocatur. Fit au-

Herpes exedēs
 gignit ab acri-
 ori bile: vt mi-
 liaris, a minus
 acri.

Erysipelas
 phlegmonosū.
 Inflāmatio ery-
 sipelatoſa.

Œdema.
 Scyrrorum spe-
 cies duæ.

Fæcis sāguineæ
 duplex spēs.

Ecchymoma
 ta.

Melasmata.

Aneurisma.

**Arteriarū san-
guis qualis exi-
stat.**

**Oedema quō
ab aneurisma-
te differat.
Sphacelos.
Syderatio.**

Gangræna.

**Phagedæna.
Herpes depa-
scens.
Cacoethe ulce-
ra,
Scabies.
Lepros.
Cancer.
Elephas.**

tem, ea vulnerata, quum ad cicatricem superposita cu-
tis deuenerit, arteriæ verò vlcus permanferit, ipsa ne-
quaquā conglutinata, neque ad cicatricem perducta, neque
carne obturata. Cæterum tumor ille compressus digi-
to cedit. Quum igitur sanguis quæ arteriæ continent,
tenuis & flauus existat, ac præterea mistus subtili spiri-
tui, & multo, proindeque sit etiam calidior eo qui conti-
netur in venis, adeo sanè is effluit, ubi vulneratur ar-
teria, ut ægrè supprimi possit. Cedit etiam in œdemati-
bus materia premētibus digitis: & pars ipsa foveæ mo-
do excauatur. At in hoc affectu pulsus non adest, ut p-
cipitur in aneurismate, & color albicantior existit. Ad
hæc œdema longè latius & maius est aneurismate: nisi
quando grumus adnatus, coalit⁹ ex aneurismate, spha-
celum, hoc est siderationem, efficiat. Sic enim vniuer-
sam solidorum corporum corruptionem appello: ita
ut ossibus quoque insit. Gangræna autem, solidorū cor-
porum mortificatio est & ipsa, verum ossa nequaquā cor-
ripit, maximasque sequitur inflammationes. Repetendū
autem rursus hoc est, atram bilem, si quidem mordax
decubuerit in carnem, circumpositam cutem exulcera-
re: si verò mitior extiterit, cancos citra vlcus induce-
re. Iam verò, qui affect⁹ ex ulcere & tumore circumam-
biente constat, phagedæna vocatur. Depascitur etiā,
& herpes circumuicinas partes: solius tamen cutis exul-
ceratio existit: phagedæna verò, vnà cum cute, attin-
git etiam subiecta. Quæ vlcera omnia, cacoethe, hoc ē
maligna vocantur. Porrò scabies & lepra, melancholi-
ci affectus, ad solam cutem spectant: quemadmodum
si in solis venis & carne fiant, nomen obtinent cancri.
Præterea elephas affectus melancholicus est, à sangui-
ne quidem melancholico primam habens generatio-
nem: tempore verò procedente, atra bilis copia sangui-
nem ipsum exuperat. Quo tempore corpus iam & gra-
uiter olet, turpeque & deformatum videtur: atque iter-

dum etiam exulceratur. Iam pudendorum tensiones præter naturam, quæ non desistunt, quidam satyriasmus, quidam priapismus appellant. Achor autem, vlcus est in capitis cute, quod coniceres pituitæ salæ, & nitrosæ esse sobolē. Ac defluit quidem ab eo sanies quedam nec aquosa simpliciter, nec ita, vt mel, crassa, Ceria (quos fauos nominant) cum tumore quodam exiguo & plurimis foraminibus accidit, melleo quodam humore fluentibus. Quin & alii tumores præter naturam his minores per cutem fiunt, nimirum myrmecia, acrochordones, psyrdraces, & epinyctides: qui sanè affectus omnibus cogniti sunt. Non minus autem est notus furunculus: qui quidem mitis existit, si solam cutem obsederit: malignus autem, si descenderit altius. Sic enim tuberculo est similis, ab eo sola duritie differens. Vterque autem affectus mixtæ cum inflammatione esse speciei videt. His tertio loco succedit bubo. Quarta is quem nonnulli vocant phygethlō, caliditate simul & generationis celeritate id ab aliis tuberculis distinguentes. Qui affectus glandularum partium est inflammatio. Hæ autem partes vbi ad scyrrhum deuenierit, is affectus struma & chæras vocatur: quemadmodum etiā vbi iduratur testes, σαρκώλη, & ramex carnosus dicitur. Quum autem in eorum tunicis humor aquosus colligitur, hydrocele nominatur: à quo affectu, epiplocele & enteroccele differunt: quæ alterum omēti: alterum intestini cuiuspiam descensum in tunicas testium significet. Quemadmodum autem vnumquodque dictorum nominum partis morbum indicat, à qua affectus cognominatur, sic & κισσώλη recens nomen, hoc est varicosus ramex, in parte iam dicta declarat ipsum affectum consistere. Quam veteres, & alias etiam turgentes venas κίρσους, hoc est varices nominant. Fiunt quippe in cruribus etiam varices, ob imbecillitatem venarum quæ inibi existunt: & tunc præsertim, quum san-

Satyriasmus.
Priapismus.
Achor.

Ceria.
Myrmecia.
Acrochordones.
Psyrdraces.
Epinyctides.

Furunculus.

Tuberculum.

Bubo.
Phygethlō.

Struma.
Chæras.
Sarcocèle.
Ramex carnosus.
Hydrocele.
Epiplocele.
κισσώλη
Ramex varicosus.
Varices.

Bubonocete.
 ἔμφάλου.

Hydropis tres
 species.

Epulides.
 Parulides.
 Thymi.
 Vua.
 Tonfillæ.
 Paristhymia.

Polypodes.

Encanthis.

Vnguis oculi.

Staphyloma
 ta.

guine corpus crasso redundat. Peritonæo vulnerato, vel rupto, nec postea cōglutinato, tumor quidem molis eam regionem occupat. Quòd si id in inguine eueniat, tumor tale bubonocete nominatur. Si verò circa vmbilicum, sic affectos ἔμφάλου quidam appellant. Cæterùm peritonæi solius nulla harum affectionum existit: sed & nerueam propaginē musculo affici prorsus est necessarium. In hydropicis etiam, copia quidē materiæ eadem in regione aggregatur: aquosæ sanè, in ascite: statuosæ, per tympanitem: pituitosæ deniq; in affectu anasarca, & eo quem leucophlegmatiam appellant. Porro epulides, parulides, thymi, & alia id genus, carneæ suppullulationes existunt. At vuæ, gurgulionis: tonsillæ, earum glandularum quæ inuicē in faucium initio opponūtur: paristhymia deniq; eorum corporum quæ in ipsis faucibus sunt, inflammationes existunt. Polypodes autem, aut inflammatione, aut tuberculo, aut alia quapiam suppullulatione in naribus consistente, gignuntur. Encanthis verò, in magnis oculorum angulis sit, tumor non toto genere præter naturam, sed sola magnitudine. Vngues autem adnascentiæ quædā sunt mēbranæ exterius adnatæ oculis: quæ ab osse circūambiente delata, vsq; ad iridis coronā extendit. At quæ vocant staphylomata, hæc quidem solo situ: hæc verò, dispōne ipsa, pter naturā existunt.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E T R E M O R E

palpitatione, conuulsione, & rigore.

Liber vnus.

Motus sensibilis duplex: vnus uolūtari⁹ qui ad neruos & musculos; a-



ENSILES motus in sanis animalium corporibus, duplices genere existunt. Alii siquidem sunt secundum voluntatis imperiū; quos sanè à neruis & musculis edi-

lius vitalis, quæ
ad cor, & arte-
rias pertinet.

tos, liberæ voluntatis actiones mos est medicis appella-
re. Alii autem à corde & arteriis profecti, functiones ap-
pellantur vitales. Est & tertia in venis insensilis motus
species, de qua in præsentiarum differere, nō videtur
expediens. Cæterum motus à nervis & ransculis edi-
tus, quo manus atq; crura mouemus, in tremore, &
conuulsione, morbo loq; rigore, ac nonnunq; palpi-
tatione apparet. Etenim istiusmodi affectus, incomposi-
ti, exorbitantesq; sunt motus instrumentorum, quæ
dum integrè valent, motus voluntarios proficiunt.

Tremor igitur, imbecillitate facultatis quæ velit atq;
mouet corpus, efficitur. Etenim animalium partes gra-
ues quā sint, deorsumq; ferri natæ, ex se vsquequaq;
moueri nequeunt: sed facultas à principio musculis, p-
neruos delata, quasi vehiculum quoddam, atq; ala mo-
tus ipsarum est. Quæ si exactè defecerit, partes vti re-
laxatæ resolutæq; deorsum vergunt, atq; instar auis
expilatæ concidunt. Vnde membra hoc pacto affecta,
omni motu priuantur. Verum si facultas ad musculos
per nervos fluat, exigua tamen & debilis, vt quātum
oportet membra corporis vehere, librareq; aut velu-
ti pondus aliquod ferre, non possit: membrum sic di-
spositum, cum tremore dehiscere necessariò conspici-
mus. Siquidem motus coacti violentiq; qui vires debi-
lium superant, fiunt haud dubiè tremuli: vt constat in
onera grauiā gestantib⁹. Pari quoq; modo si quis timo-
re correptus fuerit, manibusq; siue quid agere, siue li-
brare voluerit, tremulæ quidem manus agendo: tre-
mula quoq; crura incedendo ei ob timorem fiunt. Ti-
mor quippe facultatis robur, nihilominus q̄ onus, im-
minuit. Consimili modo senes imbecillitatis causa tre-
muli euadunt: & quibus ob ægritudinē laborauit ipsi⁹
corporis robur, his haud sine tremore perficitur mo-
tus. Tremor itaq; est compositus motus, sitq; vbi cor-
pus propria grauitate deorsum vergit, sed rursus à fa-

Tremor quo-
modo fiat.

Motus violenti,
qui viribus
superiores sūt,
fiunt tremuli.
Perculsi aīo æ-
dunt actiones
tremulas.
Timor faculta-
tis robur immi-
nuit.
Senes cur tre-
muli.

Tremor est mo-
tus cōpositus.

Palpitatio a tremore quo differat.

Moueri multa quæ prorsus immota uidentur: ut auis quæ se in sublimi aeris regione sustinet.

Statio est motus,

Iacentem in pedes delabi facultatis extreme laborantis est signum:

Extensam manum habentes, mouentur.

cultate eleuatur sursum: particulis nimirum ipsis vicissim loca mutantibus. Differunt autem inuicem palpitationis & tremoris, quum nimirum non eodem loco quod tremuli, palpitatione correpti afficiantur, nec eadem causa, nec præterea idem sit utriusque symptoma. Nullus enim tremit utique, nisi membrum aliquod mouere præelegerit. At membra palpitantia, & si reposita iaceant, nulloque exagitantur motu, palpitant: id quod mirum esse non debet. Alia siquidem multa, licet immobilia videantur esse, utpote in eodem permanentia loco, mouentur nihilominus tamen. Auis quippe, in sublimi regione aeris suspensa, dum sese, quo minus ruat, sustinet, aliquo uti motu videtur. Is igitur motus (quæ immobilitas fortasse tibi apparuerit) ex duobus certis motibus, qui in contraria loca diducere corpus queunt, est mistus. Quorum sanè si alterum, nempe motum sursum, sustuleris, à reliquo deorsum deduci corpus minimo negotio videbis. Ob id etiam stare quod incedere iis qui viribus sunt imbecillibus, haud minus est laboriosum: quum statio sit quoque motus. Sublata namque anima, quæ & mouet, & corpus erigit, corpus prius rectum, innox stratum facile videremus. Quare non immerito monuit Hippocrates. Si æger seipsum continere non possit, & ex lectica in pedes corruat, grauius est. Nam iacentem ad pedes delabi, facultatis extreme laborantis firmissimum est indicium. Etenim stare, aut sedere, aut surgere non posse, graue certè est, sed eo sanè minus graue. At more viuientis decumbere non posse, sed ceu demortuum inaniniatumque corpus deorsum irrepere, extremum est malum. Quod autem ubi quis manum extensam aliquandiu in illa figura conseruat, aliquo motu moueatur, argumento sunt utraque genera musculorum simul & ex æquo tunc operantia. Liquet itaque, ei qui nullo se mouere motu conatur, tremorem minime accidere posse. Palpitatio autem,

partibus etiam motu carētibz euenit. Etenim supercilium, palpebræq; & oculus, sæpenumero, nulla concurrente voluntate, attolluntur. Præterea in partibus palpitatione affectis, eleuationes depressionesq; apparentes, corporum quasi repletorum, moxq; enacuatorum, extensiones & contractiones existunt: in tremoribus autem, nec distenditur quicq, nec etiam contrahitur. Cæterum non omnia palpitant. Neruum siquidem, aut os, aut cartilaginē, palpitare non videas, quum cavitare careant, qua nunc distenta, nunc cōtracta, attolli quum distenduntur, cadere quum contrahuntur suis partibus possint. Est itaq; palpitatio, dilata tio quædam, atq; cōtractio, præter naturæ ordinem. Tremor verò, partiū quæ vicissim sursum deorsumq; feruntur, motus inuoluntarius. Vnde perspicuum est, membra quidem tremula priorem mutare locum: palpitantes autem particulas, perpetuo eundem tueri. Ac verò spiritum crassum & vaporosum in aliqua cauitate collectum, exituq; prohibitum, palpitationum esse causam pronuncio. Nā quod palpitatio ab spiritu oriatur, celeritas ortus & solutionis illius indicat. Etenim corpus nostrum constituunt (vt nos Hippocrates docuit) continentia, & contenta, & quæ feruntur imperu. Continentia siquidem appellauit solida: continent enim, ac liquida claudunt. Contenta autem, liquida: nam liquida solidis continentur. Quæ verò imperu semperq; feruntur, spiritus: nāq; hi per vniuersas corporis partes facile permeāt. Erit igitur spiritus quidē, sed crassus & vaporosus, palpitationis causa. Nam si ille ciarus, tenuis, purusq; fuerit, citra vllum impedimentum transluet: ac proinde partes nec replebit, nec euacuabit. Porro vt solis arteriis inesse palpitationem nunimè verum est (quod profitebatur Praxagoras) sic reperiri posse arteriam non dubito, quæ & palpitatio nis & conuulsionis aliquid sæpe ostēdat. Iam verò pal

Palpitatio quibus partibus accidat, & quibus minime.

Palpitatio est dilatatio & cōtractio præter naturæ ordinē. Tremor ē motus inuoluntarius.

Palpitationis causa.

Constituentia corpus nostrū sunt continentia, cōtenta, & quæ feruntur imperu.

Palpitatio quibus sit familiarior.

palpitatione facillè corripitùr frigidiores ætate. Adhæc, natura corporis frigidior, regio frigida, hyems, mollis viuendi ratio, crapula, & vini vsus immoderatus, cibi flatulenti & frigidi, omnia breuiter quæ corpus absolute refrigerant, palpitationi sunt generandæ idonea. Sicuti illorum contraria eandem submouere possunt. Calfacientia quippe, attenuant spiritum, corporaq; mollia simul & rara efficiunt, vt ille expirare possit. Verùm refrigerantia condensant, congregantq; ac corporis meatus arctiores reddunt. Insuper crassum, densumq; ac turbidum efficiunt spiritum, qui sua crassitie, corporumq; ipsum continentium dēsitudine, retinetur, vt minimè exhalare possit. Merito igitur veteres, iis contra palpitationē sunt vsi medicamentis, quæ attenuare & excalfacere possunt. Cuiusmodi sunt quæ ex pyrethro, adarce, & pipere constant. Aquas quoq; calidas ex terra prodeuntes, & præcipuè nitrosas, sulphureas, bituminosasq; cōmendant. Et aqua marina actu calida, muriaq; marinæ vice vtuntur, si mare absit. Porrò castoreum, non solū bibitū, sed et ad motū extrinsecus, ad id optimum est medicamē. Cæterū palpitationis generatio ex frigido dūtaxat prouenit: tremorem verò, ob multas & alias causas fieri contingit. Nam dispositio hæc, facultatis quæ corpus mouet est imbecillitas: sed causa quæ hanc ipsam imbecillitatem inducere potest, specie variat. Aut enim alimenti defectu, aut exoluto vitali robore, aut violenta vehementiq; refrigeratione, virtutem occupante, aut repletionē ipsani instar ponderis aggrauante, admodum imbecillis ad motū facultas redditur. Vnde non sicuti palpitantibus, ita & trementibus vna dūtaxat medicamentorum species congruit, sed varia. Ac pro differentia ipsius causæ, oportet per contraria semper medendi rationem variare. Etenim mulierem quæ post partum nec secundas expellere, nec sanguinem expurga-

Calfacientium vires.

Refrigerantiū facultas.

Palpitationem quæ soluit medicamenta.

Palpitatio ex frigore tantum prouenit.

Tremoris causæ diuersæ.

Tremētē mulierē ob purga-

re poterat, indeq; tremore correpta est, secta i malleo
lo vena, curauit Hippocrates. Quod autem sanguine
exuberante, venam incidere oporteat, omnibus no-
tum esse arbitror: quum sanguis contineatur in venis.
Quod verò laborante matrice, in malleolo aut popli-
te incidere expediat, id docet commercium vendarum.
Siquidem per venas cōmunicantes semper vacuare
est opus. Nam si venas, quæ particulæ affectæ non con-
sentiunt, pertundas, minimè affectum locum curabis,
sed potius sanum offendes. In animalibus itaq; motus
voluntarii opifex, fabricatrixq; facultas est, quæ vni-
uersas animalium partes gubernat. Huius autem in-
strumenta, nerui & musculi existunt. Igitur motu pri-
uari, aut non pro dignitate moueri contingit mēbra,
vel ob instrumentorum, vel ob facultatis affectus. Pal-
pitationes itaq; & conuulsiones, & membrorum reso-
lutiones, instrumentorum vitia: tremores verò, virtu-
tis imbecillæ affectus existunt. A rigore autem distin-
guitur tremor, quod tremor quidem non sine consi-
lio mouendi partem, contingat: quassatio verò, quæ
vehementer rigentibus insidet, adeò violēter valideq;
concutiat corpora, ut quietem agere minimè queant,
vel si quis viriliter illis resistat. Insuper, tremor, vnius
duntaxat particulæ: rigor vniuersi corporis est affectus.
Adhæc, tremere quidem nonnullos, absq; vlla refrige-
ratione sensibili, conpertum est. At rigēre, absq; hoc
vt videatur corpus refrigeratum, est impossibile. Non
tamen refrigeratum esse, & videri, idem esse fatearis.
Motus præterea in rigentibus, inuoluntarius omnino
est: in tremētib; autem, non absq; imperio volunta-
tis consistit. Porro vt motus aliquis dici rigor mereat,
opus est vt cum refrigeratiōe sensibili, inæqualis inuo-
luntariusq; totius corporis motus accedat. Quæ sanè
quassatio, si in nonnullis accessibus solam superficiem
concutiat, nec vniuersum corpus commoueat, is affe-

mēta post par-
tium retenta,
secta in malle-
olo uena cura-
uit Hippocra.
Matrice labo-
rante, uena se-
cāda est i mal-
leolo, aut po-
plice,

Palpitatio est
organorum ui-
tium.

Tremor, virtu-
tis imbecille ē
affectus.

Tremor nō fit
sine cōsilio mo-
uendi partem.

Rigor fit iuitis
Rigor a tremo-
re quo diste-
rat.

Rigori quid re-
quiruntur.

Horror talis af-
fectus est cutis,
qualis totius
corporis, rigor.

Rigor quid.

Calidū innatū
nō est aīalis ge-
neratione po-
sterius.

Natura nihil
aliud q̄ calidū
est.

Aīa nihil ē ali-
ud, q̄ calidum.

Calidū innatū
quō itro & fo-
ras moveatur.

Calidū innatū
esse mixtū, atq;
ex calore &
frigore suū or-
tum habere.

Aut horror vocatur. Horror itaq; talis duntaxat cu-
tis, qualis vniversi corporis rigor, affectus est. Ceterū
impræsentiarum non de rigore aut horrore qui sana
corpora infestant, sed de illo qui ægris solet superueni-
re, disputare consilium est. Igitur morbosus rigor se-
cundum Hippocratis dogma, refrigeratio quædam ē
dolorifica, cum inæquali totius corporis concussione.
At verò rigore affici, innati calidi affectum esse omni-
bus ferè in confesso est. Verum enimverò, calidū hoc
innatum minimè gigni motu aut frictiōe arbitramur,
sed corpus omni ex parte conspirabile, confluxileq;
esse contendimus: calidum autem ipsum non aduenti-
rium, nec animalis generatione posterius, sed prima-
rium, primordiale, insitūq; putamus. Natura itaq; ani-
maq; nihil aliud q̄ calidum est. Quocirca si hoc sponte
semperq; mobile eē cognoneris, errare minimè pote-
ris. Quia igitur ratione is calor semper existit mobilis,
ea nimirum, nec intus solum, nec foras mouetur: sed
alter ipsius motus succedit alteri. Cito enim immobilē
ipsum redderet intus statio: foris autē, quies eum dissi-
paret. Nam calidum moderatè extinctum, rursusq;
moderatè accensum (vt ait Heraclitus) semper mobi-
le remanet. Accenditur igitur, vbi appetens nutrimen-
tum versus centrum inclinatur. Extinguitur autem, vbi
foras & vndequaq; dispergitur. Ac mouetur quidem
ipsum innatum calidum à suo principio foras, calidita-
tis ratione: intrò verò, atq; ad proprium principium
illabatur, quia etiam frigiditatis est partiiceps. Hoc si-
quidem calidum, & mixtum est, & ex calore frigoreq;
ortum habet. At prima quidem calidi ratio spontaneā
sui ipsius mobilitatem includit, hacq; ad operandum
maximè eget. Nihilominus tamen magnum quoq; à
frigore adiumentum accipit. Nam quum innatum ca-
lidum & eleuare in altum, & secum alimentum rapere
natum sit, certè si frigus lationem calidi nō coerceret,
penitus

penitus euanesceret, atq; dissiparet. Porro animal tūc sanum existimatur, vbi temperamentū, naturæ ipsius limites non excedit: hoc est, quum calor frigusq; temperatura mediocri mutuo inter se miscentur. Si verò altera qualitas immodicè alteram superet, tūc animal laborare morbo, qui congruens sit naturæ causæ superantis, necesse est. Etenim * inflammationes, erysipelata, vlceraq; serpentia, necnon carbones, omnesq; tū impenitē calidi, tum febriles affectus, dum vis calidi dominatur, utiq; fiunt. At conuulsiones & tetani, palpitantes, stupores, resolutiones, morbi comitiales, atq; ii affectus qui homines attonitos reddunt facultate frigoris dominante oriūtur: inter quas affectiones rigor enumeratur, qui refrigeratio simpliciter nō est, sed tantū secundum sensum. Fuerit itaq; rigor innati calidi, vehemens, confertimq; assilgens, ac violenta secundum sensum refrigeratio. Iam verò quemadmodum quod in naturam haud latenter reuertitur, est iucundum, ita quod à natura pari modo recedit, dolorificū fuerit. Quare vnum idemq; frigus, aliās quidem delectasse, aliās verò tristitia affecisse credimus. Nam si frigus corpori extra modum calfacto, admotum fuerit, id prorsus delectat. At si corpus suam naturā retinens, confertim, abundeq; refrigeretur, dolebit utiq; & tristitia afficietur. Igitur nec dum alimenti defectu innatum calidum obscuratur, nec dum pabuli copia obruitur, nec dum ob imbecillitatem collabitur, rigorē fieri contingit: sed quoties ipsum validum existens, intenditur, ac dein coercetur, reprimiturq;: quod solet flāma, vbi confertim aqua illi instillatur. Calor itaq; per rigores, nec substantia nec robore læsus, ad vniuersas corporis partes extendi ferriq; properat: impeditus autē, versus principium propriè confurgit, inibiq; permanere non valens (substantiæ enim semper mobili quies mors est) seipsumq; congregans, ac veluti in spirā cō-

Atal, qñ & ualere, & egrotare dicatur.

Affectus calidi

Affectus frigidi.

Rigor est secundum sensum refrigeratio.

Iucundū quid. Dolorificū qd.

Rigor qñ obriatur.

Mobili substantiæ quies mors est.

trahens, æqualiter quidem, non amplius tamen citra violentiam, extenditur. Vbi verò exiliens infestantibus reluctantisq; rebus occurrit, ac nunc pellit illas, nunc pellitur, idq; impulsibus & consictibus variis, tunc sanè corpus mira quassatione ob duplicē illū atq; inæqualem motum, haud citra dolorem concutitur, q̄diu molestancia adfuerint. Concussio igitur, quassatioq; necnon omnium membroꝝ fremitus, omnisq; irregularis, inordinatus, inuoluntariusq; motus, ob caloris innati, factiq; iam vaporosi, inæquales, validos, violentosq; occurſus atq; resultatiōes, rigoris tempore, perficiuntur. Quamobrem corpus in rigoribus rursus incaleſcit exactius, q̄ quum naturaliter se ipsum habebat. Sudores quoq; effunduntur è corpore. Etenim ubi post multos consictus molestancia fuerint explosa, exacteq; iam perspirauerit corpus, tribus de causis id calſieri est necesse. Nempe q̄ calidum vndiq; spiratione priuatū, in profundo collectum fuerit: quodq; postea vehementer ad exteriora se extenderit: ac tertio deniq; q̄ per occurſus illos, consictus, atq; violentos motus, nat̄ra calor reaccenditur. Itaq; sæpe i huiusmodi reditu de profundo calidum quasi ebulliens, confertim humidum quoddam effundit, quod sudorē vocamus. Ob idq; in rigore refrigerari, nec rursus calſieri, prauum est: calidumq; succubuisse portendit. Est autem rigor indicium maximum exquisitæ tertianæ: quæ ab ingenti oritur ardore: eatenusq; ab ardente continua deficit, quatenus in ea incendium ipsum facit intermissionem. Nam & sitis inexpugnabilis, & refrigerationis cupiditas, & bilis syncere vomitus, vomituq; peractio quies (quæ omnia signa sunt caloris exuberantis) comitantur exquisitam tertianam. Febribus èt ex ingenti ardore continuis, solet rigor superuenire, easq; soluere. Præterea acce calidumq; medicamentū vlceri admotum, primò dolorem, mox horrorem, ac

Incaleſcit corpus a rigore vehementius q̄ antea, tribus causis.

Rigentes non recalſieri, prauum indicium ē.

Tertiana, quò ab ardente continua differat.

Rigor solet febres ardentes soluere.

dæmum rigorem inducit. Inflammationi etiam in ab-
 scellum conuersæ, rigorem horroremq; necessariò ac-
 cidere nouimus. Ad hæc res auditu visuq; formida-
 bilis, interdum horrorem, rigoremq; inducit. Ex qui-
 bus vtrique liquet, non frigori duntaxat, rigorem tribuè-
 dum eē: quum ab aliis causis, & præcipuè ab acri & ca-
 lido humore delato per sensibilia corpora interdum
 proficiscatur. Cæterum neq; frigidum humorē, neq;
 acrem, ad rigoris generationem, simpliciter excelle-
 re, sed proprium modum ipsorum vtrique necessariò
 inesse, oportet. Modus autem fuerit aut copię mensu-
 ra, aut humoris qualitas, aut aliquis corporis locus, in
 quo illum aggregari conueniat. In quiete quoq; mo-
 tusq; atq; ipsius motionis modo, haud parua dīa ob-
 oritur. Vbi igitur flaua bilis, non p vasa, sed per carnes
 mouetur, manifestè gignitur rigor. Hoc nanq; solo fe-
 bres ex ingenti ardore à tertianis differūt, q̄ illæ qui-
 dem in valis bilem contineant: hæ autem, extra vasa
 diffusam per sensibilia corpora. Per quæ quidem dum
 bilis fertur, acredine sua tristitiam inferens, dolorem
 excitat. In hoc autem duo quædam eueniunt, nempe
 vt sanguis contrahatur in profunditatem corporis,
 ob idq; exteriores partes refrigerentur: & vt ille eæ-
 dem corporis partes quæ à bile punguntur, impellant
 ipsam facultate expultrice, donec ab omnibus profligata
 partibus, per sudorem, aut vomitum, aut deiectionem
 exterminetur. Hoc etiam iis qui non * con-
 coxerunt, aut malis succis repleti sunt, aut in sole æsti-
 uo, vel balneo diu sunt immorati, aut seiplos exercue-
 runt, cōtingit. Horum nāq; aliqui horrore confestim,
 ac dein rigore correpti sunt. Verūm non solum mor-
 dax causa, sed vehementer mota, si rigor fieri debeat,
 desyderatur. Atq; hoc sanè tam frigidæ q̄ calidæ cau-
 sæ est commune, q̄ vtraq; corpus cum dolore cōmo-
 ueant. * Iccirco per quartanas atq; tertianas febres,

Acia viceri
 admota, rigorē
 inferunt.

Rigor accidit
 inflammationi
 in abscessum
 conuersæ.

Formidabilia
 inducunt hor-
 rorem, rigoremq;
 Rigoris causa.

Rigor fit vbi
 flaua bilis fer-
 tur per sensibi-
 lia membra,
 Ardētes febres
 quō a tertianis
 differant.

Frigere extre-
 ma p accessio-
 nes vnde acci-
 dat.

Rigor fit a cā
 non quiescen-
 te, sed mota.

Pituita vitrea
inducit inter-
dum rigorem.

Rigentium ex
frigido humo-
re, curatio.

Quartanis ex
acerbationib;
medicamē ex
succo cyrenai
eo & castoreo
auxiliatur.

Tertianus ri-
gor qualis.

Motus volun-
tarii a muscu-
lis sunt.

Convulsio qd.

Tensio neruo-
rum interdum
ab humectan-
tibus interdū
a siccantibus
causis oritur.

Quis à contrariis oriatur humoribus, rigor tamē in-
uadit. Etenim ut atra bilis est frigida, sic flaua calida
existit. Cæterum non solum ex atra aut flaua bile, sed
ex pituita ultra modum frigida (quam vitreā appella-
uit Praxagoras) rigor fieri consuevit: idq; in mulieri-
bus magis, & quæ in otio vitæ traducunt: qui rigor tñ ve-
hemens non est, & quiescentibus, nulloq; modo mo-
tis corporibus, ipse etiam quiescit. Ii autem qui
simili affectu correpti sunt, in principio quidem me-
dicamentum diatrion pepereon propino: inbinde ve-
rò nostrum ex calamintha: deinde ꝑ ex sicco cyrenai-
co, castoreoq; compositum, quod quartanæ ex acer-
bationibus maximè confert, præsertim quando ingē-
tis rigoris impetu ægri afficiuntur. Porro qui quarta-
nis correpti sunt febribus, vsq; ad ossa sibi penetrare
rigorem affirmant: & talem, qualis per immensa frigo-
ra, dum iter facerēt, eis accidebat. In rigore autem q
tertianas, pariq; modo ab ingenti ardore ortas comi-
tatur, quasi ab acutis tenuibusq; acub⁹ se perpungi fa-
tentur. Nunc verò de conuulsione nonnihil dicamus.
Voluntarii omnes motus, per musculos absoluuntur.
Vbi igitur musculi in propria retrahuntur capita, ad
ea singulæ partes, quibus natura infixi sunt, retrahun-
tur, couellunturq; Verum si passio aliqua suboriatur,
quæ intensionem ipsos adducat, hanc sequitur motus
similis quidem naturali, inuoluntarius tamen: atq; hæc
passio conuulsio appellatur. Nam tendi cōtrahiq; mu-
sculum in proprium principium, secumq; illam corpo-
ris partem, cui est insertus, reuellere, bene valentibus
conuulsisq; commune profectò est. At si inuitò id aga-
tur, præter naturæ ordinem dispositis, minimeq; sanis
contingit. Tenduntur autem nerui, perinde ac citha-
rarum chordæ, interdum quidem plurimò humore im-
buti: interdum à causis exiccantibus arefacti. Euenire
etiam potest, aliquam corporis partem, aut ob inflam-

mationem, aut aliqua alia de causa, vehementer affectam, nervos sibi vicinos una secum reuellere. Porro in febribus ab ingenti ardore contractis, convulsiones accidunt, ob solam siccitatem insignem uniuersi nervosi generis: in phrenitide autem, ob principii nervorum inflammationem. Cæterum quum corporis partes antea tenduntur, symptoma dicitur emprosthotonos: quum verò posterius, opisthotonos: * at quum in utroque latus ex æquo inclinant, tetanus. Igitur convulsiones à siccitate ortas, minimè curandas susceperis. Nam qui his sunt affecti, citissimè intereunt. Quæ verò vel ab humorum copia, vel ab inflammatione trahunt ortum, his, si plenitudinem vacues, aut inflammationi commotis remediis succurras, mederi poteris.

Emprosthotonos.
Opisthotonos.
Tetanus.

Convulsio a siccitate non recipit curationem

G A L E N I P E R G A M E N I D E M O R B O R V M T E M P O R I B V S. L I B E R V N V S.



QUOD in animalibus ætas, idem tempus in morbis significat. Etenim quemadmodum ipsi nos geniti ad vigorem usque augetur: inde iam contabescere incipientes, ad extremam usque corruptionem declinamus, si omnes ætates pertransituri simus: ita singuli morbi à prima ipsorum constitutione ad statum usque incrementi, donec pro augmenti prioris portione decrecentes, in totum dissoluantur. Hoc tamen discrimen interest, quod animalibus quidem, quum sint corpora, proprium generationis tempus præscriptum est, quo omnes ad vitam necessariæ partes figurantur, formanturque: morborum autem, quum sint accidentia corporum, nullum huiusmodi tempus est præfinitum, sed

Tempus morborum comparatur ætati animalium.

Tempora morborum ab ætate animalium quomodo differant.

Morborum generationi non esse certū quoddam tempus præscriptum.

Phlegmones accidentia.

Febris quid.

Vigor in singulis rebus, est magnitudo summa.

Initium morbi.

Incrementum, Status.
Declinatio.
Circuitus quotidiani.
Circuitus tertiani.
Circuitus quartani.

À prima statim generatione augescunt. Figurationem itaq; generatiōemq; proprietates corporum postulat: accidentia autem ipsorum, quum nullam figurationē desyderent, statim ubi genita sunt, ad incrementum festinant. Si quidem phlegmone exempli gratia quum primum inceptum esse, huiuscemodi speciem habere videtur, qualem habebit ubi erit maxima: sola autem magnitudine differt. * Porro pars phlegmone obsessa, calidior seipsa enadit, cum tremore maiori, itē dolore, & tensione. Sed hæc parua primo aditu sunt: inde autem ad magnitudinem quandam non omnibus æqualem crescunt. * Postea verò aut discutitur remediis tumor ipse præter naturam, simulq; illi dolor atq; calor resoluitur: aut certē in pus conuertitur. Tēpus itaq; nullum inflammationis generationi singulariter proprium tribuitur, ab eo, quod augmenti est, diuersum. Febris etiam (qui calor præter naturam est) propriū distinctumq; generationis tempus nō habet. Sed ubi corpus primum calidius q̄ antea febrili calore fieri cœperit, inde aliud, atq; aliud tempus affectiōis incrementum excipit, vsq; ad perfectum vigorem, quē in singulis rebus summam esse magnitudinem intelligimus. At verò principium specie quadā ab incremento post ipsum, diuersum esse demonstrare conabimur. Etenim initium vnus cuiusq; morbi esse cēserunt veteres, non primum illum simplicemq; insultum, duntaxat: sed temporis longitudinem latitudinemq; notatu dignam ipsi tribuerunt. Post principium ipsum, collocarunt ascensum: dein, statim: ab hoc declinationem. Ex quibus sanē temporibus circuitus morborū constant. Ipsorum autem circuituum nonnulli describuntur horis viginti quatuor: quotidianiq; vocantur: alii quadraginta octo, hoc est duabus diebus & noctibus, vocanturq; tertiani. Alios (quos appellant quartanos) septuaginta duarum horarum tempus describit

At hi circuitus omnes, aliquando ad integritatem perueniunt: ut in quotidiana, tertiana, & quartana febris interdum ad declinationem solum, vel propius ad integritatem: vel longius ab illa accedent. Igitur in auspitiis tertianæ febris (quæ exempli gratia propono) horror mediocris oritur. Dein cum maiori horrore extrema omnia refrigerantur. Postea verò & rigore, & frigore concutuntur plurimæ corporis partes. Quo tempore pulsus durior, minorque, quam prius, redditur: necnò in contractione velocior. Præterea quies post contractionem ferè maior contingit: post dilatationem, eodem cum illa modo: sæpe priori æqualis: & si aliquando inæqualis. Atque hæc sanè * in quibusdam tertianis, curriculo duarum horarum æquinoctialium solèt sæpe cōtingere: in aliis autè longiori vel breuiori interuallo. Inde pulsus maior simul & celerior, densiorque fieri incipiens, sensim singulis commemoratis incrementis: statimque ægri calidiores quam antea redduntur. In summa inæqualitas quæpiam non mediocris in corpore per hoc tempus exuperat. Atque hoc sanè est secundum tempus, à primo illo, in quo ex priori statu fuit vniuersum corpus refrigeratum, pulsusque in contrariam constitutionem mutatus. Vbi verò febris ad integritatem desinit, tunc pulsus ad naturalem statum reuertitur, si qua fides habenda est sensibus. Primum itaque tempus totius periodi est, quo corpus cum prædictis mutationibus pulsus, in alserit. Aliud ab hoc secundum est, quod pulsus & calorem in contraria mutat, donec tota corporis moles æquabiliter concalescat. Post hoc tertium, quo calor etiamnum augescit, pulsibus magnitudine, celeritate, & frequentia ei respondentibus. Quarta constitutio post tres commemoratas conspicitur, omnibus iam dictis æqualem sibi magnitudinem pro sensus nostri iudicio seruātibus. Ad hæc quinta alia, quum iam calor manifesto decrescit; halitus autem per cutem excernitur, pulsusque ad

Tertianæ febris descriptio.

naturalem habitum redit, reiciens omnia, quæ præter naturam in magnitudine, celeritate, frequentia, duritieq; conquiescit. Hoc tempore plurimis ipsorum sudor oritur. Post hoc autem, intermissiōis, siue interualli tempus succedit. Igitur primum tempus integritati cohærens, quod frigoris sensum præbet, principiū vocetur. Secundum verò, quod frigus paulatim deponit, tempus inæqualitatis dicat. Ab hoc tertium, æqualis incrementi. At quartum post hoc, cōsistentiæ. Quintum imminutionis. Sextum deniq; integritatis. Quod igitur sex hæ temporum differentiæ in tertianarum aliarumq; intermittentium febrium circuitibus reperiuntur, id sensu vel multitudo imperita iudicat. Nihil tamen obstat & alium quodammodo febris circuitū in duas sed maiores partes diuidere: vnam, primæ accessionis à primo insultu ad extremam vsq; remissionem: alteram, quæ in declinationis & insultus secundæ accessionis medio consistit. Quod igitur ab Hippocrate dictum est, in accessionibus abstinendum esse, pro accessione intelligendum existimo tempus à primo insultu, vsq; ad ipsam declinationem. Porro clarioris doctrinæ gratia, omne id quod accessionem sequitur, remissionem vocabimus: quāuis in intermittentibus febribus, remissio ipsa ablatio etiam dici meretur. Diuisimus itaq; febres desinētes ad integritatem, quotidianā, tertianam, quatanā: quæ singulæ sex distinctæ sortiantur tempora. At verò quæ non intermittunt integre, in quinque tantum soluantur, ab eis nimirum sola integritate remota. Quarum sanè nonnullæ quotidie accessionem habent: quædam tertio quoq; die. Quæ verò quarto habent, non frequenter, sed raro euenire vident. Vtpote quæ magna ex parte ad integritatem desinant. Adhæc, febrium quotidianæ, tertianæ, & quatanarum, quæ ad integritatem non desinunt, duplex species est. Quædam namq; magnitudinem, cele-

Tertianæ accessionis tempora sex describuntur: qualia reperiuntur & in aliarum intermittentium circuitibus.

Febrū non intermittentium reperiuntur tempora quinque. Cōtinuarū febriū se remittentium species.

Quartana non intermittens, raro inuenitur.

ritatem, frequētiā, atq; duritiem pulsus deponunt: quædam autem reliqua tria ad naturalem statum deducunt: ac conseruant celeritatem: hæc magis, illæ minus. Verū in quibus febribus citra sensibilem systolē, accessiois insultus accidit, tria tempora in vnum recidere est necessarium, totumq; id vsq; ad statum fieri incrementum. Nam vbi non adfuit cōspicua systole, ibi nec inæqualitas adesse potuit. Statum verò nunq̃ defuisse memini: sed semper sensibili æqualitate in omnibus febribus aliquādiu permanisse. Insultum etiam millies si ne dictis conspexi symptomatis. Quibus febribus nullus circuitus adest, vt iis quas synochos vocant, nec accessio quædam omnino est, neq; prædictæ partes. At, tamen hæc quoq; secundum diuersa tēpora, totius morbi particulas obtinent: aliis modis innotescentes, q̃ p accessioinum tempora. Sed nunc tantum de febrium circuitibus, iisq; non complicatis, sed simplicibus nobis habetur sermo. Aduerte autem aliud esse misceri: aliud inter se complicari. Semitertiana quippe, ex miscella & temperamento quotidianæ & tertianæ febris oritur. Potest tamē ipsi semitertianæ copulari alia simplex febris, vel tertiana, vel quotidiana. At huiusmodi varietas minimē ad hunc librum pertinet. Cæterum cognitis singularum febrium temporibus, facile complicatarum tempora cognoscemus. Igitur de simplicibus dictum abūdē quum sit, de commistis deinceps disseram: in quibus interdum horrificus insultus quidam contingit, omnes principii peculiareſ notas habens, p̃ter rigorem: quāuis interdum & huius quandam imaginem repræsentans. Siquidem vehemens horror, vel aliquod rigoris initium, vel paru' rigor videri potest. At exactum rigorem, qualis in tertianis, quartanisq; est, febris miscellanea cuiusmodi semitertiana existit, non recipit. Vbi igitur signa quædā secundi temporis, febris hæc præmonstrat, initium rursus alterius inua-

Synochis febribus nullum circuitū adest: ac proinde neq; accessioinem.

Miscionem febrium differre a complicatio ne earundem. Semi tertiana ex gbuscōstet.

Rigor vehemens non adest miscellaneis febribus.

Semitertianæ
febris accessio
nunq̃ integrè
desinit.

sionis horrificum efficit: quod nonnulli repetitionem appellant. Aliquando hoc secundò molitur: quibusdã tertiò facit. Deinde vix æquabiliter simplex redditur, ad vsq̃ statum inerefcens. Hæc febris ad integritatem nunq̃ desinit. Nam permultum temporis vsq̃ ad vigorem habet: declinatiõemq̃ sine perspiratu sensibili: tantum abest, vt integrè cum sudore soluatur. Quemadmodum igitur à primo insultu accessio ad vigorem vsq̃, inulto tempore peruenit, sic à vigore paulatim minuitur: ideoq̃; postridie altera accessio aduenit, horifica quidem illa, sed quæ non item cum prior repetitiões habeat. Porro hæc accessio ad vigorem etiam longo tempore ascendit, nec exiguo inclinat: atq̃ ob hoc ipsum tertio die, eadem quæ primo accessio inuadit: postea rursus, quarto, similis ei quæ secundo habita est, idq̃; perpetuo ordie. Hanc igitur febrẽ, quæ maximè inualefcit Romæ, voco semitertianam. Sunt & aliæ differentiæ particulares febrium, multiq̃; alii circuituum modi, differentiis particularibus variantes, quos ex industria omitto, ceu nihil conferentes ad præsentem cõmentationem. Atq̃ hætenus de particularibus morborum temporibus.

Semitertianã
febrem inuale
fcere maxime
Romæ.

GALENI PERGA

MENI DE TOTIVS MOR
BI TEMPORIBVS.

LIBER VNVS.

Totius morbi
t̃pa quatuor.



TOTIVS etiam morbi tempora, similiter ac animantium ætates cõsideramus. Quoꝝ vnum quidem & * primum, generationi ipsoꝝ tribuitur: Incremẽto secundum: Tertiũ vigori: Quartũ deniq̃ declinationi, si ægri salui futuri sunt. Nam si vel in ascẽ

su, vel statu decesserint, liquet talem morbum non oīa
 tempora pertransisse. Ridiculum autem fuerit, primū
 tempus primæ accessionis, totius morbi principium exi-
 stimare: quum nimirum principium morbi ad præsidia
 ferenda, vtilis præbeat indicatiōes. Ad id principium
 respiciens Hippocrates ait. Incipientibus morbis, si qd
 mouendum videtur, moue: consistentibus verò, præ-
 stat conualescere. Præterea non minus absurdum fue-
 rit, morbis qui intra diem soluuntur septimum, & iis q
 prorogantur in annum, æquale principium tribuere.
 Ostendimus autē primo libro de Crisibus, totius mor-
 bi principium, ipsius cruditatē existere. Porro inflā-
 mationis principium, totum illud tempus existit, quo
 sanguinea substantia pars affecta repletur. Quum autē
 influxus cessauerit, & quod in particula continetur, pu-
 trefieri inceperit, calor quidam ob putredinem nascit,
 & fusio magis propter calorem. vnde etiā spiritus ge-
 neratur, atq; ob hæc ambo, particula magis q̄ antea di-
 stenditur, etiam si nihil influat. Hoc igitur secundum tē-
 pus, est inflammationis augmentum. At quum humor
 in pus iam vertitur, maximū tunc dolores partē ipsam
 corripunt. Nam in puris generatiōe dolores, febris q;
 magis q̄ prius, infestant. Vocatur autem hoc tempus,
 ægritudinis vigor. Quòd si humor in pus mutetur, vel
 digeratur, minorem tumorem atq; tēSIONem efficit:
 huiusmodiq; est declinationis principium. Sic itaq; in
 inflammatione tempora diuidūtur: nec secus in feбри,
 quæ ab illa trahit ortum. At quæ ab humore citra in-
 flammationem oritur, molestantium humorum cru-
 ditatem pro initio habet. Hi vbi concoqui incipiunt,
 initium finitur, atq; ascensus siue incrementum aduen-
 tat. Vbi verò maximè concoctio perficit, vigor adest.
 Quā declinatio ē vestigio sequitur, dum symptoma-
 tum magnitudo, & humorum copia est repressa: re-
 stat autem humorum modicum, adhuc concoctionem

Principiū mor-
 bi ad præsidia
 ferenda, vtilis
 præbet indica-
 tiones.

Principiū mor-
 bi totius, est
 eius cruditas.

Inflāmationis
 quatuor tēpa
 describuntur.

Febris ab hu-
 morum putre-
 dine ortarum,
 tēpora descri-
 buntur.

Vlcerū tēpora. desyderans. Vlcerum quōq; eadem habentur tempō-
ra. Primū nāq; sanies aquosā, incoctā & tenuēs ab
ipsis defluunt. Dein pauciores, atq; crassiores. Postea
iam pus tenue. Postremò minus quidē copia, sed cras-
sius, & albidum magis redditur. Quemadmodum ap-
paret etiam in pleuritide & lippitudine. Quare nullus
morborum solutorum existit, qui non hæc quatuor p-
currat tempora. Non tamēi ex quodam alio q̄ crudi-
tatis & concoctionis indiciis, quæ excrementis de-
prehenduntur, cognitio ipsorum constat. Etenim flu-
xionum quæ ex cerebro per palatum & nares fiunt,
ex cruditatis et cōcoctionis indicium.

**Tempera mor-
borū non aliū
de cognosci, q̄
ex cruditatis
et cōcoctionis
indiciis.**

**Tempera vni-
uersa morborū
latitudinē mo-
mentaneā for-
tiantur.**

**Morbi cuiusq;
generationi p-
priū quoddā
est tempus.**

**Tempera to-
tius morbi,
quatuor.**

**Morbos qui
non soluuntur,
natur a duplex**

Vigor itaq; tum accessionis, tum totius morbi, sensibi-
li tempore absoluitur. Igitur vniuscuiusq; morbi pro-
prium quoddam tempus generationis existit: interim
sensui manifestum, interim minimè. Post quod rursus
augmenti tempus aduenit, * nec id æquè manifestū
in omnibus. * Post hæc, vigoris sequitur tēpus, omni
no sensibile. Quod si salus futura sit, declinationis etiā
tempus sequetur, & hoc sensui subiectum: quum nimi-
rum amplam latitudinem habeat. At verò morborū
qui non soluuntur, duplex natura est. Nonnulli enim
ipsorum præparationem habent, vbi exactè illam ab-
solutam sint consequuti: alii ex eorum natura sunt, q̄
soluuntur: id quod eis in ægri perniciem accidit. * Hoc
autem contingit tripliciter. Nam aut propter ægrota-
tium imbecillitatem, vel propter propriam vehemen-

etiam, vel propter veramq; prius perimunt, q̄ soluant.
 In vniuersum autem, nemo seruari potest, nisi natura
 superauerit morbum: nec perire, nisi illā morbus pro-
 strauerit. Igitur morbi singuli ex sua quidem natura,
 magnitudinem quandam possident: quæ vel supra vi-
 res est, vt eas opprimat: vel viribus ægri imbecillior,
 vt ab eis superetur, omnibus probè eueniētibus. Pro-
 inde quum supra vires fuerit, homo prorsus morietur.
 At morbi tempora tunc partim simili modo cum præ-
 dictis sumuntur: partim dissimili. Siquidem initium si-
 militer in morbi generatione constituitur. Ascensus
 autem, haud in concoctionis, sicuti in iis qui supersti-
 tes sunt futuri, sed in cruditatis signis, letalibusq; con-
 sistit. Ergo bene colorata urina, & mediocriter crassa,
 omnium optima existit, quantum ad colorem & con-
 sistentiam pertinet. Conueniet aut̄ præterea, vel eneo-
 rema, vel nebulam, vel hypostasim salubrem adesse, vt
 cumq; morbi natura postulauerit. At cruda vrina est il-
 la, quæ nec suspensum quicq; nec subsidens, nec nebu-
 lam habet: immo quæ nec crassitiem aliquam, nec pal-
 lorem assumpsit, sed alba est, & persistētia tenuis, aquæ
 speciem referens. Quod si aut nubecula, aut eneo-
 rema, aut hypostasis nigricare videatur, talis vrina est le-
 talis: quemadmodum si quædam similia fursuri, vel la-
 mis, in ea videantur. Iam verò, si aut foetida sit, aut pir-
 guitudinem oleaceam in se contineat, mortem minat.
 Hæc igitur sunt vrinæ, magni morbi notæ. Magnum
 etiam esse morbum cognosces, si sputum pleuritide &
 peripneumonia laborantibus, vel nigrum, vel * fuluū
 vehementer, vel spumās, vel impenitē foetidum fuerit:
 vel nihil omnino expuatur: id ē ingenti dolore, vel spi-
 randi difficultate hominem affligente. Respondent his
 & alii morbi, qui iecur, ventriculūq; exercent, eodē
 letalium signorum genere comprehēsi. Vnde in huius-
 modi morbis vigorem similiter cum eo qui salubrium

Seruari nemo
 potest, nisi na-
 тура superau-
 rit morbū: nec
 perire, nisi illā
 morbus pro-
 strauerit.

Vrina optima
 qualis.

Vrinæ crudæ
 indicia.

Vrinæ letalis,
 notæ.

Sputi pessimi
 signa.

est, determinare non licet. Nam illic maximæ accessiones statum definiunt. Hic verò non licet maximas accessiones similiter determinare: quum morbus quidem ipse à principio incoctus persistat. Verum intellectu maximum capere oportet. Porro in inflammatione quæ terminatur, puris generatio, vigoris terminus est: in ea verò quæ non finiet, homo etiam in eius ascensu mori potest. Cæterum vires validissimæ usque ad extremam phlegmiones magnitudinem sufficere possunt: quæ magnitudo extrema, vel in gangrænam, vel in putredinem terminatur. Iam verò vno eodemque tempore duobus tribusue morbis homo infestari potest: quorum alius iam inclinatur: alius principii tempus adhuc, vel augmenti primordia occupat: tertius plurimum auctus est. Deinde hominem mori contingit, non propter inclinantem, vel nunc incipientem, sed ob vehementer auctum. Quæ de causa, tria facultatum nostrum corpus regentium principia, summè considerabis, quo nam statu sint prædita. Dico autem hæc, cerebrum, cor, & hepar. Deinde alias quæque vniuersas particulas, ex singulis principiiis ortas, nempe nervos, venas, arterias: adhuc illas, quæ naturam quidem propriam habent, sed ab omnibus principiiis reguntur. Nam ex hac speculatione, primum, siue vnus, siue plures, in homine morbi sint, inuenies. Proximum est, cuiusque propria tempora ad præsidiorum inuentionem necessaria inspicere. Etenim circa initium & fines, omnia imbecilliora sunt: in vigore fortiora: quæ hæc intercedunt, medio consistunt ordine. Igitur in vigore, quod mitigandi vim possidet, in curatione præpollere debet: in principio & fine, quod vehementiam habet. At media tempora, pro summiorem proportionem capiantur. Neque enim quam quis victus rationem instituet, inuenire poterit, neque vniquam nutrire, sine certa temporum distinctione. Etenim si vigoris tempori, etiam sine alimenti exhibitione

Principia facultatum nostrum corpus regentium, tria.

Victus & remedium rationem institui iuxta ipsius morbi tempora.

sufficere possit æger, optimum sanè fuerit, donec morbus inclinet, à cibo abstinere. Si verò sufficere citra cibum non possit, protinus ab initio in quolibet tempore, quod alimentum admittit, alendus est. Atq; hoc, remissionis est tempus. Voco remissionem modo, secundam partem totius circuitus in duo vniuersa diuisi, nepe accessiōem & remissionem.

GALENI PERGA

MENI DE LOCIS AFFECTIS.

LIBER PRIMVS.



PR O Differentia partiū humani corporis, variari affectuum curationem contingit. Partes igitur quæ in superficie corporis sitæ sunt, vnà cum affectibus quibus vexantur, facile sensibus deprehenduntur. At quæ in imò corpore delitescunt, exercitæ cogitationis virum delyderant, quā in partium actione & vsu, tum vel maxime in arte secādi corpora: quæ nimirum nos docet ac curatissime proprietatem essentia vniuscuiusq; partis. * Si igitur inter tusiendum, bronchium aliquod expuatur (est enim id natura cartilagineū) maximo sanè vlcere affligi pulmonē existimamus. Nā tametsi aspera arteria similibus sit ex brochiis compacta, tam grandis tamen exulceratio, sine præmatura morte in illa gigni non poterit. Nec verò tantum ex proprietate essentia, sed ex magnitudine etiam excrementi reiecti, affectus locus discernitur. Vt si vnà cum tusi excreetur aliqua portio vasīs grandiuscula (quod aliquādo contingit) tunc certè credendū est, illam educi à pulmone. Quandoquidem venæ quæ in asperam arteriā disseminantur, minutissimæ sunt, & capillorum instar.

Curatio affectuum variat, pro differentiâ affectuæ particularum.

Ars secādi corpora docet nos pro prietatē essentia vniuscuiusq; partis. Essentia proprietatis.

Magnitudo excreta substantia.

Res naturali-
ter in particu-
lis quibusdam
contentæ.

Sanguis arte-
riarum qualis.

Res adhæres.

Res contentæ
præter naturā.

Vrina suppres-
sa quæ sint co-
sideranda.

Musculus vesi-
cæ collū con-
stringens, agit
voluntarie.

Similiter si per dysenteriam tunicam aliquam corporis lentiorems albus aliquando reddiderit, non ab re coniecties vlcere crassiora intestina torqueri. Nec non ex rebus naturaliter in particulis quibusdam contentis, creberrimè sedes affecta cognoscitur. Vt si vrina per vulnus reddatur, vesicam: si vero sterens, intestinorum aliquod: at si cibus, ventriculum liquet esse conuulseratum. Similiter etiam si vulnerato thorace, spiritus per vulnus effluat, indicat membranam cingentem constas, solutam esse. Præterea sanguis eiectus saliendo, arteriam esse vulneratam denunciat. Qui quidem arteriarum sanguis, eo qui à venis effluit, calidior, tenuior atque flauior apparet. Ex adhærentibus etiam rebus, affectæ sedis notæ petuntur: quum nimirum & ipsæ et essentia proprietatem obtineant. Huius generis est raumentum: quod quidē ostendit illius partis vlcus, à qua reiiicitur. Nam si id cum lotio excernatur, vrinae meatum: si tussiendo, spiritalium instrumentorum: si per vomitum, gulæ aut ventriculi: si cum alui excrementis, intestinorum vlcerationem significat. Est præterea & alius diiudicandi modus sumptus à rebus alicubi contentis præter naturam. Vt si in vesica aut renibus cõtineatur lapis: in thorace pus: aut denique aliquis humor molestus in animalis corpore, illic genitus, vel adueniens extrinsecus. Fingamus igitur (gratia exempli) aliquem tribus diebus non reddidisse urinam. Adhæc, euidens quidam tumor circa pubem emineat, euidētem repletionem vesicæ indicans. In primis enim considerandum est, num resolutæ excreticis potentia nomine id accidat: an ob obstructum vrinarium meatum: nā utrumque potest accidere. Prius tamen reuocare in memoriam oportet, musculum qui claudit collum vesicæ, ab actione quiescere, dum fungitur vesica suo munere. Cuius quidem musculi actio, parit voluntatis imperio. At vesica ipsa, utpote naturaliter agens, minimè voluntati obsecundat.

obsecundat. Inest etenim illi quemadmodum cæteris
ferè omnibus partibus, facultas quædam expultrix,
qua utitur, dum contristatur ab excrementis. Quæ sa-
nè excernendi vis, si aliquādo fuerit affecta fieri potest
vt supprimatur vrina. Proinde si hominē sic figuraue-
ris, vt decliuus sit colli vesicæ positus, ac manib⁹ pubis
tumorē p̄sferis, tandē reddet lotiū. Quod si sic faciēdo
nihil omnino promoueris, non resolutā eam vim, sed
vrinæ fistulam constipatā esse, suspicari oportet. Quip-
pe musculus ei circumdatus, si resoluatur, non cohibi-
ti, sed præter voluntatem emissi lotii, est causa. Trifa-
riam autem cōtingit obstrui collum vesicæ. Aut enim
corpus ipsius in tantum tumorem attollitur, vt mea-
tus inde occupetur: aut aliquid ei præter naturam, vt
caruncula vel callus innascit: aut deniq; à re quapiam
adueniente, meatus ipse obstruitur. Porrò corpus eius
ad magnitudinem insignem attollitur, si vel inflamma-
tiōe, vel scirrho, vel abscessu, vel alio quouis tumore,
fuerit affectum. In meatu caro quidem oritur, si præ-
cesserit vlcus. Obstruitur meatus, vel à lapide, vel gru-
mo, vel pure, vel crasso lentoq; humore: quæ omnia
distinguere oportet, ex præsentibus præteritisq; ac-
cidentibus. Sit igitur aliquis puer, qui perpetuò puden-
dum scalpat. Eius autem vrina sit aquæ similis, in qua
sabulosa quædam subsideant. Dein verò, repente sup-
primatur vrina. Nunquid, optima ratione conieceris,
huic lapidem incidisse in collum vesicæ? Itaq; supino
collocato puero, vt crura reliquo corpore sint subli-
miora, multifariam ipsum concuties. Sic enim feceris,
vt lapis à meatu recedat. Quibus peractis, iube ut puer
vrinam conetur reddere. Quod si profluxerit, noticiā
causæ, ac simul curationis modum, te inuenisse, ne du-
bitaueris. Sin autem nihilominus supprimatur vrina,
tunc demissa ænea fistula, simul lapidem à vesicæ collo
repelles, & euocabis vrinam. At nulla lapidis nota præ-

Vesica non pa-
ret voluntatis
imperio.

Vrinā suppres-
sam ob resolu-
tā vim excer-
nendi, quō ex-
pell. re oportet.

Obstruitur col-
lum vesicæ tri-
fariam.

Lapidis inci-
dētis collo ve-
sicæ, indicia.

cedente retentum lotium, si sanguis simul cum vrina profuxerit, argumentum est grumum aliquē extitisse ipsius obstructionis causam. Quāq̄ fieri potest, vt ob vlcus vesicæ, citra sanguinis profusione, paulatim grumus concreascit. Potest etiam cōtingere, vt sanguis ex renibus per vteras in vesicam defluens, grumum efficiat. Ad hæc igitur omnia, sicuti etiam vbi pus, vel aliquis lentus humor meatum vrinæ obstruxit, haud inutilis est ænea fistula immissa. Sic etiam vbi ob carunculam ab vlcere innatam, vesicæ ceruicem obstructā esse putamus, & ex præcedentibus vlcere notis, & ex eo q̄ immissa ænea fistula vrina vacuatur, id intelligere possumus. Quippe demissa fistula, dolorem mouet in ea meatus parte, vbi vlcus eē coniicimus: fracta q̄ sub fistula carne, sequuntur cum vrinæ excretiōe & cruore & carnis fragmenta. In omnibus igitur his artificiosa coniectura nobis perq̄ utilis est, vt quæ inter exactā notitiam, & omnimodam ignorantiam, media quodammodo existimet. Cæterum cuiuslibet partis vsus, magnificè ad affectorum locorum cognitionem conducit. Etenim actio, motus partium factius ē: at vsus, omnibus inest, vel nihil etiam agentibus. Fit itaq̄ excretionis vrinæ actio, à compressione vesicæ, opitulantis etiam abdominis musculis, vbi vrinam admodum exiguum continet, aut vesica ipsa est infirma. Reliquæ autem partes omnes, ad actionem sunt utiles. Porrò si vesica minimè in tumorem extēsa, vrina redi non possit, necessum est, vel vteras, vel renes obstructos esse. Quapropter hic rursus intueri oportet, num anteq̄ supprimeretur vrina, aut lapidis, aut inflammationis, aut alterius cuiuspiam mali accidentia præcellerint. Neq̄ interim negligenda est, vniuersi corporis dispositio: vt possimus planè discernere, num in ipsis renibus à lapide, vel crassis humoribus, fuerit obstructio oborta: an in vocatis vtericis. Quum igitur singu-

Ænea fistula
ad qd utilis.

Carunculæ col-
lo vesicæ inna-
tæ argumēta.
Cōiectura arti-
ficiosa.

Vrinæ excre-
tio a qbus fiat

læ actiones corporis, peculiaria sortiantur organa, quibus obeuntur, sanè actionem lædi est necesse, instrumento efficiente ipsam, quomodolibet læso. Verùm interdum facile affectus productus soluitur, ita vt simul atq; opifex causa semota fuerit, prorsus ipse cōquiescat. Interdum verò vsq; adeò pertinaciter hæret, vt per- maneat diutissimè, etiam ablata causa. Accidit autem nonnunq̃, vt efficiens causa pertransiens, non firmum faciat affectum: veluti quum suffusioi similia oculi imaginantur, collecto in ore ventriculi aliquo tenui excremento, vnde vapores sublari ad oculos, similes imagines mouent, quales per suffusiones cernuntur. Oportet siquidem oculos participes fieri eius dispositionis, quæ infestat ventriculū, si videndo debeāt hallucinari. Itaq; necessum est ordiri semper ab instrumento actionis oblæsæ. Dein autem inuestigare, quis nam sit ipsius noxæ modus. Num videlicet dispositio ipsa sit permanens: an adhuc in generatione consistens, nec nata per seuerare. Quòd si nunc quoq; fiat, vtrum causa quæ effectū producit, contineatur in ipsa parte: an per ipsam transeat, inuestigandum. Etenim arefacto immodicè humore, quem crystalloidem vocant, perseuerans erit oblæsiō, & essentia ipsius proprius affectus. Si verò crassus humor in pupilla constiterit, essentia quidem nondum * est læsa: verùm accidētis causa in oculo, ipso cōsistit. Tunc autem per ipsum trāsire dicitur, quum euaporans humor in ventriculo continetur. Non autem necesse est, ad hoc vt pars aliqua esse affecta dicatur, in essentia ipsius permanentem esse dispositionem. Nam vbi vehemens dolor aliquod intestinum infestat, firma to in vna quapiam parte dolore, vt quasi perforari videatur, quo pacto quis, vel nequaq̃, intestinum affici dixerit, vel in eo affectū non consistere, quis huiuscemodi dolores interdum, excreto quodam humore vitreo, vel temporis momento soluantur. Is igitur humor, vi

Actionē lædi
necesse, insto
efficiente ipsam
quolibet læso.

Oculis caligantibus, quæ sunt consideranda

Humor vitreus.

*Causa ē id, quo
tangēte quidē
afficiuntur: abla-
to autē, affectus
sedatur.*

*Dysenteriae
causa mordax
existit humor,*

*Morbus oīs p
tinus ab initio
eandē sibi ipsi
naturā, atq; ef-
fentiā sortitur:
nec differt nisi
magnitudine a
iā absoluto, &
maximo.*

*Morbos exigu-
os subito vin-
ci a natura.*

*Dysenteria est
vltus intestino-
rum.*

treus, causa illius doloris existit. Id siquidem quo tan-
gente afficiuntur, & quo separato quiescit affectus, cau-
sam esse, omnibus in confesso est. At verò ipse affectus,
nonnunquam à causa aliqua oritur, sed ita oritur, vt subla-
ta causa effectrice, haud quaquā permanentē habeat di-
positionem. Interdum autem partim iam factus est:
partim etiamnum fit. Sæpenumero etiam si fieri desi-
nat, vtpote ablata causa, perseverans tamē permanet
dispositio. Veluti in dysenteria, cuius affectus, mordax
humor existit causa: vtpote qui ab initio extergat, ab-
radatq; , ac dein temporis tractu ulceret intestinum.
Quod si antea quā produxerit vltus, * pfluere is humor
delinat, affectus ipse nondum dysenteria vocabitur.
Sin verò vltus iam intestinum exerceat, etiam si humor
finiatur, non ob id finitur affectus. Hoc autem summo
pere venit considerandum, omnem morbum protin-
us ab initio, vbi primū corpus ipsum limites tem-
peraturæ, quæ sanitati debetur, excesserit, eandem sibi
ipsi naturam atq; essentiā sortiri, nec differre, nisi ma-
gnitudine, à iam absoluto & maximo. Siquidem res
similares, quum nullam figuram naturalem desyde-
rent, protinus ab initio eadem essentia constant. Dis-
similares verò, & quibus varia est forma, vt domus, ef-
fentiā generatione posteriorem habere poterūt. Quā
itaq; causæ agunt in corpus, ipsa species affectus ab ini-
tio est eadem, tamen ob exiguitatem non planè cerni-
tur, sicuti neq; in saxo concauitas, quā vnica stilla pro-
duxit. Cæterum id genus affectus exigui, separatis ef-
ficientibus causis, illico à natura vincuntur. Illi quippe
dūtaxat externo egent auxilio, quos ob magnitudinē
vincere natura non potest. Igitur vbi primū mor-
dax humor aliquod intestinum eroserit, quis id quod
iam factum est, nodum apertè videatur, nihilo minus
dispositio ipsa sub dysenteriae specie comprehenditur.
Sit autem hoc initium viæ ad inveniendas affectas se-

des, nullam actionem lædi, nisi pars quæ illā efficit, afficiatur. Verūm vt affectio & actio diuersę sunt voces, ita diuersus quoq; earum est vsus. Id siquidem agere dicitur, quod ex seipso motum obtinet. Affici verò, qđ motum habet ab alio. Quum itaq; duo sint motus genera, alterationis & lationis: vbi ad permanentem dispositionem alteratio peruenit, fueritq; dispositio pter naturam, morbus vocatur, quīs p abusionem non nulli eam dispositionem affectum nominēt. Distinguēda tamen est interim propria & primaria affectio, ab ea quæ per cōsensum accidit. Vt autē recta, propriaq; nominum appellatione vtar, afficitur quidem caput, quando condolefcit ventriculo: ægrotat verò, quum proprio morbo laborat. Similiter ventriculum affici qđ dem dicemus, vbi à vitiosis molestatur humoribus: ægrotare verò, aut per intemperiem propriam, aut quū inflammatiōem, vel vlcus, vel abscessum habet præter naturam. Porro corruptionis ciborum tres primæ ac veluti generalissimæ sunt differentiæ. Vna quidem per proprios ventriculi morbos: altera à vitiosis humoribus in ipso collectis: tertia ab alimētorum qualitate inducitur. Licet itaq; vitiosam ædi coctionem, ventriculo non primaria, sed sec undaria ratione, affecto: minimeq; circa actionem propriam hallucinante: quemadmodum vbi vitiosi cibi & corruptioni obnoxii ingerūtur. Si igit quispiam fumosum ructū emittat, igneo quodam calore ventriculum eius esse dicemus prædictum. Ac deinde rursus distinguendo inuestigabimus, vtrum ab intemperie corporis ipsius ventriculi, is calor oriatur: aut à flaua bile, eaq; vel in ipsius spatio cōtenta: aut in tunicas ita, vt vix abstergi possit, demissa. At ne hic quidem cessabimus. Nā rursus quærere oportet, an iecinor male suo officio fungēte, huiusmodi humor accumuletur: an is ex vniuerso defluat corpore: an etiam in ipso nec gignatur ventriculo. Ergo si in v

Actio nulla lædit, nisi pars qđ illam efficit, afficiatur.

Agere quid dicatur.

Affici quid dicatur.

Motus genera duo.

Morbus qđ.

Affici qñ dicitur caput.

Ægrotare qñ dicat caput.

Corruptionis ciborum tres differentiæ.

Ructus fumosus signat igneum calorem ventriculi.

Accescere in v^o
triculo cibos,
ob causam fri
gidam.

Ructu edito fu
moso, vel aci
do, quid agen
dū, cōsideran
dūne, ad vtriū
q; causam per
uelligandam.

Vomere nemo
cogēdus est, ni
si sit ad vomē
dū procliuus.

Nausea inanis
indicat calidū
succū imbibi
tum ventricul
tunicis.

Cupiditas ci
bi vnde exci
tetur.

Locus affectus
quid indicet.

Diatrion pipe
reō ructuri aci
do confert.

triculo cibi in fumosam qualitatem mutantur, idq; nō
ex sua ipsorum natura, causam calidā, si verò accescāt,
eam frigidam esse est necesse. Vt discernas autem num
intemperies aliqua, an vitiosus quispiam humor ven
triculi corpus infestet, offerre oportet cibos qui suapte
natura q̄maximè corruptionis modo aduersentur: vt
panem aut chondrum illis qui in fumum transmutare
cibum consueuerunt: nēl autem his, qui à cibo acidū
saporem percipiunt. Dein cōsiderare excrementa,
tum ea quæ vomuntur, tum quæ deiciuntur per aluū:
num humor aliquis cum illis quidē biliosus & calidus:
cum his verò pituitosus ac frigidus excernatur. An nul
lo vacuato humore, ipsa exigua quandam mutatio
nem obtineāt. Quippe vbi * citra humoris affluxum
igneo calore ventriculus infestatur, panem aut chon
dram absq; humore videbis deiici, per q̄ exigua i ipsis
facta transmutatione. * Quod si humor quoq; prau
in ipso ventre consistens corrumpat cibos, videntur iī
(vbi deiecti fuerint) in huiusmodi humore submersi,
& ab ipsius actione manifestius alterati. Id quod à vo
mitione etiam clarius discernitur, si laborans sit proclī
tis ad vomitum. Nam cogere eum qui nequeat vome
re, absurdum est. Atq; hæc ita deprehēduntur, si in spa
tio ventriculi noxius cōtineatur humor. Si verò in tu
nicis sit imbutus, vt ad calidum nausea quædam inanis
(hoc est citra vomitum) sitisq; vehemens cōsequitur,
ita à frigido ciborum cupiditas excitatur. Porro cali
da dispositio, vbicunq; fuerit, semp refrigeranda ē. At
quousq; aut quo mō, aut qua materia refrigerare con
ueniat, locus affectus commōstrat. Iam verò iis qui aci
dum ructum ædunt auxiliatur medicamen diatrion
pepereon, aut aliud simile, ex aqua vel vino epotum.
Aliis autem qui nidorosum, tum absynthium, tum hie
ra picra ē ex vsu. Quo quidem medicamine (hiera ui
delicet, quæ ex aloe constat) in potu exhibito, quosdā

olim colicos perſanauit, quibus mordacium humorū defluxus in inteſtinum, conciliauerat affectionem. Cæterum inteſtinorum proximæ ventriculo partes, exhibitæ tum cibis, tum potibus: quæ verò non ita multū à ſede diſtant, clyſmis promptius curantur. Fingamus rursus per ventrem deiici excrementa quædam: aliqui quidem ramenti, aliquando cruētum aliquid: ſimulq; aliquando hæc ambo. Tunc ſanè inteſtinum vlcere aſfectum eſſe, dubitauerit nemo. At verò vtrum in exilibus inteſtinis, an craſſis, ipſum vlcus conſiſtat, id ex raſura, & exitus tempore, & ex miſtione cum ſtercore, diſtinguere oportet. Si quidem infimarum partium vlcera, nullas omnino vlcerum habent notas alui excrementis admixtas: earum verò partium quæ paulò alti⁹ ſunt ſitæ, vlcera, miſtas quidem cum ſtercore notas habent: ſed id leuiter duntaxat. Quemadmodum, ſi multo ſint ſublimiores, vehementior erit miſtura. Præcipuè verò in ſupremis inteſtinis vlceris notæ ſtercori accuratè miſcentur. Poſſe ex vno quandoq; indicio ſimul & locus & diſpoſitio deprehendi: aut locus vnà cū cauſa. Cæterum locorū notæ, & ab actiōe læſa, & excrementis, & poſitu, & doloris proprietate & propriis accidentibus deſumuntur. Affectum verò, & ab excrementorum ſpecie, & loci natura, & doloris proprietate, & propriis accidentibus. Actio itaq; læſa, affectā partem indicare poſteſt, hoc modo. Si enim accideſ aliqđ circa cernēdi offm̄ euenerit, oculū affici conſtat. Excrementorū ſpēs partē affectā indicat, vel q̄ ſint ex eſſentia illius, vel q̄ ab ea contineantur. Poſitus etiam affectam partem commonſtrat. Durus quippe in dextra p̄ cordiorum parte tumor, non lienis, ſed iecoris affecti eſt nota: in ſiniſtra autem, non hepatis, ſed ſplenis affectum indicat. Adhæc, ſi membranofæ tunicæ fruſtūlū vomendo fuerit reiectum, aut gulæ, aut ventriculi: ſi ruſſiſſendo, gutturiſ, aut aſperæ arteriæ: ſi excreando,

Hiera picra qbus conducatur affectibus.

Inteſtina ſuprema cibo & potu infima promptius clyſmis curari.

Vlcus, obſideat ne tenuia inteſtina, an craſſa, quō dignoſcendum.

Locorū notæ vnde ſumant.

Actio læſa partem affectam indicat.

Excrementorum ſpecies partē affectā indicat. Poſitus indicat partē læſam.

Dolores lingu-
li affectū pñt p
se ostendere.

Accidentia p.
pria indicāt lo-
cum affectum.

Peripneumoni-
cis vident ma-
xillæ rubere.

Affectuū notæ
vnde deprehē-
dantur.

Lapis in qui-
bus gignatur
partibus.

Abcessū cor
sustinere non
potest.

Dolorem nec
pulmo, nec li-
gamētū patit.

Horror intēpe-
stius cū febrē
suppurationē i
flāmationis in-
dicat.

Affectuū pro-
pria signa quæ
sunt.

faucium: si cum vrina, eius fistulæ: si à sede, alicuius in-
testinorum : si per mulieris pudenda, vteri affectum
portendit. Singuli etiam, dolores, propositus varie-
tate, possunt affectam sedem ostendere. Nam si appa-
rentibus per vomitum vlceris notis, in anterioribus
partibus circa præcordia sentiatur dolor, ventriculū:
si verò in posterioribus circa dorsum, gulam exulcera-
tam esse est indicium. Ex propriis accidentibus etiam in-
notescit affectus locus. Nam ore ventriculi affecto, fa-
stidium infestat. Per hepatis verò imbecillitatem, ex-
crementa alui, aquæ in qua carnes nuper mactatæ ablu-
tæ fuerunt, assimilantur. At in peripneumoniciis, maxil-
læ videntur rubere. Quinetiam propriæ ipsorum affe-
ctuum notæ, in excrementis deprehenduntur. Siquidē
raimentum, vlceris: si in vrina sabulosum residet, lapī
dis: cucurbitæ verò seminibus excrementa similia, la-
torum vermium indicia sunt. A locis etiam ipsis, mor-
borum indicia sumuntur, eo quod quibusdam solis mor-
bus ille accidat: quibusdam verò solis nunquam eueniat.
Quippe soli oculi suffusione laborant. Lapis in vesica &
renibus duntaxat nascitur: atque ut nonnullis placet, et
in colo. Lumbrici in intestinis gignuntur. Rursus impos-
sibile est, ut cor abcessum sustineat: aut pulmo, aut li-
gamenta, dolorem. Ab accidentium quoque proprietate
affectuum indicia oriuntur. Nam quibusdam per ta-
bificos morbos, vngues adunci euadunt. Intenpestiuus
horror cum febre, inflammationis ad suppurationem
transcuntis indicium est. Lingua nigricans ardentem febrē
portendit. Paucæ tamen affectuum sunt notæ, quæ non si-
mul affectam sedem ostendant. Cæterum ut actionum
noxæ affectam duntaxat particulam, sic differentiarum earum,
ipsius affectum declarant. Ea igitur sola sunt affe-
ctuum propria signa, quæ per accidens ipsos sequuntur.
Porro quum ob vapores vel etiā humores ipsos ascen-
dentes ad cerebrum, mens læditur, nemo sanè dixerit

cerebrum tunc laborare primogenio affectu: quod omni affectu carere, ipsum hauquaquam defendi potest. Quare dicendum est, illud consensum siue consortii lege affici: hoc est ab altera parte talem affectionem recipere. Sunt præterea nonnullæ actiones, quæ idonea indigentes materia, ipsam ab aliis partibus præparatam accipiunt. Quæ de re interdum optima ratione contingit, nulla existente in actionis cuiuspiam propriis instrumentis noxa, actionem ipsam perire, defectu scilicet eius materię, ex qua fieri consuevit: veluti in voce accidit: cuius quidem materia efflatio existit. * Hæc autem sit contractio thorace ab intercostalibus musculis. His igitur nihil agentibus, animal vocem amittit: & quidem nullo interdum in propriis vocis particulis apparere affectu. Sunt verò hæc partes, tres cartilaginee à tribus commotæ musculis, in quos inseruntur nervi demissi à cerebro. Est præterea in gutture ligula, siue epiglottis, maxime proprium vocis ipsius instrumentum. Etenim accidit quidam ab alto, ita ut dorsi initium affligeretur: Is tertio die exiguam admodum vocem emisit. Quarto deinde die omnino obmutuit: resoluta quoque simul fuerunt & crura: manibus prorsus illæsis. Sed nec spirationem amisit, nec difficulter spirabat. Nam quum tota sub ceruice spina esset ei resoluta, accidit thoraci, ut & septum transversum, & musculi superni, numero quodam sex, mouerentur. Quippe nervi ex spinali medulla, quæ in ceruice est, in ipsos descendunt. At nervi musculorum intercostalium, qui efflatum efficiunt, omnes affecti erant. Vbi igitur sedata fuit spinæ inflammatio, à septimo die vox restituta est iuueni, & crura motus facultatem, antea interceptam, recuperarunt. Huiusmodi ergo noxæ speciem, magis proprie per consensum euenire dixeris, quàm ubi ab humoribus in ventriculo contentis, exhalantibusque, caput dolore tætur. Iam verò, ut ad crura facultas quædam sed citra essen-

Affici per consensum quod dicitur cerebrum.

Vocis materia est efflatio, quæ sit contractio thorace ab intercostalibus musculis. Vocis propria instrumenta sunt tres cartilaginee quæ constitunt laryngem, ac præterea epiglottis.

Affectus per consensum speciem dux.

tiam substantiam' ue descendere ob phlegmonem prohibita est, sic ad oculos, cum essentia, ubi obstructi fuerint uisorii meatus. Ad guttur autem, quibus materia perueniat per illam spinæ dorsii resolutionem, sufficiens tamen ipsius quantitas nequaquam accedit. Qui uero ob intercostalium musculorum perforationem obmutuit, is totam vocis materiam amisit. Porro quemadmodum crura resoluitur ob inflammationem spinæ, ita etiam guttur vocalibus siue recurrentibus nervis (quos ipse inueni) aut incisus, aut laqueo interceptis. Atque idem est modus quo læduntur gutturis musculi, siue recurrentes nervi, siue ii qui iuxta arterias sunt, vitentur.

Recurrentes nervos inuenit Galenus.

Moueri per voluntatis imperio nemo potest, absque facultate animali.

Angina est inflammatio internarum gutturis partium.

Loci affecti notitia qua ratione Galeno ipsam curationem ostenderit.

Vtrinque enim animalis facultas desideratur, sine qua moveri nemo potest pro voluntatis imperio. Incisus præterea musculis qui epiglottida mouet, animal etiam euadit mutum. At laqueus collo circumdatus non solum reddit animal mutum, sed etiam suffocat, ipsum respiratione priuando. Aspera autem arteria, si dissecetur, voci quidem nocet, sed animal non priuat respiratione.

Angina uero, quum sit interharum gutturis partium inflammatio, strangulationi proportionem respondens, respirationem tollere potest, ipsius meatum obstruendo. Idcirco vocalis instrumenti maxime proprius affectus est. Qui autem ex affecti loci notitia ipse curationem inuenerim, ex hoc exemplo perdisces. Occurrit mihi olim quidam, cui sensus trium digitorum manus, iam triginta diebus perierat, prorsus illa sola motione: nec iuuabatur quicquam à medicamentis ipsi manui admotis.

Quum igitur intellexissem ex illo, cum proficisceretur Romam, se decidisse à vehiculo, ac initium dorsii tunc sibi contusum fuisse: nec multo post accidisse digitorum affectum: conieci inde, * in primo statim exortu nervi post septimam vertebra, partem aliquam ob ictum fuisse inflammata, eamque iam induruisse in scirrhum. Quippe neruorum qui à ceruice prodeunt, ultimi pars

* humillor, quæ descendit per cubitum, in cutem minorum digitorum diffeminatur, ac præterea per medii digiti mediam partem dispergitur. Quamobrem illi spinæ parti, * quæ affectæ particulæ principium in se continebat, congruenti medicamento cum succurrissem, digitis suum sensum restitui, cum maxima spectantium omnium admiratione. Quo autem modo sensus digitorum perierit, motu prorsus illæso, iā audies. Sentire enim, veluti quiddam pati est: moueri autem, ceu quoddam est agere. Quamobrem ut quis moueatur, opus est robore: at ut sentiat, vel minima facultas est satis. Ob idq; necessum est, ut sensu ipso deperdito, simul exoluatur & motus: ubi per vnum eundemq; nervum ambæ perficiuntur actiones. Porro omnis voluntarius motus, ad musculorum officium pertinet. Quippe nullus nervorum per se, sine musculo, ullam huiusmodi in animatis particulis actionem efficere possunt. Cæterum ad partes mouendas musculi ipsi aliquando quidem * immediate perueniunt: aliquando verò per medios tendones: quales sunt illi qui mouent digitos. Si igitur affici musculorum nervos contingat, digitorum motus peribit: si verò eos qui ad cutem ptingunt, tangendi sensus corrumpitur. At ubi rota resoluitur membra, quum videlicet commune principium est læsum, simul & motus & sensus pereunt. Ac tunc locum primario affectum, ex læsorum nervorum multitudine duntaxat inuenire poteris. Accidit autem iterdum, ut dextra tantum pars ipsius spinæ afficiatur, altera omnino illæsa: aut e contrario, ut illa manente integra, sinistra affectum sustineat. Atq; hac ratione nonnunquam tota pars sinistra resoluitur, dextera illæsa manente: nonnunquam contrā, dextra pars duntaxat, & afficitur, & resoluitur. Vbi verò non affecta spina, tantum unus nervi processus est læsus, eas duntaxat partes resolutio occupat, in quas ille nervus est distributus. Itaq; si

Sentire est veluti quiddam pati. Moueri ē veluti quiddam agere. Sensu amisso, cur motus pereat, ubi per vnum eundemq; nervum utraque actio perficitur. Nervum nullum absq; musculo posse motum præstare.

Spinæ interdum dextram, interdum sinistram partem resolui.

Medendi rōne
esse cōueniēdā
ad affectus ori
ginem.

Sedis musculi
resolui ob fri
gus immodicū.

Instrumentis na
turalibus, co
gnata actionis
vis inest.
Instrumentis anima
libus, veluti lu
men a sole, a
principio facul
tas defluit.

Spina fuerit affecta, aut aliquod neruorum principis, conuertenda illuc tota medendi ratio est. Alioquin frustra circa resoluta membra occupaberis. Iam verò, ob frigus immoderatum, interdum sedis musculus resolui solet quāmaximè: siue sederit quis super lapidem frigidum: siue in aqua frigida supra modum fuerit versatus.

Quam sanè resolutionem sequitur inuoluntaria excrementorum deiectio. Qui igitur in anatomico exercitatus fuerit, accurateque præcedentia & præsentia accidentia norit, ac sic ad curandorum morborum experientiam methodo & ratione peruenerit, is inueniet & locum affectum, & ipsam dispositionem. Vt autem affecti musculi, voluntarias: sic vesica, necnon intestina oblata, naturales actiones lædere possunt: eo quod ipsis contractis excernantur ea quæ continent. Ac differunt certè plurimum naturalia ab animalibus instrumentis: quæ naturalibus quidem, cognata actionis vis inest: animalibus verò instrumentis à principio (veluti lumen à sole) ipsa defluit. Quamobrem solis partibus quæ & sentiendi & mouendi vim habent, accidit, ut ipsis interdum haudquaquam affectis, nihilominus eorum actio exoluatur: id quod naturalibus instrumentis minimè solet accideret. Quoties enim horum actio læditur, semper ipsa primo afficiuntur. Cæterum animalibus instrumentis omnibus, * naturalis quoque dispensatio adest, quum nimium & arteriarum & venarum adminiculo indigeant, ad essentiam propriam seruandam.

Proinde alterari à vicinis, ipsis ut naturalibus: alterationem verò sentire, ut animatis cuenit.

GALENI PERGA

MENI DE LOCIS

AFFECTIS LIB. II.

CAP. I.



RES sunt exercitationis modi circa affectorum locorum notitiam.

Exercitationis
circa affectorū
locorū notitiā,
tres modi.

Quorum vnus circa singulas corporis partes: alter circa causas & dispositiones: tertius circa differentiam accidentium versatur, Igitur à locis sumitur modus, vbi dicimus: affecto ce

rebro huiuscemodi accidentia sequuntur. A dispositionibus & causis sumptus, existit talis: vt si dixerimus, in inflammationis seorsum, aut refrigerationis, huiuscemodi sunt accidentia. Ab accidentibus, vt quum dicimus: hoc doloris genus hæc dispositiones, aut hosce locos portendit.

CAP. II.

HAllucinatur autem Archigenes, vbi dolorem stupidum neruis tantum euenire ait. Quippe stupor à frigida dispositione oritur, nō neruorum duntaxat, sed etiam venarum, arteriarum, carnis, membranae, tunicarum, & cutis. Quod si ob id q̄ hæc omnia per neruos sensum habent, ad neruos illam dispositionem refert, cur non reliquas omnes dolorum differentias, proprias eē neruorum ait: Etenim dolor, tristis est sensus: quemadmodum ipsa voluptas, blandus. Quod si re accuratius inspexeris, haudquaquā doloris species dicendus est * stupidus dolor: sicuti neq̄ species vlcus inflammationum vlcus: sed vtrobiq̄ duarum dispositionū concursus adest. Etenim stupor refrigeratio est insignis: iccirco corporibus ita dispositis & sensus & motus difficultatem inducit: quemadmodum completa refrigeratio & sensum & motum omnino tollit. Quod autem

Archigenis opinio refellit.
Stupor a frigida oritur dispositione.

Dolor, tristis est sensus.

Voluptas est blandus sensus.

Refrigeratio completa sensum & motum tollit.

- Stupor medio-
cris, dolorem
soluere potest.** Stupor dispositionis, non doloris, aut sensus, sit nomē, Hippocrates docet, vbi ait: Stupor enim mediocris dolorem soluere potest. Porro cōstrictas vehementer particulas, atq; eos qui torpedinē animal dum adhuc viuit tetigerint, infestare solet etiam stupor. At quib; membrum aliquod stupidum fuerit, ii quicquid tetigerint, obscuro & hebeti sensu percipiunt, neq; moueri possunt. Si verò moueri cogantur, dolent. Cæterum citra hoc q; moueri tēret, affectū ipsum stuporis haud obscure persentiunt, sed tunc minimè dolent. Stupor itaq; nō particulæ cuiuspiam proprius affectus est, sed dispositio, quæ accidere qdē oibus potest partibus, ab iis tamen dūtaxat manifestè sentiri, quæ & suos affectus percipere, & moueri pro voluntatis imperio sunt natæ. Iam verò ex carne (quæ nusq; sola ac per se reperitur) ligamentisq; & tendonibus per ipsam disseminatis, musculorum essentia constat: quæ vt pmanere posset, venis indigebat, arteriisq;. Verum citra dolorem pulsare, ad solas arterias pertinet, animali etiā nū rectè valente. Vbi verò ingens inflammatio est oborta, vel erysipelas, vel abscessus, arteriarum pulsus cum dolore sentitur: quum per bonam valetudinem, nec cum dolore, nec sine dolore ipsum discerneremus. Etenim duabus præcipuè occasionibus vehemens dolor partibus inflammatis infertur: * nempe quum mouetur, & quum à re quapiam præmuntur. Proinde inflammato musculo, duplici nomine, ob dilatatas arterias, dolorem percipimus: & q; moneantur illæ, & comprimantur ab adiacente carne, atq; ipsam similiter cōprimant. Quin etiam sine musculo, arteria inflammatorium affectum sustinens, ipsa per se cum dolore pulsat. Quòd si aliquando per id genus affectus, stupidus esse pulsus ipsi ægro videatur, tūc scire licet, dispositionem in musculo neruis ita consistere, vt ad resolutionem tendāt. Nam dispositio stuporis, media est inter resolutionem
- Stupor quos i
festare soleat.**
- Stupor accide-
re oibus parti-
bus potest.**
- Caro per se re-
peritur nunq̃.
Musculi cōpo-
sitio.**
- Pulsus dolorifi-
cus qū sentiat.**
- Dolor inflāma-
tis musculis
vnde accidat.**
- Stupor ē dispo-
sitio media, in-
ter resolutionē
& integrā va-
etudinem.**

& integrā valetudinem. Cæterum neq; i peripneumonia, neq; in laterali morbo pulsatis potest dolor contingere: idq; ob partium naturā. Pulmo siquidem, sensum nō habet: morbus verò lateralis, membranæ cingentis costas affectus est. * Cuius quidem pars illa quæ costis adhæret, necessario comprimitur: * quæ verò inter costas, ē collocata, comprimi nequaquā potest: sed inflammationis duntaxat ratione dolet. Siquidem in eo spatio arteriæ consistunt, per musculos intercostales dispersæ: idq; altius q̄ vt membranam cingentem costas attingant. At inflammatis interdum intercostalibus musculis, dilatio arteriarum dolorem necessario infert. Proinde æger pro magnitudine inflammationis, sentiet in parte inflammata ipsum dolorem pulsatilem. Igitur pulsatis dolor (qui vehementes partiū sensibilibus inflammationes sequitur) arterias ipsas primario affectu molestat: per consensum autem cæteras partes sensibiles: eo q̄ à vicinorum contactu præmanetur. At neq; in hepate, neq; in renibus vnq̄ huiuscemodi pulsatio percipitur, quoniam nullus per totum corpus ipsorum, sicuti nec per pulmonem, nervus diffeminatur. Quia verò membrana quæ eorum viscerum quodlibet ambit, & per quam dispergitur nervus, sensu prædita est: ob id nimirum in ipsis grauitatis sensus percipitur, vbi tumor aliquis præter naturam illa, infestauerit. Etenim membranæ, cutis, adenesq; , quoniam his partibus nullæ insint arteriæ, vbi inflammatae sunt, non pulsatis, sed extensiuo dolore cruciantur. In vniuersum autem, primæ doloris species sunt duæ: vna quædem, dum subito temperies mutatur: altera, dum continuitas soluitur. Siquidem pars intenta, aut compressa, aut contusa, aut vulnerata, dolet ob continui diuortium. Cæterum non eandem doloris speciem excitāt mordax humor & plurimus. Ille quippe rodendo: hic verò tendendo dolorem infert. Quantam autem vim

Pulsatis dolor, nec in peripneumonia, neq; in pleuritide oritur.

Pulmo caret sensu.
Pleuritis quid.

Pulsatis dolor quas inflammationes sequitur: & quibus non accidas partibus.

Extensiuo dolore quæ afficiuntur partes.
Doloris species, primæ, sunt duæ.

Intēperies do-
lores inferat.

Colicos dolo-
res oriri ab hu-
more vitreo,
Impacto in ali-
quo intestino
crassiori.

Oleū rutaceū
colico dolori
est remedium.

Dolorē qui hu-
mores maiorē,
& qui minorē
inferant.

Crassi intesti-
ni dolor, ut di-
gnoscentur.

Doloris colici,
& eius qui ab
impacto lapi-
de oritur, sunt
cōmunia prae-
sidia calfacien-
tia.

Philonium.

Colici doloris,
& orti a lapi-
de, signa di-
uersa.

habeat inteniperantia ad inducendum dolorem, ex iis licet planē perpendere, qui vehemēter refrigerati, ad ignem manus affatim calfacere tentant. Quippe into- lerabilem sentiunt dolorem, praeipueq; iuxta unguū radices. Similiter etiam per dolores vocatos colicos, ubi frigidissimus aliquis humor (qualis ille est quem vi treum Praxagoras nominat) in quopiam intestino cras- siori est impactus, adeo torquentur aegri, ut videantur sibi circa vterarum regionem terebro perforari: id quod olim mihi etiam contigit: ceterum miscto oleo

rutaceo, quum id paulopost conarer excernere, excre- ui humorem vitro fuso persimilem. Sunt & alii dolo- res, per quos palus infixus vř: qui & ipsi corpus affectū crassum esse significant. Differunt aut inter se, aut mul- titudine, aut crassitudine, aut rei dolorem facientis po- tentia, siue ea humor fuerit, siue spiritus flatulentus. Si quidem paucus plurimo, & tenuis crasso, & permanēs

moto, ac deniq; minus refrigerans, eo qui vehementis- simam refrigerandi vim obtinet, minorem solet ex- citare dolorem. Igitur siue clauo transfixus esse, siue terebro perforari locus videatur, is dolor ad crassum

intestinum est referendus. Atqui huiusmodi dolores, ab eo quo lapis impactus est, discerni non possunt, nisi quis accidentia quae postea consequuntur, expectaue- rit. Vtriusq; tamen doloris sunt communia praesidia: & quidem calorifica in primis, siue ea extrinsecus adhi- beantur, siue ea iniiciantur. Deinde nisi mitigatus do- lor fuerit, eorum medicamentorum quae dolorem ob-

tundere possunt, aliquod adhibendum est: cuiusmodi existit, qđ a Philone instituit. Vex si lapis dolorē excita- verit, ipse interdū sol^o, interdū vnā cum cruore excer- nitur. in vrinisq; subsidet sabulosa quaedam. At si in co- lo affectus constiterit, nihil horū vř: sed protinus infla- tio quaedam, & extensio, & status complures, & tor- mina, & excrementa flatibus plena cernuntur. Ea autē

licet discernere

licet discernere, si & super aquam natet, & bubulo ster-
cori simulentur. Quinetiam cibi tum cupiditas, tum cō-
coctio deterior euadit, & præsens, & præcedēs, & quæ
sequetur. Venter nāq; malè affici accidit, vt qui
parti primariò affectæ continenter adhæreat. Insuper
colicos nōminatos affectus magna ex parte præcedit
cruditas, & spiritus flatulentus, & vomitus & nausea,
quæ multo tempore inanis permanet, & i præcordiis
mordacitas, & fastidium, & indigentia plurima. Igitur
id genus dolores vehementissimi, consistere in crassis
intestinis putantur. Qui verò mitiores sunt, ex duobus
alterum necessarium est: aut q̄ in his ipsis sunt, sed à le-
niori causa orti: aut q̄ in tenuibus intestinis consistāt.
Porro qui mordaces dolores sunt, ii à mordaci humo-
re intestinum erodente fiunt. Vnde dysenteriam semp̄
huiusmodi dolores præcedunt: vtpote per quam inte-
stina vicerentur. Cæterum dysenteria illa, quæ veluti
fæculentum sanguinem excernit abundantisimè, ieci-
noris affecti censetur esse symptōma. Ea verò per quā
syncerus multusq; sanguis excernitur, plerumq; vni-
uersum corpus euacuat, hand secus q̄ hæmorrhoides,
aut muliebri profluuium. Vt verò ad dolorum differē-
tias reuertar, punctorius dolor, potissimum circa mē-
branas consistit. Quamobrem lateralis dolor, puncto-
rius esse censetur. Iam verò hæmodia, siue dētiū stu-
por, solis dentibus & gingiuis accidere solet, vbi quis-
piam & austeros & acidos cibos ingesserit. Cæterum
complura alia dolorum genera sunt ab Archigene pro-
dita, sed quæ prorsus intelligi nequeant. Qui sanè vir,
ita omnium affectuū proprietates descripsit, ac si oēs
ipse fuisset perpeffus, quod nō verisimile est. Præterea
vbi ait hemibraneas sphacelodes circumscribi, hoc est
submoueri à dissectione vasorum, minimè declara-
uit quidnam sphacelos esset: de cuius vo- is significato
uarij var iè opinantur. Dein dolorem pulsatorium &

Colicos dolo-
res quæ præ-
cedat sympto-
mata.

Dysenteria do-
lores mordaces
præcedunt.

Dysenteria hæ-
patica
Dolor puncto-
rius.
Hæmodia.

Sphacelos.

turgidum inferri ab arteriis cõtendit, vbi ipsæ per hemieranias sphacelodes primogenia affectiõe laborât. Est autem turgid^{us} dolor, qui à parte primariò affecta, veluti à radice incipiens, celeriter in partes adiacentes transferrur. Id quod non solum in hemierania, sed in cephalea etiam solet accidere. Sed neq; illud etiam est verũ, affectos nervos, protin^{us} intorqueri, indurariq;: quum reperiantur nonnulli affectus, per quos laxiores euadunt nervi: quemadmodum per atrophiam cõtispicuum est. In inflammationibus autem & tumoribus præter naturam, manifestè intenduntur nervi. Cæterum inflammati partibus, præter tẽsionem, accedit, vt rubescant, renitentur, intumescant, & dolcant. Aduerte tamẽ interim, propriæ actionis læsionem esse singulæ partium proprium symptoma. Porro conuulsiones nervorũ, Hippocratis testimonio, & à plenitudine, & ab inanitione oriuntur: quum nimirum nervi per eas dispositiones immodicè tendi possint: quemadmodum chordæ in cithara, quæ à contrariis aeris statibus, siue humidus fuerit ille, vt rigare ipsas imple req; possit, siue vehementer aridus, ad vltimam tẽsionem perueniũt. Quamobrem citharistæ, vbi instrumenta, post vsu, reponunt, solent chordas ipsas laxare. At quod Archigenes dixit, profundos esse dolores nervorũ, id ab accidentibus quæ plurimis nervorũ eueniunt, est sumptum. Etenim quum venæ quidem semper priores in superficie cõsistant: deinde post eas arteriæ, quibus tandem nervi subduntur: iccirco laborantes tẽsionem in imo sentiunt. Quanq; multi tendones (quæ corpora sunt nervosa) nõ profundos, sed in superficie dolores habent, si quando ipsos sic quoq; tẽdi contigerit: vt sunt illi qui extendunt digitos. Minimè autem nervis accidere potest affixus dolor, vt falso profitetur Archigenes: quum magna ex parte dolores ipsorũ ad infernas supernasq; extendatur partes.

Dolor turgidus.

Nervi in quibus laxentur affectibus: & in quibus tendantur.

Actionis læsio est affectus partium symptoma. Convulsiones oriuntur a plenitudine, & ab inanitione.

Citharistæ cur chordas instrumentorum laxant.

Nervi subduntur arteriis & venis.

Tendones sunt nervosa corpora.

Dolor nervorum non est affixus.

Tam verò membranarum dolores in latitudinem protenduntur: videnturque esse æquales, quæ vniuersum illarum corpus æquale existat. Semper tamen ubi intentæ particula sensu acutiori est prædita, ibi vehementior infestat dolor. Adhæc pleuriticoz nonnulli iugulâ dolent, porrecta in hunc locum succingente costas membrana. Aliquando ad pectoria descendit dolor, percepto ipsi sensu in septo transuerso: utpote quod necessariò mouetur, quum pleuritici respirant, idque magis quàm cæteræ ipsius thoracis partes. Vbi enim veluti radix doloris consistit in latere, tunc laborantes, musculus qui illic sunt, respirare pigritant: ac proinde soli septo transuerso respirationis munus committit natura: quemadmodum in bene valentibus, qui leni, ac minimè violenta vtuntur respiratione. Igitur quum in internis partibus lateris inflammatio aliqua oritur, septum transuersum intentum impensus dolet. Quum verò in supinis, tunc iugulum potius dolor infestat. Vbi ingens in hepate inflammatio oritur, aut ubi ipsum est induratum, dolor qui tunc iugulum in dextrâ parte infestat, causæ venæ magis, quàm membranarum tensionem sequitur. Quod autem membranarum quæ ossibus adiacent, dolores profundius sint, & veluti dolentium ossium quandam imaginem referant, haud quidem inuicendum est. Proprius autem arteriæ venarumque dolor extensus secundum longitudinem corporis, veluti chordæ cuiusdam speciem refert, nullâ gravitatem inducens. Porro vlcerosus dolor, non solum ad cutem, sed ad imas quoque partes, ut ossa, extenditur. Pruriginosus autem, ad solam pertinet superficiem: non tamen primariò, pro ratione ipsius propria, sed per accidens, quia nimirum cutis omnes sibi subiectas partes spissitudine superet. Horum ergo dolorum uterque propriæ dispositionis est accidens. Fiunt autem ob quosdam humiores acres: tantumque ipsi inter se, quantum dispositiones à quibus oriuntur, dissident. Verum

Membranarum dolores sunt latissimi, æqualesque.

Pleuritide infestante respiratione ipsa perficitur a solo septo transuerso

Dolor ab inflammato hepate.

Dolor membranarum ambientium ossa.

Dolor arteriarum & venarum.

Dolor ulcerosus & pruriginosus.

Cutis superat omnes subiectas sibi partes spissitudine.

quia crebro dispositio pruriginosa, vlcerosam antecedit, necnon soluta quiescenteq; vlcerosa in pruriginosam fieri transmutatio assolet, inde est q̄ de ipsis scripserit in distinctè atq; confuse Archigenes. Qui quidē **Dolor pungēs.** vbi etiam ait * pungētem dolorem in profundo esse, perperam hallucinatur: quandoquidē ad membranas is, non ad imas partes propriè pertinere videtur. Similiter vbi infixum dolorem vocat, quum sinus accesserit, sermo illius absurditate non caret. Quippe si-

Sinus quid,

**Dolor tensius
q̄ accidat.**

**Dolor hepatis
vicina corpora
i consensum
adducit.**

**Hepatis inflam-
mationi neces-
sario adest fe-
bris.**

nus cavitas quædam est: quum partium antea coniunctarum, altera distat ab altera. Vbi igitur fluxione impletur, ita vt adiacētes partes tendantur, tunc tensi-um dolorem sentiunt laborantes, non quidem longo spatio porrectum, sed propriis limitibus circūscriptū. Præterea dum ait, hepatis dolorem in hærentem, hoc est eodem in loco permanentem, existere, an non etiā veris contraria profert? Siquidem hepatis dolor, si quāpiam alius, vicina corpora, ad cōsensum perducit. Nā & ad iugulum vsq; porrigitur, & spirandi difficultatē creberrimè infert: atq; interdum tussum quoq; & dysenteriam excitat: nec raro nothas costas infestat. Porro inter vehementer respirandum nonnunq̄ gravitatem in dextra præcordiorum parte sentimus. Cæterisq; si frid citra febrim eueniat, aut obstructione, aut dura dispositione hepar laborare, coniecito. Nam vbi inflammatione infestatur, tunc febrim adesse est necesse.

C A P.

I I I.

**Pulmonis in-
flammati sym-
ptomata.**

Igitur ad inueniēdas affectas sedes, in primis quærere oportet, an singulorum locorum, quomodo cunq; afficiātur, propria signa inueniri possint: an pro affectuum ratione alterentur. Deinde, verum singulorum affectuū propria sint signa: an circa quālibet partem variantur. Postea verò expedit, loci simul & affectus memores, signa ipsa perstringere. Veluti si ita acciderit, vt pulmo inflammatione laboret, tanta spirandē

difficultas orietur, tantaq; angustia, vt suffocari laborantes videantur, ac recti sedere conentur, quem affectum vocant orthopnoeam. Quin etiam calidam sentiunt * expirationem, idq; maxime si erysipelatis pariticeps ipsa inflammatio fuerit: quaniobrem vbi plurimum effiant, iuuantur, inspirareq; abundanter frigidum aerem desyderant. Sputum verò ipsum modò hoc, modò alio expuunt colore tinctum. Insuper grauitatis cuiusdam thoraci incumbentis sensum sæpenumero ægri percipiunt: ac dolorem ex imo ad ipsum peruenire, & ad pectus, & ad spinā. Præterea febris acuta ipsis adest. Pulsus verò habent, qualem in libro de Pulsibus diximus. Similiter vbi membrana costas succingens est inflammata, acuta febris infestat, simulq; dolor punctus, vna cum spirandi difficultate. Magna etiam ex parte sputum colore infectum apparet, haud secus q̃ in peripneumonia. Igitur vtrunq; affectum respirandi difficultas necessario cōsequitur: eo q̃ affecta particula spiritus instrumentum existat: Oritur autem febris, & propter affectum ipsum (calidus enim affectus est inflammatio) & propter positum. Nam & pulmo, & succingens costas membrana prope cor cōsistunt. Sic etiam eiusus ipsis vt spiritalibus conuenit. Sed quod aliquid expuatur, id ab affectu procedit. Quippe iam ostendimus omnem inflammationem ex affluente sanguine fieri. Quapropter si biliosus sanguis fuerit, flauum aut pallidum erit sputum: si pituitosus, spumans & candidum. Si melancholicus, aut nigrum aut liuidum. Si nihil horum infecerit sanguinem, rubrum. Quinetiam in laterali morbo sæpenumero magis biliosum: in peripneumonia verò magis pituitosum sequi sputum consuevit. Quod autem inflammatarum thoracis partium excrementa, per asperam expurgentur arteriam, in causa certè est, tum positus earum, tum formatio: vt quæ per solam hanc viam effluxum fortiantur. At ve-

Orthopnoea.

Pleuritidis quæ
ad sint sympto-
mata..Inflamatio ois
ex affluente fit
sanguine.
Sputi pleuritico-
rum species
diuersæ.Thoracis præ
inflammatis ex-
purgari p aspe-
ram arteriam.

Cerebri excre-
menta per quas
regiones vacu-
antur

Sedes affecta
unde dignosci
possit.

ro venterculus duos habet meatus: ac quod in eo vitio-
sum est, supernatare solet, vomitione q; eiicitur: quod
autem in intestinis subsidet deiectione vacuatur: veluti
renum vesicæ q; excrementa, meiando excernuntur,
Nam quæ redundant in cerebro, per nares præcipue;
nonnunq; per palatum & aures exterminantur.
Sedes itaq; affectæ dignoscuntur & ab accidentibus, et
ab actione læsa, & ab excrementorum qualitate, & à
tumoribus præter naturam, & à dolorib; & à coloris
vitio, qd sequitur, vel in vniuerso corpore, vel in vna
quapiã parte, vel duabus, idq; maximè in oculis & lin-
gua: quibus addere potes etiam eam affectionem, quæ
per consensum affligit. Fit autè in hisce omnibus exer-
citatio, vbi particularia sub eandem viam, & rationem
ducuntur. In pñis igitur intueri oportet, num sit actio
aliqua læsa. Quippe cum ipsa proprium aliquod instru-
mentum affici necesse est. Deinde vbi actionem esse læ-
sam perspexeris, ad modum læsionis accedendo, con-
sidera ad quem affectum propriè p̄tineat. Postea par-
tem affectam expende, num tumore quodam, aut do-
lore infestetur, & quidem accuratè cuiuslibet horum
speciem inuestigando. Fingamus ergo, vt quispiam in-
ter respirandum, in notharum costarum regione do-
leat. Non protinus hunc esse pleuriticum suspicari de-
bes. Sed in primis quidem, an tussiendo aliquid expuat,
considerare. Id enim si coloratū videris, tunc ægrum
dices esse pleuriticum. Quod si tussiendo nihil omnino
expuat, fieri potest vt nihilominus pleuriticus sit ille q
dem, sed inflammationem habeat incoctam adedò, & i-
pactam, vt nihil ab ea foras eiici possit. Fieri quoq; po-
test, vt ob hepatis inflammationem dolor in iam dicta
sede excitetur. Cæterùm ex differentia pulsus, ex deie-
ctionibus, ex tumore præter naturā, ex grauitate, &
pondere, ac deniq; ex aliis notis, quæ hepatis inflāma-
tioni sæpe solent accidere, iecorarium affectum, à pleu-

Iecorarius af-
fectus a pleuri-
tico, quomodo
discernatur.

ritico, licebit nobis discernere. Verum in huiusmodi dispositionibus, solidum firmumque discernendi indicium, per omne tempus morbi, à pulsu sumendum est deinde tractu temporis, reliqua etiam consideranda. Nam & linguæ, & vniuersi corporis color alteratur, ubi hepate affecto totius corporis color. Affectus primarios ab iis qui per consensum accidunt, distinguendos esse. Animæ principis sedes quoniam per se, et quoniam per consensum legatur.

Preparatio functiones cerebri quæ, dicantur.

Originem motus & sensus consistere in cerebro.

Affectuum per consensum curatio.

Cerebri & eius membrarum affectibus eadem succurri methodi ratione. Essentiam morbi in primis est cognoscenda.

ritico, licebit nobis discernere. Verum in huiusmodi dispositionibus, solidum firmumque discernendi indicium, per omne tempus morbi, à pulsu sumendum est deinde tractu temporis, reliqua etiam consideranda. Nam & linguæ, & vniuersi corporis color alteratur, ubi hepate affecto totius corporis color. Affectus primarios ab iis qui per consensum accidunt, distinguendos esse. Animæ principis sedes quoniam per se, et quoniam per consensum legatur.

Preparatio functiones cerebri quæ, dicantur.

Originem motus & sensus consistere in cerebro.

Affectuum per consensum curatio.

Cerebri & eius membrarum affectibus eadem succurri methodi ratione. Essentiam morbi in primis est cognoscenda.

Curatiōe per
contraria mo-
lendam esse.

Delira, & vigi-
lie a causa ca-
lida oriuntur.
Soporosi affe-
ctus oriuntur a
causa frigida.
Vinū meracius
inducit vigi-
lias.

Calida cur vi-
gilia efficiat.
Frigida cur gi-
quant sopore

Affectus pro-
prius quando
putandus sit.

Affectus per
consensum qñ
dicatur.
Accessione fe-
brili inuadere,
cur xgri conti-
piantur sopore

Soporis causa.

qua cognita, facile nobis licebit per contraria curatio-
nem moliri. Itaq; non tantum affectum locum, sed cau-
sam etiam inferentem noxam considerare oportet.
Vt exempli gratia, delirium est eius actionis sympto-
ma quæ à loco mentis cōpote prodit: similiter sopor
stupidus: sed à contrariis causis oriuntur. Siquidem &
vigiliam, & delirium, causa potestate calida efficit. At
quotquot somnolenti soporisiq; affectus existunt, om-
nes à frigida causa proueniunt: id quod ex medicamē-
torum natura planè discere licet. Quippe frigida stu-
porem soporemq; calida verò vigilias & varias mo-
tiones inducunt. Tenuis etiam victus ratio, & vinum
meracius, vigilias pariunt, præcipuè si vinum ipsum
fuerit suapte natura calidum, aut etiam antiquius val-
de. Etenim calida causa motum excitat, ob idq; vigi-
lias affert: frigus aut ocliosum, & ad motiones pigrum
reddit animal: qua ratione somnum soporemq; concii-
liat. Igitur qui hæc intelligit, quum per ardentium fe-
brium vigorem, hominem viderit & vigilare, & deli-
rare, deinde inclinante iam febre, & dormire, & rectè
sapere, in capite nullam propriam esse dispositionem,
sed à febris abundanti calore delirium fieri, perpēdet.
Quippe tunc affectus proprius putandus est, quum per
manere in parte quapiam conspicitur. At vbi pars ali-
qua simul cum alia sic afficitur, vt irritata quidē vna,
altera infestetur vehementius: remissa verò irritatione,
quiescat, eam per consensum affici putandum est. Sic
etiam contingit, vt quum febrium accessiones inuade-
re incipiunt, sopore laborantes grauentur: q; eo tēp-
ore cerebrum sit vehementer refrigeratum, alio-
qui paratissimum, vt noxam eiusmodi subeat:
quum nimirum frigidiori intēperie sit præ-
ditum. Gignitur autem sopor, vel ab
intemperie frigida, vel à pituita
in cerebro exuperante.

GALENI PERGA

MENIDE LOCIS AFFECTIS.

LIBER TERTIVS.

CAP. I.



GITVR Ad cognoscendas affectus sedes, curandosq; illarū affectus, accurata inquisitione est opus. Ceterum per artis exercitationem comperi, eam remediorum inuentionem, quæ ex vera demonstratione oritur, in iis quæ raro contingunt, experientia longè præstare. Nam experimenta dūtaxat sectantes medici, nō ea quæ raro, sed quæ crebrò accidunt, memoria & imitatione assequuntur: Quocirca dispositionum raro euenientium, non solum curationem, sed præuenientes et notiones ipsarum, negligunt. Ego verò semper inuestigare studui, quæ nam sedes vel afficeretur ipsa, vel alteri consentiret. Quumq; eam inuētā esse arbitrarer, tunc ad dispositionē eius inuestigandā, atq; ex vtriusq; totius curatiui generis indicationem sumendam, ac de nīq; remediorum qualitatem, quantitatem, idoneamq; materiam comparandā, me accinxi: haud neglecta interrim, ætatis, naturæ, temporis, regiōis, aliorumq; id genus omnium contemplatione. Deprehendi autem possunt affectus sedes ab extremis, atq; ab iis quæ affectis partibus adnascuntur, necnon à functionum nota: quibus connumeratur & color præter naturam, si guraq;. Verū vbi nulla mihi pateret aliā via, sola functionis læsio fuit satis, ad inuentionem affectarum particularum.

CAP. I. I.

QUum autem exoletam cuiusdam memoriam restituere conarer, primum quidem apud me

Remediorū inuentio quæ ex vera demonstratione paratur, in iis quæ raro contingunt, longe experientia præstat.

Affectus sedes vnde deprehenduntur.

Memoria exoletam restituere, quæ sine consideratione.

ipsum inuestigauī, quæ nā pars esset affecta, cui localia adhiberem præsidia, prius videlicet vniuersi corporis vacuatione præmissa, quod præceptum est in morbis omnibus obseruandum. Deinde qua via & ratione inuenirem singula remediorum. Cæterum affectam sedē eam ipsam existimaui, qua princeps animi vis cōtinetur. Medicamenta autem ea adhibenda esse, quæ huius sedis dispositioni reluctarentur. Quum igitur huius inquisitionis gratia consuluissem epistolam quandā ad Marsum, ab Archigene scriptam, in qua iubet, deprauata memoria, raso capiti affigi cucurbitulas, non iniuria sanē inconstantiam hominis sum demiratus: quoniam nimirum neglecto corde (cui memoriā ipse, ceu opus cognatum tribuit) ad caput remedia trāsferret. Nam quid per immortales Deos ex affectorum locorum notitia (quam ipse ad medendi rationem ait maxime necessariam existere) consequemur vtilitatis, nisi ab ipsis ad remediorū inuentionē ducamur? Adhæc si affectio quæ oblatit memoriā, existat frigida & sicca, nullū vsum adferunt cucurbitulæ admotæ: siue eæ incisa prius cute, siue integra, administrentur. Siquidem detractione sanguinis, quæ fit, ubi scarificata prius cutis fuerit, ad extremum ducit periculū. At citra vllam scarificationem cucurbitulæ adhibitæ, solius excitandi caloris gratia vtilēs esse censentur. Quippe attrahūt ad se huiusmodi ex imo: id quod magnopere aridæ dispositiōi aduersatur. Porro rationalem animæ vim in cerebro: vtilem, irascibilem uē, in corde: appetitoriā deniq; in iecore sitam esse, nemini non persuasum existimo: id quod vel ex vulgariū sermone indies discere licet. Fatuū siquidē aiunt carere cerebro: timido & pusillanimi, corde esse. Tityo verō iecur ab aquila erosum, non solum poetæ, verū etiam pictores, sculptoresq; fingunt. At verō, quemadmodum si ratio lædatur, sæpenumero contingit lædi memoriā: sic si memoria vitietur,

Archigenis inconstantia demiratur Galenus.

Memoriæ oblatit a causa frigida & sicca, cucurbitulas admotas non esse ex vſu.

Cucurbitulæ absq; scarificatione adhibitæ, solius excitandi caloris gratia sunt vtilēs.

Animæ facultatū singulis quę sedes tribuntur

Tityo erosum iecur ab aquila fingunt poetæ.

Ratione læsa, sæpe memoriā

ratio ipsa quodammodo etiam labefactatur: utpote actionis utriusque noxa procedente ab eadem dispositione. Quæ ubi vehementius intenditur, simul cum memoria ratio quoque omnino deperditur. Ac talis quidē affectio stultitia vocatur. Sic in lethargo etiam, in omnibusque soporosis affectibus, utraque simul pereit actio. Quod autem affectus hic à frigida intemperie oriatur, quæ animales actiones omnino torpidas reddit, sane id vel ex animalibus ipsis, quæ per frigora latere coguntur, satis liquido constat: necnon ex frigidis tum medicamentis, tum cibis. Lactuca quippe, graues inducit somnos, si multam quis ipsius quantitatem ingesserit. Verum & capitis grauitates, quæ sine mordaci infestant dolore, somnum soporemque conciliant: quibus apoplegmatisini magnifice opitulari videntur. Igitur ut capitis ardor vigilias, sic refrigeratio inducit soporem. Item biliosi calidique morbi, vigilias, deliria, phrenitides: contra, pituitosi frigidi que, ignauiam soporemque efficiunt. Nam quod ad vigilias soporesque per morbos pertinet, calida frigidaque intemperies, primam sibi facultatem vedicat: altera verò ab hac, ad humiditatem ariditatemque refertur. Balneæ siquidem, eo quod madefaciant caput, soporiferæ sunt. Haud secus vini moderata potio, omnesque cibi humectantes. Ex ætate etiam, pueritia quidem, ob humorem est somnolenta. Senes verò ob ariditatem, vigiliis vexantur. Omnia igitur hæc argumenta esse possunt, ad animi ignauiam inducendam, humiditatem præter naturam obtinere secundas partes: frigiditatem verò priores. Cæterum ut humiditas sola, si abundet, longos profundosque somnos inducit: ita ariditas sola, vigilias. Quod si frigus cum humore intendatur vehementer, soporem stuporemque constituit: si ne hoc verò, memoriæ nocet, stultitiamque inducit. Quum itaque non solum in frigiditate humiditateque, verum etiam in ariditate & calore, non paruum secundum

bedi contingit:
ut e conuerso.

Stultitia quid.

Frigida intemperies animales actiones reddit omnino torpidas.

Lactuca soporem gignit.
Apoplegma etiam quibus affectibus conferant.

Vigilias qui morbi infestat.

Balneæ cur soporiferæ.
Vinum modice sumptum inducit somnum.
Pueri cur somnolenti
Senes cur vigilantes.

Stultitia unde oritur.

**Actiões prin-
cipales.**

**Actiões mo-
rales.**

**Vigilans so-
por.**

**Caput quadru-
pliciter affici.**

**Stultitia est in-
tellectus amis-
sio.**

**Memoriæ exo-
letæ, vel graui-
ter læsæ, causæ**

magis & minus, discrimen sic: nihil mirum, si multifa-
riæ inueniantur causæ quæ animales actiones lædere
possint. Impræsentiarum autem, clarioris doctrinæ
gratia, rationalis animæ actiones, principales: irratio-
nalis verò, morales vocentur. Quum autem bifariam
fieri contingat intemperies prædictas, duplex quoq;
erit vtriusq; dispositionis modus: vnus quidem, in hu-
midis siccisq; humoribus: alter in corporibus solidis: si
quando in eandem intemperiem cum mollibus, soli-
dæ partes inciderint. Præterea quæ ipsæ intemperies in
ter se sint contrariæ, * sit tamen ex ipsis interdum mi-
xtum quoddam temperamentum: vt in vigilantj so-
pore, in quo pituitosus biliosusq; humor exuperant.
Ita in calidi frigidiq; contrarietate, eisdem quoq; mo-
dos inuenire licebit, tum per simplices intemperatias:
tum per compositas ex ambabus. Quod si in solidis
corporis partibus mixtam ex contrariis dispositionē
fieri fateamur, tres sic prodibunt in vtraq; contrarie-
tate intemperies. Igitur huiusmodi affectus omnes
capiti aduenire solent, sed inter se differunt, non solū
misionis varietate, aut eo q; magis minus' ue intendū-
tur: verū etiam quia interdum afficiuntur ventricu-
li cerebri id genus intemperantiis: interdum vniuersa
eius vasa: aut humiditas dispersa per corpus cerebri.
Accedit ad hæc, quartus quoq; modus, quum videlicet
ipsum met corpus cerebri intemperatum redditur.

C A P.

I I I.

Quorum igitur vel memoria, vel intellectus pe-
riit (intellectus enim amissio, stultitia est) som-
nos obseruare oportet. Præterea, vtruni excernant
quippiam, vel ex naribus, vel ab ore, quod à capite de-
fluat: an aridæ huiusmodi partes sint. Quippe ex iis di-
spositionem ipsam consequi cōiectura poterimus. Vbi
igitur vel periit, vel grauius læsa est memoria, frigi-
da est omnino intemperies cerebri. Quocirca calface

re ipsum oportet. At verò exiccare, vel humectare, non necessarium est. Sed si humiditati copuletur, arefacere: si ariditati, madefacere. Cæterum si inter has medium obtinet, ipsum est conservandum. Interdum verò ubi principales actiones sunt læsæ, febris quoque accedit, ut in phrenitide, & lethargo. Interdum sine febre adest vitium: ut in mania, & melancholia: id quod modò per consensum: modò primaria affectione cerebro laborante, accidit. Etenim ubi propriis accidentibus exprinuntur huiusmodi vitia, permanentiaque sunt, nec aliis præcedentibus superueniunt, primogenia dicuntur esse. Vbi verò propriis accidentibus minimè litnuntur, neque perpetuò permanēt, atque ad alias affectiones sequuntur, per consensum ipsa evenire dicuntur. Nec interim latere nos debet, ubi quis lege consortii afficitur, fiatque adhuc affectio, quæ deletis efficiētib⁹ eam causis, ipsa quoque simul deletur. Sin autem consentientes partes permanentem iam habeant dispositionem, quis causa efficiens conquiescat, ipsa tamen permanebit affectio. Quòd autem in cerebro consistāt omnes principalium animæ virium affectus, pro confesso habent omnes medici, qui studio veritatis tenentur: sicuti & quæ omēs nervi qui volūtat⁹ imperio audiūt, à cerebro ducant originem. Conuulso siquidem vniuerso corpore, omnes profectò autumant, ralem quampiā affici partem, quæ ut in arbore caudex ramorum, sic ipsa sit communis omnium nervorum origo. Si igitur partes omnes quæ infra faciem sunt læsæ, conuulsæ sint, primas spinalis medullæ partes affectas esse putandum est: ac proinde illis opitulandum. Si verò simul cum vniuerso corpore facies quoque conuulsæ videatur, * non modò spinalis medullæ exortum, sed etiam cerebrum ipsum, à quo nervi faciei oriuntur, curamus. At verò si crur tantum, aut altera manus conuulsione tentetur, totius membri conuulsio nervorum,

esse intemperiem frigidam cerebri: quæ re frigenda est.

Affectus primogenii, siue primarij, quæ sint: Affectus per consensum, qui dicantur.

Animæ principalium facultatū affectus, consistunt in cerebro. Nervus omnis à cerebro ducit originem.

Convulsio quo
differat a natu
rali motu.

Convulsio fit
ob plenitudinē
vel inanitionē.

Epilepsia est
convulsio uni
uersi corporis,
quæ ex tempo
rum accidit in
teruallis.

Epilepsia cōsi
stet in cerebro.
Epilepsia unde
gignatur.

qui ad ipsum feruntur, principium affectum esse decla
rat. Cæterum, quum omnis motus à voluntate profec
tus, attractis musculis in eas quibus innascuntur, par
tes, fieri videatur: nec fieri possit attractio, nisi ad suam
originem retrahatur musculus, constat convulsionem
in convulsis partibus factam, hac sola ratione à motu
naturali differre, q̄ præter voluntatē sit. Porro ipsam
cōuulsionem neruorum, ob plenitudinem vel inanitione
nem fieri q̄ verissimè professus est nobis Hippocrates:
id quod vel ex fidiculis instrumentorū (quæ ob vtriusq;
intemperiem ambiētis aeris, humidam nempe, & aridam,
ad eō tenduntur vt disrumpantur) liquidō constat.
Si igitur convulsio fiat vel à labore, vel vigiliis,
vell fame, vel solitudine, vel arida æstuantiq; fe
bre, qualem est videret in phreniticis, causam eius ariditatem,
inanitionemq; rectē putaueris. Sin verò tem
ulentō cuipiam, ac omnino pleno homini convulsio
accidat, non ab re ipsam à cōtraria causa iudicabis or
tum habuisse. Atqui inanitioni contraria est repletio.
Iam comitialis morbus convulsio est oninium corpo
ris partium, minimè quidem perpetua (vt in empro
sthotono, opisthotono, & tetano) sed quæ ex tempo
rum accidit interuallis. Nec solum hac re, sed mentis
quoq; & memoriæ, ac sensuum oblæsiōe à iam dictis
cōuulsionum generibus differt. Vnde constat in cere
bro hunc affectum consistere. Cæterum velocis eius di
scussio, crassum humorem spiritus meatum in cerebri
ventriculis obstruentem, hunc maximè affectum pe
perisse declarat: neruorū principio seipsum quatiente,
quo excutiat id quod infestat. Itaq; non ab ariditate,
inanitione uel, sed à crasso & viscido humore, impediē
te animale spiritum, quo minus deferatur in corp⁹,
hanc affectionem gigni, argumento est, q̄ subito &
fiat, & soluitur. Siquidem breui tempore fieri non po
test, vt vel cerebrum, vel tenuior ipsi⁹ membrana, ad

tātam ariditatem perueniat, vt corio simile quippiam
 patiatur. In corpore itaq; cerebri, anima suam sedem
 fortitur: in quo etiā fit tum ipsa ratiocinatio, tum re-
 cordatio sensibilibus imaginum. Primum autem istru-
 mentum ipsius animæ, tum in sensibilibus actionibus
 vniuersis, tum in iis quæ à consilio & voluntate profi-
 ciscuntur, spiritus est animalis, qui in cerebri ventricu-
 lis continetur: sed præcipuè in postremo: quis non cō-
 temnendus sit medius vetriculus: quem aniplecti mul-
 tis rationibus cogimur: vt duos anteriores deserere.

Satis tamen fuerit ad curationem, nosse sedem affectū
 esse ipsum cerebrum: atq; in eius ventriculis humore
 crassum & viscidum comprehendi, nunc pituitosum,
 nunc melancholicum. Pituitosum in præsentia humo-
 rem appello, in quo humiditas, frigiditasq;: vt melan-
 cholicum, in quo siccitas & frigiditas dominatur. Ac
 pituitæ quidem vnum genus est, qd̄ quotidie vel secre-
 do, vel vomendo, vel emungendo educitur, vapo-
 roso spiritu plenum: vt ne sensu quidem lateat ipsum esse
 dissimulare. Alia verò pituita, similis quidē videtur,
 licet fortassis non similis existat: qualis est tum cru-
 dus humor, qui in vrinis subsidet: tum is qui à Praxa-
 gora vitreus vocatur. Ex quo genere videtur esse &
 salua, quæ neq; fluida admodum sit, neq; aquosa.

Verū salua non vnica duntaxat qualitate gustum so-
 let afficere, nedū vniuersa pituita. Sic atra bilis quoq;
 ob substantiæ varietatem nō obscuras differentias for-
 titur. Nam alia ē veluti fæx sanguinis, quæ admodum
 spissa existit, fæcibus vini haud absimilis. Alia verò, q̄
 superior, essentiæ est multo tenuioris: atq; vomentib;
 ipsam & olfacientibus videtur acida. Hæc etiam attol-
 lit in bullas terram, eamq; radit, atq; fermentat. At il-
 la quam fæci vini similem esse dixi, in terram effusa nō
 inducit feruorē, nisi fortē in ardenti febre ipsam præ-
 assari contingat: neq; vlla etiam acida qualitate parti-

Anima colloca-
 tur in ipsius ce-
 rebri corpore:
 in quo & ratio
 cinatio fit, &
 memoria.

Animæ primū
 organū, est ani-
 malis spiritus,
 qui in cerebri
 ventriculis con-
 tinetur, sed præ-
 cipue in postre-
 mo.

Pituitæ diffe-
 rentiæ.

Atræ bilis sp̄s.

Epilepsia fieri
 a crassa pitui-
 ta, vel a melan-
 cholio succo
 retento in mea-
 tibus ventricu-
 lorum cerebri
 Melancholia
 unde oritur.
 Manie causa
 Phrenitidis dis-
 ferentia.

Phreniticorum
 insania quo ab
 ardentium fe-
 brium delirio
 differat.
 Delirium arden-
 tium febrium
 quomodo fiat.

Ori ventriculi
 inesse acutiorē
 sensum q̄m reli-
 quis corporis
 partibus.
 Consensus atq̄
 necessitudo ce-
 rebri cum ven-
 triculo, unde
 inotescat.
 Hypochondria-
 cos affectus que
 sequantur.

cipat. Quare iudicio meo potius melancholicus aut suc-
 cus aut sanguis, q̄ atra bilis, dicenda est. Igitur ut cras-
 sus pituita succus, ita hic quoq̄ comitialis morbum
 solet efficere, ubi in meatibus ventriculorum cerebri
 retinetur: siue is medius sit, siue postremus. Vbi verò i
 ipso cerebri corpore abundat, eam insaniam speciem,
 quam Græci vocant melancholiam, inducit. Quemad-
 modum alter atræ bilis succus, qui præassata flaua bile
 nascitur, ferina gignit deliramenta, modo cum febre,
 modo absq̄ illa, in cerebri corpore abūdans. Atq̄ hanc
 ob causam phrenitis nonnunq̄ est mitior, ubi à pallida
 bile ortum traxit. Interdum vehementior, ubi flaua
 bilis eam peperit. Deliria autem, quæ per febrium vi-
 gores accidunt, non propria cerebri affectione, sed p
 consensum sunt. Quamobrem sic delirantes, minimè
 appellamus phreniticos: quia phreniticorum insania nō
 quiescit mitigato febrium vigore. * Quemadmodū
 igitur phreniticorū febris unū quoddā ex symptoma-
 tibus dispositionū cerebri iudicat: sic ardentium febriū
 symptoma delirium est: qd̄ nimirū sit elatis ad cerebrū
 multis uaporibus * calidis. Haud secus gignitur ea af-
 fectio quæ suffusioni est persimilis, à ventriculi dispo-
 sitionibus ortum trahens. Nāq̄ uentriculo cerebrum,
 cerebroq̄ uentriculus, suas affectiōes transmittit: idq̄
 propter neruorum à cerebro ad os uentriculi descen-
 dentium magnitudinem: per quos etiam sensus huic
 particulæ, q̄ nulli reliquarum corporis partium, acutior
 est. Quocirca fracturas quidem capitis, ubi ad mem-
 branas usq̄ perueniunt, biliosus uomitus: capitis autē
 dolores quomodocunq̄ fiant, nausea stomachiq̄ mor-
 sus consequitur. Hypochondriacas uerò & flatulentas
 vocatas affectiōes melancholica comitatur tristitia:
 haud secus q̄ acutas febres delirium: & * nonnullas
 oris uentriculi dispositiones, affectio suffusiōi persimī-
 lis. Sic neruosis partibus inflammatīs, promptius q̄ re-
 liquis,

liquis, delirium superuenire solet: idq; ascendente ad caput, interdum per continuas partes solo calore: interdum spiritu vaporoso, uel fumoso, uel fuliginoso.

C A P.

IIII.

Igitur crassi humores q in cerebri substantia abundant, interdum ei ueluti instrumentali: interdum ut similari uocent. Quum enim meatus obstruuntur, ut instrumentali: quum uerò alteratur temperamētum, ut similari. Proinde recte ab Hippocrate dictum est, Melancholici magna ex parte comitiali morbo afficiuntur: & contra, morbo comitiali laborantes, melancholici euadunt. Atq; horum utrūlibet magis accidit, pro ut uel in hanc, uel in illam partem infirmitas repit. Si enim in corpus, epileptici: si uerò in mentem, melancholici euadunt. Quum autem nō solū ab atra bile, sed etiam à pituita morbus comitialis oriatur, sciendum est, solum eum qui ab atra bile ducit originem, in melācholiā transire posse. Etenim quum anima ipsa, aut temperamentum actiuarum sit qualitarum, aut ab ipsarum temperamento mutetur: bilem ipsam ubi cerebro, ueluti parti instrumentali, nocet, ad cerebri corpus conuerti ait, id quod in obstructionibus fieri constat. Quum uerò temperamentum mutando, ei ueluti similari nocet, ad mētē eam repere dicit. Accidit autem cerebro, ut nonnunq̃ uniuerso in uenis sanguine melancholico effecto, ob cōmune uitium, ipsū q̃q; lædatur. Nōnunq̃ uerò, totius corporis sanguine prorsus innocuo, solus is qui in cerebro contentus est, alteratur: idq; bifariam fit. Aut enim aliunde in ipsū deriuatur: aut in ipsomet melancholicus humor genitus ē: quum uidelicet internus calor aut flauam bilem, aut crassū atrūq; sanguinem, superassauit. Si igitur uniuersum corpus redundet melancholico sanguine, curationem à uenæ sectione auspicari oportet: si uerò cerebrum tantū, æger tunc (quod ad hanc dispositio-

Cerebrum qñ afficiatur ut instrumentum, & qñ ut pars similis.

Melancholici magna ex parte epileptici fiunt, & econuerso.

Atra bilis qñ in cerebri corpus: & qñ in animam repas.

Melancholicus
sanguis in qui
bus minime ha
beat: & in q
bus omniū ma
xime accumu
latur.

**Cibi melācho
licum succum
gignentes.**

nem pertinet) sanguinis detractio non indiget: quia ob aliam causam sanguis detrahi possit. Vtrum uero melancholicus sanguis vniuersum corpus, an solum cerebrum occupet, sic discernendum est. In primis vniuersi corporis habitum, qualis nam sit, accuratè cōsideres uelim. memineris q; q; molles & cādidi, & obesi, nequaquam humorem melancholicum possidēt. Macri uero, & nigri, & hirsuti, & quibus latæ sunt uenæ, aptissimi sunt, ut huiusmodi in ipsis humor accumulet. Fit q; interdum, ut * admodum rubicundi, affatim melancholicum temperamentum contrahant: atq; post hos etiam flauissimi præcipuè uigiliis, & multis laboribus, & sollicitudine, & tenui uictu æducari fuerint. Cuius generis etiam hæ notæ existunt, si hæmorrhoids aliqua sit restricta: aut consueta alia sanguinis euacuatio: aut usus fuerit æger cibus melancholici succi. Porro qui sanguinem melancholicum gignunt, hi ferè sunt: caprina, bubalaq; caro, magisq; hircinæ & taurinæ: sed maximè asinorum & camelorum carnes: itemq; uulpinæ: & caninæ. Magnū ad huiusmodi sanguinis generationem momentum adfert etiam * leporis cibus: sed multò maius aprorum. Limaces quoq; sanguinem melancholicum pariunt, si frequens sit eorum usus. Præterea omnium animalium terrestrium carnes sale conditæ: necnon aquatiliū carnes, ut thunni, balenæ, vituli marini, delphini, canis, atq; cetaceorum omnium. Ex oleribus autē, brassica ferè sola, gignere sanguinem id genus consueuit: quemadmodum & arborum germina, ubi vel muria, uel oxyhalme condiuntur: præcipuè lentisci, terebinthi, rubi, canirubi. Leguminum uero omnium maxime lentes inter melancholicos cibos annumerantur: mox fursuraceus panis, & qui ex typha & uitiatis seminibus factus est. Præterea uina crassa, nigraq; aptissima sunt, ut ex ipsis humor melancholicus fiat. Vetus etiam calcus, si supercalfactus in ipso corpore fuerit,

facile huiusmodi humorem procreat. Sunt etiam nonnulli, qui per febriles morbos contraxerunt melancholicum succum. Ad efficaciorē autem notitiā, non parē cōfert anni tenipus, ac prāterita, prāsensq; ipsius constitutio: necnon regio, & laborantis ætas. His itaq; omnibus prāmedicatis, si existimas in vniuersi corporis venis contineri sanguinem melancholicum, quo certiorē habeas notitiā, cubiti venā secā, prācipueq; mediā, quæ communis est, & ei quæ humeralis dicitur, & ei quæ per axillā ad manū ferī. Quodd si tum fluens sanguis non videatur melancholicus esse, supprimatur cōfestim. Si verō talis appareat, vacua q̄tum pro laborantis corporis habitu satis esse conieccheris. Est prāterea tertium melancholiæ genus, morbi comitialis exemplo, vbi ortum à ventriculo sciipit. Solentq; medicorum nonnulli hanc dispositionem, hypochondriacum, statulentumq; morbum vocare. Quem sanē (vt Diocles testatur) sumpto cibo cōcoctū difficili, statim ructus acidus comitatur: cū eoq; status & æstus. Adhæc fluctuatio in præcordiis, non illi co, sed vbi cibus venter complexus fuerit. Interdum etiam ventriculi vehēmentēs dolores, qui nonnullis ad dorsum vsq; extenduntur. Cæterū ægri cibis concoctis quiescunt: moxq; aliis ingestis, eadē reuertuntur symptomata: quæ interdum ieiunos, interdum ē cœna affligunt, ita vt ægri vomant cibos crudos, & pituitā subamaram, calidāq; & ad eō nōnunq; acidā, vt dentes torpēre videantur. Atq; horum pluri- ma statim ab ineunte ætate eueniunt. Vt cūq; tamen acciderint, omnibus protelant. Cuius morbi causā, calorem immoderatum venarū mēseraicarū, obstructionēq; earundem, à crasso sanguine ortā, idē Diocles assignat. Videtur autē in ipso ventriculo p huiusmodi affectus, inflammatio quædam consistere: sanguis autē in parte inflammata contentus, &

Vena medi
in cubito per-
tundendam iis
esse, qui sangui-
ne melancholici
co abundante p
vniuersum cor-
poris habiū,

Hypochondria
cæ ac flatulē
melancholiæ
(quæ a ventricu-
lo orit) signa.

Hypochondria
cæ melanchol-
iæ causa.

Epilepsiam ali-
quando oriri a
ventriculo.

Melancholicos
nuncq̃ deserit
timor.

Melancho'ico-
rum species va-
riæ.

Atra bilis cur-
timorem con-
ciliet.

Hypochondria-
cus morbus q̃
dicendus.

crassior esse, & atra bili similior. Quo quidem exhalante ad cerebrum, melancholica eueniunt circa mentem symptomata. Frequentissimè etiam videmus, flaua in ventriculo bile contenta, caput dolore affici: illa verò eiecta per vomitum, illico dolorem compesci. Atq; inter optimos medicos conuenit, non solum hæc accidere, verum etiam epilepsiam, aliquando capiti à ventriculo oriri. Cæterum melancholicos ut nunq̃ deserit timor: ita eorum phantasmata præter naturam, non semper eodem genere continentur. Siquidem alius se testam factum putauit: atq; iccirco obuiantibus cedebat, ne collideretur. Alius, ne Atlas, qui mundum sustinere dicitur, grauatus sub tanto onere, illum à sese excuteret, atq; ipse cõminueretur cum eo, pertimescebat. Differunt porro inter se melancholici, nam omnes timent, morerent, vitam damnant, odio habent homines, sed non omnes niori cupiunt. Quippe hoc ipsum nonnullis melancholicæ caput existit, quod pertimescunt mortem. Sunt qui simul & mortem metuant, & mortem sibi conciscant. Quemadmodum igitur externæ tenebræ pauorem inducunt, sic atræ bilis color, mentis sedem tenebris similem reddens, timorem efficit. Siquidem tum humores, tum ipsa temperies corporis, possunt animæ actiones mutare: id quod à nobis est demonstratum, in eo libello cui titulus est, q̃ mores animæ corporis temperi sequantur. Ergo si circa ventriculum prima inceperint ipsius morbi symptomata, quibus auctis melancholica sequatur affectio: deinde alui deiectione, vomitu, proba coctione, ructibusq; leuetur is qui laborat, hypochondriacum, flatuosumq; ipsum morbum vocabimus. Accidentia verò ipsius dicemus & mœstitiam, & metum. Vbi verò propria melancholicæ accidentia esse auctiora videntur: circa ventriculum autem aut nulla, aut perexigua cernuntur: haud ab re existimaueris, primitiuam in cerebro affectionem consistere, ob

atram in ipso bilem congestam. Quem morbum mini-
mè inueteratum, frequentibus balneis, victuq; humi-
do & boni succi, nullo alio præsidio adhibito, ipse aliàs
curaui. Nam vbi diuturnus ipse morbus est factus, for-
tiora remedia postulat. C A P. V.

*Melancholiam
recentem qua
victus ratione
curauit Gale-
nus.*

Morbus comitialis similiter vt melancholia, tri-
bus clauditur differentiis. Verùm omnibus
commune est, quòd afficitur cerebrum, siue pri-
mària, affectione, siue consortii lege. Prima igitur dif-
ferentia existit, vbi affectus in ipso consistit cerebro: id
quod pluribus epilepticis accidit. Secunda, vbi ab ore
uentriculi per consensum dispositio ascendit ad cere-
brum, quemadmodum per suffusiones contingit. Ter-
tia deniq; sit raro, quum à parte alia quauis ipse af-
fectus incipiens, inde, sentiente id ægro, ad cerebrum
vsq; perreptat. Quale genus morbi ipse adhuc adole-
scens primùm vidi in puero tertium decimum ætatis
annum agente. Qui sanè narrabat, dispositionè ipsam
à crure initium capere: mox illinc rectà ascendere per
femur & eminentes ei lumbos, ac per latus id, ad cer-
uicem, donec perueniret ad caput: quod quum primū
tangeret, ipsum haudquā sibi constare. Interroganti-
bus autem medicis, quale esset quod ferebatur ad ca-
put, nihil habuit quod responderet puer. Alius tamen
compos mentis dicebat, veluti frigidam quandam au-
ram existere. Vnde ex duobus alterum Pelopi præcep-
tori placuit: aut q; qualitas quædam, alteratis per cō-
tinuationem partibus, aut spiritalis substantia transmi-
teretur: nec mirandum esse dicebat, tam validam vim
esse humori, in affecta particula præter naturam gesti-
to, vt cum perniciosarum ferarum venenis componi
posset. Etenim vbi phalangium momordit aliquem, q̄
uis paruum existat animal, existimare tamen debemus,
venenum ex ipsius ore, primò quidem, in superficiem:
dein verò in totum corpus deferri. Præterea marinæ

*Epilepsie tres
differentiæ.*

*Pelops Galeni
præceptor.*

*Phalangii mor-
sus.*

Turturis maris aculeus.
Scorpiōis aculeus.

turturis, sicuti & terreni scorpionis aculeus, quī in extremam illam, acutissimamq; partē, finiatur, ubi nullum foramen est, per quod venenum deiici possit: necessarium tamen est, ut excogitemus substantiam quandam inesse illi, aut spiritalem, aut fluidam, quæ ut mole minima, ita facultate est quæ maxima. Siquidem quū

Scorpiōis venenum refrigescere.

nuper fuisset quidam ictus ab scorpione, videor mihi esse (inquit) percussus grandine: eratq; omnino frigidus, frigidusq; sudore perfusus. Quippe ubi ex ista parte per totam ipsam celeriter distributa fuerit veneni vis, contingit eam, eodem rursus contactu, in singulas subiectarum rei partium recipi: mox ex illis in alias continuas, donec in aliquam peruenerit principem: quo tempore, mortis periculum instat. Ad hanc rem in primis

Inter a venenatis bestiis partem cutis, quomodo sint curandæ.

conferunt vincula partibus supernis iniecta, abscissoq; partium venenatarum. Noui equidem rusticum, qui epoto è viperis medicamēto, rescisso prius digito, euasit: sicuti & alium quendam, qui sola sectione, citra medicamen, est liberatus. Sed epilepticum illum puerum

Epileptice ab altero crure exortæ curatio.

medici quoq; sanarunt, primò quidem vniuersum eius corpus purgantes: dein medicamen ex thapsia & sinapi, parti primò affectæ adhibentes: ac supra illam medium membrum ligantes. Quod verò ad causam pertinet, ob quam in huiusmodi per consensum affectibus, epileptice conuulsiones fiant: probabile sanè mihi videtur, quemadmodum frequētissimè singultum fieri videmus, affecto stomacho, ita hæc oriri dispositionem. Etenim quum ventriculus ciborum mole grauatur,

Singultus quā excitetur.

aut ubi à corruptis cibis mordicus infestatur, singultu haud dubiè corripit. Immo verò acris humor ipsum ventriculum mordicans non singultum modò, sed conuulsionem etiam, per vniuersum excitat corpus. Quo

Conuulsionis epileptice causa.

iecto per vomitum, illico conuulsio sedatur. Quo minus mirandum est, si neruorum principum motu huiusmodi concutiat, ut à se expellat, quicquid fuerit

ad, quod à parte primò affecta, ad ipsum trāsmittitur. Vbi verò deperdito sensu quis cōciderit, non acciden-
te motu, quo vel cōuelli, vel salire videatur, affectum
ipsum oriri à frigore censeo. Quo in genere cōtinetur
lethargus. Apoplexiæ autem, q̄ subito eueniat, aut fri-
gidum, aut crassum, aut viscidum quippiam, quod affa-
ctum principes cerebri ventriculos impleat, non totius
substantiæ intemperiem, causam esse ē perspicuum: ve-
luti lethargi, phrenitidis, mania, melancholia, stulti-
tiæ, amissa memoria, sensuum hebetationis, & resolu-
ti motus. Porro in omnibus his affectibus, in quorum
numero apoplexia cōtinetur, periculi magnitudinem,
ex nocumento respirationis conijcere oportet. Siqui-
dem in cunctis soporosis affectib⁹, & si corpus nec mo-
ueatur, nec sentiat, sola tamen spiratio quæ musculo-
rum * thoracem mouentium est niuus, seruetur.
Porro musculis vniuersis, principium motus ab innat-
is ipsis neruis accedit, qui à cerebro initium primariū
fortiuntur. Quāuis enim ex medulla spinali permulti
oriri nerui videantur, vini tamen quam habet illa, ce-
rebrum ipsi omnem suppeditat. Quum itaq; spiratio-
nem vehementer impeditam conspexeris, non parua
in cerebro morbidam dispositionem esse conijcies, sp-
cipuè in soporosis affectibus: qui omnes consistunt in
cerebro.

C A P. V I.

Affectus vertiginosus siue primariò, siue lege con-
sortii accidat (quod solet ob cōsensum uentricu-
li) ad cerebrum ipsum pertinet. Quo derenti, vel à mi-
nima occasione hebetantur: adeò, vt interdum cadāt,
si vel ipsi vnico duntaxat circuitu in gyrum agantur,
aut quippiam aliud circūrotari viderint. Est autem ra-
tioni consonum, huiuscemodi affectionem fieri, claro
per magnas illas arterias, quæ plexum retiformem cō-
stituant, uapi do, calidoq; spiritu, atq; cerebrum ipsum
replente. Fieri etiam potest, vt inæqualis intemperies

Lethargus.

Apoplexiæ cā

Apoplexiæ o e
cupâte, pericu-
li . magnitudo
ex notamento
respiratōis col-
ligi debet.
Nerui oriūtur
a cerebro, mu-
sculisq; princi-
piū motus lax-
giuntur.

Soporosos af-
fectus oēs cōsi-
stere in cere-
bro.

Vertigo ad ce-
rebrū gūct.

Vertiginis cā

in ore ventriculi. Atqui spiritus, dolores sensiuos pariunt: biliosa excrementa, dolore mordaci afficiunt. Dolores a plenitudine inducti, grauitatis sensum præ se ferunt. Quod si rubor adsit & calor, calidos in cā eē humores est signum. Sunt quibus caput asiduē doler, vbi vel liberalius vinum iēgerint, vel meracius: idq; magis, si suapte natura calidum fuerit. Præterea calidi odores omnes, atq; in uniuersum odorata omnia, capiti dolorem conciliant. Nōnullos autem ob sensus exuperantiam dolor infestat: quemadmodum in ore ventriculi accidit.

Odorata oīa
conciliare do-
lorem capitis.

CAP. VIII.

AT verò, si aliquando per totum corpus, neruorum actio viciosa redditur, ipsorum eē affectum principium cōstat: id quod ex sola dignosci potest anatomicè. Quā igitur oēs pariter nerui, tū sentiendi, tū mouēdi vim amiserint, affectus is apoplexia appellat. Vbi verò alteri lateri, aut dextro, aut sinistro id accidit, resolutio nominatur, eius scilicet partis, in qua consistit affectus. Quod si in aliquo membrorum idem euenerit, eiusdem resolutio dicetur. Cæterū omnes animātis partes sub ceruice positæ, quæ à consilio & voluntatis imperio moueri possunt, neruos habent qui eas moueant, procedentes ab spinali medulla. Porro nerui qui mouent thoracem, ab ea spinæ parte quæ in ceruice est, exoriuntur. Si itaq; tota spina transversim dissecta fuerit, omnes quæ sub ipsa sunt corporis partes, sensu motuq; priuantur: q̄ per eam nimirum facultas sentiendi & mouendi pro arbitrio, deferatur à cerebro. Quod si transversim ad medium vsq; secundum longitudinem ipsa spina incidatur, non omnes suppositæ corporis partes, sed eæ duntaxat, quæ è regione sectionis sunt, resoluentur: dextra quidem, dextra spinæ parte dissecta: sinistra verò, sinistra. Videtur autem huiusmodi resolutionum aliquæ, faciem quoq; infestare: sed tum resolutum latus ad alteram faciei partem

Apoplexia qd
Resolutio qd.

Nerui mouen-
tes thoracē, a
colli spina ex-
oriuntur.

Spinæ lēioni-
bus, quo pacto
subditarum il-
li partium lē-
siones rīdeāt.

ipsum inuestigauī, quæ nā pars esset affecta, cui localia adhiberem præsidia, prius videlicet vniuersi corporis vacuatione præmissa, quod præceptum est in morbis omnibus obseruandum. Deinde qua via & ratione inuenirem singula remediorum. Cæterum affectam sedē eam ipsam existimaui, qua princeps animi vis cōtinetur. Medicamenta autem ea adhibenda esse, quæ huius sedis dispositioni reluctarentur. Quum igitur huius inquisitionis gratia consuluissem epistolam quandā ad Marsum, ab Archigene scriptam, in qua iubet, deprauata memoria, raso capiti affigi cucurbitulas, non iniuria sanē inconstantiam hominis sum demiratus: quoniam nimirum neglecto corde (cui memoriā ipse, ceu opus cognatum tribuit) ad caput remedia trāsferret. Nam quid per immortales Deos ex affectorum locorum notitia (quam ipse ad medendi rationem ait maximē necessariam existere) consequemur vtilitatis, nisi ab ipsis ad remediorū inuentionē ducamur? Adhæc si affectio quæ oblædit memoriā, existat frigida & sicca, nullū vsum adferunt cucurbitulæ admotæ: siue eæ incisa prius cute, siue integra, administrentur. Siquidem detractio sanguinis, quæ fit, vbi scarificata prius cutis fuerit, ad extremum ducit periculū. At citra vllam scarificationem cucurbitulæ adhibitæ, solius excitandi caloris gratia vtilēs esse censentur. Quippe attrahūt ad se huiusmodi ex imo: id quod magnopere aridæ dispositiōi aduersatur. Porro rationalem animæ vim in cerebro: viderem, irascibilem uē, in corde: appetitoriā deniq; in iecore sitam esse, nemini non persuasum existimō: id quod vel ex vulgariū sermone indies discere licet. Fatuū siquidē aiunt carere cerebro: timido & pusillanimi, cor deesse. Tityo verò iecur ab aquila erosum, non solum poetæ, verū etiam pictores, sculptoresq; fingunt. At verò, quemadmodum si ratio lædatur, sæpenumero contingit lædi memoriā: sic si memoria vitietur,

Archigenis inconstantia demiratur Galenus.

Memoriæ oblecta a causa frigida & sicca, cucurbitulas admotas non esse ex usu.

Cucurbitulæ absq; scarificatione adhibitæ, solius excitandi caloris gratia sunt vtilēs.

Animæ facultatū singulis quæ sedes tribuantur.

Tityo erosum iecur ab aquila fingunt poetæ.

Ratione læsa, sæpe memoriā

Iedi contingit;
vt econuerso.

ratio ipsa quodammodo etiam labefactatur: vtpote actionis vtriusque noxa procedente ab eadem dispositione. Quæ ubi vehementius intenditur, simul cum memoria ratio quoque omnino deperditur. Ac talis quidē affectio stultitia vocatur. Sic in lethargo etiam, in omnibusque soporosis affectibus, vtræque simul pereit actio. Quod autem affectus hi, à frigida intemperie oriuntur, quæ animales actiones omnino torpidas reddit, sane id vel ex animalibus ipsis, quæ per frigora latere coguntur, satis liquidò constat: necnon ex frigidis tum medicamentis, tum cibis. Lactuca quippe, graues inducit somnos, si multam quis ipsius quietatem ingesserit. Verum & capitis grauitates, quæ sine mordaci infestant dolore, somnum soporemque conciliant: quibus apoplegmatismi magnificè opitulari videntur. Igitur ut capitis ardor vigilias, sic refrigeratio inducit soporem. Item biliosi calidi que morbi, vigilias, deliria, phrenitides: contra, pituitosi frigidi que, ignauiam soporemque efficiunt. Nam quod ad vigilias soporesque per morbos pertinet, calida frigidaque intemperies, primam sibi facultatem vèdicat: altera verò ab hac, ad humiditatem ariditatemque refertur. Balneæ siquidem, eo quod madefaciant caput, soporiferæ sunt. Haud secus vini moderata potio, omnesque cibi humectantes. Ex ætatibus etiam, pueritia quidem, ob humorem est somnolenta. Senes verò ob ariditatem, vigiliis vexantur. Omnia igitur hæc argumenta esse possunt, ad animi ignauiam inducendam, humiditatem præter naturam obtinere secundas partes: frigiditatem verò priores. Cæterum ut humiditas sola, si abundet, longos profundosque somnos inducit: ita ariditas sola, vigilias. Quod si frigus cum humore intendatur vehementer, soporem stuporemque constituit: si ne hoc verò, memoriæ nocet, stultitiamque inducit. Quum itaque non solum in frigiditate humiditateque, verum etiam in ariditate & calore, non paruum secundum

Stultitia quid.

Frigida intemperies animales actiones reddit omnino torpidas.

Lactuca soporem gignit. Apoplegmatismi quibusæfectibus conferant.

Vigilias qui morbi inferat.

Balneæ cur soporiferæ. Vinum modice sumptum inducit somnum. Pueri cur somnolenti Senes cur vigilantes.

Stultitia unde oritur.

magis & minus, discrimen sit: nihil mirum, si multifaria inueniantur causæ quæ animales actiones lædere possint. Impræsentiarum autem, clarioris doctrinæ gratia, rationalis animæ actiones, principales: irrationalis verò, morales vocentur. Quum autem bifariam fieri contingat intemperies prædictas, duplex quoque erit vtriusque dispositionis modus: vnus quidem, in humidis siccisque humoribus: alter in corporibus solidis: si quando in eandem intemperiem cum mollibus, solidæ partes inciderint. Præterea quis ipsæ intemperies inter se sint contrariæ, * sit tamen ex ipsis interdum mixtum quoddam temperamentum: vt in vigilanti sompore, in quo pituitosus biliosusque humor exuperant. Ita in calidi frigidi que contrarietate, eisdem quoque modis inuenire licebit, tum per simplices intemperatias: tum per compositas ex ambabus. Quod si in solidis corporis partibus mixtam ex contrariis dispositionem fieri fateamur, tres sic prodibunt in vtraque contrarietate intemperies. Igitur huiusmodi affectus omnes capiti aduenire solent, sed inter se differunt, non solum missionis varietate, aut eo quod magis minusue intenduntur: verum etiam quia interdum afficiuntur ventriculi cerebri id genus intemperantiis: interdum vniuersa eius vasa: aut humiditas dispersa per corpus cerebri. Accedit ad hæc, quartus quoque modus, quum videlicet ipsum nec corpus cerebri intemperatum redditur.

C A P. I I I.

Quorum igitur vel memoria, vel intellectus perit (intellectus enim amissio, stultitia est) somnos obseruare oportet. Præterea, vtrum excernant: quippiam, vel ex naribus, vel ab ore, quod à capite defluat: an aridæ huiusmodi partes sint. Quippe ex iis dispositionem ipsam consequi cōiectura poterimus. Vbi igitur vel periit, vel grauiter læsa est memoria, frigida est omnino intemperies cerebri. Quocirca calface

Actiones principales.
Actiones morales.

Vigilans sompore.

Caput quadruplicitè affici.

Stultitia est intellectus amissio.

Memoriæ exoletæ, vel grauiter læsæ, causæ

re ipsum oportet . At verò exiccare , vel humectare , non necessarium est . Sed si humiditati copuletur , ar-
facere : si ariditati , madefacere . Cæterum si inter has
medium obtrinet , ipsum est conseruandum . Interdum
verò vbi principales actiones sunt læsæ , febris quoq;
accedit , vt in phrenicide , & lethargo . Interdum sine fe-
bre adest vitium : vt in mania , & melancholia : id quod
modò per consensum : modò primaria affectione cere-
bro laborante , accidit . Etenim vbi propriis accidenti-
bus exprimuntur huiusmodi vitia , permanen-
tiaq; sunt , nec aliis præcedentibus superueniunt , pri-
mogenia dicuntur esse . Vbi verò propriis accidentib;
minimè limitantur , neq; perpetuò permanēt , atq; ad
alias affectiones sequuntur , per consensum ipsa eueni-
re dicimus . Nec interim latere nos debet , vbi quis le-
ge consortii afficitur , fiatq; adhuc affectio , q; deletis ef-
ficientibus eam causis , ipsa quoq; simul deletur . Sin au-
tem consentientes partes permanentem iam habeant
dispositionem , quis causa efficiens conquiescat , ipsa ta-
men permanebit affectio . Quòd autem in cerebro cõ-
sistât omnes principalium animæ virium affectus , pro
confesso habent omnes medici , qui studio veritatis te-
nentur : sicuti & q; oēs nerui qui volūtatis imperio au-
diūt , à cerebro ducant originem . Conuulso siquidem
vniuerso corpore , omnes profectò autumant , talem
quampiam affici partem , quæ vt in arbore caudex ra-
moram , sic ipsa sit communis omnium neruorum ori-
go . Si igitur partes omnes quæ infra faciem sunt læ-
sæ , conuulsæ sint , primas spinalis medullæ partes affectas
esse putandum est : ac proinde illis opitulandum . Si ve-
rò simul cum vniuerso corpore facies quoq; conuul-
sa videatur , * non modò spinalis medullæ exortum ,
sed etiam cerebrum ipsum , à quo nerui faciei oriunt;
curamus . At verò si crus tantum , aut altera manus cõ-
uulsione tentetur , totius membri cõuulsio neruorum ,

147
esse intempe-
riem frigidam
cerebri: quæ re-
frigeranda est.

Affectus pri-
mogenii , siue
primarii, q; sint:
Affectus per
consensum, qui
dicantur.

Animæ princi-
paliū facultatū
affectus, consi-
stunt i cerebro.
Neruus omnis
a cerebro du-
cit originem.

Convulsio quo
differat a natu-
rali motu.

Convulsio fit
ob plenitudinē
vel inanitionē.

Epilepsia est
convulsio vni-
uersi corporis,
quæ ex tempo-
rum accidit in-
teruallis.

Epilepsia cōsi-
stet in cerebro.
Epilepsia vnde
gignatur.

qui ad ipsum feruntur, principium affectum esse de-
clarat. Cæterum, quum omnis motus à voluntate profe-
ctus, attractis musculis in eas quibus innascuntur, par-
tes, fieri videatur: nec fieri possit attractio, nisi ad suam
originem retrahatur musculus, constat convulsionem
in convulsis partibus factam, hac sola ratione à motu
naturali differre, q̄ præter voluntatē fit. Porro ipsam
convulsionem nervorum, ob plenitudinem vel inanitionem
fieri q̄ verissimè professus est nobis Hippocrates:
id quod vel ex fidiculis instrumentorū (quæ ob utranq̄
intemperiem ambiētis aeris, humidam nempe, & ari-
dam, adeò tenduntur ut disrumpantur) liquidò con-
stat. Si igitur convulsio fiat vel à labore, vel vigiliis,
vel fame, vel solitudine, vel arida æstuantiq̄ fe-
bre, qualem est videt̄ in phreniticis, causam eius ari-
ditatem, inanitionemq̄, rectè putaveris. Sin verò te-
mulento cuipiam, ac omnino pleno homini convulsio
accidat, non ab re ipsam à cōtraria causa iudicabis or-
tum habuisse. Atqui inanitioni contraria est repletio.
Iam comitialis morbus convulsio est omnium corpo-
ris partium, minimè quidem perpetua (ut in empro-
sithotono, opisthotono, & tetano) sed quæ ex tempo-
rum accidit interuallis. Nec solum hac re, sed mentis
quoq̄ & memoriæ, ac sensuum oblacione à iam dictis
convulsionum generibus differt. Vnde constat in cere-
bro hunc affectum consistere. Cæterum velox eius di-
scussio, crassum humorem spiritus meatum in cerebri
ventriculis obstruentem, hunc maximè affectum pe-
perisse declarat: nervorū principio seipsum quatiente,
quo excutiat id quod infestat. Itaq̄ non ab ariditate,
inanitione ne, sed à crasso & viscido humore, impediē-
te animale spiritum, quo minus deferatur in corp⁹,
hanc affectionem gigni, argumento est, q̄ subito &
fiat, & solvatur. Siquidem breui tempore fieri non po-
test, ut vel cerebrum, vel tenuior ipsi⁹ membrana, ad

tātam ariditatem perueniat, vt corio simile quippiam
 patiat. In corpore itaq; cerebri, anima suam sedem
 fortitur: in quo etiā fit tum ipsa ratiocinatio, tum re-
 cordatio sensibilibus imaginum. Primum autem instru-
 mentum ipsius animæ, tum in sensibilibus actionibus
 vniuersis, tum in iis quæ à consilio & voluntate profi-
 ciscuntur, spiritus est animalis, qui in cerebri ventricu-
 lis continetur: sed præcipuè in postremo: quis non cō-
 temnendus sit medius vētriculus: quem amplecti mul-
 tis rationibus cogimur: vt duos anteriores deferere.
 Satis tamen fuerit ad curationem, nosse sedem affectā
 esse ipsum cerebrum: atq; in eius ventriculis humorē
 crassum & viscidum comprehendere, nunc pituitosum,
 nunc melancholicum. Pituitosum in præsentia humo-
 rem appello, in quo humiditas, frigiditasq;: vt melan-
 cholicum, in quo siccitas & frigiditas dominatur. Ac
 pituitæ quidem vnum genus est, qđ quotidie vel screā-
 do, vel vomendo, vel emungendo educitur, vapore-
 so spiritu plenum: vt ne sensu quidem lateat ipsum esse
 dissimulare. Alia verò pituita, similis quidē videtur,
 licet fortassis non similis existat: qualis est tum cru-
 dus humor, qui in vrinis subsidet: tum is qui à Praxa-
 gora vitreus vocatur. Ex quo genere videtur esse &
 salina, quæ neq; fluida admodum sit, neq; aquosa.
 Verū salina non vnica duntaxat qualitate gustum so-
 let afficere, nedū vniuersa pituita. Sic atra bilis quoq;
 ob substantiæ varietatem nō obscuras differentias sor-
 titur. Nam alia ē veluti fæx sanguinis, quæ admodum
 spissa existit, fæcibus vini haud absimilis. Alia verò, q̄
 superior, essentiæ est multo tenuioris: atq; vomentib;
 ipsam & olfacientibus videtur acida. Hæc etiam attol-
 lit in bullas terram, eamq; radit, atq; fermentat. At il-
 la quam fæci vini similem esse dixi, in terram effusa nō
 inducit feruorē, nisi fortē in ardenti febre ipsam præ-
 assari contingat: neq; vlla etiam acida qualitate parti-

Anima colloca-
 tur in ipsius ce-
 rebri corpore:
 in quo & ratio
 cinatio sit, &
 memoria.

Animæ primū
 organū, est ani-
 malis spiritus,
 qui in cerebri
 ventriculis con-
 tinetur, sed præ-
 cipue in postre-
 mo.

Pituitæ diffe-
 rentiæ.

Atræ bilis spæ.

Epilepsia fieri
a crassa pitui-
ta, vel a melan-
cholio succo
retento in mea-
ribus ventricu-
lorum cerebri
Melancholia
vnde oriantur.
Manise causa
Phrenitidis dis-
ferentia.

Phreniticorum
insania quo ab
ardentium fe-
brium delirio
differat.
Delirium arden-
tium febrium
quomodo fiat.

Ori ventriculi
inesse acutiores
sensum quam reli-
quis corporis
partibus.
Consensus atque
necessitudo cere-
bri cum ven-
triculo, vnde
innotescat.
Hypochondri-
cos affectus que
sequantur.

clpat. Quare iudicio meo potius melancholicus aut suc-
cus aut sanguis, quam atra bilis, dicenda est. Igitur ut cras-
sus pituitæ succus, ita hic quoque comitalem morbum
solet efficere, ubi in meatibus ventriculorum cerebri
retinetur: siue is medius sit, siue postremus. Vbi verò
ipso cerebri corpore abundat, eam insaniam speciem,
quam Græci vocant melancholiam, inducit. Quemad-
modum alter atræ bilis succus, qui præassata flaua bile
nascitur, ferina gignit deliramenta, modo cum febre,
modo absque illa, in cerebri corpore abundans. Atque hæc
ob causam phrenitis nonnunquam est mitior, ubi à pallida
bile ortum traxit. Interdum vehementior, ubi flaua
bilis eam peperit. Deliria autem, quæ per febrium vi-
gores accidunt, non propria cerebri affectione, sed per
consensum fiunt. Quamobrem sic delirantes, minimè
appellamus phreniticos: quia phreniticorum insania non
quiescit mitigato febrium uigore. * Quemadmodum
igitur phreniticorum febris unum quoddam ex symptoma-
tibus dispositionum cerebri iudicat: sic ardentium febrium
symptoma delirium est: quod nimirum fit elatis ad cerebrum
multis uaporibus * calidis. Haud secus gignitur ea af-
fectio quæ suffusioni est persimilis, à ventriculi disposi-
tionibus ortum trahens. Namque uentriculo cerebrum,
cerebroque uentriculus, suas affectiones transmittit: idque
propter neruorum à cerebro ad os uentriculi descen-
dentium magnitudinem: per quos etiam sensus huic
particulæ, quam ulli reliquarum corporis partium, acutior
est. Quocirca fracturas quidem capitis, ubi ad mem-
branas usque perueniunt, biliosus uomitus: capitis autem
dolores quomocunque fiant, nausea stomachique mor-
sus consequitur. Hypochondriacas uero & flatulentas
vocatas affectiones melancholica comitatur tristitia:
haud secus quam acutas febres delirium: & * nonnullas
oris uentriculi dispositiones, affectio suffusioni persimi-
lis. Sic neruosis partibus inflammatis, promptius quam re-
liquis,

liquis, delirium superuenire solet: idq; ascendente ad caput, interdum per continuas partes solo calore: interdum spiritu vaporoso, uel fumoso, uel fuliginoso.

C A P. I I I I.

Igitur crassi humores q in cerebri substantia abundant, interdum ei ueluti instrumentali: interdum ut simili nocent. Quum enim meatus obstruuntur, ut instrumentali: quum uerò alteratur temperamentum, ut simili. Proinde recte ab Hippocrate dictum est, Melancholici magna ex parte comitiali morbo afficiuntur: & contra, morbo comitiali laborantes, melancholici euadunt. Atq; horum utrūlibet magis accidit, pro ut uel in hanc, uel in illam partem infirmitas repit. Si enim in corpus, epileptici: si uerò in mentem, melancholici euadunt. Quum autem nō solum ab atra bile, sed etiam à pituita morbus comitialis oriatur, sciendum est, solum eum qui ab atra bile ducit originem, in melancholiam transire posse. Etenim quum anima ipsa, aut temperamentum actiuarum sit qualitatum, aut ab ipsarum temperamento mutetur: bilem ipsam ubi cerebro, ueluti parti instrumentali, nocet, ad cerebri corpus conuerti ait, id quod in obstructionibus fieri constat. Quum uerò temperamentum mutando, ei ueluti simili nocet, ad mentem eam repere dicit. Accidit autem cerebro, ut nonnunq̃ uniuerso in uenis sanguine melancholico effecto, ob cōmune uitium, ipsum q̃q; lædatur. Nōnunq̃ uerò, totius corporis sanguine prorsus innocuo, solus is qui in cerebro contentus est, alteratur: idq; bifariam fit. Aut enim aliunde in ipsum deriuatur: aut in ipsomet melancholicus humor genitus ē: quum uidelicet internus calor aut flauam bilem, aut crassum atrūq; sanguinem, superassauit. Si igitur uniuersum corpus redundet melancholico sanguine, curationem à uenæ sectione auspicari oportet: si uerò cerebrum tantum, æger tunc (quod ad hanc dispositio-

Cerebrum qñ afficiatur ut instrumentum, & qñ ut pars similis.

Melancholici magna ex parte epileptici fiunt, & econuerso.

Atra bilis qñ in cerebri corpus: & qñ in animam repit.

Melancholicus sanguis in quibus minime habetur: & in quibus omnium maxime accumulatur.

Cibi melancholicum succum gignentes.

nem pertinet) sanguinis detractione non indiget: quis ob aliam causam sanguis detrahi possit. Vtrum uero melancholicus sanguis uniuersum corpus, an solum cerebrum occupet, sic discernendum est. In primis uniuersi corporis habitum, qualis nam sit, accuratè consideres uelim. memineris quod quod molles & cãdidi, & obesi, nequaquam humorem melancholicum possidēt. Macri uero, & nigri, & hirsuti, & quibus latæ sunt uenæ, aptissimi sunt, ut huiusmodi in ipsis humor accumulēt. Fit quod interdum, ut * admodum rubicundi, affatim melancholicum temperamentum contrahant: atque post hos etiam flauissimi præcipuè uigiliis, & multis laboribus, & sollicitudine, & tenui victu æducati fuerint. Cuius generis etiam hæ notæ existunt, si hæmorrhoids aliqua sit restricta: aut consueta alia sanguinis euacuatio: aut usus fuerit æger cibis melancholici succi. Porro qui sanguinem melancholicum gignunt, hi ferè sunt: caprina, bubalaque; caro, magisque hircinæ & taurinæ: sed maxime asinorum & camelorum carnes: itemque uulpinæ: & caninæ. Magnū ad huiusmodi sanguinis generationem momentum adfert etiam * leporis esus: sed multò maius aprorum. Limaces quoque sanguinem melancholicum pariunt, si frequens sit eorum usus. Præterea omnium animalium terrestrium carnes sale conditæ: necnon aquatiliū carnes, ut thunni, balenæ, vituli marini, delphini, canis, atque cetaceorum omnium. Ex oleribus autem, brassica ferè sola, gignere sanguinem id genus consueuit: quemadmodum & arborum germina, ubi uel muria, uel oxyhalme condiuntur: præcipuè lentis, terebinthi, rubi, canirubi. Leguminum uero omnium maxime lentes inter melancholicos cibos annumerantur: mox fursuraceus panis, & qui ex typha & nitiatibus seminibus factus est. Præterea uina crassa, nigraque, aptissima sunt, ut ex ipsis humor melancholicus fiat. Vetus etiam caseus, si supercalfactus in ipso corpore fuerit,

facile huiusmodi humorem procreat. Sunt etiam nonnulli, qui per febriles morbos contraxerunt melancholicum succum. Ad efficaciorē autem notitiā, non parum cōfert anni tempus, ac præterita, præsensq; ipsius constitutio: necnon regio, & laborantis ætas. His itaq; omnibus præmeditatis, si existimas in vniuersi corporis venis contineri sanguinem melancholicum, quo certiorē habeas notitiā, cubiti venam secā, præcipueq; medianā, quæ communis est, & ei quæ humeralis dicitur, & ei quæ per axillam ad manum fert. Quod si tum fluens sanguis non videatur melancholicus esse, supprimatur cōfestim. Si verò talis appareat, vacua q̃tum pro laborantis corporis habitu satis esse conieccheris. Est præterea tertium melancholiæ genus, morbi comitialis exemplo, vbi ortum à ventriculo suscipit. Solentq; medicorum nonnulli hanc dispositionem, hypochondriacum, flatulentumq; morbum vocare. Quem sanè (vt Diocles testatur) sumpto cibo cōcoctu difficili, statim ructus acidus comitatur: cū eoq; flatus & æstus. Adhæc fluctuatio in præcordiis, non illi co, sed vbi cibos venter complexus fuerit. Interdum etiam ventriculi vehementes dolores, qui nonnullis ad dorsum vsq; extenduntur. Cæterum ægri cibis concoctis quiescunt: moxq; aliis ingestis, eadem reuertuntur symptomata: quæ interdum ieiunos, interdum et cœna affligunt, ita vt ægri vomant cibos crudos, & pituitam subamaram, calidamq; & adeò nonnunq; acidam, vt dentes torpere videantur. Atq; horum pluri- ma statim ab ineunte ætate eueniunt. Vt cunq; tamen acciderint, omnibus protelanē. Cuius morbi causam, calorem immoderatum venarum miseraicarum, obstructionemq; earundem, à crasso sanguine ortam, idē Diocles assignat. Videtur autem in ipso ventriculo p huiusmodi affectus, inflammatio quædam consistere: sanguis autem in parte inflammata contentus, &

Vena mediæ in cubito per-
tundendam iis
esse, qui sangui-
ne melancholici
co abundant
vniuersum cor-
poris habitū.

Hypochondria-
cæ ac flatulæ
melancholiæ
(quæ a ventricu-
lo oritur) signa.

Hypochondria-
cæ melancholi-
cæ causa.

atram in ipso bilem congestani. Quem morbum minime inneteratum, frequentibus balneis, victuq; humido & boni succi, nullo alio præsidio adhibito, ipse alias curavi. Nam ubi diuturnus ipse morbus est factus, fortiora remedia postulat.

C A P. V.

MOrbus comitialis similiter ut melancholia, tribus clauditur differentiis. Verum omnibus commune est, quod afficitur cerebrum, siue primaria, affectione, siue consortii lege. Prima igitur differentia existit, ubi affectus in ipso consistit cerebro: id quod pluribus epilepticis accidit. Secunda, ubi ab ore ventriculi per consensum dispositio ascendit ad cerebrum, quemadmodum per suffusiones contingit. Tertia denique, sit raro, quum à parte alia quavis ipse affectus incipiens, inde, sentiente id ægro, ad cerebrum usque perreptat. Quale genus morbi ipse adhuc adolescens primum vidi in puero tertium decimum ætatis annum agente. Qui sanè narrabat, dispositionem ipsam à crure initium capere: mox illinc recta ascendere per femur & eminentes ei lumbos, ac per latus id, ad cernicem, donec perveniret ad caput: quod quum primum tangeret, ipsum haudquaquam sibi constare. Interrogantibus autem medicis, quale esset quod ferebatur ad caput, nihil habuit quod responderet puer. Alius tamen compos mentis dicebat, veluti frigidam quandam auram existere. Vnde ex duobus alterum Pelopi præceptor placuit: aut quod qualitas quædam, alteratis per continuationem partibus, aut spiritalis substantia transmitteretur: nec mirandum esse dicebat, tam validam vim esse humori, in affecta particula præter naturam generato, ut cum perniciosarum ferarum venenis componi posset. Etenim ubi phalangium momordit aliquem, quod vis parvum existat animal, existimare tamen debemus, venenum ex ipsius ore, primo quidem, in superficiem: dein verò in totum corpus deferri. Præterea marinæ

Melancholiam recentem qua visus ratione curavit Gale- nus.

Epilepsie tres differentie.

Pelops Galeni præceptor.

Phalangii mor- sus.

Turturis maris aculeus.
Scorpiōis aculeus.

Scorpiōis venenum refrigere.

Itē a venenatis bestiis partikulæ, quomodo sint curandæ.

Epileptiæ ab altero crure exortæ curatio.

Epileptiæ.

Singultus quā excitetur.

Convulsionis epilepticorum causa.

turturis, sicuti & terreni scorpionis aculeus, quā in extremam illam, acutissimamq; partē, finiatur, vbi nullum foramen est, per quod venenum deiici possit: necessarium tamen est, ut excogitemus substantiam quandam inesse illi, aut spiritalem, aut fluidam, quæ ut mole minima, ita facultate est quæ maxima. Siquidem quā nuper fuisset quidam ictus ab scorpione, videtur mihi esse (inquit) percussus grandine: eratq; omnino frigidus, frigidoq; sudore perfusus. Quippe vbi ex icta parte per totam ipsam celeriter distributa fuerit veneni vis, contingit eam, eodem rursus contactu, in singulas subiectarum rei partium recipi: mox ex illis in alias continuas, donec in aliquam peruenerit principem: quo tempore, mortis periculum instat. Ad hanc rem in primis conferunt vincula partibus supernis iniecta, abscisioq; partium venenatarum. Noui equidem rusticum, qui epoto è viperis medicamentum, rescisso prius digito, euasit: sicuti & alium quendam, qui sola sectione, citra medicamen, est liberatus. Sed epilepticum illum puerum medici quoq; sanarunt, primò quidem vniuersum eius corpus purgantes: dein medicamen ex thapsia & sinapi, parti primò affectæ adhibentes: ac supra illam medium membrum ligantes. Quod verò ad causam pertinet, ob quam in huiusmodi per consensum affectibus, epileptiæ conuulsiones fiant: probabile sanè mihi videtur, quemadmodum frequētissimè singultum fieri videmus, affecto stomacho, ita hæc oriri dispositionem. Etenim quum ventriculus ciborum mole grauatur, aut vbi à corruptis cibis mordicus infestatur, singultu haud dubiè corripit. Immo verò acris humor ipsum ventriculum mordicans non singultum modò, sed conuulsionem etiam, per vniuersum excitat corpus. Quo eiectione per vomitum, illico conuulsio sedatur. Quo minus mirandum est, si neruorum principium motu huiusmodi concutiat, ut à se expellat, quicquid fuerit

id, quod à parte primò affecta, ad ipsum trāsmittitur. Vbi verò deperdito sensu quis cōciderit, non acciden-
te motu, quo vel cōuelli, vel salire videatur, affectum
ipsum oriri à frigore censeo. Quo in genere cōtinetur
Lethargus. Apoplexiæ autem, q̄ subito eueniat, aut fri-
gidum, aut crassum, aut viscidum quippiam, quod affa-
ctum principes cerebri ventriculos impleat, non totius
substantiæ intemperiem, causam esse ē perspicuum: ve-
luti lethargi, phrenitidis, manix, melancholiæ, stulti-
tiæ, amissæ memoriæ, sensuum hebetationis, & resolu-
ti motus. Porro in omnibus his affectibus, in quorum,
numero apoplexia cōtinetur, periculi magnitudinem,
ex nocumēto respirationis conicere oportet. Siqui-
dem in cunctis soporosis affectib⁹, & si corpus nec mo-
ueatur, nec sentiat, sola tamen spiratio quæ musculo-
rum * thoracem mouentium est niuus, seruatur.
Porro musculis vniuersis, principium motus ab innatis
ipsis neruis accedit, qui à cerebro initium primariū
sortiuntur. Quāuis enim ex medulla spinali permulti
oriri nerui videantur, vni tamen quam habet illa, ce-
rebrum ipsi omnem suppeditat. Quum itaq; spiratio-
nem vehementer impeditam conspexeris, non parū
in cerebro morbidam dispositionem esse coniicies, p-
cipuè in soporosis affectibus: qui omnes consistunt in
cerebro.

C A P. VI.

Affectus vertiginosus siue primariò, siue lege con-
sortii accadat (quod solet ob cōsensum ventricu-
li) ad cerebrum ipsum pertinet. Quo detenti, vel à mi-
nima occasione hebetantur: adeò, vt interdum cadāt,
si vel ipsi vnico duntaxat circuitu in gyrum agantur,
aut quippiam aliud circūrotari viderint. Est autem ra-
tioni consonum, huiuscemodi affectionem fieri, elato
per magnas illas arterias, quæ plexum retiformem cō-
stituunt, uapi do, calidoq; spiritu, atq; cerebrum ipsum
replente. Fieri etiam potest, vt inæqualis intemperies

Lethargus.
Apoplexiæ cā

Apoplexia oē
cupāte, pericu-
li magnitudo
ex nocumēto
respiratōis col-
ligi debet.
Nerui oriūtur
a cerebro, mu-
sculisq; princi-
piū motus lat-
giantur.

Soporosos af-
fectus oēs cōsi-
stere in cere-
bro.

Vertigo ad ge-
nerū p̄tinet.

Vertiginis cā

in ore ventriculi. Atqui spiritus, dolores tenuiores pariunt: biliosa excrementa, dolore mordaci afficiunt. Dolores a plenitudine inducti, grauitatis sensum præ se ferunt. Quod si rubor adsit & calor, calidos in cā eē humores est signum. Sunt quibus caput assidue dolet, vbi vel liberalius vinum igesserint, vel meracius: idq; magis, si suapte natura calidum fuerit. Præterea calidi odores omnes, atq; in uniuersum odorata omnia, capiti dolorem conciliant. Nōnullos autem ob sensus exuperantiam dolor infestat: quemadmodum in ore ventriculi accidit.

C A P. V I I I.

AT verò, si aliquando per totum corpus, neruorum actio vitiosa redditur, ipsorum eē affectum principium cōstat: id quod ex sola dignosci potest anatomicē. Quū igitur oēs pariter nerui, tū sentiendi, tū mouēdi vim amiserint, affectus is apoplexia appellat. Vbi verò alteri lateri, aut dextro, aut sinistro id accidit, resolutio nominatur, eius scilicet partis, in qua consistit affectus. Quod si in aliquo membrorum idem euenerit, eiusdem resolutio dicitur. Cæterū omnes animatis partes sub ceruice positæ, quæ à consilio & voluntatis imperio moueri possunt, neruos habent qui eas moueant, procedentes ab spinali medulla. Porrò nerui qui mouent thoracem, ab ea spinæ parte quæ in ceruice est, exoriuntur. Si itaq; tota spina transuersim dissecta fuerit, omnes quæ sub ipsa sunt corporis partes, sensu motuq; priuantur: q; per eam nimirum facultas sentiendi & mouendi pro arbitrio, deferatur à cerebro. Quod si transuersim ad medium vsq; secundum longitudinem ipsa spina incidatur, non omnes suppositæ corporis partes, sed eæ duntaxat, quæ è regione sectionis sunt, resoluentur: dextra quidem, dextra spinæ parte dissecta: sinistra verò, sinistra. Videtur autem huiusmodi resolutionum aliquæ, faciem quoq; infestare: sed tum resolutum latus ad alteram faciei partem

Odorata oīa conciliare dolorem capitis.

Apoplexia qd Resolutio qd.

Nerui mouentes thoracē, a colli spina exoriuntur.

Spinæ læSIONIBUS, quo pacto subditarum illi partium læSIONES rīDEANT.

retrahitur. Quum igitur nervi qui in faciei partes dispersi sunt, à cerebro oriuntur, sanè si earum aliqua simul cum toto corpore resoluta sit, scire oportet resolutionis dispositionem in cerebro ipso consistere. Vbi verò illæ peremerint, haud dubiè, spinæ initium afficitur. Accidit verò nonnullis, ut faciei partes solæ afficiantur, ut lingua, oculus, mandibula, & labrum. Quippe non omnibus ab vno loco principium influit: quum ex diuersis cerebri partibus suos nervos recipiunt.

Apoplexia omnibus actibus animalibus noxam infert.

Igitur apoplexia omnibus actionibus animalibus noxam inferens, cerebrum affectum esse manifestè declarat. Discernitur autem magnitudo affectionis, ex noxæ quam spirationi infert, vehementia. Quum enim naturalem ordinem plurimum egreditur, magnam: quum verò paulum impedimenti est, parvam in cerebro noxam esse, conicere oportet. Sanè omnium pessima spiratio putanda est, quæ & intermittitur, & magna cum violentia trahitur. Siquidem ob id contingit mori apoplecticos, quæ spirare non possint. At verò, ubi pars aliqua conuulsa est, nervus ei motioni deputatus, aut musculus, necessariò est affectus. Potissimum autem dicitur resolutio nervorum, ubi motus deperditus est. Vbi verò partium aliquarum sensus perit, eam partem sensus expertem esse: resolutam autem, non usque adeò dicimus. Quam perinde est, ut quisque eam nominare voluerit, modò sedem affectam, simulque illius dispositionem inueniat.

C A P. I X.

Vbi olfaciendi vis læditur, non eorum meatuum, qui in naribus sunt, sed vel anteriorum cerebri ventriculorum, quum aliqua intemperie laborant, est noxa: vel eorum meatuum, qui in ossibus colatoriis consistunt, si aliquando obrurentur. Siquidem odoratorum sensus, in anterioribus perficitur cerebri finibus, elatis ad ipsos, per foramina colatori ossis vaporibus.

Odoratorum sensus in anterioribus perficitur cerebri finibus.

GALENI PERGA

MENI DE LOCIS AFFECTIS.

LIBER QVARTVS.

C A P. I.



AT Verò oculorum interdum quidē sensus, interdum motus, ac nonnunq̃ vtraq̃ functio resoluitur: idq̃ nunc in altero nunc in vtroq̃ cōtingit ocu- lo. Est quum solius palpebræ vel sen- sus, vel motus læditur. Vbi igitur nul- lo malo apparente in oculo, perierit facultas cernēdi, neruo in ipsum descendenti à cerebo, causa tribuēda est, nimirum vel inflammato, vel indurato, vel quomo- docūq̃ aliter ob humorum affluxum læso, obstructō- ne secundum proprium foramen. * Quæ omnia acci- dere illi tanq̃ organicæ parti, necessum ē. Nā tanq̃ pars similis, octo intemperiebus vexatur. Præter has cau- sas exoluti oculorum sensus, ē alia, vbi nihil omnino, vel exiguum admodum visifici spiritus à principio (qd̃ in cerebro consistere putandū est) ad eos descenderit. Si verò vteruis oculorum, motum duntaxat amiserit, secundæ copulæ neruum, qui à cerebro oritur, mole- stari, est necesse, ab aliq̃ videlicet eorū affectuū, q̃s alteri neruo, qui à prima coniugatione orit̃, & cui soli meat̃ cō- spiciuus inest, nuper accidere diximus. Quia verò mu- sculi oculum ipsum mouentes senario numero cōstāt, ac præter eos alii quoq̃ adsunt, qui descendentes in ipsum amplectuntur optici pori radicem, vt videlicet oculum retrahant, & firmēt, nec mollis ille neruus, in processu peruertatur aliqua ex parte, accidit sanē in- terim, hoc ipso neruo nequaq̃ læso, musculorū aliquē, aut in propria essentia, aut in neruo ad ipsum descen-

Visum quibus modis exolui contingat.

Oculorum mo- tum vnde pe- rire accidat.

Opticis ner- uis solis inesse cōspicuos mea- tus.

Oculo mouen- do musculi sunt sex tribu- ti.

tercesserit, quærendum est in primis, num ex quo incipit affectus, singulis diebus perpetuò hæc apparitio perseuerarit. Nam assiduitas suffusionem portendit: intermissio autem, quæ malum à ventriculo prodierit, suspicionem excitat: id quæ; magis, si perfectè quis concoquens, nullum sibi visum apparere fatetur: ac multò magis, si quum apparuerint tales imagines, mordicus in ore ventriculi doluit: maximè verò, si post hæc, vomendo, eiecta re mordente, mitigata accidentia fuerint. Quin et, si à ventriculo symptoma id exoriat,ur, medicamine ex aloe potui dato, minimo negotio curatur, accedente simul proba coctione: Vbi verò altera pupilla tenebrosior, aut turbidior, aut non exactè pura aspicitur, suffusionis esse initium censendum est. Similia quoque suffusioni accidentia in quibusdam phrenitidis speciebus (affecto scilicet cerebro) sæpenumero euenire solent. Sunt etenim phrenitici quidam, qui de iis quæ oculis offeruntur, rectè (quantum ad sensitiuam notitiam pertinet) iudicant: cogitando verò, à naturali iudicio aberrant. Alii rursus, cogitatione quidem falluntur minimè: sensibus tamen hallucinantur, id quod mihi olim contigisse videtur, quum ardenti febre laborans, & floccos vellerem, & in vestibis festucas colligerem, id quæ; animo constans. Sunt præterea qui simul sensus & cogitationis vicio laborant. Porro vbi in cuiuspiam cerebro biliosus succus abundat, accedit quæ; febris ardens, ab illo oritur tunc fumus, veluti in lucernis ab oleo: qui, per vasa quæ ad oculum tendunt, delapsus, earum imaginum in ipsis esse causa censetur.

*Hicra picæ
cui affectui ob
ueniat.*

*Phreniticorum
varia sympto
mata.*

CAP. II.

In lingua etiam, interdum motum ipsius, interdum sensum, interdum vitari quoque tactum contingit. Non tamen alio gustus, atque alio tactus nervo vititur. Siquidem nervi à tertia coniugatione orti, qui in linguæ pelliculam disseminantur, non solum tangendi, sed

*Lingua recipit
ab iisdem nervis
tertix coniuga
tionis, qui, in il
lâ descendunt,
simul gustû &
tactum.*

Sensoria, quæ
qbus sensibus
sint crassiora,
aut tenuiora.

Facies unde
suos nervos re-
cipiat

Cares.

Sopor.

Apoplexiæ so-
lutæ solet pa-
ralysis succe-
dere.

Sopor fit affe-
ctis musculis
temporum.

gustandi etiam vim obtinent. Crebrius tamen læditur
gustandi q̄ tangendi facultas, quum ad gustum exacto
iudicio sit opus. Etenim tangendi sensorium, crassissi-
mum, ut cernendi, tenuissimum est. Auditus verò sen-
sorium, ut in tenuitate à visu: ita sensorium gustus in
crassitudine, à tactu secundum locum obtinet. Olfaciē
di verò sensorium, in illorum quatuor medio cōstitit.
Igitur quum posterior cerebri pars tam dextra, q̄ sini-
stra, afficitur, ne apoplexia hominem rapiat, timendū
est. Vbi autem altera tantū, in paralyfin finiri solet:
quæ interdum alteram solum linguæ partem motu de-
stituit, illa solo ipsius tum gustu, tum tactu: interdum par-
tes sub capite cōstitutæ, modò has, modò illas. Quum
autem à parte anteriore cerebri facies suos nervos re-
cipiat: à posteriore verò omnes partes quo sub capite
sunt: à qua etiam oritur septima coniugatio nervorū,
qui inserti in musculos linguæ, voluntarium illius mo-
tum perficiunt: non ab re quidē anteriore cerebri par-
te altera affecta, sola linguæ motio vitio carebit: reliquæ
verò faciei partes omnes, in altera parte, dextra aut si-
nistra, sensu & voluntario motu destituentur. Quem-
admodum si afficiatur posterior pars cerebri, reliqua-
rum partium faciei in columbia simul & motu & sensu;
soli linguæ motus vitiabitur. Quod si aliquando to-
ta anterior cerebri pars afficiatur, supremum ipsius vē-
trē ei consentire necesse est: atq; cogitandi quoq; actio-
nes vitiari. Proinde qui ita est affectus, nec sentit, nec
mouetur: spirandi tamen facultas haudquā in illo læ-
ditur: vocaturq; hic affectus caros, siue sopor. Qui si ve-
hementer spirationem opprimat, apoplexia nomina-
tur. At solutæ apoplexiæ creberrimè solet paralyfis
succedere. Sopore verò finito, magna ex parte bona
valetudo subsequitur. Fit autem sopor Hippocrate au-
thore, affectis musculis temporum, atq; in acutis mor-
bis. Inter soporem & apoplexiam, morbus comitialis

est medius: conuulsionem vniuerso corpori inducēs: sed in paralyfin non desinit. Quorum trium morboꝝ, frigidus, crassusq; aut omnino viscidus humor est causa. Verum & in sopore, & in morbo comitiali, vētres magis, cerebri corpus minus: in apoplexia verò, corpus magis affici solet. Atq; in sopore anterior pars magis: in apoplexia & morbo comitiali, vtraq; afficitur. In catalepsi & vigilanti sopore, posteriora cerebri magis læduntur. Quum autem ossē aliquo terebra perforato, medius ventriculus fuerit attritus, sopor hominem occupat: sed neq; conuulsione, nec difficili spiratione oborta: hæc enim apoplexiæ: illa morbo comitiali est affinis: haud secus q̃ catalepsi, soporiq; seruata secundum naturam spiratio. Verum vt in sopore clauduntur palpebræ, ita in catalepsi manent apertæ. Iam verò vehementes dolores sopor sequi consuevit, concidente videlicet robore aialis spiritus: quod primum animæ instrumentum existit in vētriculis cerebri, indeq; fluens per neruos defert motum & sensum i vniuersas corporis partes. Igitur affectuum linguæ, alii q̃dem illi communes sunt, * ob commercium quod habet cum cerebro & neruis. Alii ipsius dūtaxat proprii censentur. Quæadmodū ergo consortii lege, per septimam neruorum coniugationem motus ipsi vitiatur, sic sensus impediri potest per tertiam, quæ & mollis ē, & in pelliculam illius, sicuti septima in musculos, disseminatur. Quod verò ad proprios illius affectus pertinet, sicuti musculorum eius, vt simularium, intemperatiæ motum impediunt, ita ambientis ipsam extrinsecus membranæ intemperies, & tangendi, & gustandi simul sensum vitiat. At instrumentalium affectionum speciem referunt inflantur itiones, scirrhi, œdemata, erysipelata, suppurationes, & alia id genus. De quibus quia visu & tactu discerni possunt, nihil in hisce commentariis dicemus. Vt autem de ipso auditu nonnihil

Cerebri corp⁹ magis affici in apoplexia, q̃ i morbo comitiali, & sopore, in his aut venticulos magis

Catalepsi detēri dormiūt apertis palpebris. Sopor consuevit sequi vehementes dolores. Animalis spiritus est primū instrumentum animæ.

Lineæ proprii merbi qui sint

Porrò vbi afficiuntur priores vertebræ spinæ, licet raro, euenire tamen interdum angina potest, idq; in pueris magis q̃ in adultis: nimirū ob ipsas vertebras ad iteriora luxatas: quemadmodum Hippocrates ait, secundo de Popularibus morbis. Cæterum per huiusmodi anginas guttur nullo proprio affectu laborat. Quum autē spinæ partes, quo fuerint altiores, eo sint præstantiores, sanē quo affectio fuerit inferior primis duab⁹ vertebris, cō inferet multò minorem noxam. At nerui septi transuersi sub quarta & quinta vertebra oriuntur. Ab eo autē solo fit spiratio * lenis, accedēte in tercostaliū musculorū actione, vbi vehemētiore ē opus respiratione: quæ si vehementissima requiratur, supremos etiam musculos concurrere oportet. Porro vbi vnica duntaxat vertebra, aut etiam duæ, aut tres, sese consequentes inuicē, distrahunt, ea parte spinā cauari cōtingit. Vbi uerò inter distractas vertebra, vel vna, vel plures, illæ sæ manserint, sic affectis gibbus accidere solet. At si in alterutram partem, vel dextram, vel sinistram, distrahatur vertebra, ibidem in obliquū spina torquetur. Cæterum alia sequuntur symptomata, vbi proprio affectu laborat spinalis medulla: & alia vbi vna vel plures vertebræ afflictæ luxantur. Nam quum proprio affectu spina ipsa affligitur, citra vertebrarum aliquam luxationem, si quidem in altera duntaxat parte afficiatur, omnium inferiorū corporis partium, quæ è regione nocuementi consistūt, tam sensus q̃ motus læditur. Si verò vtraq; pars sit affecta, omnes particulæ, tam in dextra, q̃ in sinistra regione, ei quæ affecta est, subiectæ, similiter resoluuntur. At luxata, vel ad gibbum, vel ad concanum vertebra, fieri potest, vt nulla omnino partium inferiorum, vel in sentiendi, vel mouendi functione, aliquod vitium percipiat. Per angulosas tamen luxationes spinæ, subiectas omnes particulas lædi est necesse. Paulatim verò facta luxatio

Anginā aliquā ob vertebras luxatas accidere.

Spine partes altiores, præstantiores existere.

Septum transuersum solum perficere lenē respirationem.

Gibbus vnde accidat.

Spina, proprio si labores affectu quid accidat.

Angulosæ luxationes spinæ sunt nocentes iis quæ i ore hem, atq; paulatim fiunt.

**Luxatiões spi
nae obliquae.**

ne, atq; in orbē magis, nihil notatu dignū patiunt partes quæ cōmotæ vertebræ subiiciunt. Sed in obliquum luxatio, lædit oīno eas partes, ad quas nervi ex luxatis vertebris procedētes, pueniūt: idq; magis in ceruice: ī thorace minus: sed multo min⁹ in lūbis accidere solet. Siqdē ī ceruice, vertebræ iter se cōnexę, equalr vtręq; foramini pferūt vnde neru⁹ procedit: in thorace aut, supior magis, inferior minus: sed in lūbis, tot⁹ neruus, ex superna excidit vertebrā. * Quare in eis transuersa vertebrarum luxatio, vnā secum trahens & medullam, & neruum, illæsum seruat naturalem ortū ipsius. In ceruice autem, ex loco medio inter duas vertebrae procedentes nervi, per obliquas luxationes, in ea quidem parte, ad quam spina deflectitur, opprimuntur: in altera verò, tenduntur. Rursus tensiones quidem, vbi ingens quoq; inflammatio accesserit, conuulsio comitatur. Ad compressiões verò, earum partium ad quas oppressus neruus descendit, sequitur resolutio. Igitur per eas quas nuper diximus vertebrarum luxationes, reliquæ faciei partes omnes, neq; in sensu, neq; in motu, noxam subeunt. Solæ autem genæ læduntur, vte quæ mouentur à lato musculo. * At vertebræ solent luxari, aut ob casum, aut ictum, aut tumorem præter naturam, neruosa corpora vertebris atq; medullæ cognata, extendentem. Vt autem in præsentiarum, aliquid de angina dicamus, Hippocrates affectus omnes, qui cum spiratione difficili, guttur aut fauces infestāt, cynāchas, hoc est anginas appellat. Ac sunt quidem anginæ genera quinq;. Primum est, vbi inflammātur fauces: hoc est, internus oris locus, vbi & gulæ & gutturis partes extremæ coeūt. Secundum est, vbi nec fauces, nec reliquæ oris partes, nec etiam externarum partium vlla inflammata videtur: laborans tamen suffocatiōis periculum in gutture sentit. Tertium, vbi extrinsec⁹ circa fauces inflammatio apparet. Quartum vbi guttu

**Luxatio verte
brarum vnde
possit accide
re.**

**Anginæ gene
ra quinq;.**

ris partes tam externæ, quàm internæ, similiter inflammata videtur. Quintum denique, quum ad anteriores partes, colli luxantur vertebræ. Id quod sanè contingit, vel solis musculis qui cum ipsis communicant, tumore præter naturam affectis: vel nato ibi tuberculo: vel gula pariter vitiata: nonnunquam musculis quoque qui gulam gutturi iungunt, propriisque aliquando gutturis musculis, qui ipsum aperiunt, oblatis. Hi igitur affectus omnes difficilem respirationem efficiunt, minimè tamen in discrimen suffocationis adducunt. At ægri & difficultè deglutiunt, & dolent, tum præcipuè, quum eis potus per nares resilit. Nullo autem spiritalium instrumentorum, nec primario, nec per consensum affecto, fieri minimè potest, ut spiratio lædatur. Quocirca ex sola spirandi specie, illico nonnihil & de affecta sede, & de ipsa dispositione, conicere licet. Quippe si videatur laborans, inter spirandum, totum mouere thoracem, ut in parte quidem anteriore, ad iugulum: in utroque latere, ad cervicem: in parte posteriore ad scapulas usque, motus ipsius ascendat: tres ex huiusmodi spiratione dispositiones significantur. Vna est flammea in corde, & pulmone caliditas. Secunda, in altero spiritalium instrumentorum angustia. Tertia, facultatis musculos mouentis debilitas. Quum igitur huiusmodi spiratiõem conspexeris, in primis arteriæ pulsationem perpẽdere oportet. Hæc enim quantus sit calor, indicat. Deinde spirationem ipsam expende, an multa, an frequens, an exustilando fiat. Postremò thoracè in pectore tãge, quem si præter cætera, ardentè inueneris, iam omnes copiosi caloris notas te habere ne dubita. Quibus ex abundantia accedit faciei, oculorumque rubor, capitis ardor, sitis vehemēs, lingua arida, salebrosaque. Vbi vero incendii signis modum seruantibus, thorax dilatur vehementer, angustiam in spiritalibus instrumentis esse portendit. Solet autem imbecillitas accidere spi-

Caloris copiosi nota.

Angustia spiritalium instrumentorum quid indicet.

Spine unde ac
cidere imbecil
litas soleat.

na, interdum cerebri vitio, ut potè à quo & sentiendū,
& mouendi facultatem recipit: interdum ipsa dunta-
xat spina primariò affectu laborante, idq; ob peculia-
rem intemperiem, vel toti spinæ, vel diuersis ipsi⁹ par-
tibus adaenientem. Igitur ob ipsius imbecillitatem spi-
næ, omnibus thoracis partibus solet aer inspirari, vel
nullo ardente calore ægrum ad id cogente. Siquidem
vbi animans quiescit, viresq; validæ sunt, liberam re-
spirationem solum septum transuersum efficere solet.
Vbi verò id ob imbecillitatem, spirandi munus perfee-
re nequit, intercostalium musculorum tunc concurrit
auxilium. Quòd si præterea maiori animal egeat spira-
tione, tunc superni musculi omnes, quorum maximè
scapulas secum manifestè mouent, ad spirandi actionē
detyderantur. Cæterum tametsi per spiritalium orga-
norum imbecillitatē tot⁹ thorax moueatur, dilateturq;
narium pinnae, dilatatio tamen thoracis est minor, q̃
in ardentibus febribus: in quibus, si vires valeant, * to-
tus thorax plurimum dilatari cōsuevit: minorq; etiā,
q̃ in angina, & dyspnœa, & peripneumonia. Quippe
hoc morbo affecti, & maxima, & frequētissima spira-
tione vtuntur. At quemadmodum ob infirmitatē om-
nium organorum respiratiōis, sic ob vnus quoq; par-
ticulæ imbecillitatem, omnes thoracis partes dilatari
coguntur. In vniuersum autem, vnica pereunte actio-
ne, solum musculum qui ipsam efficere solet, aut neruū
ipsius, esse affectum, putandum est. At vbi plures actio-
nes viciatæ sunt in diuersis locis, accidit interdum om-
nes musculos, quibus perficiuntur, ab aliqua comuni
causa esse oblitos. Fieri etiam potest, ut neru⁹ aliquis,
qui musculis illis communis est, afficiatur. Verū si ex
anatomie ad quam particulam porrigantur singuli ner-
ui ab spina prodeuntes didiceris, affectas sedes q̃ facili-
mè inuenies. Sic enim quum ex refrigeratione prima-
rum vertebrarum spinæ, à quibus quatuor nerui ad

Narū pinnas
dilatari p im-
becillitatē tho-
racis.

caput ascendunt, ut pericranio sensum largiantur, cuiusdam olim caput afficeretur, affecta sede explorata, illiq; remediis adhibitis, eum subito persanauimus.

CAP. IIII.

AT verò sanguinem è vètriculo gulaq; vomitione: ex spiritalibus partibus, tussi: ex faucibus, & gurgulione, sreatu: ex ore, simplici expuitione ex el li, apud omnes medicos in confesso est. Nos verò sanguinem qui à cerebro affatim descendebat ad fauces, tusiendo educi sæpenumero vidimus. Quippe subito gutturi irruens, tussim mouere potest. Quare diligenter oportet huiuscemodi affectus distinguere. Cæterū contingit plerunq; ut vel erosa, vel excisa, vel rupta vena, sanguis tusiendo, affatim cōfertimq; eiiciatur. At si spumofum aliquid simul eductum fuerit, efficacissimum est indicium, ipsum educi à pulmone. Hæc scilicet, si bronchi pars quæpiā, aut arteriæ, aut venæ runcata: aut etiam pulmonis ipsius caruncula reiciat. Quippe nihil horum accidit iis, qui ex thorace sanguinem tusiendo producant. Iam verò nullus dolor infestat eos, quibus à pulmone sanguis erumpit: utpote qui duos nervos per quos tenues à sexta nervorum à cerebro ortorum coniugatione recipit, extrinsecus per membranam ipsum continentem dispersos: qui intrinsecus haudquaquam per visceris profunditatem extenduntur. Verum thoraci multi ab internis: multi etiam ab externis partibus adueniunt nervi, quibus facile dolores percipi possunt. Præterea thorax quidem est musculosus & ossulentus: pulmo verò & latus, & tutus à contusione. Proinde thoracis dolores intēsiore sunt: pulmonis remissiores. Quum igitur dolente parte quapiā thoracis, sanguinem quis spuendo reiecerit, nec multum, nec rubrum, sed nigricātem, gruniosumq; huic thorax primaria affectione infestatur. At sanguis affecto thorace, per pulmonem educitur: ut in suppuratis:

Sanguis quæ parte soleat excerni.

Sanguinis à pulmone reiecti, indicia.

Dolor non infestat eos quibus à pulmone sanguis erumpit.

Pulmonis dolores cur remissiores sint, thoracis.

Sanguis, affectio thorace, & pulmonē educitur.

Pulmonis vlcera ægre curationem recipere.

Sanguisugam posse esse in causa fluxus sanguinis.

Sermonis organa.

Vocis infirma.

Vox qua ex causa pite, aut vitari possit.

affectibus pus, quod inter thoracem & pulmonem deprehenditur: ad eundemq; modum, quod in pleuritide coloratum sputum emitti solet, per pulmonem excernitur. Porro vlcera quæ sanguinis reiectioni solent superuenire, in pulmone quidem, ægrè curationem admittunt. At in thorace disrupta vasa, à quibus sanguis expuitur, magna ex parte conglutinantur. Inuestigandum verò est, num ob adhærescentē sanguisugam, vel in ipso narium meatu, vel in illa oris parte, qua ad nares foramen tendit, sanguis aut emungat, aut screeat. Ex vetriculo est cruor, epota hirudine, euomit. Qui cruor tamen est tenuis, saniciq; specie referens: siue is ex vetriculo, siue ex naribus, siue ex ore feratur. C A P . V.

Quod non sit eadem res, vox atq; sermo, neminem ignorare existimo. Vox siquidem vocalium instrumentorum est munus: loquela verò, eorum quæ sermoni sunt deputata: inter quæ lingua principatum obtinet: cui non parum conferunt & nasus, & labra, & dentes. Sic etiam vocis instrumenta sunt guttur, & ipsum mouētes muscoli, ac nerui qui à cerebro ipsis mouendi vim deferunt. Igitur si vel claudentes, vel aperientes guttur muscoli, immobiles reddantur, qui sic afficitur obmutescet. Vbi verò vel difficulter mouetur, vel palpitant, vel tremunt, vel aliter afficiuntur, pro affectionis ipsius modo, vox ipsa lædetur. Quod si alius quispiam ex mouentibus guttur musculis, quoquo modo lædatur, vitabitur quidem vox, sed exiguum. Quippe sic affectus, neq; obmutescet omnino, neq; ita paruum habebit vocem. Ut autem ex musculis guttur mouentibus, precipui habentur ii, qui ipsum & aperiunt & claudunt, ita ex vocalibus neruis, ii quos recurrentes vocant: qui & ipsi, sextæ coniugationis pars sunt neruorum, qui à cerebro oriuntur: quemadmodum & alii, qui quidem per ipsum dispersi, differunt ab illis, eo quod à neruis sextæ coniugationis, non in cer-

uice, sed quum ad thoracis regionem peruenerint, se-
parantur. Per vulnera igitur recurrentes nervi refrige-
rati, tantisper vocem impediunt, donec calfacti, natu-
ralem temperiem recuperarint. Præterea vitari vocē
* in acumen & magnitudinem haud obscurè contin-
git, vbi fauces etiam à suis musculis contendī & conti-
neri non possunt. Item grauisimè læditur vox, quum
membrana faucibus gutturiq; continua, multa humi-
ditate rigatur. Quòd etiam desillationes eadem ratio-
ne vocem raucam efficiant, nemo non intelligit. Ve-
hemens quoq; exclamatio similiter vocem offendit.
Cæterum quum gutturis musculi interni inflammantur,
angina is affectus dicitur, quæ simul & vocem, &
spirationem lædit. Idem quoq; in vniuersum facere
solent omnes præter naturam tumores, siue in spirita-
libus vijs exoriantur, siue extrinsecus ipsas cōprimāt.
Sic enim gula quoq; vbi inflammatione est affecta, vt
comprimat asperæ arteriæ tunicam, qua cartilaginū
ipsius extremitates, sigmoides dictæ, iunguntur, & spi-
rationi, & voci, noxam afferre consuevit: quemadmo-
dum & vertebrarum ceruicis in anteriorem partem
luxatio. Igitur oēs huiusmodi affectus voci accidunt,
propriis ipsius instrumentis vitio aliquo laborātibus.
Sunt autem affectus, alii quā peculiari sua materia pri-
uatur: quæ sanè est, generaliter quidem loquendo, ex-
piratio: secundum speciem verò, efflatio. Quæ quidem
fit, quum spiritus affatim foras effertur, concurrenti-
bus ad hanc actionem intercostalibus musculis. Proin-
de accidit, vt per vehementia thoracis vulnera, atq;
omnino ipsius in altera parte resolutiones, in primis q-
dem semispirans, ac mox animal semiuocale euadat:
idq; per accidēs. In apoplexia verò, sopore, morbo co-
mitiali, vigilanti sopore, cōmuni ratione earum actio-
num, quæ ab imperio voluntatis proficiuntur, vbcē
lædi contingit. His itaq; quinque actionibus consequē-

Recurrētes ner-
ui refrigerati,
vocem impe-
diunt.

Vox in acumē
& magnitudi-
nem quā vitiat.

Vox inde ef-
ficiatur rauca.

Angina offen-
dit vocē simul
& respiratio-
nem.

Voci qui affe-
ctus incommo-
dent.

Vocis materia
est efflatio.
Efflatio que-
modo fiat.

Actiones inter se conuenientes sunt quinque circa respirationem.

Exspiratio.
Efflatio.
Efflatio strepens.
Vox.
Loquela.

tia quadam inter se conuenientibus, expiratione, efflatione citra strepitum, strepenti efflatione, voce, & loquela: si earum prima lædatur, reliquas omnes lædi necesse est. Vltima verò læsa, reliquæ haudquaquam læduntur. At cum secunda, tres oblæduntur reliquæ. Cum tertia, duæ vltimæ. Cum quarta, sola postrema. Atqui expirationem efficiunt vniuersi thoracem contrahentes muscoli: efflationem (quæ vehemens exspiratio est) intercostales maximè: strepenti efflationem, hi qui in faucibus sunt: vocem verò ipsam, gutturis muscoli absoluunt. At lingua articulatiōem vocem distinguens, loquendi vsum largitur: ad quam rem nonnihil cōferre videntur dentes, labra, narium foramina, palatū, gurgulio, mediocrēq; ipsius linguæ vinculum. Quorum aliquod si fuerit vitiatum, vitiari quoq; sermonem ipsum contingit.

C A P. V I.

Difficilis respiratio i qua oēs thoracis mouētūr musculi, a quibus causis oriri possit, inuestigatio.

VT autem ad causas dyspnoæ explorandas rursus hic sermo redeat, si videris aliquem respirantem ægrè, ita vt inter respirandum, thoracis omnes moueantur muscoli, pectusq; etiam, vnà cum scapulis attollatur, certè ex tribus vnum coniecere oportet: aut virium imbecillitatem, aut viarum spiritus angustiam, aut vehementem in corde & pulmone caliditatem. Quāuis interdum duæ, ac nonnunquam (licet raro) tres quoq; ex iam dictis causis concurrere possunt. Atqui tribus quidem simul coeuntibus, proximam mortem timere oportet. Vbi verò duæ fuerint, difficile ē ægrū seruare. Sed vna duntaxat infestante, peculiari opus ē finitione, vt sciatur, seruabitur ne æger, an ipsi malo succumbet. Igitur vbi vires duntaxat fuerint infirmæ, ad tria mouentium musculorum genera venire, eosq; omnes ad motionem excitare solent: vno genere vehementer mouere nequeunte. Quippe si septū trāuersum solum, veluti quum secundum naturam se habet, sufficienter mouere posset, utiq; nec intercostali-

bus, nec superioribus musculis indigeret. Quoniam vero imbecillum est, omnes sensim commouet: sed nec frequentem, nec admodum raram actionem efficit. At plurimum aucto in spiritalibus instrumentis calor: omnibus quidē thoracis musculis agit animal: sed velox, frequens, & vehemens, est eorum actio, si citra virium imbecillitatem ipse calor infestet. Virium autē imbecillitatem, vbi non accesserit flammæ caliditas, nec velox, nec frequens omnino comitatur motus: proinde nō ita multum omnes thoracis partes potest distendere. Præterea, vbi ob plurimum calorem spiratio est difficilis, spiritus quidam calidus, feruidusq; efflatur. Vbi verò ob solam imbecillitatē, * nulla facta per os efflatione spiritus per nares tantum emittitur. Quòd si per inspirationem cuiuspiam narium pinnae manifestē * dilatatae videantur, id sanē efficax roboris prostrati est indicium. Ob spiritalium verò instrumentorum angustiam, totus quidē thorax * plurimū, celeriter, atq; frequenter distenditur. Cæterum qui sic laborant, * absq; vlla efflatione expirant. Si verò simul conuenerint in spiritalibus instrumentis & calor, & angustia (quod solet in peripneumonia) tunc sanē nec maxima, nec frequentissima, nec etiam celerissima spiratio sufficere potest: sed surgere tentant ægri: q; sic melius eis thorax dilatari videatur. Similiter solent respirare & ii, quibus asperæ pulmonis arteriæ, plurima defluxione opplentur. At neq; efflant, nec calidū emittunt spiritum. Purulentis etiam totus thorax attollitur: sed neq; ab eis fit efflatio, neq; spiritus emittitur calidus, nisi fortē adurens febris accesserit. Verum ii q; celerrimē suffocantur: tum ob plenitudinem ipsam, tū q; vires omnibus purulentis necessariò imbecilliores reddantur. Contra autem per anhelantes affectus, humoribus crassis & viscidis in ipso pulmone impactis, permanere possunt vires robustæ & constātes. Adhæc

Narium pinnae manifeste dilatatae inter respirationem, robur prostratum indicant.

Recti qui spirare soleant.

Purulentis qualis fiat respiratio.

Purulentis cur q; ocysyme suffocentur.

Tuberculū in pulmone ortū, qualem respirationem efficiat.

tuberculum coctū difficile aliquādo fuerit in ipso ortum, thorax maximè dilatabitur, sed non trahet ita multum spiritum, ob idq; crebro spirare cogetur, * verū absq; efflatione: quæ sanè aucti caloris est propria. Magna porrò interdum fit respiratio, ob magnitudinem dilatationis, quam thorax molitur: iterdum verò, ob inspirati aeris multam essentiam. Igitur quicunq; sine aliqua spiritalium instrumentorum angustiam, per febres ardentes difficulter spirant, his inspirati aeris quantitas, magnitudini dilatatiōis thoracis proportionē respondet. Quibus verò, vel tumor vel angustia sine flammæ calore in spiritalibus est, i his, thoracis quidem dilatatio fit maxima, id verò quod inspiratur, non solum dilatationem proportionē non assequitur, verū etiam minus, q̄ secundum naturam inspirari solet, attrahitur. Cæterum inspiratio ea quæ ob virium imbecillitatem fit omnibus agentibus muscularis, dicenda est sublimis, nō magna. Iam verò multus spiritus, & ex longis intervallis attractus (quemadmodum inquit Hippocrates) delirium declarat. Spiratio exigua simul & rara, spiritalium instrumentorum frigiditatem: frequens verò nō solum spiritalium, sed eorum etiam quæ cum ipsis moventur, vt hepatis, lienis, ventriculi, & gulæ, laborem indicat. Est etiam alia dyspnœæ species, quum veluti breui quadam quiete intercipitur opus thoracis: idq; modò in inspiratione, modò in expiratione, siue hoc accidat ob convulsionē musculorum thoracis: siue ob caloris copiam, cogen-tis ægrum continenter vel inspirare, vel expirare. Est & alius spiratiōis affectus, apnœæ, hoc est, priuatio spirationis, vocatus: Qui tamen constare nequit. Nam videretur esse impossibile, vt animal omni spiratione ex-actè priuatum, in vita seruari possit. Quāvis animalia ea quæ in cauernis delitescere consueuerunt, mouere thoracem videantur minimè. Proinde coniicere opor

Aeris inspirati quāritas in quibus nā respondeat magnitudinis thoracis: & in quibus nequaquā.

Inspiratio sublimis, quæ. Spiritus magnus & rarus, delirium indicat.

Spiratio exigua simul, & rara quid significet.

Spiratio frequens quid indicet.

Apnœa.

Animal nō posse vivere spiratione priuatum. Latentia animalia.

et, aut adeo exiguum adesse illis respirationem, ut ef-
fugiat sensum: aut animalia eiusmodi, tunc non indige-
re respiratione, sed transpirationem illis sufficere, quæ
fit arteriarum motu per vniuersum corpus. Fieri au-
tem contingit apnoeam, minimè quidem affectis respi-
rationis organis, sed principio à quo illa reguntur.

Trāspiratio fit
per arterias.

C A P. VII.

Verùm enim uerò pulmo nunq̃ vehementi dolo-
re cruciatur: at grauitatis sensum, atq̃ aliquando
extensionem, vel ad pectus, vel ad spinam (quādoqui-
dem inde suspēduntur membranæ ipsum ambientes)
percipere potest. Sæpenumero etiā pulmone affecto,
ægri molestant angustia, atq̃ ob id crebro celeriterq̃
respirant & thoracem vehementer attollunt, sed non
ita multum aerem attrahunt. Hæc si citra febrem acci-
derint, aut tuberculum, aut plenitudinem crassorum
humorum in eo consistere, ostendunt. Cæterum si in-
ter respirādum ægri minimè videant stertere, idiesq̃
augeatur symptoma, crudi tuberculi ortum suspicari
oportet. Si verò stertendo strepitum fecerint, lentorū
crassorumq̃ humorum, pertinaciter impactorū, mul-
titudinem, pulmonis brōchia molestare est indicium.
Quod si illi o ab angustie sensu quis difficulter respi-
ret, fluxionem vel à cerebro, vel à vicinis sedibus, ir-
ruere in pulmonis bronchia significatur. Porro si ubi
vehemens putrescit pleuritis, remissa tam febris excā
descendit, in imo thoracis æger derelictam grauitatē
percipiat, ac per varios decubitus, maximè dum repē-
te ab vno in alterum latus conuertitur, aliquid tran-
fluere sentiat, puris multitudinem ibi contineri, conie-
ctura est certissima: præcipuè si nihil penè expuerit la-
borans. Si verò citra febrem serosus aut pituitosus hu-
mor subito in thoracis spatium defluēs, excitauerit spi-
randi difficultatem, æger tunc tenue sputum, idq̃ ab
initio quidem exiguum, sed cum vehementi tussi: ubi

Pulmo nunq̃
vehementi do-
lore cruciatur.

Tuberculum
in pulmone or-
tum, quæ indi-
cent.

Puris in thora-
ce contenti in-
dicia.

Pauca cū magna tussi expuntur dupliciter.

Pulmonis inflammatio. Pulmonis erysipelas.

Pulmonis interieci æqualis & inæqualis indicia.

Rupta esse vasa in pulmone unde deprehendimus.

verò concoctum est, plus atq; crassius, & cum mitiori tussi expuere solet. Quippe bifariam accidere potest, vt vehementer tusiendo pauca quis expuat: nempe aut ob lentum, crassum ue humorem: aut ob impensè tenuem. Siquidem tenuis humor quum subleuatus est, inter tusiendum à spiritu diuisus refluit: lentus verò, aut omnino, crassus difficulter effertur: vtpote qui non tã facilè à corporibus, quibus impactus est, abstergi, neq; à quouis spiritu, nisi à vehementi & multo, potest impelli. Igitur sputum quod neq; liquidum, neq; aquosum admodum fuerit, neq; crassum etiam, aut lētū, id facilè efferrī solet, maxime vbi vires validæ fuerint. Porro vbi cum spirandi difficultate, cui & angustia & grauitas coniuncta est, acuta quoq; febris incidit, is affectus est inflammatio pulmonis. At si intolerabile incendium fuerit, angustia verò, grauitatisq; sensus minor, erysipelas ipsum vexare censendum est. Vexatur etiam pulmo interdum inæquali, sicuti & æquali intemperie, citra humorum affluxū. Igitur inæqualis, tussim excitat: æqualis verò, si moderata sit, spirationis concinnitatē variat. Si autem vehemens, idq; vigente calore, frigidi aeris & potionis cupiditatem inducit, ac tractu temporis in febrem desinit. Per frigidam autem intemperiem, contraria euenire solent. Quippe si modum seruauerit, calidi aeris, & calide desiderium potionis excitat: si verò modum excedit, replet viscus ipsum fluxionibus. Ob ruptionem etiam vasorum, contingit sanguinem in pulmones transfluere, atq; excitare tussim. At ruptiones in eo deprehēdes, tum ex multo sanguinis effusione, tum ex magna, notabiliq; aliqua causa, quæ subito aduenerit. Sunt autē causæ prægressæ, casus ab alto, collisio, iracundia, exclamatio, atque alia id genus. Contingit quippe interdum vasa disrumpi, vbi non præmissa lenitione pulmonis per præcedentes exclamations, vehementer aliquis exclamare cō-

tendit. Adhæc nulla extrinsecus manifesta adueniente causa, sanguinis abundantia potest in pulmone vas rû pere, si minimè extendi possit, aut ob frigus à vicinis contractum, aut ob innatam temperiem. At verò, vbi oscula referantur venarum, calidæ præcedunt semp dispositiones. Quæ verò eroso vase aliquo affatim accidunt sanguinis euacuationes, eas præcedere solêt exiguâ sputa, acresq; in pulmonem fluxiones à capite. Nô nunq; verò & pulmonis aliqua pars, aut crustula simul efferri videtur. Distinguitur autem vlcus pulmonis ab vlcere aspera arteriæ & gutturis, tum ob ea quæ cum sputo excernuntur: tum ob sputi ipsius quantitatem. Siquidem per vlcus pulmonis, plurimum sputi reicitur. à partibus autem illis exulceratis, admodum parû excernitur. Præterea pulmonû vlcera non comitatî dolor: ea verò quæ guttur & asperam arteriam infestât, dolorem quidem inducunt, non tñ nimis vehementē.

Pulmonis vas a quibus rû pi occasionib⁹ possint.

Pulmonis vlcus ab vlcere asperæ arteriæ & fauciu, quò distinguatur.

GALENI PERGA

MENI DE LOCIS AFFECTIS.

LIBER QVINTVS.

CAP. I.



INCIPES Autem symptomata quæ cordi primariò affectu, & per cõ sensum accidunt, consyderanda.

Cor igitur, innati caloris existit fons & origo: quemadmodum sensus & motus, cerebrum: ac hepar denique

facultatis nutritoriæ: à quibus sanè tribus principiis animal gubernatur. Cæterum animal omnino mori non potest, nisi prius ipsum cor afficiatur: ad cuius intemperantias immodicas mors necessariò sequitur. Si

Cor innati caloris vrigo. Principia nos gubernantia. Animal mori non posse, nisi prius cor afficiatur.

Cordis tempe-
riē esse neces-
sariā cerebro
& hepatis non
aut horum, illi.
Latentia nec
moveri, nec sen-
tire, nec ali.

quidem quum singulæ partes peculiari temperie cor-
dis suas actiones p̄ficiant, hac profectò pereunte, actio-
nes quoq̃ ipsarum perire est necesse: ac proinde cere-
bri etiam et iecoris. Horum verò temperie deperdita,
non oportet cordis simul actionem perire. Nam & si
sensu & motu volūtario sit destitutum animal: nec nu-
tritur, veluti in latentibus euenit: nihilominus viue-
re ipsum posse, q̃diu cor illæsum permanserit, haud in-
ficiandum est. At vero si cor respiratione priuetur, ho-
minem illicò perire est necesse. Porrò ad ipsam respi-
rationem conducunt thoracis muscoli, in quos nerui
à cervicis medulla orti, motionis principium deferūt.
Qua quidem facultate morrice, quæ à cerebro influit,
musculi si priuent (vt videre est per vehementes apo-
plexias) perit opus respirationis. At verò, qua ratione
homines per somnum spirāt, reliquis musculis oībus,
præter eos qui ad thoracem pertinent, tunc feriantib-
us, eadem per minorem apoplexiam, atq̃ alios ei vi-
cinos affectus, spirare possunt. Verū per vehemen-
tes superni principii læsiones, tota spiratio resoluitur:
vnde cordis quoq̃ temperies corrumpitur, peritq̃; ne-
cessariò animal. Ex iecinoris etiam affectu mori aliquā-
do contingit: alia tamen ratione, * atrophia videli-
cet. Quare in huiusmodi affectibus vita potest longius
produci. Mori etiam contingit nonnullos ob syncopē
vitio stomachi ortam, ac vehementem dolorem, & ti-
morem grauem, ac deniq̃ voluptatem immensam.
Etenim quibus vitale robur infirmum est, animi verò
affectiones, ob impericiam, fortes, iis facile animæ sub-
stantia resoluitur. Atq̃ horum aliqui etiam ob mœsti-
tiam perierunt: sed non illicò. At vir magnanimus, ob
nullam animi perturbationem vnq̃ succubuit. Pro-
prio autem affectu laborare contingit cor, vel ob sim-
plicem intemperie, siue inæqualis, siue æqualis ea fue-
rit: vel ob inflammationem, vel erysipelas, idq̃; dū sic-

Respirationi
quæ conferat.

Mortem cōtin-
gere posse ob
timorē grauē,
& voluptatem
immensam, atq̃
etiā mœstitiā.
Magnanimus
vir, ob nullam
animi pertur-
bationem suc-
cubuit vnquā.

ri incipit. Nam illicò, ante q̄ augeantur huiusmodi affectus, animal ipsum corrumpitur. Quos sanè affectus cardiaca sequitur syncope: quemadmodū stomachicæ eos, qui os ventriculi afficiunt. Hæ tamen etiam cōsentiente corde accidunt. Igitur exiguæ quidem cordis intemperantiæ, pulsus arteriarum, pro sua quæq̄ natura, variant: maiores verò, per proprias quidem simularium partium intemperies, subitam mortem nō inducunt: per eas autem quæ ad partes instrumentales pertinent, subito enecare possunt, sed præcedentibus signis quibusdam: quorum vnum ab Hippocrate est dictum. Qui sæpe & multum exoluuntur sine causa manifesta, ii repente moriuntur. Est præterea & alius affectus, palpitatio videlicet cordis, aut per se eueniēs, aut cum suspitione quadam, quod in humore cor ipsum moueatur. Inflammato autem manifestè corde gladiatores vidimus, haud aliter q̄ qui syncope cardiaca pereunt, obiisse. Si ad ventrem cordis, præcipueq̄ sinistrum, aliquando penetrauerit vulnus, protinus cum multo sanguine vitam exhalabit animal. Si verò non ad ventrem vsq̄ pertingat, sed in cordis substantia cōsistat vulnus, ex ita affectis aliqui, nō solum ea die qua vulnerati fuerunt, sed sequēti quoq̄ nocte potuerunt viuere. Qui oborta deinde inflammatione fuerunt extincti. Cæterum q̄ diu vixerunt, mentis compotes inuenti sunt. Vnde euidens testimonium sumere potest ea secta, quæ negat rationalem animæ vim, in corde consistere. Palpitatio autem visceris hui⁹, plurimis per integram valetudinem accidere est visa. Quos omneis detractio sanguinis inuit, vnà cum extenuante victus & medicinæ rōne. Eorum tñ qui affecti sic fuerunt, nullus ad senectutem peruenit. Panniculus ambiens cor quomocunq̄ affectus, nullum affert periculum, nisi ipso inflammatione affecto, cor consortii lege afficiat. Porro supercalfactum cor, spirationem efficit magnā,

Syncope duplex.

Repente mori quibus contingat. Palpitatio cordis.

Cordis vulnus nisi ad ventrem vsq̄ pertingat, non statim perimit animal.

Rationalis animæ vis nō cōsistit in corde.

Palpitationi cordis conductio sectio venæ, tenuisq̄ victus & medicinaratio.

Cor incalescēs refrigeratūq̄, qualem edat spiritum.

densam, & celerem: calidumq; semper spiritum reflat. Contra refrigeratum, exiguam reddit spirationem, & raram.

C A P. I I.

Thorax proprium respirationis organum. Thorax dolens, exiguam densamq; edit respirationem.

Similiter etiam thorax (proprium ipsius respiratio- nis organum) aut primario, aut per consensum af- ficitur: à cuius quidem affectibus necessario respiratio vitiatur. Igitur ubi dolorificis affectibus infestatur, exiguam densamq; reddit spirationem: id quod etiam vi- cinis partibus, & iis quæ simul mouentur affectis solet accidere. Quippe interdum læditur respiratio, thora- ce non laborante proprio aliquo affectu, sed vel nervo aliquo orto ab spina: vel spina ipsa affecta. Eorum ve- rò affectuum qui propriè ad thoracem pertinent, qui- dam in ipsius musculis: quidam in membrana costas luc- cingente consistunt. Igitur intercostales musculi, qui in ima parte consistunt, grauiori q̃ externi dolore ob inflammationes cruciantur: facileq; membranæ sub- ditæ suam affectionem communicant: quemadmodum ubi ipsa primario aliquando affectu infestatur, interco- stalium musculorum partes internæ, similiter ei con- dolescunt. Verum exquisita pleuritis fit, ubi succingens costas membrana primario affectu laborat. Proinde dolor, vel ad iugulum, vel ad præcordia potest exten- di: ad iugulum quidem, superioribus eius partibus: ad præcordia verò, inferioribus inflammatis. Vehemens quoq; febris, huiusmodi inflammationem sequitur: quia sedes affecta & parum distat à corde, & cum pannicu- lo inuolvente ipsum, ac septo transuerso, cognationem habet. Iam verò inflammati intercostales musculi, mi- nus: cingens verò membrana, magis & tendit, & indu- rat arteriam. At in peripneumonia, nulla apparet talis durities. Porro effusa in vacuitatem thoracis sanies, in asperas pulmonis arterias recipitur, ac dein p̃ tussum excreta, naturam humoris qui peperit inflammationem, declarat. Etenim si bilis abundat, pallidum, aut flauum:

si atra

Pleuritis exqui- sita quoniam fit.

Pleuritidi que- adiuuat sympto- mata.

Sputorum diffe- rentiæ, pro va- rietate humo- rum gignentium pleuritidem.

strata bilis, nigrum: si pituita, spumofum, & candidas: si sanguis, rubrum sputū reiiicitur. Quòd verò ex thoracis capacitate aliquid expuatur, hinc liquet manifestissimè, q̃ si per vulnus thoracis penetrans, aqua multa infundatur, moxq; tussiendo expuatur, æger vel ex sapore mulsani esse deprehendet. Præterea in eo ipso spatio, quod inter pulmonem atq; thoracem est, purulenti & pus retinere, & ipsum tussiendo expuere, haud obscurè cernuntur. Nec verò defendi potest, sanguinè in ea vena quæ circa spinam est, còtentum, regurgitare ad cor, vt inde ad pulmones feratur, quod ex Erasistrati sermone colligitur. Nam è còtrariò, vena hæc, à dextra cordis auricula exorta, sanguinem secum defert, qui omnibus thoracis partibus, quæ circa octo costas * inferiores consistunt, alimentum præbeat. Etenim superiores quatuor non ab * ea, sed à vena perreptante ad iugulum, nutrimentum suscipiunt. Pus itaq; in thoracis capacitate còtentum, expirationis tempore, in pulmonis asperas arterias transmittitur. Siquidè respirationis actio, ad ipsum thoracem pertinet, pulmone nullam propriam habente motionem. Quippe qui per consequentiam dilatato thorace, pariter ipse attollitur: eo verò constricto, spongiarū manibus compressarum exemplo, rursus in sese residet. Proinde thorax vehementer constrictus, humorem qui in vacuitate subdita continetur, in asperas eius arterias compriimit. Nisi verò thorax admodum vehementer pulmonem omni ex parte compresserit, humor in asperarū arteriarum ora recipi haudquaquā poterit. Quamobrè quo robustior fieret compressio, animal adiuuixit tussim natura. Quæ naturale est symptoma, sternutatio, singultui, & nausæ, consimile. Verùm quia viribus opus est, quibus excitetur huiusmodi naturale symptoma, contingit frequenter per suppuratos affectus interire ægros, viribus antea prostratis, q̃ à validissima ce

Pus in thoracis capacitate contentū, expirationis tēpore, i pulmonis asperas arterias transmitti. Pulmo nullam propriam habet motionē.

Tussis quorūdam animalū indita. Tussis naturale est symptoma.

Pleuritidis in-
separabilia sym-
ptomata.

lerrimaq; cōstrictione thoracis fiat tussis, quam vires
ad eò imbecillæ præstare nequeunt. Porro ileparabilia
lateralis morbi symptomata sunt, febris acuta, dolor,
perinde ac si locus vel intendatur, vel pungatur: spira-
tio frequens & exigua, pulsus parvus, arteriam & du-
ram, & quodammodo tensam indicans, tussis magna
ex parte cum coloratis sputis, nonnunq; verò sine his.

Incoctæ pleuri-
tides.

Atq; hæc sanè incoctas vocant pleuritides, quæ vel ce-
lerrimè hominem rapiunt, vel longo temporis spatio
finiuntur. Sunt præterea alii lateq; cū febre dolores, p-
quos spirationem exiguam reddi est necesse, sed nullū
sputum redditur: vt in ea re nihil à pleuritide sine spu-
to constante differre videatur. Verum hi facillè ab illis
discerni possunt, quòd in his quidem nulla omnino tussis
molestet (quemadmodum in illis, qui absq; sputo in-
festantur pleuritide, in quibus sicca adest tussis) neq;
tensionem, neq; vllam duritiē pulsus referat, nec per-
inde acuta febre laborent, nec deniq; adeò difficulter
spirent. Sunt etiam nonnulli, qui extrinsecus presso i-
flammati loco, dolore sese fatentur. Atq; ii per sputū
purgantur minimè, quia ab initio nihil eius succi, qui
excitauit inflammationem, peruenire ad spatium tho-
racis consuevit. At inflammatione concocta, nisi pus-
prius discussum fuerit, ad cutim vsq; attoilicetur, incidi-
turq;.

C A P. I I I.

Phrenes.

Septū transuer-
sum separat
irascibile aīæ
facultatē (q̄ in
corde est) ab
appetitoria, q̄
inest iecinori.

TErminum quo thoracis pars inferior finitur, an-
tiqui phrenas vocarunt, fortè quia eo inflammata
to mēs læditur. At Plato ipsum septum appellat, q̄ ira-
scibilem animi facultatem, quæ in corde est, ab appeti-
toria, cuius sedes est in iecinore, distinguat, separetq;.
Cæterum recentiores septum transuersum id noīant,
vt Aristoteles succincturam. Qui sanè musculus spira-
tionis instrumentum quum sit, non immeritò, si afficia-
tur, ipsam lædit spirationem. Antea tamen q̄ quis ob
affectum septum deliret, frequētem atq; exiguum in-

festante verò delirio, multa varietate inæqualem spiritum reddit. Delirare tamen solent nonnulli, ob vitium consistens in ore ventriculi: sicuti per febres ardentes, pleuritideni, & peripneumoniam. At quæ ob septum transversum deliria oriuntur, non multum à phrenitide distant. Etenim per cæterarum partium affectus, & per ardentes febres, mitigari solet delirium, quoties morbus declinare videtur. Phrenitidis autem propria præcipuaq; nota est, ne in declinatione quidem febrium, delirium quiescere: quum nimirum non per consensum sub huiusmodi morbo cerebrum, sed primaria affectione laboret. Proinde paulatim affectus hic gignitur: nec repente subito, ut alienantur ægri, ut in aliarum partium affectibus: quin etiã prius quàm inualescat is morbus, præcedunt ipsi non pauca accidentia phrenitica: ut puta immensæ vigiliæ, aut somnus imaginibus variis turbatus, aut denique rerum oninium quæ faciunt agrestis quædam obliuio. Interdum etiam, qui phrenitici euadunt, maiori cum tumultu aut temeritate respondent, quum antea tamen fuerint mansueti. Atque si omnes, potu exiguo utuntur. Nonnunquam occipit dolore infestatur. Quum verò ad phrenitidem iam proximè accedunt, oculi euadunt eis vehementer squallidi, aut ex altero ipsorum acris lachryma effunditur, ac dein lipitudo innatat, & venæ intumescunt sanguine, sanguis quoque stillat è naribus. Quo tempore nihil quod exacte ad prudentiam pertineat, respondent, & floccos uellunt, & festucas carpunt, atque aridiori febre, cui non ita magna in alterutram partem mutationes accedunt, torquentur. Ad hæc lingua quoque illis aspera est, nonnulli: auditu falluntur, atque interdum iacent cogitabundi. Quinetiam dispositione dolorifica affecti, vel acius premente aliquo, eam handquaquam sentiunt. Ergo hoc modo per cerebri affectum, paulatim phrenitis gignitur. Ab aliarum verò partium nulla, perpetuum deli-

Deliria quibus ex causis oriuntur.

Deliria ex septo transverso orta non multum a phrenitide differunt. Phrenitidis nota præcipua quæ.

Phrenitidem præcedentia symptomata.

Phrenitidis instantis symptomata.

Delirium nullum perpetuum, excepto phrenitico, et quod oriuntur a septo transverso.

Delirium septo
transuerso or-
tū, qñ a phre-
nitide distin-
guatur.

rium oriri potest, dempto solo septo transuerso, cuius
vitio excitatum delirium, parum à continuo distat : à
phrenitide tamen distinguitur, & ex symptomatis, &
ex sanguinis destillatione à naribus, ex ipsaq; spiratio
nis specie. Siquidem spiratio phreniticorum ē magna,
& ex longis facta interuallis: inæqualis verò, vbi à se-
pto delirium oritur. Ceteræ p̄cordia * reuelli, septi
transuersi illico ab initio affecti, proprium indicium est:
id quod affecto cerebro, posterius accidit: videlicet nō
incipiente affectu, sed vbi formatus iam fuerit. Calor
quoq; circa caput & faciem, vehementior est iis, qui
ob cerebri vitium delirant.

C A P. IIII.

Oesophagus.
Stomachus.
Gulæ vsus du-
plex.

IIus partis quæ inter fauces & os ventriculi me-
dia est, & quæ oesophagus, stomachus, & gula dici-
tur, duplex est vsus. Vnus, q̄ veluti via sit eorum quæ
deuorantur: alter q̄ circa vtrunq; progressum tam de-
uoratorum, q̄ eorum quæ à ventriculo in os reijciun-
tur, aliquid moliri videatur. Nam quum gemine insint
ei tunicæ, altera ad cibi potusq; deglutionem vitur:
altera ad eam, quæ vomendo fit, expulsionem. Proin-
de rationi est consonum, duo esse affectuum ipsius ge-
nera: vnum quidem quod veluti viæ tum ingestorum,
tum vomitione reiectorum ei accidit: alterum verò,
quod ei, veluti vtriusq; actionis instrumento, enenire
potest. Constat itaq; eorum duorum vsuum, alterum
quidem semper esse necessarium: alterum propter oc-
casionem quasdam. Igitur eorum symptomatum quæ
gulam tanq̄ viam infestant, genus vnum est, quum ob
tumorem aliquem præter naturam, angustior ipsius
meatus redditur: alter, quum perficere proprias actio-
nes nequit. Accedit etiam gulæ angustia asciticia, vbi à
vertebris intrò luxatis comprimitur. Vbi verò gula
inflammata, non à vicinis partibus conciliata, sed pro-
pria familiariq; angustia torquetur, grauissimus tūc in-
ter deglutiendum infestat dolor, accedente quoq; perq̄

Gulæ inflama-
tæ indicia.

difficili transitu: præsertim si supinus, q̄ laborat, iacēs, deglutire quippiam conetur. Nam erecta figura transglutitio multò facilius perficitur. Nec verò puto late-
re vos, partium inflammatarum nullam non do- ere, vbi suo munere fungitur: contra, mitigari dolorem, vbi ab agendo destiterit. Quum autem gula sentiendi facultate sit prædita, ipsam quoq̄, veluti auctarium in ditionem, in vsum euocare oportet, quo plenius affectus illius dignoscantur. Quare iuuat ægros interrogare, quid nam deglutiendo sentiant. Quippe imbecillitatē nonnunq̄ percipere se fatentur, vt longo vix temporis spatio per gulam transeant ingesta. Interdum ea in media via hære- & coerceri aiunt. Horum primum, actionis infirmitatem: alterum, particulæ cuiuspiã angustiam indicat. Verum vtriusq̄ differentias ex reliqs accidetibus intelligere licet. Nam in imbecillitate quæ ex sola intemperie citra tumorem sit præter naturã, ingestorum in transitu tarditas, & æqualis, & sine dolore, & in supino quidem decubitu, maior: ceruicē verò erecta, minor, sine vllò angustia sensu, acciderē solet. Vbi verò cum tumore coniuncta imbecillitas est, nã quãpiam particulam angustiorē cæteris efficiet: atq̄ per eam ipsam tardior erit transitus. Quòd si tumor fuerit inflammationis aut erysipelatis particeps, accedet ei dolor, & sitis, & multi caloris sensus, febrisq̄ non admodum ardens, quæ siti proportionē haudquaquã respondeat. Si verò tumor aliquis ex non ita calidis fuerit, tum citra febrim, & calorem, & sitim, deglutitionis inæqualitas aderit, retentis cibis i parte aliqua. Porro affectus dolorificus gulæ, iuxta dorsum q̄q̄ sentitur, quum gula incumbat spinæ. Iam verò, si ob ruptum aliquod vas ipsius gulæ, sanguis aliquando vomatur, dolor statim sentitur iuxta locum vbi talis ruptio contigerit. At reserato ore vasis, nullus percipitur dolor, quare, à ruptione atq̄ erosione vasis distingui-

Inflammatq̄ omnes partes doli-
lēt vbi suo fun-
guntur munerē:
mitigantē do-
lor, vbi ab agē
do destiterint.
Gulæ sensu, cet
iudicio, cē vtē-
dum, ad digno-
scendos affe-
ctus illius.

Referatio nasci-
quitte a ru-
ptione atq̄ ero-
sione differt.

tur: ac præterea, & neq; ictus, neq; casus hæc profusio-
nem præcescit, id quod rupto vase videre est. Quam
ob solam sanguinis plenitudinem, vasa interdum dis-
rumpi possunt. Quæ verò per erosionem fit eiection san-
guinis, vlcere præcedente contingit. Fit autem vlcus,
vel rupto vase, vel vitiosorum humorum influentia:
id qd in cute qd sæpenuerò accidit. CAP. V.

Vicus vnde
fiat.

Os ventriculi
quæ inferre so-
leat sympto-
mata.

Oris vetriculi
affectus prima-
rij.

Os ventriculi (quod veteres ob accidentia quæ in-
ducit, cor nominabant) non solum syncopem,
sed conuulsiones, sopores, morbum comitalem, atq;
melancholiam inferre solet: nec nō symptomata, qua
lia per suffusiones infestant. Quos quidem affectus om-
nes, consentientibus ei cæteris partibus, in ipso fie-
ri contingit. Quippe ad propriam eius rationem perti-
net, * tum fastidire, tum natantes cibos corrumpere.
Nam si cibi in ventriculi fundo firmentur, præcipuè si
suapte natura non facile corrumpantur, * neutrum
ex illis accidit. Porro quum grammaticus quidam
iuuenis, quoties vel nimis vehementer docebat, vel
cogitabat, vel esuriebat, vel irascebatur, morbo co-
mitiali, ob nimis acutum sensum oris ventriculi, corri-
peretur, tertia vel quarta hora panem optimè præpa-
ratum ei exhiberi iussi, solum quidem, si non sitiret: si
verò siti cruciaretur, ex vino madidum, & quidem al-
bo, modiceq; astringente. Nam huiusmodi vinum,
vt vires addit ventriculo, sic minimè tentat caput, qd
solent vina vehementia. Dein verò singulis annis bis,
aut ter, picram ex aloë ei exhibens (quod quidem me-
dicamentum totum ventrem ab excrementis liberat, *
ipsumq; ad actiones proprias corroborat) ita restitui
hominem, vt reliquum vitæ integra sanitate frueretur.

Vinum albū,
modiceq; astri-
gens, uireis ad-
dit ventriculo,
& minime ten-
tat caput.
Picræ ex aloë
vſus.

Complures etiam nō solum inſomnia & ſomni tumultuosi moleſtant, ſed amentia quoq; propter vitioſum humorem, collectum in ore ventriculi. Iam verò ſtatu letum illum hypochondriorum morbum, omnes pro-

Hypochon-
driacæ melan-
choliæ sympto-
mata, & ſigna,

fessi sunt, tristitiam, desperationem, atque mœstitiā inducere, nihilq; ad melancholiæ accidentia reliqui facere. Laborantes autem eo morbo, post cruditates, diutius accidentibus multò vehementius cruciantur: ac quidam ipsorum quoque spleneticī sunt. Quocirca coniciendum est, ex hoc etiam viscere vitiosam saniem in ventriculū relegari. Ergo ea accidentia quæ cerebrū afficiunt, vel oculos, vitiosorum humorum vaporatio nem sequunt. At syncopa quæ vitio stomachi, hoc est, oris ventriculi, accidit, ob dolorum ipsius proprietatē exolutionē inducit, fortasse verò eius quæ itēperie ad cor pueniente. Quemadmodū ubi cor vehemēter intemperatum est, vires agminatim cadunt, oportet. Similiter etiam citræ, hoc est picæ, mulieribus accidit, ore ventriculi affecto. Nausea præterea, cardialgia, & singultus, inter huius partis affectus debēt annumerari. Afficit autē ventriculi uniuersa capacitas, similib; dispositionib; quibus & os illius: cæteræ nō pinde uehementibus. At quia coctionis opus perficitur in partibus oris subditis, necessum ē eas ipsas partes, quum malè dispositæ fuerint, cruditatis causam existere. Quòd uerò sanguis à iecinore atque liene effluens, uacuari per ventriculū possit, sanè de hac re latius alibi sumus dicturi.

C A P.

V I.

A T Iecori duplex etiam genus morborum accidit, vnum à sola intēperie, citra tumorem præter naturam: alterum, ubi unā cum itēperie, tumor quoque adest, ut inflammatio, erysipelas, scirrhus, inflatio, & obstructio à crassis & viscosis humoribus, in extremis uasorum partibus, quæ à uena portæ exoriuntur, facta. Verū in iis laborans grauitatem percipit in dextra præcordiorum regione. Quòd si halituosus quoque spiritus, cui nō pateat exitus, illic concludatur, non solum grauitas, sed tensionis quoque sensus sequet. Meminisse autem oportet, octo numero musculos per

Syncopa vitio oris ventriculi accidens, quomodo vires exoluat.

Citræ sunt ore ventriculi affecto.

Nausea.

Cardialgia, Singultus.

Sanguinem à iecinore & liene vacuari per ventriculū posse.

Iecori duplex genus morborum accidit.

abdominis regionem extendi, quatuor comprehēſos coniugationibus. Quarum prima ex musculis constat rectis, per totum carneis, à pectore ad pubis ossa protēſis. At reliquarum trium cōiugationum musculus, vsq; ad rectorum contactum, carnea substantia constant: vbi verò primū illos attigerint, in membranas nerveas degenerant. Horum itaq; musculorum coniugatio vna, quæ quidē reliquis est exterior, à thorace oblī qua deducitur, in anteriores partes descendens. Altera huic opposita, ab infernis exorta partibus, obliqua ad anteriores ascendit. Huic tertia musculorum coniugatio subiicitur, qui trāſuerſum habent positum, atq; peritonæo innectuntur. Rectorum igitur musculorum tumores præter naturam, oblongi, ac per totum extensi videntur: quapropter haud obscura est ipsorum dignotio: sicuti & eorum qui obliqui à thorace descendunt. At multò difficilior est notitia musculorum, qui iis sunt subiecti: difficillima verò transuerſorum. Quis igitur iecur sub peritonæo à tribus ex illis musculis cōtegatur, fieri non potest, ut tactus aliquam ipsius notitiam præſtet, nisi vel magna in ipso inflammatio oriatur, vel incumbentes ei muscoli, admodum extenuentur. Iecur tamē declarant affici, in dextera præcordiorum parte grauitas, dolor tota præcordia retrahens, atq; ipsius ad iugulum vsq; extensio, exigua tussis, linguae color, i primis quidem ruber, deinde uerò niger, ingens cibi fastidium, inexplēbilis sitis, vomitus tum synceræ bilis, tum ei quæ ouorum luteis assimulatur: quæ aliquando æruginis quoq; colorem refert. Alius quoq; astringitur, nisi vnā cum uisceris huius imbecillitate, inflammatio ipsa acciderit. Erysipelatis accidentia his ferē similia sunt. Sed insuper febris quoq; cum uehementissima siti laborantes, cruciat. Etenim, iecoris ac uentriculi flammæ dispositionibus ardentes fires solent superuenire, quas etiam excitari contingit

Abdominis
otto musculi,
quatuer com-
prehensi con-
iugationibus.

Iecoris situs.

Iecur inflāma-
tum quæ indi-
cent,

Hepatis erysi-
pelate affecti
accidentia.

in pulmonis inflammatione participe erysipelatis, * quæ admodum etiam per uniuersum corpus, ob putredinem biliosorum humorum immodicè effervescentium. Verùm quæ aut iecoris aut uentriculi occasione eueniunt, eæ febres, omnium sunt vehementissimæ, ac magna ex parte in marasimum degenerant. Quæ in simis iecoris partibus eueniunt inflammationes, vt magis quàm illæ quæ in eius gibbo sūt fastidium, nausæ, uomitum biliosum, ac sitim ingentem inducunt: sic è contrario hæ, maiori quàm illæ inter spirandum dolore laborantem infestant: magis quæ tussim excitant, atque dolorem vsq; ad dextrum iugulum, adeò ut detrahi videatur, extendunt. Vtriq; autem parti, quum dolor adest, nonnunquam nothæ costæ consentiunt. Soli verò iecinori est proprium, ut tumoris cumulum comprehensim habeat circumscriptionem. Quare durus in ipso circa principium tumor (quem scirrhom vocant) multò euidentiùs ob duritiem dignosci potest, quàm inflammatio. At verò tractu temporis, quibus magis increseat scirrhus, non tamen equè faciliè deprehendit, intercipiente scilicet indicium aqua inter cutem, quæ & illico scirrhum sequi consuevit, & nisi afficiatur hepar, gigni minimè potest. Non tamen semper ob primariam excitatur affectionem illius, & si hoc frequentissimè accadat. Etenim quia hepar facultatis sanguificatricis est instrumentum, consequens est, ut ipso uitiato, actio quoque eius vitietur. Accidit tamen interdum, vt ob intemperiem aliquius particulæ eaz quæ aut per meseraicas, aut cauam venam, cum illo commercium habent, ipsum quoque refrigeretur. Porro simarum partium uenæ, ab ea quæ in porta est, exortæ, in tenuissimas extremitates finiuntur: ad quem similiter locum, aliæ quoque uenarum extremitates, à concaua uena in gibbas uisceris partes distributarum, perueniunt. Cibus igitur uniuerso corpori distributus, ex omnibus simarum partium uenis exi-

Febres ardetes a vetriculo, & hepate ortæ, in marasimum sepe degenerant. Simis hepatis inflammationis quæ ad sint symptomata.

Gibbis hepatis inflammationis quæ symptomata oriatur.

Hepatis scirrhus illico sequi hydrops consuevit.

Hydrops gigni non potest, nisi afficiatur hepar.

Hepar est sanguificationis principium. Venarum hepatis exploratio.

ens, ad gibbas partes per dictas extremitates transumitur. In qua quidem uenularum conspiratione, nonnulli fieri obstructions existimant. Ergo ob refrigerationem iecinoris, in sanguinem mutari cibus non potest, refrigeranturq; cum illo totius corporis uenæ. Sæpe numero etiam, nullo tumore apparente in iecinore, æger aqua inter cutem corripitur, vel ob uitium lienis, uel ieiuni, uel alicuius intestini tenuioris, aut mesenterij, aut pulmonis, aut renū, aut ob imodicum hæmorrhoidum, aut mensium profluuium, aut ob suppressionem menstruum, aut ob alium uteri momentaneum affectum. Ex intempestiua præterea frigida potatio iecur affatim refrigeratum, statim aquam inter cutem inducit. Ac sic affecti, uehementi ciborum desiderio tenentur, quod solent omnes quibus os uentriculi fuerit perfrigeratum.

C A P. V I I.

Porro utrum semper in morbo regio locus affectus sit hepar, an alia præterea dispositio hunc affectum efficere possit, deinceps considerandum. Si quidem uidemus nonnunquam iecinore hæud male affecto, per morbi iudicationem effundi pallidam bilē per uniuersam cutem. Quinetiam citra morbi iudicationem interdum aliena quadam corruptione, qualis ob ferarū, morsum contingit, quandoq; sanguis in bilem mutat. Fieri autem potest, ut iecinoris naturali temperie mutata, humores huiusmodi uitio afficiantur, & quidem citra obstructionem, aut inflammationem, aut scirrhum. Ob splenis quoq; vitia, corporis color uitiat, sed multo nigrior fit, q̃ ob affectum hepar. Quum igitur sanguinis generatio hepatis munus existat, nullam sanè aliam causam huiusce generationis dicemus esse, à facultate ipsius uisceris propria. Cæterum omnium facultatum essentia, in peculiaribus partium temperaturis consistit. Proinde si hepar ad aliquam octo intemperantiam aliquando labatur, accidit facultati ipsius

Hidropis causæ diuersæ.

Cibi desiderium vehemens inesse iis, quibus os uentriculi fuerit perfrigeratum.

Sanguis q̃ in bile mutetur. Color corporis quot modis uitari possit. Lienis, q̃ hepatis, vitia, nigriorem colorem reddunt. Essentia facultatum, in propriis partium temperaturis consistit.

noxā, quæ peculiariter illi intemperantiæ debetur. Igitur calidæ iecinoris intemperantiæ, quum contentos in ipso humores, tum eos qui suggeruntur per mesenterii uenas, adurunt, & assant: frigidæ autem, succosiani in ipso contentos, crassos, ad fluxumq; contumaces efficiunt. Quod uerò ad ipsum suggeritur, pituitosum, crudum, & semicoctū reddunt. Rursus aridæ in temperantiæ, sicciore crassioresq; humidæ uerò tenuiores, aquosioresq; humores efficiunt. Igitur quum alui sedimina, aquæ, in qua nuper mactatæ carnes fuerint ablutæ, similia uideris, iecur esse affectū existimabis. Nominantur autem præcipuè hepatica, quæ ob ibecillitatem ipsius deiciuntur. Vt autem tenue excrementum & saniem referens, infirmi iecinoris gignere sanguinem non valentis: ita id quod simulatur fæci, superassantis sanguinem hepatis est indicium. At uerò nonnulli primò quidem, saniem, & cruenta quædam: dein tractu temporis, crassum ac melancholicum sanguinem, postremo atram quoq; bilem, atq; syncerā, deiciunt. Qui affectus interdum ob frigidam intemperiem, citra febrem, incipit: ac tunc quidem tenuis sanies excernitur: dein uerò progressu temporis, corrupto in uiscere sanguine, febris solet superuenire. Porro nonnulli eorum qui ob frigidam intemperiem laborare inceperunt, non solum non amittunt cibi cupiditatem, uerum etiam multo magis q̃ antea appetunt. At calidas intemperies, nūq̃ conuitatur cibi cupiditas, sed fastidium graue, sitis uehemens, febris insignis, atque prauorum humorum vomitus. Sciendum autem est, singulis nostri corporis partibus quatuor naturales facultates inesse: quarum prima appellat attractrix, quæ peculiare parti succos, alendi ipsam gratia, & appetere, & attrahere potest. Altera deinde est, quæ alteratrix dicitur, qua succus attractus, similis euadit ei, quæ nutritur, particulæ. Huic aliæ duæ ministrant: retentrix

Hepatis intemperantiæ singulis qui effectus tribuatur.

Iecore affecto qualia excrementa excernantur, Hepatica excrementa quæ dicantur.

Calidus intemperies nuncq̃ comitatur cibi cupiditas. Facultates naturales quatuor inesse singulis nostri corporis partibus.

Facultatum singularum lésiones in hepate, quæ signa indicent.

Signū alicuius dī, quod ab eo proficiscitur, rā quā a causa.

Partes aliquas purgari interdū per hepar.

Particula oīs agit secundum proprietatem temperamēti.

nempe, quæ suo munere fungitur, quando pars succū attractum concoquit, donec eum, in suam ipsius naturam conuerterit: & expultrix, quæ post absolutam coctionem, excernit id quod inutile est, atq; excrementum vocatur. Si igitur in iecinore attractrix facultas, quomodocunq; afficiatur, cibum quem confecit ventriculus, atq; in chylum conuertit, relinquet, vt liquidus excernatur per aluum. Atq; hoc sanè ipsius facultatis affectæ erit signum. Siquidem quicquid ab aliquo proficiscitur, tanq; à causa, id etiam esse illius signum constat. Vbi autem hepar integrè valet, mesarei venis veluti quibusdam manibus, quæ ex uentriculo ei cibū afferant, vtif. Cæteræ vbi vel inflammatio vel erysipelas afficit mesenterium, nō solū qualia per iecinoris imbecillitatem excrementa deiici consueuerunt, planè excernuntur, sed apparet etiam veluti ab inflammatione, sanies quædam illis admixta. Vt autem non potente ob imbecillitatem hepate succum à ventriculo attrahere, attractrix facultas afficitur: sic vbi retinere non valet, retentrix vis infirma putanda est: ob idq; prinid quidem cructa sanies excernitur: dein crasior & fæculentior. Similiter aliæ quædam excretiones contingunt, non quidem ob imbecillitatem, sed ob expultricis facultatis robur, ratione plenitudinis, idq; interdum per integram valetudinem. Sic plerunq; pars aliqua quum affecta est, per hepar purgatur, viribus ipsius iam robustioribus factis. Quemadmodum autem retentrix facultas, dū imbecillior est, ac rē quæ ipsam grauat retinere non potest, vis expultrix id quod infestat euacuat: sic infirma expultrice, retineri quædam res solent, facultate retentrice non vsq; ad eò grauata. Nam in quolibet instrumento aliàs alia facultas vel fiet fortior, vel imbecillior: facta relatione ad actionem. Etenim omnis particula, secundum temperamenti ei * perpetuò inest, agit proprietatem. Iam verò int-

terdum etiam contingit, vt ob folliculi fellis imbecillitate, ad se bilem minimè attrahere valētis, impurus vagetur sanguis per vninerſum corpus, aliaq; oriatur morbi arcuati ſpecies præter illas, quas ſuperius expoſui. Qui folliculus ſic etiani nonnunq̃ impletur, quem admodum vrinæ veſica, vt euacuari non poſſit, aut q̃ obſtructus eſt, aut quia ſecretoria ipſius facultas eſt imbecillior. Veluti etiam quum obſtructis aut iſſimis vaſis, quæ ab ipſo extenduntur in hepar, bilioſum humorem interdū attrahere non poteſt. Proinde excrementorum proprietatem in morbo regio cōſiderare, per q̃ neceſſarium eſt. Porro quibus citra febrim morbus regius accidit, vrgente in dextra præcordiorum parte grauitatis cuiuſdam ſenſu, iis omnibus aperiens obſtructiones cibis & potibus, & medicamentis extenuatibus, deinde medicamentum quod bilem ducere poſſit, exhibens, eorum plurimos vna die ſanitati reſtitui. Qui verò purgatione liberari non potuerunt, iis ruruſus valentiore ad aperiendum data portione, medicamentum quod vehementius purgaret, exhibui: ſic, ut ſub purgationis ſine, cœrulea magis q̃ flaua bilis cum acri mordacitate ſecerneretur. Atq; in iis conieci fellis folliculum ſimiliter affici, vt ſolet vrinæ veſica, vbi magna humoris copia diſtenditur, quā excernere nequit, interdum ob excretorię facultatis imbecillitatē, interdum, quòd ob grauem ſomnū, vel negotia quæpiam, ultra q̃ par eſt, vrinam ſupprimens, dein ab ea proſternatur, mirum in modū intenta. At folliculus fellis, *

Morbi regii
cauſa.

Excrementorum
proprietas in morbo
regio conſideranda.

Regii morbi
abſq; febre in
uacuis curatio.

quum inueter nihil ad excretionem à facultate animali, vnicum habet imbecillitatis principium, veluti cætera quoq; naturalia inſtrumenta, à partibus intemperie ortum.

GALENI PERGA

MENI DE LOCIS AFFECTIS.

LIBER SEXTVS.

CAP. I.

Lien sanguine
alitur melan-
cholico.



LIEN Autem, quum ex hepate san-
guinem melancholicum trahat, quo
ipse postea nutritur, sanè si in eo fa-
cultas attractrix facta sit ibecillior,
sanguis ex iccore impurus in vniuer-
sum corpus transmittitur, ac proin-

de color nigrior euadit. Quin etiam exemplo hepatis,
sæpenumero ex se reiiicit excrementa quædam: ita vt
per vomitum, cui nausea accedit, nonnunq̃ excernatur
melancholicus sanguis: qui interdū etiam solet per in-
ferna descendere. At huiusmodi vacuatiōe suppressa,
nonnulli melancholica tristitia afficiuntur, cibosq̃ auī
disimè concupiscunt: idq̃ præcipuè, si valde fuerint
acida, quæ excrementa ad ventriculum transferunt.
Si autem alia melācholici humoris corruptio accidat,
subuerti, deiiciq̃ appetētiam videbis. Quod verò indu-

Liene idurato,
illicq̃ cōsentiē
te iecinore, aq̃
inter cutē orit̃.
Regius morib⁹
permistus.

Frigida intēpe
stiuē exhibita,
solet aquā iter
cutem efficere
si præcipue vi-
tiosa fuerit.

Aquā inter cu-
tem gigni non
posse, nisi ad

rato ipso, aqua inter cutem effundi possit, consentien-
te iecinore, iam antea est dictum. Quin etiam laboran-
te aliquando utroq̃ viscere, regium morbum euenire
conspeximus, nigriore q̃ pro consuetudine subsequen-
te colore: ita vt videretur flaua bilis esse fuligini admi-
sta. Quemadmodum autem vitiosa aqua & frigida, *
si confertim & intempestiuè bibatur, solet aquam in-
ter cutem inducere (nocet enim sic ingesta interiorib⁹
partibus, maximè verò iis, quæ tum temporis fuerint
imbecilliore) sic ob refrigeratum vnā cum tumore
lienem, vtputa si adsit scirrhus, vel citra tumorem, vt
per iam nuper dictam aquæ potionem, aqua inter cu-

tem etiam euenire consuevit. Cæterum nisi ad hepar usq; ipsa refrigeratio peruenerit, aqua inter cutē subsequi potest minimè.

C A P. I I.

Dysenteria exquisita, intestinorum vlcus existit. Qui sanè affectus, non gignitur affatim, aut subito, vt ille quem vitio hepatis accidere dixim⁹: sed protinus quidem ab ipsi⁹ initio, bilis mordax excernitur, quam deinde interaneorū abrasiones sequuntur: postea verò paulum cruoris deici simul videtur, quando videlicet ipse affectus iam esse dysenteria censetur. Quā itaq; huiusmodi abrasiones solæ excernuntur, considerandum est, num pingue quippiam simul cū eis deiciatur. Ita enim vlcus in crassis intestinis consistere, existimandum est. Vbi verò cruorem quoq; excerni videris, intueri oportet, vtrum is reliquis excrementis adeò permixtus sit, vt vniuersus vniuersis misceatur: an pars eius aliqua reliquis supernatet. Etenim si admixtus sit, in superioribus: si verò supernatet, in humilioribus intestinis vlcus esse portendit. Idem etiam & in abrais excrementis videre est, verum non ita manifestè, vt in cruore. Similiter crustula, quod nam intestinum sit vlceratum declarant, tum ex essentiae proprietate, tum ex modo, quo vel misceri reliquis excrementis, vel vni eorum parti supernatare videntur. Nec yerò mediocriter conducit ad curationem nosse in qua intestinorum parte consistat vlcus. Nam si in superioribus intestinis sit, ab epotis medicamentis præsidium petendum est: sin verò humilioribus hæreat, clysterē subiicere magis cōuenit. At huiusmodi dysenteriae ab iis quæ ab hepate profluunt, sic discernuntur. Nam ab initio tenuis sanies sanguinis ab hepate excernit: dein de aucto malo, crassus humor fœcibus vini haud absimilis. Præterea, in hepaticis excretionibus, nihil abrasum expellitur, atq; interdum duorum, aut trium dierum intervallo, supprimitur euacuatio: dein rursus ma-

hepar refrigeratio peruenerit.

Dysenteria est vlcus intestinum.

Dysenteriae causa,

Intestinorum; quæ nam exulcerata sint, crassiora ne, an tenuia, ab excrementis dignoscitur.

Intestinis superius exulceratis, epotis medicamentis succurrere oportet: infimis, per clysteres iniectos.

Hepaticum fluxum a dysenteria quò distinet oportet.

*Tinesmi defici
ptio.*

*Colicis dolorē,
nephriticūq;
circa p̄cipiū,
eandē fere me
dendi ratiōne
desyderare.*

*Colici dolores
a nephriticis
quomō distin
guantur.*

*Nephriticorū
vrinæ quales.*

*Colica excre
menta qualia.*

lum reuertitur, atq; excernuntur excrementa priori-
bus multò peiora. Id verò per intestinoꝝ vlcera haud
quā apparet. Quippe in iis, neq; affatim, neq; ex lon-
gis temporis intervalis, laborantes deiicere consueve-
runt. Porro vlcera quæ in recto intestino oriuntur (ti-
nesimum vocant) vehementi quidem tensione, & p̄p̄-
ta deiiciendi cupiditate infestant: paucis admodum
sequentibus excrementis: quæ quidem ab initio pitui-
tosa & pingua: progressu verò temporis, etiam ramē-
ti specie deiiciantur: sed per totum morbi spacium, iis
quæ à supernis descendunt, minimè misceri videtur.
Iam verò, vt doloris colici, nephriticiq; distinctio, in
initio difficilis est, sic circa id tempus, non ita magna
præsidiōrum differētia desyderatur. Cæterum & nau-
sea, & vomitūs per id genus affectus vrgent, sed mul-
tò grauiores, & magis assidui, dolēte colo. Euomūtq;
ita laborantes pituitosa quædam, atq; corrupta: hac
in re longè superantes nephriticos: ac retinent etiam
magis excrementa, ut ne statim quidem, neq; etiam
ructum excernere possint. Sæpenumero veluti circui-
re videtur dolor, modò hanc, modò illam partem in-
festans. Nephritici verò dolores, eodem in loco stabi-
les, infestant iugiter. Quum itaq; dolor in loco fuerit
altiore renibus, manifestum colicæ indicium porten-
dit: si verò circa sedem renum infestet, vrinæ consyde-
randæ sunt. Nam nephritici ab initio dilutas purasq;
reddunt vrinas: dein sequentibus diebus, crassum ali-
quid in ipsis subsidere videtur: dæmum arenosæ min-
guntur. At in colica, si quid ab aluo deiicitur, id statuo-
rum quodammodo est, & sæpenumero aquæ superna-
tare consuevit, similem habens bubulo stercore consi-
stētiam. Quin etiam cruciatus colici, q̄ nephritici, mul-
tò magis lenientibus mitigantur clysteribus. Atq; in-
terdū euenit, vt frigido aliquo humore simul eiecto,
illico quiescāt. Quare ipsum præsidiū mitigans, erit
etiam cura-

etiam cueatiuum, atq; prognosticum. Nephritici etiā dolores, cum vrina exeunte lapide, simul & soluūtur, & locum affectum indicant. Vt autem perseuerante dolore vtraq; pars eisdem auxiliis indiget, sic tempore subsequente ad præseruationem oportet diuersa p̄sidia adhibere. Quum autem omnia intestina ordine quodam à ventriculo ipso descendant, atq; omnium suprenum ieiunum sit: deinde quod tenue vocatur: postea cœcum, quod vsq; ad ifernas partes extendit: deinde colō, quod ad superiores reuertitur partes, ita vt sæpenumero hepar & lienem attingat: satis mirari non possum, quo pacto vehementissimos, quosq; dolores, quacunq; in parte consistant, ab omnibus colo tribuantur. Igitur ob frigidum crassumq; , aut etiam humiorem viscidum, aut ob flatulentum spiritum, in corpore crasso densoq; alicuius intestini inferioris genitum, sed egredi nequeuntem, excitari dolor consueuit: vehemens quidem, ob intemperiem atq; tensionē corporum in quibus hæret impactus: longus verò, q̄a difficulter vacuatur. At dolor ille acerbissimus, quem ileō, voluulū, & chordapson vocāt, sublimiores intestinorum partes infestat, adeoq; impellit ad vomitum, vt nonnulli stercus per os reddentes, miserrima tandem morte moriantur. A quo affectu vix aliquis vnq̄ euadere potuit. Itaq; non ab re visum est medicis antiquioribus, vel ab inflāmatione, vel ab obstructio- ne aridi stercoris, oriri huiusmodi tenuium intestinorū affectum. Sunt & alia symptomata, quæ & intestinis & vētriculo simul affectis euenire creduntur, vt quas liē- terias cœliacas nominant, vbi materiæ ipsæ minimē mordaces existunt. Etenim ut mordaces ob mordēdi vim omnia intestina ad excretionem excitant, sic nō mordaces, intestinorum imbecillitatem sequuntur: quia retinere contenta ne exiguo quidem tempore possunt.

**Intestinorum
ordo.**

Dolor colicus

**Ileos:
Voluulus.
Chordapson.
Voluulo labo-
rantē vix ali-
quem euasisse.
Voluuli causa.**

**Lienteriz cœ-
liacæ.**

Igitur si nephritis repēte incidat, lapide notatu digno, uel in renum aliquo, uel i ureteris etiam impacto, dolorem excitabit haud ab similem colico: uerū distinguetur ab eo, per illa quæ in capite præcedenti accidere colo affecto iam diximus. Vbi uerò ex iis quæ in urinis resident, aut ex lapide excreto, discerni ipsi dolores possunt, quæstioni nullus locus relinquitur. Porro ubi dolor alterius renis, cum horrore inordinato & uario, necnō inordinata febre affligit, si per pro-

Nephriticus dolor cum horrore inordinato, ac febre et inordinata affligens, quā abscessum significat.

hum decubitus atq; in alterum lat^o permutationem, in ipso rene dolente suspensi cuiusdam ponderis sensum æger percipiat, abscessum iam concretum esse conuincere oportet. Quo concocto, pus mixtum, ut laborantem à dolore liberat, sic ulceris in rene periculum affert: quod nisi illico cicatrice inducatur, ægrè curationem recipiet. At perseverantis ulceris notæ ex urina haud obscurè deprehenduntur. Adde q; laborans creberrimè in affecto rene dolorem sentit: atq; interdum cum urina exiguum pus ueluti ab ulcere excernitur. Similiter ramentum nonnunq; cum urina excerni uidetur: atq; interim sanguis quoq; qui erosi iam ulceris est indicium. Quanquā rupto aut referato aliquo uase, sanguis potest etiam profluere. Verū efficacissima exulceratorum renum est coniectura, si

Renis exulcerati indicia.

Carunculae cum exigua quædam carunculae cum urina excernantur: urina excreta, efficacissimæ ulceratorum renū sunt notæ. Pili similia excrementa, quæ in urinis cernuntur, in uenis gigni.

utpote quas renum essentia partes, easq; ob uehementem ulceris erosionē auulsas esse, constat. At quæ unā cū lotio excernuntur pilis similia, probabilius mihi uisum est, ea in uenis, q̄ in renum capacitate, gigni: idq; ex crassa lentaq; materia, quam calor calfecit excauitq; cuius sanè affectionis per diuretica * speraui curationē futuram: nec unq; spes me fefellit. Iam uesica, ubi longo tempore acres per ipsam urinæ transeunt, ulceribus affligi solet. Est & alius renum affectus quo tenuis sanies sanguinis mingitur: cuius quidem existet

causa, aut ipsorum imbecillitas renum: aut maxima relaxatio eorum meatuum, per quos ex uena caua in renes percolatur urina. Atque ad renes quod pertinet is affectus videtur, quem alii matellæ hydropem, alii profusum urinæ, alii diabete[m], alii diplacon vocant: qui certè quod rarissime accidit. Quo morbo affecti, inexplibili siti vexantur. Quare & exuberanter bibunt: & reddunt totum id quod biberunt, minimè à sua qualitate mutatum. Hic igitur renum vesicæque affectus, similis est læuitati ventriculi, intestinorumque. Igitur ut ex ventriculo iecur per mesenterii venas, veluti arbores à terra per radices, alimentum ad sese trahit, sic etiam renes sibi quicquid in venis est aquosum, alliciunt. Cæterum vesica non trahit à renibus: quemadmodum neque intestina à ventriculo: sed renes quidem per vreteras excernendo in vesicam mittunt: ventriculus autem in ieiunum, per intestinum ab Herophilo dictum dodecactylum. Proinde diabete[m] causa, renum imbecillitas, non potentium diutius continere urinam, censenda est. Verum enimvero obiciet aliquis, si imbecilli sint renes, quomodo fieri potest, ut urinam ad sese tam celeriter attrahant? Cui quidem respondere licebit: quemadmodum canina appetentia, in ventriculi ore consistens, non potente ipso sustinere pondus deuoratorum, multa impetuosè ingerere, eademque celeriter excernere cogit: sic etiam renibus etiam serosi humoris cupiditatem, unam cum virium imbecillitate accidere. Unde & humiditatem affatim trahere, & eam mox in vesicam pellere, ipsi renes coguntur. Quod autem urinæ fluore repente euenire possit, læuitas intestinorum non possit, veluti nec canina appetentia, ob id fit, quia cupiditas qua cibum appetit venter, animale officium existit: quocirca sensum nostrum fungi nequaquam potest. Renum vero desiderium est naturale, neque ab ipso sensu nostri afficiuntur. Proinde quum ad statum peruenit, ne sen-

Diabetes.

Diplacon.

Vesica non tra-

hit a renibus.

Intestina non

trahunt a ven-

triculo.

Diabete[m] cau-

sa est imbecil-

litas renum.

Appetentia ca-

nina.

Appetentia di-

bi esse anima-

le opus.

ens, ad gibbas partes per dictas extremitates transumitur. In qua quidem uenularum conspiratione, nonnulli fieri obstructions existimant. Ergo ob refrigerationem iecinoris, in sanguinem mutari cibus non potest, refrigeranturq; cum illo totius corporis uenæ. Sæpe numero etiam, nullo tumore apparente in iecinore, æger aqua inter cutem corripitur, vel ob uitiū lienis, uel ieiuni, uel alicuius intestini tenuioris, aut mesenterii, aut pulmonis, aut renū, aut ob immodicum hæmorrhoidum, aut mensium profluuium, aut ob suppressionem menstruorum, aut ob aliam uteri momentaneum affectum. Ex intempestiua præterea frigida potatio iecur affatim refrigeratum, statim aquam inter cutem inducit. Ac sic affecti, uehementi ciborum desiderio tenentur, quod solent omnes quibus os uentriculi fuerit perfrigeratum.

C A P. V I I.

Porro utrum semper in morbo regio locus affectus sit hepar, an alia præterea dispositio hunc affectum efficere possit, deinceps considerandum. Si quidem uidemus nonnunquam iecinore hæud malè affecto, per morbi iudicationem effundi pallidam bilē per uniuersam cutim. Quinetiam citra morbi iudicationem interdum aliena quadam corruptione, qualis ob ferarū, morsum contingit, quandoq; sanguis in bilem mutat. Fieri autem potest, ut iecinoris naturali temperie mutata, humores huiusmodi uitio afficiantur, & quidem citra obstructionem, aut inflammationem, aut scirrhum. Ob splenis quoq; vitia, corporis color uitiat, sed multo nigrior fit, q̄ ob affectum hepar. Quum igitur sanguinis generatio hepatis munus existat, nullam sanè aliam causam huiusce generationis dicemus esse, à facultate ipsius uisceris propria. Cæterum omnium facultatum essentia, in peculiaribus partium temperaturis consistit. Proinde si hepar ad aliquam octo intemperantiam aliquando labatur, accidit facultati ipsius

Hidropis causæ diuersæ.

Cibi desyderium uehemens inesse iis, quibus os uentriculi fuerit perfrigeratum.

Sanguis qm̄ in bilē mutetur. Color corporis quot modis uitiari possit. Lienis, qm̄ hepatis, vitia, nigriorem colorem reddunt. Essentia facultatū, in propriis partium temperaturis consistit.

noxa, quæ peculiariter illi intemperantiæ debetur. Igitur calidæ iecinoris intemperantiæ, quum contentos in ipso humores, tum eos qui suggeruntur per mesenterii uenas, adurunt, & assant: frigidæ autem, succosiani in ipso contentos, crassos, ad fluxumq; contumaces efficiunt. Quod uerò ad ipsum suggeritur, pituitosum, crudum, & semicoctum reddunt. Rursus aridæ intemperantiæ, sicciores crassioresq; humidæ uerò tenuiores, aquosioresq; humores efficiunt. Igitur quum alui sedimina, aquæ, in qua nuper maceratæ carnes fuerint ablutæ, similia videris, iecur esse affectum existimabis. Nominantur autem præcipuè hepatica, quæ ob ibecillitatem ipsius deiciuntur. Ut autem tenue excrementum & sanietem referens, infirmi iecinoris gignere sanguinem non valentis: ita id quod similatur fæci, super assantis sanguinem hepatis est indicium. At uerò nonnulli primo quidem, sanietem, & cruenta quædam: dein tractu temporis, crassum ac melancholicum sanguinem, postremo atram quoq; bilem, atq; syncerā, deiciunt. Qui affectus interdum ob frigidam intemperiem, citra febrem, incipit: ac tunc quidem tenuis sanies excernitur: dein uerò progressu temporis, corrupto in uiscere sanguine, febris solet superuenire. Porro nonnulli eorum qui ob frigidam intemperiem laborare inceperunt, non solum non amittunt cibi cupiditatem, uerum etiam multo magis q̃ antea appetunt. At calidas intemperies, nunq̃ conuitatur cibi cupiditas, sed fastidium graue, sitis vehemens, febris insignis, atque prauorum humorum vomitus. Sciendum autem est, singulis nostri corporis partibus quatuor naturales facultates inesse: quarum prima appellat attractrix, quæ peculiare parti succos, alendi ipsam gratia, & appetere, & attrahere potest. Altera deinde est, quæ alteratrix dicitur, qua succus attractus, similis euadit ei, quæ nutritur, particulæ. Huic aliæ duæ ministrant: retentrix

Hepatis intemperantiæ singulis qui effectus tribuatur.

Iecore affecto qualia excrementa excernantur, Hepatica excrementa quæ dicantur.

Calidus intemperies nunq̃ comitatur cibi cupiditas.

Facultates naturales quatuor inesse singulis nostri corporis partibus.

nempe, quæ suo munere fungitur, quando pars succi attractum concoquit, donec eum, in suam ipsius naturam conuerterit: & expultrix, quæ post absolutam coctionem, excernit id quod inutile est, atq; excrementum vocatur. Si igitur in iecinore attractrix facultas, quomocumq; afficiatur, cibum quem confecit ventriculus, atq; in chylum conuertit, relinquet, vt liquidus excernatur per aluum. Atq; hoc sanè ipsius facultatis affecta erit signum. Siquidem quicquid ab aliquo proficiscitur, tanq; à causa, id etiam esse illius signum constat. Vbi autem hepar integrè valet, mesarei venis veluti quibusdam manibus, quæ ex uentriculo ei cibum afferant, vtis. Cæteræ vbi vel inflammatio vel erysipelas afficit mesenterium, nō solum qualia per iecinoris imbecillitatem excrementa deici consueuerunt, planè excernuntur, sed apparet etiam veluti ab inflammatione, sanies quædam illis admixta. Vt autem non potente ob imbecillitatem hepate succum à ventriculo attrahere, attractrix facultas afficitur: sic vbi retinere non valet, retentrix vis infirma putanda est: ob idq; primo quidem cruenta sanies excernitur: dein crassior & faculentior. Similiter aliæ quædam excretiones contingunt, non quidem ob imbecillitatem, sed ob expultricis facultatis robur, ratione plenitudinis, idq; interdum per integram valetudinem. Sic plerumq; pars aliqua quum affecta est, per hepar purgatur, viribus ipsius iam robustioribus factis. Quemadmodum autem retentrix facultas, dū imbecillior est, ac rē quæ ipsam grauat retinere non potest, vis expultrix id quod infestat euacuat: sic infirma expultrice, retineri quædam res solent, facultate retentrice non vsq; adeo grauata. Nam in quolibet instrumento aliàs alia facultas vel sit fortior, vel imbecillior: facta relatione ad actionem. Etenim omnis particula, secundum temperamentum ei * perpetuò inest, agit proprietatem. Iam verò in-

Facultatum singularum læsiones in hepate, quæ signa indicent.

Signū alicuius dī, quod ab eo proficiscitur, tā quā a causa.

Partes aliquas purgari interdū per hepar.

Particula oīs agit secundum proprietatem temperamēti.

terdum etiam contingit, vt ob folliculi fellis imbecillitate, ad se bilem minimè attrahere valētis, impurus vagetur sanguis per vnuerſum corpus, aliaq; oriatur morbi arcuati ſpecies præter illas, quas ſuperius expoſui. Qui folliculus ſic etiam nonnunq̃ impletur, quem admodum vrinæ veſica, vt euacuari non poſſit, aut quæ obſtructus eſt, aut quia ſecretoria ipſius facultas eſt imbecillior. Veluti etiam quum obſtructis aut iſſimis vaſis, quæ ab ipſo extenduntur in hepar, bilioſum humorem interdū attrahere non poteſt. Proinde excrementorum proprietatem in morbo regio cōſyderare, per q̃ neceſſarium eſt. Porro quibus citra febrim morbus regius accidit, vrgente in dextra præcordiorum parte grauitatis cuiuſdam ſenſu, iis omnibus aperiens obſtructiones cibis & potibus, & medicamentis extenuatibus, deinde medicamentum quod bilem ducere poſſit, exhibens, eorum plurimos vna die ſanitati reſtitui. Qui verò purgatione liberari non potuerunt, iis ruſus valentiore ad aperiendum data potione, medicamentum quod vehementius purgaret, exhibui: ſic, ut ſub purgationis ſine, cœrulea magis q̃ flaua bilis cum acri mordacitate ſecerneretur. Atq; in iis conieci fellis folliculum ſimiliter affici, vt ſolet vrinæ veſica, vbi magna humoris copia diſtenditur, quā excernere nequit, interdum ob excretorię facultatis imbecillitatē, interdum, quòd ob grauem ſomnū, vel negotia quæpiam, ultra q̃ par eſt, vrinam ſupprimens, dein ab ea proſternatur, mirum in modū intenta. At folliculus fellis, * quum inuetur nihil ad excretionem à facultate animali, vnicum habet imbecillitatis principiū, veluti cætera quoq; naturalia inſtrumenta, à partibus intemperie ortum.

Morbi regii
cauſa.

Excrementorum
pprietas in morbo
regio conſyderanda.

Regii morbi
abſq; febre in
uadentis curatio.

GALENI PERG

MENI DE LOCIS AFFECTIS.

LIBER SEXTVS.

CAP. I.

Lien sanguine
alitur melan-
cholico.



Liene idurato,
illuc cōsentit
te iecinore, aq̃
inter cutē orit̃.
Regius merb̃
permittit.
Frigida intēpe
stius exhibitā,
solet aquā iter
cutem efficere
si p̃cipue vi-
tiosa fuerit.
Aqua inter cu-
tem gigni non
possit, nisi ad

LIEN Autem, quum ex hepate san-
guinem melancholicum trahat, quo
ipse postea nutritur, sanè si in eo fa-
cultas attractrix facta sit, ibecillior,
sanguis ex icore impurus in vniuer-
sum corpus transmittitur, ac proin-
de color nigrior euadit. Quin etiam exemplo hepatis,
sæpenumero ex se reiecit excrementa quædam: ita ut
per vomitum, cui nausea accedit, nonnūq̃ excernatur
melancholicus sanguis: qui interdū etiam solet per in-
ferna descendere. At huiusmodi vacuatiōe suppressa,
nonnulli melancholica tristitia afficiuntur, cibosq̃ au-
disimè concupiscunt: idq̃ p̃cipuè, si valde fuerint
acida, quæ excrementa ad ventriculum transferunt.
Si autem alia melācholici humoris corruptio accadat,
subuerti, deiiciq̃ appetētiā videbis. Quod verò indu-
rato ipso, aqua inter cutem effundi possit, consentien-
te iecinore, iam antea est dictum. Quin etiam laboran-
te aliquando utroq̃ viscere, regium morbum euenire
conspeximus, nigriore q̃ pro consuetudine subsequen-
te colore: ita ut videretur flaua bilis esse fuligini admi-
sta. Quemadmodum autem vitiosa aqua & frigida, *
si confertim & intempestiuè bibatur, solet aquam in-
ter cutem inducere (nocet enim sic ingesta interiorib̃
partibus, maximè verò iis, quæ tum temporis fuerint
imbecilliore) sic ob refrigeratum vnā cum tumore
lienem, utputa si adsit scirrhus, vel citra tumorem, ut
per iam nuper dictam aqua portionem, aqua inter cu-

tē etiam euenire consuevit. Cæterū nisi ad hepar usq; ipsa refrigeratio peruenierit, aqua inter cutē subsequi potest minimē.

C A P. I I.

hepar refrigeratio peruenit.

Dysenteria est vlcus intestinum.

Dysenteria causa.

Dysenteria exquisita, intestinorum vlcus existit. Qui sanè affectus, non gignitur affatim, aut subito, vt ille quem vicio hepatis accidere dixim⁹: sed protinus quidem ab ipsi⁹ initio, bilis mordax excernitur, quam deinde interaneoꝝ abrasiones sequuntur: postea verò paulum cruoris deici simul videtur, quando videlicet ipse affectus iam esse dysenteria censetur. Quā itaq; huiusmodi abrasiones solæ excernuntur, considerandum est, num pingue quippiam simul cū eis deiciatur. Ita enim vlcus in crassis intestinis consistere, existimandum est. Vbi verò cruorem quoq; excerni videris, intueri oportet, vtrum is reliquis excrementis adeò permixtus sit, vt vniuersus vniuersis misceatur: an pars eius aliqua reliquis supernatet. Etenim si admixtus sit, in superioribus: si verò supernatet, in humilioribus intestinis vlcus esse portendit. Idem etiam & in abrasis excrementis videre est, verū non ita manifestè, vt in cruore. Similiter crustula, quod nam intestinum sit vlceratum declarant, tum ex essentia proprietate, tum ex modo, quo vel misceri reliquis excrementis, vel vni eorum parti supernatare videntur. Nec yerò mediocriter conducit ad curationem nosse in qua intestinorum parte consistat vlcus. Nam si in superioribus intestinis sit, ab epotis medicamentis præsidium petendum est: sin verò humilioribus hæreat, clysterē subiicere magis cōuenit. At huiusmodi dysenteria ab iis quæ ab hepate profluunt, sic discernuntur. Nam ab initio tenuis sanies sanguinis ab hepate excernit: dein de aucto malo, crassus humor fecibus vini haud absimilis. Præterea, in hepaticis excretionibus, nihil abrasum expellitur, atq; interdum duorum, aut trium dierum intervallo, suppressitur euacuatio: dein rursus ma-

Intestinorum; quæ nam exulcerata sint, crassiora ne, an tenuia, ab excrementis dignoscitur.

Intestinis superius exulceratis, epotis medicamentis succurrere oportet: inferius, per clysteres iniectos.

Hepaticum fluxum a dysenteria quō distinet oporteat.

etiam cueatiuum, atq; prognosticum. Nephritici etiā dolores, cum vrina exeunte lapide, simul & soluūtur, & locum affectum indicant. Vt autem perseuerante dolore vtraq; pars eisdem auxiliis indiget, sic tempore subsequente ad præseruationem oportet diuersa p̄sidia adhibere. Quum autem omnia intestina ordine quodam à ventriculo ipso descendant, atq; omnium supremum ieiunum sit: deinde quod tenue vocatur: postea cœcum, quod vsq; ad isernas partes extendit: deinde colō, quod ad superiores reuertitur partes, ita vt sæpenumero hepar & lienem attingat: satis mirari non possum, quo pacto vehementissimos, quosq; dolores, quacunq; in parte consistant, ab omniōus colo tribuantur. Igitur ob frigidum crassumq; , aut etiam humorem viscidum, aut ob flatulentum spiritum, in corpore crasso densoq; alicuius intestini inferioris genitum, sed egredi nequeuntem, excitari dolor consueuit: vehemens quidem, ob intemperiem atq; tensionē corporum in quibus hæret impactus: longus verò, q̄a difficulter vacuatur. At dolor ille acerbissimus, quem ileō, voluulum, & chordapson vocāt, sublimiores intestinorum partes infestat, adeoq; impellit ad vomitum, vt nonnulli stercus per os reddentes, miserrima tandem morte moriantur. A quo affectu vix aliquis vnq̄ euadere potuit. Itaq; non ab re visum est medicis antiquioribus, vel ab inflāmatione, vel ab obstructio-
ne aridi stercoris, oriri huiusmodi tenuium intestinorū affectum. Sunt & alia symptomata, quæ & intestinis & vētriculo simul affectis euenire creduntur, vt quas lienterias cœliacas nominant, vbi materiæ ipsæ minimē mordaces existunt. Etenim ut mordaces ob mordēdi vim omnia intestina ad excretionem excitant, sic nō mordaces, intestinorum inbecillitatem sequuntur: quia retinere contenta ne exiguo quidem tempore possunt.

Intestinorum
ordo.

Dolor colicū

Ileos:
Voluulus.
Chordapson.
Voluulo labo-
rantē vix ali-
quem euasisse.
Voluuli causa.

Lienteria cœ-
liaca.

Igitur si nephritis repēte incidat, lapide notatu digno, uel in renum aliquo, uel i ureteris etiam impācto, dolorem excitabit haud absimilem colico: uerū distinguetur ab eo, per illa quæ in capite præcedenti accidere colo affecto iam diximus. Vbi uerò ex iis quæ in urinis resident, aut ex lapide excreto, discerni ipsi dolores possunt, quæstioni nullus locus relinquitur. Porro ubi dolor alterius renis, cum horrore inordina-

Nephriticus dolor cum horrore inordinato, ac febre et inordinata affligens, quā abscessum signifi-

to & uario, necnō inordinata febre affligit, si per pro hum decubitum atq; in alterum lat^o permutationem, in ipso rene dolente suspensi cuiusdam ponderis sensum æger percipiat, abscessum iam concretum esse conuincere oportet. Quo concocto, pus mixtum, ut laborantem a dolore liberat, sic ulceris in rene periculum affert: quod nisi illico cicatrice inducatur, ægrē curationem recipiet. At perseverantis ulceris notæ ex urina haud obscurè deprehenduntur. Adde q; laborans creberrimè in affecto rene dolorem sentit: atq; interdum cum urina exiguum pus ueluti ab ulcere excernitur. Similiter ramentum nonnunq; cum urina excerni uidetur: atq; interim sanguis quoq; qui erosi iam ulceris est indicium. Quanquā rupto aut reserato aliquo uasē, sanguis potest etiam profluere. Verū efficacissima exulceratorum renum est coniectura, si

Renis exulcerati indicia.

Carunculae cū exigua quædam caruncula cum urina excernantur: utpote quas renum essentia partes, easq; ob uehementem ulceris erosionē auulsas esse, constat. At quæ unā cū lotio excernuntur pilis similia, probabilius mihi uisum est, ea in uenis, q̄ in renum capacitate, gigni: idq; ex crassa lentaq; materia, quam calor calfecit exiccavitq; cuius sanè affectionis per diuretica * sperari curationē futuram: nec unq; spes me fefellit. Iam uelica, ubi longo tempore acres per ipsam urinæ transeunt, ulceribus affligi solet. Est & alius renum affectus quo tenuis sanies sanguinis mingitur: cuius quidem existet

Carunculae cū exigua quædam caruncula cum urina excernantur: utpote quas renum essentia partes, easq; ob uehementem ulceris erosionē auulsas esse, constat. At quæ unā cū lotio excernuntur pilis similia, probabilius mihi uisum est, ea in uenis, q̄ in renum capacitate, gigni: idq; ex crassa lentaq; materia, quam calor calfecit exiccavitq; cuius sanè affectionis per diuretica * sperari curationē futuram: nec unq; spes me fefellit. Iam uelica, ubi longo tempore acres per ipsam urinæ transeunt, ulceribus affligi solet. Est & alius renum affectus quo tenuis sanies sanguinis mingitur: cuius quidem existet

causa, aut ipsorum imbecillitas renum: aut maxima relaxatio eorum meatuum, per quos ex uena caua in renes percolatur urina. Atque ad renes quod pertinet is affectus videtur, quem alii matellæ hydropem, alii profluuium urinæ, alii diabete[m], alii dipsacon vocant: qui certè quod rarissimè accidit. Quo morbo affecti, inexplabili siti vexantur. Quare & exuberanter bibunt: & reddunt totum id quod biberunt, minimè à sua qualitate mutatum. Hic igitur renum vesicæque affectus, similis est læuitati ventriculi, intestinorumque. Igitur ut ex ventriculo iecur per mesenterii venas, veluti arbores à terra per radices, alimentum ad sese trahit, sic etiam renes sibi quicquid in venis est aquosum, alliciunt. Ceterum vesica non trahit à renibus: quemadmodum neque intestina à ventriculo: sed renes quidem per vtreteras excernendo in vesicam mittunt: ventriculus autem in ieiunum, per intestinum ab Herophilo dictum dodecadactylum. Proinde diabetis causa, renum imbecillitas, non potentium diutius continere urinam, censenda est. Verum enimvero obiciet aliquis, si imbecilli sint renes, quomodo fieri potest, ut urinam ad sese tam celeriter attrahant? Cui quidem respondere licebit: quemadmodum canina appetentia, in ventriculi ore consistens, non potente ipso sustinere pondus deuoratorum, multa impetuosè ingerere, eademque celeriter excernere cogit: sic in renibus etiam serosi humoris cupiditatem, vnam cum virium imbecillitate accidere. Vnde & humiditatem assatim trahere, & eam mox in vesicam pelle re, ipsi renes coguntur. Quod autem urinæ fluor repentè euenire possit, læuitas intestinorum non possit, veluti nec canina appetentia, ob id fit, quia cupiditas qua cibum appetit venter, animale officium existit: quocitra sensum nostrum fungi nequaquam potest. Renum vero desiderium est naturale, neque ab ipso sensus nostri afficiuntur. Proinde quum ad statum peruenit, ne sen-

Diabetes.
Dipsacon.

Vesica non trahit à renibus.
Intestina non trahunt à ventriculo.
Diabetis causa est imbecillitas renum.

Appetentia canina.

Appetentia cibi esse animale opus.

Sitientes vehementer, quatuor accidentium discrimen a potione subire possunt.

sum quidem mouet, quemadmodum appetentia canina. Porro laborantes vehementi siti, quatuor accidentium discrimen, à potione subire solent. Vnum, & quidem primum, vomitio est: alterum, velox per aluum excretio, aut fluore, aut laxitate intestinorum: tertium, quod potus diutius quam par est, in ventriculo manet: quartum denique est diabete, sine vrinæ profusum. Occurrit interdum affectus alius diabete simillimus, & quidem ob ciborum multitudinem, qui nec crudi permanent, nec deiiciuntur per aluum, nec plenitudinem gignunt, nec etiam probe alere possunt, sed discutiuntur, dissipanturque. Cuius ut crebrior est, quam diaphani, euentus, ita faciliorem curationem admittit. Quippe si prius quam ad summum peruenerit, ipsum cognoueris, haud ita difficulter curabitur. Atque is affectus, à celeri dissipatione ortus ducit, omnibus partibus attracticem, appetitricemque facultatem seruantibus. At verò ingentis sitis, quæ citra diabetem accidit, causa est ventriculus, aut calida, aut sicca, aut utraque intemperie laborans: maximè verò os ipsius: proximè ventriculo hepar, sed maximè pars eius sinia: simul inflammatis meseraicis venis, & ieiuno, & ventriculo, atque cum gula, pulmone. Quarum partium incendium marcor ut plurimum comitatur.

Sitis ingentis causa.

Diabetes, proprius renū affectus est.

Diabetes itaque proprius renum affectus existit, qui canina in ore ventriculi appetentiæ proportionem respondet, accedente præterea retentricis facultatis imbecillitate.

C A P. I I I I.

Ischuria. Stranguria.

Vesicæ superueniunt symptomata, partim communia cæteris, veluti omnes ipsius præter naturam tumores, dolores, & quæ hos gignunt, dispositiones: partim ipsi propria, ut ischuria, hoc est vrinæ retentio: stranguria, hoc est stillicidium vrinæ: præterea immoderata vrinæ profusio. Quæ quidem euacuationes vesicae, seu meatu vtuntur, ipsa haudquaquam affecta. At verò stillicidium vrinæ, si ob vrinæ acrimoniam fiat, sym-

ptoma vesicæ est, affectus verò minimè. Si verò aut ab vlcere, aut ab ibecillitate procedat, * in vesicæ affectu consistit. Cæterùm quum ab intemperie vesica sit imbecillior, propria ipsius actio læditur, quæ est vrinæ excretio: ad quam animal excitari solet, quum vel à multitudine contentæ in ipsa materiæ vesica grauat: vel à mordacitate conuellitur. Quin etiam instrumentales affectus, interdum imbecillitatem inducere possunt: præterea omnes intemperantiæ, præcipueq; illæ, quæ sæpe nonnullis eueniunt, quum frigore corripiuntur. Adhæc, ischuriæ symptoma superuenire solet vesicæ, tanq̃ meiendi instrumento: interdum quidè, quum circa id quod in ea continetur, contrahi nō potest, vt ipsum exprimat: interdum etiam, obstructio inferiori meatu, aut à crassis humoribus, aut à lapide impacto. Atq; accidit nonnunq̃ vel ab inflāmatione, uel ab alio id genus tumore, ut angustior reddat meatus, uel etiam omnino obstruatur. Sciendū autem est, non vesicæ, sed meiendi munus veluti etiam deiciendi, nō intestinorum officium pendere à uoluntatis imperio. Quippe vesicæ officium vnicum * est, contractio. At musculus qui vrinæ meatum in circuitu ambit, in origine ceruicis vesicæ positus, instrumentum est, cuius opus ab electione excitatur. Similem quoq; & actionē & vsum habet musculus, qui recti intestini partem extremam ambit. Proinde ipsis resolutis, neq; vrinā vesica, neq; alius stercora, retinere potest: sed præter uoluntatem, * vtraq; paulatim effluunt. Quare suppressio vrinæ fieri nequit ob affectum spinæ, aut neruorū ab illa in dictos musculos exortorum (quod nonnulli putarunt, credentes vesicæ officium à uoluntate pendere) sed ipsius inuoluntaria excretio. Atqui ut nonnulli, tum urinarum, tum excrementorum alui deiectionem, totam ab electione procedere existimantes, hallucinati sunt: sic rursus alii, his è diuerso, totū hoc

Stillicidiū vř.
ne qñ sympto
ma vesicæ, &
qñ affectus ei
proprius exi
stat.

Meiēdi munus
nō vesicæ, pen
det a volunta
tis imperio.
Deiciēdi mu
nus, non intesti
norum, est vo
luntarium.

Musculus uest
cæ atq; sedis,
agit secūdam
voluntatis im
perium: quib
resolutis, excre
menta retineri
non possunt.

opus naturale putantes, ab scopo aberrant. Etenim cibi à ventriculo in ieiunum transmissio, tota naturæ opus est: voluntatis autem, extensio digiti. At alui deiectio, & urinæ redditio, utroque instrumento propriis suis facultatibus operante, perficitur. Rectum enim intestinum, atque vesica naturali facultate utuntur: musculi verò, ea quæ animalis & uoluntaria vocantur. Quippe musculi qui solent cohibere fluores, ab opere quiescunt, abdominis musculis munere suo fungentibus: maximè verò mediis. Quum igitur vesicæ corpus ita fuerit affectum, ut quod in ea continetur, exprimere nequeat, urina supprimitur, uocaturque symptoma id ischuria. Accidit etiam interdum, propter ipsius sensum obtusum, ut non reddatur urina: citra tamè expultricis facultatis læsionem: nimirum si proprii vesicæ nervi afficiantur, nervis musculi cervicem eius constringentis, munere suo fungentibus. Qui quidem si resolvetur, urina præter uoluntatem excernitur. Ob spinæ etiam luxationem ad interiora, supprimitur aliquando urina consuevit: orta uidelicet phlegmone in affecta partícula. Quemadmodum vertebrae ad externas partes luxatis inuito urinam profluere uidimus, ob resolutum nervum musculi vesicam ipsam claudentis. Retenta est: longo tempore urina, vel ob somnum diuturnum, uel ob negotia urgentia, ipsa vesica extenditur, atque urina supprimitur, contractrice facultate propter tensionem immodicam, læsa. Præterea ob sanguinis grumum & pus crassiusculum, interdum retinetur urina. In pueris etiam, quos lapis in vesica cruciabat, vidimus sæpe numero ipsam urinam supprimitur. Eos itaque, resupino figurato corpore, adeò percussimus, ut à meatu lapidis dimoveretur. Cæterum grumos vocatos, non solum eos qui in vesica, sed multò magis illos quoque qui in intestinis, ventriculo, atque thorace nonnunquam continentur, animi defectio, & color pallidus sequi solet: pulsus verò

Ischuria quando accidat.

Urinæ suppressæ causæ.

Grumos in corpore præter naturam contentos, quæ sequuntur symptoma.

parus, obscurus, & frequens apparet: laborasq; ipse, cum anxietate resoluitur. Sunt autem ad intentionem affectæ sedis, non solum præsentia symptomata, sed præterita etiam inuestiganda. Nonnihil etiam confert quæritatem puris (si quando excernatur) & mixturâ eius cum vrina, considerare. Nam si pus cum lotio exactè permixtum sit, à supernis alicunde partibus effluit. Si verò sine vrina excernatur, in vesica consistere suppurationem indicat. Sed quod mediam inter hæc conditionem seruauerit, id à renibus descendisse, certum indicium est. Similiter expendendum est, si rupta vomica, cum notis affecti loci, vlcere aliquod quoq; signum appareat. Nam & hoc, aut exactè, aut mediocriter, aut omnino nihil cum vrina miscetur. Atq; vocatum quidem ramentum, vlcere: essentia verò proprietas, affectæ partis proprium indicium est. Quippe partes à vesica auulsæ, lamis: à renibus verò, sunt carunculis similes. Similiter ubi ex sublimioribus pars aliqua affecta est, excrementa cum vrinis eiectioni, & ea inspectarum partium essentia comparare oportet. Igitur cum vrina expurgantur gibba hepatis partes, atque omnes quotquot his superiores existunt: per aluum verò pars iecinoris sima, intestina, ventriculus, lien. Præter has aliæ quædam sunt purgationes, sed raro, ut quæ thorax & pulmo per aluum purgatur: quæ sub septo transuerso sunt positæ partes, per vrinas. Vidimus etiam nos pulmonis vomica expurgari similiter per vrinam: reiecto videlicet pure, à pulmone quidem, per læuam arteriam, in sinistrum cordis ventriculum: à corde autem, per arteriam magnam, ad renes: atq; illinc tandem per vteras ad velicam. Etenim ut à concaua uena, ita ex magna arteria, rami ad renes descendunt.

C A P. V.

Vteri affectuum plurimarum differentiarum existunt. Si quidem mulierum quæ hystericis dispositionibus

Pus si cum vrina excernatur, mixturam ipsius esse considerandam.

Ramentum est signum vlcere. Essentia, proprietas, affectæ partis indicium est. Partes à vesica auulsæ, lamis, à renibus sunt carunculis similes. Partium singulæ per quæ regionem purgantur.

Pulmonis vomica aliquando per vrinam purgari.

Arteria magna ramulos mittit ad renes.

Vteri affectuum plurimarum differentiarum.

corripiuntur, aliæ quidem sine sensu immobiles iacēt, cum obscuro paruoq; pulsu, vel omnino sine vilo pulsu. Aliæ autem sentiūt, atq; moueri possunt, integræq; ratione fruuntur, sed tamen deliquio animi, difficiliq; spiratione laborāt. Aliæ deniq; crura simul & brachia contrahunt. Porro nonnulli ad explorandum num penitus respiratio perierit, flocculos lanæ carptæ, suspēdi coram naribus iubent. Alii poculum aquæ plenum ori ventriculi imponunt. Quippe immotum omnino seruari humorem aiunt, si spiratio tota sit intercepta. Etenim in confesso est & spirationem à vita, & uitam à spiratione separari non posse: adeo vt viuentem nō spirare, & spirantem nō viuere, sit impossibile. Quod si in animalibus, quæ in latebris delitescunt, nulla appareat respirationis nota, neq; ob id mirari debemus, quum videlicet ea animalia sint frigida. Quippe maximus vsus respirationis est, vt intimus calor & refrigeratione & ventilatione seruetur. Quare haud ita difficile fuerit perpendere, exiguum illum calorem in eis derelictum, arteriarq; cordisq; motu seruari: quæ actio à quibusdam medicis transpiratio vocatur. Similiter etiam pereunte ob uteri affectum spiratiōe, quoniam vniuersum corpus refrigeratur (id quod perspicuum est) fieri potest, ut * nullo attractio per os spiritu, aut reddito, transpiratio, quæ per arterias fit, perseveret, licet adeo interdum exigua, vt sensum omnino effugiat. Accidit autem vteri suffocatio magna ex parte uiduis mulieribus: iis præsertim, quæ quum antea probe repurgarentur, parerent, atq; virorum congressu fruerentur, his omnibus postea priuātur. Quare verisimile est, ob retenta menstrua, vel semen cohibitum, eiusmodi mulieres vteri dispositionibus infestari: idq; fortasse magis ob semen retentum. Nam quum muliere semen humidius atq; frigidius sit, ipsum excerni oportet, præsertim si copia redundet. Nec secus etiam

Respiratiōem
penisse oino,
aut nō prorsus
quibus modis
deprehendat.
Spiratio a vi-
ta separari nō
potest: nec a re-
spiratiōe, ipsa
vita.

Respirationis
vius.
Latentiū aiali
um calor, mo-
tu cordis & ar-
teriarū seruaf.

Transpiratio p
arterias.

Vteri suffoca-
tio quibus præ-
cipue accidat.

Vteri suffoca-
tio ob retenta
mēstrua, vel co-
hibitum semē
solet accidere.
Semen mulie-
ris quale.

in viris. Sunt quippè nonnulli eorum, quos protinus à iuventute, concubitus imbecilliores reddit. Alii nisi assidue coeant, capitis grauitate infestantur, cibos fastidiunt, febribus sunt obnoxii, deterius coquunt & appetunt, ac deniq; torpore, pigritia, ac melancholicis accidentibus molestantur. Proinde ex retento semine, q̄ ex suppressis menstruis, videtur mihi lōgè maior noxa euenire posse corporibus, eorum presertim, qui suapte natura viriosis abundāt humoribus pleni q; sunt, & in otio educati: qui q; quū antea nihil fecissent ad libidinem reliqui, affatim continere cōperunt. In quibus sanè conicio naturalem excernendi ipsum cupiditatem, læsionis causam existere. Etenim quum tale & tantum ipsum semen euaserit, neminem non ad sui excretionem vi quadam stimulat. Ob id q; planè cōstat, modestos uiros, non ob voluptatem, sed ut ab impedimento præsuerentur, indulgere libidini, perinde ac si nulla sit ei coniugata voluptas. Ita Diogenem Cylicum narrant, virum alioqui mortalium omnium (quod ad continentiam pertinet) constantissimum, libidini tamen nauasse operam, non à coniuncta illi voluptate, veluti bono aliquo, illectum, sed ut noxam, quæ à retento semine prouenire solet, arceret. Eum nāq; meretrix adire pollicita, quum diutius cessaret, ipse manu pudendis admota, semen excussit, ac venientem dein mulierculam remisit, inquit. Manus huiusmodi celebrando præuenit te. Sic etiam arbitror animalia omnia excitari ad coitum, non quòd existiment voluptatem boni cuiuspiam speciem præ se ferre, sed ut semen, qđ retentum ipsa molestat, excernant: haud secus q̄ deliciendi stercoris, excernendæq; urinx desyderio suapte natura mouentur. Fieri autem potest, ut profluentibus menstruis, retineatur in viduis semen, grauissima q; inducat symptomata. Nec sanè cuiquam mirum videri debet, si exiguus humor in vna parte cō

Semen retentū nonnullis uirīs, quæ symptomata inducat. Semen retentū qđ menstrua quibus inferant grauiora symptomata.

Libidini indulgere multos modestos viros, valetudinis gratia. Diogenes Cylicus.

Animalia oīa quo pascio excitent ad veniētem.

tentus, tantorum accidentium sit causa: quum à phalangii ictu, affici totum corpus videatur: exiguo veneno per minimū foramen iniecto. Præterea (scorpionis ictus breui admodum tempore grauissima symptomata inducit, quū in illius aculeo foramen nullum uideatur. Rationi tamen est consonum, ut vel à spiritu quodam, vel tenui humiditate iniecta accidentia illa proficiantur. Sunt qui putant res quasdam solo tactu per qualitatis uim, ea quæ ipsis vicina sunt, alterare posse: idq; planè uideri in marina torpedine aiunt: utpote cui tam uehemens sit potentia, ut per piscatoris tridē tem transmissa ad manum, alteratione, totam reddat, repente torpidam. Similis etiam facultas inest Heraclio lapidi. Ferrum siquidem, quod tetigerit, ei adhæret. Deinde si aliud, id quod primò tactum fuerit, tetigerit, similiter ut primum illi inhærebit. Ac sic deinceps. Porro idem affectus oriri possunt & ab humoribus in corpore putrescentibus, & ab epoto ueneno.

Ii tamen qui uenenum hauserunt, ab iis qui aliter sunt affecti, discerni possint. Quum enim homio suapte natura probis succis abundans, ac * salubri secundum omnia usus uictus ratione, repente moritur (ut letali assumpto ueneno fieri contingit) deinde corpus aut liuens, aut nigricans, aut variū apparet: aut diffuens, * aut grauē reddit odorem putredinis, hunc uenenu sumpsisse aiunt. Igitur si eiusmodi affectibus nos infestari fateamur, qui ex nobismetipsis accepto sue originis impetu, similes sint iis q epoto ueneno eueniunt, nihil mirū fuerit, si etiam vitiatum semen, aut menstruum, huiusmodi, quum retinetur, aut putrescit in corpore, grauia symptomata inducat: iis præsertim, q ut afficiantur, sunt apti. Siquidem quantā vim habeat, afficiendæ rei aptitudo, in canibus licet videre. Quum enim reliquorum animalium nullum rabie arripiatur, solus canis eo affectu corripitur, tantaq; sit in ipso hu-

Phalagii ictus.
Scorpiōis ictus.

Torpedo marina piscatoris manum reddit torpidam, per medium tridē tem.
Heraclius lapis.

Veneno extinctos, quō distinguemur ab aliis qui ob prauos corporis succos intereunt.

Afficiendæ rei aptitudo maxime obtinet ut ad expiendum affectum.

morum corruptio, ut vel solum eius sputum, si hu-
 manum corpus contigerit, rabiem excitare sit potens.
 Quod verò ad gigniendos uteri affectus maiorem vim
 habeat semen, quàm menstruū retentū, vel ex hoc liquet,
 dum quod supprimuntur menses mulieribus coniugatis,
 & si pluribus accidentibus infestentur, nunquàm tamē aut
 spiratione priuantur, aut animæ deliquio laborant, quod
 solent nonnullæ viduæ, licet æquē ut antea, aut paulo
 minus, quod pertinet ad menstrua, purgentur. Quæ
 sanè symptomata Plato exponere cupiēs sic in Timeo
 edisserit. Ea pars quæ in mulieribus & uterus & vulua
 nominatur, quum sit animal avidum generandi, si in-
 tempestivè, diuquē infœcundū māsērit, admodum in-
 dignatur, erransquē per totum corpus, ac meatus spiri-
 tum obstruens, respirarequē non sinens, in extremam
 anxietatem adducit, & alios morbos complureis exci-
 tat. Hæc Plato. Cæterum illius agitatōis uteri, quam
 mulieres percipiunt, non est causa ascensus eius usque
 ad regionem diaphragmatis, ut nonnulli putarunt. Nā
 si aliquid ex utero videatur ascendere, id perexiguū
 est. Sed uteri ipsius tensiones esse potius in causa dixe-
 rim, cur tangentibus obstetricibus, modò sursum, mo-
 dò retrahi i latus videatur. Nam simul cum utero, cer-
 uicem quoque ipsius retrahi necesse est. Quum igitur ad
 uterum multa admodum venarum ora perveniant,
 per quas ex cōcaua vena sanguinem attrahere potest,
 * sanè ob plenitudinem tum earum, tum vinculorū, quæ
 ex illis depēdēt contingit uterū sursum, aut etiam ad la-
 tus retrahi. Siquidem omnis convulsio sit, aut à pleni-
 tudine, aut ab inanitiōe. Plenitudo quippe repleta cor-
 pora & in latum, & in profundum extendit, sed longi-
 tudinem reddit breviorē. Quo autem breviora sūt,
 eò magis ad suam originem retrahuntur. Dum itaque
 descendens sanguis ad uterum, ingredi ad ipsius intes-
 tinam capacitatem non potest, aut quia crassior est, quàm sit

Canis solus ra-
 bie corripitur:
 eiusque sputum
 rabie excitare
 est potens.

Plato.

Uterum non
 ascendere ad re-
 gionē diaphra-
 gmatis per uteri
 suffocationes:
 sed tū ipsum,
 tū ipsius vasa
 tēdī qua ratio
 ne videtur va-
 gari.
 Convulsio ois
 fit aut a pleni-
 tudine, aut ab
 inanitione.

vasorum ora permeare possit, aut quia clausa sunt orificia, multiplicatus in venis, eas extendit: atque vicina ipsis vincula madefacit: ad quorum omnium tensionem, continuò vterum retrahi est necesse. * Qui si vndiq; trahatur æqualiter, recta erit & sine inclinatione ipsius transmutatio: sin verò inæqualiter, ad partem vehementius trahentem intenditur. Non ergo veluti animal errabundum aliàs ad alium locum discurrit in mulieribus vterus, sed ab extensione retrahitur. Quòd si quispiam dixerit, vteri corpus tunc minimè affectū esse, sed peruersione laborare, haud absurda is dixisse videbitur. Igitur peruersiones vteri, eo quem diximus modo, ad suppressa sequuntur menstrua: eas tamē ob hoc, accidentium quæ in animalis corpore apparent, causas esse, nequaquā putandum est. Quæ verò citra peruersionem, aut menstruorum retentionem, viduas molestant noxæ, hæc ob retentum semen euenire putantur, Cæterum pro multitudinis, qualitatis uel ratione, tum menstruorum, tum seminis, aliàs aliæ accidentiū species oriri solēt. Etenim noxia causa vniuersum corpus refrigerare potente, adeò vehemēter omnes partes refrigerantur, vt & respiratio, & arteriarum pulsus sensu deprehendi nō possint. Quæ si vel crassa fuerit, vel acris, conuulsiones: si verò atræ bilis naturam referat, mœstitiā inducet: quæadmodum animi quoque deliquia, & ad fortes extensiones, & refrigerationes, & oris ventriculi affectus, subsequi cōsueuerunt. Porro si mulier nec prægnans, nec puerpera, lac possideat, mēstrua ei defecerunt. At nullo in mammis lacte apparente, menstrua suppressa hisce notis deprehenduntur. Grauitas totum corpus infestat, necnon fastidium, atq; inæqualis horror. Quòd si citra horrorem inæqualitas aliqua fuerit, atq; fastidiū, appetatq; mulier quædam aliena, vt exempli gratia, extinctos carbones, iube vt obstetrix vteri ceruicem tangat. Nam

Vteri peruer-
siones ad sup-
flua sequuntur
menstrua.

Noxæ quæ ab-
q; vteri puer-
sione viduas
molestāt, ob re-
tentum semen
oriuntur.

Menstrua defe-
cerunt mulieri
cui lac inest:
nec prægnati-
nec existenti
puerperæ.

si citra duritiem clausa inueniatur, cam prægnantem esse conicies. Si verò etiam durities adsit, affectum aliquem in vtero esse portendit. Oportet itaq; speculari obstericem, ad quam partem vel declinet, vel retrahatur vterus: nam in ea parte affectam vteri sedem esse, conicies. Atq; in quibusdam fœminis, eius partis dolor cum gravitate nonnihil potest significare: quinetiã in coxam dolor interdum trãsit, & crus ipsum, quod è regione est, per incessum claudicat. Quòd si longiori tempore supprimantur menstrua, nullamq; medicus mulieri vacationem promoueat, tumor aliquis præter naturam, in ilibus interdum oritur, ostendens nimirum ex internis partibus quanupiam esse inflammationem. Nonnullis panus in extrema ilium parte excitatur, veluti viris quoq; eodem in loco nonnunq; oriri solet. * Qui panus in quadam muliere fuit suppuratus, adeò vt opus fuerit sectione. * Iuxta hanc ipsam ptē vidimus colon intestinum & suppuratum, & sectum: interdum ignorantibus medicis imperitis quid' nam inciderent: interdum intelligentibus quoq;. * Cæterum quoties suppurari contigit colum, semper facillè curationem recepit: vteri verò sectiones, ægrius conglutinantur. Itaq; symptomata huiusmodi consueverunt sequi suppressa menstrua: ac præterea lumborū, & colli, & sincipitis dolor, qui ad oculorum vsq; radices extenditur: item febres ardentes, & nigricantes urina: cum rubra quadam sanie, perinde ac si aquæ, i qua nuper mactatæ carnes ablutæ fuerunt, fuliginem quis miscuisset. Quibusdam vrina aut difficulter redditur, aut omnino supprimitur. Quòd si per alium quempiã corporis locum sanguis effluerit, aut inflammatiõ, aut erysipelas excitetur, an menstrua purgentur interrogare debes. Siquidem nihil horum accidere solet, integre repurgatis. Quum verò immodicè, vacuantur menses, color sequitur fœdus, pedes molli tumore

Menstruis deficiētib' quopacis deprehēdemus an sit grāuida mulier, neque.

Colon intestinum suppuratum interdū iuxta bubones.

Suppressos menses quæ sequantur symptomata.

Menstrua fluxu immodice quæ sequantur symptomata.

Profluuij mulie-
bris causa.

attolluntur, corporis robur prostermitur, vitiatur cibo-
rum tum concoctio, tum cupiditas. Sed accidit inter-
dum foemini muliebri vocatum profluuium, vel vte-
ro haudquaquam affecto, quum videlicet vniuersum
corpus per ipsum interdum purgatur: quemadmo-
dum per renes quoque aliquando solet vacuari. Id vero
potissimum fit, si mulier laxis sit carnibus, & pituito-
sa. Atque id quod excernitur, nonnunquam rubra sanies est:
interdum aquosa, & suppallida. Quod si purus fuerit
sanguis, qualis ex dissecta vena profluit, diligenter ani-
maduertere oportet, numerosio sit aliqua in utero. Ea
vero magna ex parte in ceruice potius quam alibi contin-
gere solet: discerniturque per excretam saniem, si fue-
rit profunda: si vero circa os ceruicis constiterit, non
solum per hanc, sed per tactum etiam cognosci potest.

Pregnanti si
extenuent ma-
mam, abortus
sequitur.

Atque praegnantibus quoque, quum ora venarum in cerui-
ce aperiantur, excernunt sanguinem. Ergo si mulieri
utero graui, subito extenuentur mammae, abortus se-
quitur. Atque geminos ferens, si altera mamma extenuetur,
alterum amittit: & omnino si dextra mamma ex-
tenuata est, marem, si sinistra, foeminam pariet.

Mares continetur
dextris.

Foeminae conti-
nentur sinistris.

siquidem dextris, foeminae magis continentur sinistris uteri
partibus. Atque raro aliter accidit. Si mulier prompte
quidem conceperit, dein secundo, aut tertio, aut quar-
to impregnationis mense, foetum eiecerit, circa uteri
acetabula humorem pituitosum abundare, atque iccir-
co venarum arteriarumque eius loci ad ora vasorum in
uterum descendantium, nexum debiliorem esse, con-
siliendum est, ut foetum ob gravitatem ferre nequeat,
sed abruinpatur facile.

C A P.

V I.

Colis vlcus vn-
de deprehenda-
tur.

AT colis vlcus deprehenditur ex dolore infestante
ipsum: necnon ex iis, quae familiaria vlceri, vna
cum vrina purgantur. Ceterum haec, ab iis quae a vesti-
ca excernuntur, miscellae modus distinguit. Nam quod

ex cole defluit, in primo statim exitu excussum, urinā præuenire consuevit. Quod verò à vesica emittitur, urinæ admistum videtur. Quin etiam assiduè inter me iendum mordicus dolent pudendorum vlcera: præcipuè quum vel crustula, vel sordibus solutis, pura remanserint. Porro gonorrhœa est seminis assidua excretio, & inuita, quæ fit cole haudquaquã extenso. Priapismus verò est permanens colis tumor extensio ue in longitudinem atq; circulum, nullo stimulante ad libidinem aut desyderio, aut acquisito calore, vt quibusdam consuevit accidere, qui supini decumbunt. Igitur quemadmodum omnia corporis nostri excrementa, duobus modis vacuantur (interdum enim à continentibus ipsa corporibus excernuntur, interdum sponte profluunt, eo quòd ob imbecillitatem ab ipsis retineri nequeant corporibus) ita de semine quoq; dicendum est. Nam in huiusmodi omnibus, ut excernere tempestiuè, ita continere, naturæ est officium. Verùm secretio fit, aperto fluxionis meatu: ac reliquo conceptaculi spatio & contracto, & ad apertum iam meatum, quicquid intus continetur, pellente. Retentio verò fit, quū clausus manet meatus, & contentum à continente haudquaquàm impellitur, sed potius per contractionem comprehenditur, & retinetur. Hoc modo contenti in canis instrumentis humores, per integram valetudinē naturaliter & excernuntur, & retinentur. In illis autē qui præter naturam se habent, retentio quidē, ob excreticis facultatis imbecillitatem: excretio verò, ob retentricis infirmitatem euenit: vel ob dispositionem aliquam, quæ haud secus q̃ naturalis ipsa excretoria vis, partes mouere possit. Id quod in seminariis vasis videre licet, vbi quis vel comitali morbo, vel conuulsione violenter fuerit correptus. Cæterum videmus alias quoq; partes, ut manus, pedes, aut digitos conuelli, modo simul cum totius corporis conuulsione: mo

Excreta a cole
& vesica, quò
discernenda.

Gonorrhœa est
seminis assidua
profusio, & in
uita, quæ fit co
le haudquaquã
extenso.
Priapism⁹ qd.

Excrementa
corporis, duo
bus modis va
cuari.

Excretio quò
fit.

Retentio vt fiat.

Semē excerni
inuito per con
uulsiones.

sed ea duntaxat, quæ rara vident, prosequuntur admiratione. Quid autem in rerum natura, potest admirabilius contingere, quàm quod nouè perpetuis mensibus clauditur os uteri adeò exactè, vt ne specilli quidè acumen admittat: perfectò autem fœtu, vsq; adeò distèditur, vt totum animal per ipsum egredi possit? Ne igitur dubites pudendorum vim per se doctam esse: vt fistulosum hoc, neruolumq; corpus, vbi ad coitum insurgit animal, à naturali facultate, quæ ipsum potest attollere protinus distendat. Cuius rei simile, & in corde, & arteria planè videre est: nisi quod horum motus perpetuus existit, quia necessaria nobis est eorum actio: fistulosus verò neruus, non semper mouetur, sed quum vsus requirit. Quum ergo sic fuerit extensus, sequitur atq; illud replet ex arteriis spiritus: quemadmodum pulmo thoracem, ob eam quam habet ad ipsius motum consequutionè. Atq; eam actionè, satius est, vt ad neruū, quàm ad arterias referas: quum præsertim omnes functiones, ex propria partium essentia, non ex earum situ, provenire, rationi consonum sit. Arteriæ itaq; nullam aliā in pudendo habent actionis vim: quàm in vniuerso corpore: licet calfactis lumbis par sit, vt arteriæ calidiores reddantur, & magis etiam pateant ipsarum ora. Quamobrem non exiguum tunc spiritus essentiam, in fistulosum neruum effundunt: qui paulatim impletus, colem extendit: ita vt tota ipsius essentia consistere in fistuloso neruo videatur. Ex dictis igitur constat, vel ob arteriarum ora immodicè patefacta, vel vaporosum spiritum in fistuloso neruo ortum, priapismum oriri. Cæterum ab vtrisque ipsum fieri posse existimo: crebrius tamen ob arteriarum ora patentia. Porro medicamenta excitandæ tentiginis vim obtinentia, tum epota, tum pubi lūbis 7. admodum, calida omnino, ac flatulenta sunt: quemadmodum contraria omnia, minimè flatus excitant, ac potius refrigerant, quàm calfaciant. Sunt præterea

Populares etiam quæ raro vident, prosequuntur admiratione.

Priapi tensio. nem ad neruū potius referendam esse, quàm ad arterias.

Lumbis incaltescentibus, arteriæ penis calidiores redduntur.

Penis essentia tota in neruo fistuloso consistit.

Priapismus vnde oritur.

Medicamenta excitandæ tentiginis qualia existant.

Alimenta ve-
nerca.

Priapismo qui
soleant vexari
plurimum.

Cantores olim
q̃ nostro secu-
lo erant longe
cōtinentiores.
Pudēda castis
reddi exilia
& rugosa.

Ignavia robur
excluit.
Exercitatio vi-
res augere so-
let.

Mammæ.

alimenta quædam, quæ, quod plurimum gignant se-
minis, excitare ad libidinem possunt. Iam verò, qui
quum plurimo semine abundant, à concubitu absti-
nēt, ii interdum priapismo vexari solent, præsertim si
veneris imaginibus molestantur, nec studeant, vt mul-
ta exercitatione sanguinis abundantiam dissipent. Ac
cantores & athletæ, qui iam inde ab initio nullam vi-
tæ partem veneris illecebris contaminarunt, nullam
admittentes eiusmodi uel cogitationem, uel imagina-
tionem, iis pudenda & exilia, & rugosa fieri, ve-
luti senibus, consueuerunt. Siquidem præter cætera
quæ accidere solent iis, qui protinus iuuentute prima
immodicè sese permiserunt libidini, id etiam euenit,
vt horum locorum vasa, amplius patentia, maio-
rem ad se sanguinis copiam alliciant, & coeundi cu-
piditas magis increseat. Ignavia siquidem (vt inquit
Plato) exoluit: proprii autem officii exercitatio,
robur augere solet. Sic mammæ quoq̃, in iis
quæ nondum imprægnatæ fuerunt, con-
tractæ permanent: in aliis verò à par-
tu infantulos suos lactantibus,
nastissimæ euadūt, atq̃ ita
magnæ permanent
lac fundentes,
q̃diu scē-
tum lactauerūt:
quo ablato, haud ita
multò post, à lactis genera-
tione desistunt.

GALENI PERGA

MENI DE DIFFERENTIIS

FEBRIVM LIBER. I.

CAP. I.



PROPRIAE Ac maxime principales febriu differentiae sunt, quae sumuntur ab ipsa febris substantia, quae in calore praeter naturam consistit. Ut si dixerimus, febrium aliae quaedam mordaces: aliae vero sunt mites. At reliquae differentiae, ab accidente aliquo deducuntur. Ut quum

Febrium differentiae maxime principales sunt, quae sumuntur ab ipsa febris substantia;

Febrium differentiae ab accidente desumptae.

dicimus, febrium aliae pallidae, aliae rubrae, aliae liuidae. Porro differentiae caloris praeter naturam, & ex eo quod magis & minus, & ex materia in qua calor acceditur, & ex modo motus eiusdem caloris, sumuntur. Sunt autem omnino euidenter, quae in eo quod magis, aut minus, calor est accensus, consistunt. Quo in genere differentiae, consueverunt medici magnam ac parvam febrem vocare, improprie quidem rei quali nomen quati tribuentes. Quae vero a caloris materia ducuntur, maxime propriae differentiae caloris praeter naturam sunt. Atque haec sane ternario numero ambiuntur. Nam aut incalcescit ipsius cordis corpus: aut qui continentur in ventriculis eius humores: aut sola quidam aerea spiritalisque substantia sufficienter incaluit: humores autem & solida corpora, incalcescunt quidem adhuc, nondum autem sunt calefacta. Misti siquidem est in arteriis omnibus,

Febrium differentiae sumptae a materia cui haeret calor praeter naturam, sunt tres.

Aeream substā-
tiam esse mi-
stam per om-
nia sanguini.

spirantibus per infinita foramina, aerea substantia san-
guini: ac nihilo minus in corde ipso, ceu * confluxi-
li & cōspirabili cum vniuersis arteriis. Incipit itaq; hic
præter naturam calor, quē nominamus febrem, aliās
ex alio eorum, quæ nuper diximus: spargitur autem,
atq; vnā cum patiente afficit duo reliqua genera. Facil-
lima igitur ab humoribus ad spiritum caliditatis tran-
sumptio: non æquē autem promptē vnā cum spiritu:
accenduntur humores. Corpus etiam solidum, humo-
ribus atq; aeræ substantiæ facilius impartitur calorē,
q̄ ipsum ab eisdem suscipiat. Omnis siquidem substan-
tia tenuis, promptius alteratur q̄ crassa. Est autem te-
nuissima quidem aeris: crassissima verò corporum so-
lidorum: media humorum substantia existit. Cæterum
solidas partes, continentia: humores, contenta: spiri-
tus, impellentia appellauit Hippocrates.

Tenuis substā-
tia facilius al-
teratur quam
crassa.

C A P.

I I.

Ephemerarum
causæ.

Pestilenti mor-
bo correptos,
fugiēdos esse.

Tabidos, &
putridum ex-
pirantes, esse
abigendos.

Febres quæ oc-
casiones accen-
dant.

Q Vòd igitur ex laboribus, ira, tristitia, solis ar-
doribus, frigore, vigiliis, cruditate, ebrietate,
& crapula, nonnulli febricitare cernantur, omnibus ē
in confesso: quemadmodum etiam, q̄ pestilens aeris
constitutio febres conciliet: quodq; periculosa sit con-
uersatio cum laborantibus pestilenti morbo: quum ni-
mirum is non secus sit contagiosus, q̄ scabies aut lippi-
rudo. Sed neq; tutum est cum iis qui tabe correpti
sunt, conuersari: neq; (ut summam dicam) cum illis
qui spiritum putrem reddunt. Iam verò, qui consueta
exercitia omiserint, & aliis morborum generibus, &
febris maximè corripiūtur. Plethora etiam, vitiosi
cibi, medicamēta, estusq; circa canis syderis ortū, atq;
alia id genus complura, similiter febres accendunt.

C A P.

I I I.

Elementa cor-
porum, quæ.

I Gitur calidum, frigidum, humidum, atq; siccum,
corporum elementa existunt: ex ipsorumq; tem-
peraturis primi constituuntur morbi: quorum vnus ē

febris, vbi in corde quædā præter naturā caliditas generatur. At differentiæ caloris, à triplici differētia materiæ desumebantur. Siquidem uel in ipso corpore cordis, uel in humoribus, uel in spiritu, calor præter naturam accenditur. Præincipiunt autem causæ quædam notissimæ, in omni febrium constitutione, quatenus dictum est. Sed neq; sat est, si calor aliquis dicatur esse præter naturam, adhuc ut dici febris mereatur. Oportet siquidem prius ut cor illo incalescat; alioq; calor à sole aut ab igni inductus febris esset dicendus. Porro iracundia est ueluti feruor quidā, ac motus vehemens potentiæ irascibilis, in corde * delitescētis. Simul autem cum eo feruore calfit aliquando spiritus: aliquando substantia sanguinis. Quod si ita contigerit, ut ea corpora quæ in se admisserunt caliditatem, longo eam tempore retinere sint apta, licet motus cordis sedetur, in hisce tamen permanet calor præter naturam, atq; inde hominem febricitare est necesse. Huiuscemodi autem febris habet originem à motu atq; feruore naturæ caliditatis. Quæ autem ex tristitia fit, ex solo motu, non autem ex feruore gignitur. At illius quæ labores sequitur, principium est musculorum, neruorum, copularum, & articularum motus immoderatus. Ea si quidem primò, calorem quendam concipiunt. Dein verò continuatim calor ascendit ad cor: ac tunc homo necessariò febricitat. Quæ autem ex densitate cutis accenditur, febris, qualis maximè constipatis atq; astrictis corporibus accidere solet, mordaci effluxu in corpore coaceruato, contingit. Semper enim corpora animalium diffantur: idq; duplici modo: nempe effusis ad exteriora vaporosis fuliginosisq; superfluitatibus: ac rursus intus attracta refrigerante ac ventilante natium calorem aerea substantia. Quum igitur vehemens aliqua causa cutim ipsam condensans, meatus angustiores reddiderit, sæpius in plethoricam disposi-

Febris ē calor præter naturā in corde accensus.

Causæ procatartice.

Irascētia quid.

Febris ab iracundia qñ gignatur.

Febris orta a tristitia.

Febris ab exercitio immodico.

Febris a cute densata.

Diffari aialit corpora duplici modo.

Astrictionē cu-
ris, quō febris
sequatur.

Cruditatē pa-
tietium, qui nā
facile ī febres
incidāt & qui
regre.

Febres oriri so-
lent ob obstru-
ctiōes meatuū.
Putrescunt fa-
cile, calida &
humida, si con-
clusa in calidis
locis nec diffū-
tur, nec refrige-
rentur.
Plenitudo ad
mires,

tionem incidit corpus: si & nupidum & optimum, quā
effluit, extiterit. At si fuerit mordax & acre, nonnunquā
febre corripitur: quo tpe etiam calor maximē auge-
t, refrigerio extrinsecus adueniente priuatus. Acris autē
ac mordax superfluitas * effluit iis, qui aut natura vi-
tiosos habent humores, aut prauis cibis vtuntur, aut
sæpius cruditate vexantur: maximē si post eiusmodi
cibos aquam vitiosam biberint. Idem his quoque
accidit, qui supra modum laborant, aut vigilant, aut
cogitant, aut medicamina acuta iugiter sumunt. Eorū
igitur qui cruditatem patiuntur, ii quidem qui prauis
succis redundant, ac malē diffiantur, aut intempestiuē
laborāt, aut balneis superfluis vtuntur, faciliē corripitū-
tur febribus: Qui verō boni habitus sunt, itegre quēq; dif-
fiantur, & quiescunt, regionem quēq; ventriculi & hepa-
tis calfaciunt, impossibile est, vt febricitent. Nam in
eisdem residet ventriculi & hepatis partibus, quicquid
corruptum est, ac paulatim coquitur, redditur quēq; opti-
mum: sicuti & iis qui se motibus vehementioribus tor-
quēt, aut æstiuo sole, aut balneis calidis dulcium aqua-
rum vtuntur, quicquid vitiatum est, recipitur in cor-
poris habitū. Quibus verō corrupti cibi descenderunt
in ventrem, * eos febris nō corripit, nisi ob alias cau-
sas: veluti si defatigati sint ob crebriorem deiiciēdi ne-
cessitatem: aut ventrem inflammatio tētauerit. * Por-
rō per obstructiones meatuum, & humorum constipa-
tiones, ob putredinem solet febris oriri. Promptissi-
mē nāq; putrescunt omnia calida & humida, in calidis
locis contenta, nisi diffari ipsa & refrigerari contige-
rit. * Quin etiam in altera plenitudine quæ ad vi-
res dicitur, succi cito ad corruptionem deueniunt, *
quum nec vincantur, nec concoquantur à facultate,
vtpote imbecilla existente. Propterea autem quicūq;
cibi glutinosi atq; crassi sunt, * ii ratione putredinis
magis morbifici existunt: quādoquidem succi ex ipsis

geniti, longè promptiores sunt, vt & in meatibus hæ-
reant, & inpingantur. At acres & attenuantes cibi, q̃
mali succi sunt, febres etiam accendunt. Partes etiam
quæ experiuntur inflammationem, ratiõe putredinis
similiter febres inducunt. Impactus siquidem ĩ eis qui
ĩfluxit humor, si natura calidus sit, nec diffletur, acti-
um putrescit. Si igitur fluxiõem ipsam exquisitè ama-
ra bilis pepererit, caliditas erysipelatoſa partem occu-
pat: si verò sanguis, phlegmonosa: at si ex vtriusq; mi-
ſcellaneus humor, vel sit erysipelas inflàmationis par-
ticeps, vel inflammatio erysipelatis: nomen quidẽ ab
humore eccellente ſuſcipiens: cognomen autem ab al-
tero. In hiſce autem omnibus conſortii lege febris ac-
cenditur. Nā proxima pars calefacta particulæ, ſimul
cum ea calſit, donec ad cor * diſpoſitio ipſa peruene-
rit. Etenim in carbunculis id quod continuum exiſtit,
ſimiliter cõcaleſcit. Fiunt autem ex ſanguine qui-
dem ſatis calido, & ad atræ bilis naturam, propter ad-
uſtionem, conuerſo.

CAP. IIII.

Calidiores aeris ambientis ſtatus, per inſpirationẽ
quidem manifeſtè cor calfaciunt: corpori autem
extrinſecus circũfuſi, totum ipſum calidius reddunt:
ſed præſertim arterias: vt quæ ipſius ſubſtantiæ aeris
ambientis aliquid ad ſe alliciant: * cum quibus omni-
bus affici etiã cor eſt neceſſe: & quum calidius impẽ-
dio fuerit, ipſum primũ atq; præcipuè, calorem fe-
brilem ſuſcipere, ac dein vniuerſo corpori communi-
care. Peſtilentis autem febris, ĩſpiratio aeris vitiati &
putridi maximè eſſe in cauſa videtur. Fit aliquando
etiam ob eos qui ſunt in corpore humores ad putre-
ſcendum paratos: quum exiguam aliquam occaſionẽ
ad febris originem ab aere ambiente acceperit aĩal.
Aeris autem putredo accidit, vel ob cadauerum multi-
tudinẽ m̃nimè crematorum: vel ob lacuum, vel pa-
ludũ æſtiuo tempore euaporationẽ. Cæterum nulla

Inflàmata par-
ticulæ, cur fe-
bres ſuccedat.

Caliditas ery-
pelatoſa, &
phlegmonosa,
quã inſeſtent.

Carbunculi ori-
untur a feruen-
te & melâcho-
lico ſanguine.

Aer impendio
calidior, quid i
corpora noſtra
moliatur.

Peſtilentis fe-
bris cã eſt ĩſpi-
ratio aeris vi-
tiati & putri-
dinecũ vitio-
ſus ſuccus in
corpore, ad pu-
treſcendum ha-
bilis.

Causam nullā posse agere, absq; patiētis corporis aptitudine.

Pestilēti febre, quę corpora facile, & quę difficillime corripantur.

Aeris constitutio calida & humida, pestiferis est morbis obnoxia.

Corpora consentientia causis morbificis, facile corripuntur.

Corporum dispositiones dissimiles.

Corpus cōtra pestilentē aurā abet reddi purissimū, ac maxime tum per spirabile, tum causę præpotenti contrarium.

Pestiferę febres oēs a putredine oriuntur.

causarum sine patientis aptitudine agere potest. Alio-
qui ex æquo omnes afficerentur ab eadem causa. Quę
igitur vitiosis succis redundant corpora, obstructaq;
sunt, atq; inerti victus & exercitii ratione educata fue-
runt, ea sanē per pestilentes constitutiones ambientis,
statim à prima inspiratione initium putredinis sumēt,
ac plurimum in malo prouehentur. Quę verò contra-
rio modo disposita, nonnulla quidem nihil: nonnulla
verò adeò exiguum læsionis percipient, vt minimo
negotio reuerti ad naturalem habitum possint. Iā ve-
rò, quum aeris temperatura, ad caliditatem atq; humi-
ditatem immodicam fuerit conuersa, pestilentes mor-
bi exorientur: qui ea tantum corripiet corpora, quę
vt afficiantur, prompta & idonea erunt. Etenim ea cor-
pora, quorum dispositiones cōsentiunt causis morbifi-
cis, facillimē contaminantur: quorum verò renitunt,
ac reluctantur, quantum viribus ac magnitudine con-
trarietas valet, tantum inuisita cōtingit permanere ea
corpora. Quum enim corporū dispositiones dissimiles
ac multiformes existant, quędam facilē alterantur ac
patiuntur à causa in ipsa operante: quędam insupera-
biles atq; impassibiles permanent: quędam agrē pa-
tiuntur. Est autem ipsius medici opus, correctiuum er-
rorum omnium, qui circa humanum corpus contin-
gunt. Quare in iis omnibus prima esse debet, atq; com-
munis intentio, vt corpus q̄maximē purum sit, ac per-
spirabile: secunda autem: vt præpotenti causę aduer-
setur, q̄maximē fieri poterit. Nam quibus horum con-
traria insunt, corripuntur celeriter, acerrimeq; labo-
rant,

C A P. V.

Igitur omnes pestiferę febres à putredine originē
ducunt. At ephemerę, minimē putredinē humorū
sequuntur. Sed qui quidem ex solis incendio febrici-
tat, ab agentis causę caliditate affici natura est aptus.
Qui ex ira, huic feruorem quidem fieri caloris qui in

corde consistit, est necessarium: non tamen etiam putredinem. Sic & ei qui supra modum exercitatus est, vehementior calor præter naturam sine humorum putredine in corpore accenditur. Cui autem cutis astricta est, quum prius aciores superfluitates expirarent per eam, postea quæ sunt retentæ, coaceruatæque, in febre incidit, nulla interueniente humorum putredine. Porro quæ tumoribus inguinum superueniunt febres, omnes (authore Hippocrate) perniciosæ sunt, exceptis ephemeris. Sunt si quidem quædam febres è genere ephemerarum, superuenientes tumoribus inguinum: quæ quidem ab eis differunt quæ ex humorum putredine eueniunt, quæque vel in aliquo viscerum, vel in cauis & maximis uasis radicem habent suæ generatiōis. Quandoquidem quæ inguinum tumoribus ephemeræ superueniunt, concalfaciunt semper partes vicinas donec usque ad cor febrilis calor pueniat: quod tamē putrida fuligo non peruenit: sed ibidem, in loco inguinis circumscripta remanet, sola alteratiōe per continuum facta, atque usque ad cor ipsum extensa sola caliditate. In putredine autem quæ aut in visceribus, aut in magnis fit uasis, quidam veluti fumus, ex putrescentibus succis ad ventriculos cordis attollitur. Præterea in tumoribus inguinum omnes simul, collectique humores putrescunt, siue per vnum, siue per duos continuos dies: utpote in vno eodemque loco compacti: at qui in visceribus sunt, uasisque magnis, quum perpetuò fluat, suoque contactu vicinos ad putredinem trahant, spatio temporis putridum calorem accendunt.

C A P. V I.

Humorū autem putredo, quæ in uasis fit, similis est ei quæ in inflammationibus abscessibus, atque tuberibus accidit, duplex existens secundum genus. Nam aut fit vincere natura: aut omnimodo superata: aut adeo imbecilli reddita, ut nullam amplius in pu-

Ephemeræ
omnes fieri nulla
intercedente
putredine.

Ephemeræ su-
peruenientes tu-
moribus ingui-
nū, quomodo
a putridis dif-
ferant.

Putredo hu-
morū quæ in
uasis fit, contin-
git dupliciter

Pus laudabile
quale esse de-
beat

rescente excremento ad optimum moliri possit tran-
smutationem : quod quidem tertium genus putredi-
nis ex duobus primis conflat. Per abscessus igitur,
integrè superante natura, optimum conficitur pus,
aspectui album & crassum, & quaq; versum sibi simile:
læue autem tangenti, ac minimè fœtidum. Nam si se-
miputridum fuerit, tertium in tali transmutatione ge-
nus, quod paulo ante diximus, fit: quodq; secundū ma-
gis & minus, varias differentias sortitur. Quotcunq;
autem in abscessibus putredinis sunt differentiz, toti-
dem & in febribus quæ ex putredine succeduntur,
sunt eorum quæ in vrinis apparēt, formæ varietates.

Vrina optima
ab humoribus
putrescētibus,
qualis.
Vrina pes-
sima.

Optima verò vrina quæ ex putrescente humore per-
ficitur, qui adhuc concoctionem à continenti vale sus-
cipiat, est quæ albam, læuem, æqualē, & minimè fœ-
tidam habet hypostasim. Pesima autem est, quæ in om-
nibus maximè contrario modo se habet. Quæ verò
intermedia existit, quò ad alteram propius accesserit,
tantò aut melior est, aut deterior.

G A P.

V I I.

Ephemeræ oēs
oriuntur a pro-
catartica cā.

Porrò febrium ephemerarum hoc unum est præ-
cipuum atq; inseparabile indicium, qd ab aliqua ma-
nifesta causa p̄incipienteq; (quam procatacticam vo-
cant) oriatur. Non est tamen id signum earum pro-
prium. Nam & aliarum quædam, à causa manifesta gi-
gnuntur, quæ nimirum præcessit. Inseparabile verò
ac proprium ephemerarum est, vrinæ statim prima
die concoctio: pulsusq; ad magnitudinem & celeritatē
effatu dignam accedens: ita vt frequentia à proportio-
ne deficiat secundum externam quietem. Est autem &
magis inseparabile & proprium, qd nullo modo ad ce-
leritatem ea pars pulsus, quæ dicitur systole, tendit: &
si aliquando contingat hoc, minimum ac vix percepti-
bile existit, parumq; à naturali tenore mutatum. Sed
& caliditatis suauitas, proprium atq; inseparabile est

Ephemerarū
vrina & pul-
sus qualis.

Ephemerarū
calor ē perce-
ptus suauis.

huiusmodi febrium indicium. Inseparabile quoque, æqualis atque incompressus ascensus, in calore simul & pulsibus: non tamen proprium, quum & aliis quibusdam adsit: sicuti etiam consistente febre mediocritas. Neque enim hoc etiam est ephemerarum proprium: quod eis maximè inest. Proprium præterea, inseparabileque ephemerarum indicium est, cum sudore, aut rore, aut aliquo optimo vapore inclinatio, quam sequatur integritas. Atque hæc quidem est communis ephemerarum febrium dignotio. Earum verò quæ ex aduerso ab ephemeris distinguuntur, quædam in putredine humorum consistunt: quædam solidas animalis particulas occupant. Atque has sanè Medici febres hecticas appellarunt, vel quia firmæ atque fixæ, perinde ac habitus, sunt: vel quia corporis habitum comprehenderunt: sic enim partes solidas vocitant. Primum autem & proprium, non tamen inseparabile, putridarum febrium est signum, quod nulla procatactica causa eas antecedit: id quod neutri aliorum generum inest. Quandoquidem ephemeræ omnes oriuntur à procatacticis. Hæcticæ autem, quando sine his gignuntur, minimè ab initio inuadunt. Vbi quis igitur citra manifestam, præincipientemque causam cœpit febrere, scire oportet eius febris causam in humoribus esse. Interdum tamen aliqua ex procatacticis causis sui ratione febrem accendit ephemeram: succedit autem altera ex putredine humorum, ubi quod afficitur corpus & impurum, & superflui humoris colluvie redundans fuerit. Successionis autem ipsius, una quidem propria inseparabilisque dignotio habetur, quod febris ephemera ad integritatem non desinat. Contingit verò aliquando, ut per vigorem ephemeræ, ac nullo magis per declinationis initium, signum aliquod permutationis cernatur: videlicet si ea tranquillitas absit, quam adesse oportebat. Initium autem sumere à rigore febrem, ubi nec insolatus, nec præcessit aliqua refrige-

Ephemerarum inclinatio accidit cum sudore vel rore.

Putridæ febres.

Hæcticæ febres occupant solidas corporis partes.

Putridas febres nulla procatactica antecedit causa.

Putrida febris quâdo succedat ephemera.

Ephemeram permutari in putridam, quibus dignoscetur indicia.

separabilis. Comitatur tamen magna ex parte heſticas febres: nonnunq̃ verò etiam duo genera alia, ſymptomate aliquo interueniente. Quippe durities accidit arteriarum tunicis, aut ob congelationem, aut tensionem, aut ſiccitatem. Congelationes igitur, vehementes algores efficiunt: tensionem verò, inflammatioes, & duri tumores, & neruorum diſpoſitio inflammatio nibus correfpondens. At ſiccitatem, euacuationes diuturnæ, & longi temporis fames, & diutina febres ardentes. In vniuerſum autem, quæcunq; ſolidas animalis particulas vehementer exiccant, ſicuti & heſticae febres, arteriarum duritiem efficiunt.

CAP.

VIII.

AT verò heſticae febres magna quidem ex parte ardentibus febribus ſolent ſupuenire, vſq; adeò productis, vt humorem in corpore cordis còtentum abſumpſerint: quanq̃ fieri etiam poteſt, ut magna adhuc eius portio ſeruetur. Cæterum illæ nò tantùm heſticae ſunt, ſed etiã tabidæ. Quæ verò manente adhuc humiditate gignuntur, vbi cordis occupauerint corpus, hinc maximè ſuccenduntur, quemadmodum lucernæ flamma ex ellychnio. Alio autem modo febres heſticae oriuntur, vbi ſtatim ab initio inuadentes, ſimilem ortum cum ephemeris habent: videlicet aut ex ira, aut triſtitia, aut laſſitudine inſigni, aut ardore ſolis contractum. Quæ igitur ſic gignuntur, nò admodum ægrè curantur. Quæ autem peruenerunt ad tabem, iis, vbi iam exquisitè conſiſtunt, & iamdudum inceperunt, ut medeamur eſt impoſſibile. Si quidem earum natura calida eſt & ſicca: quum per eas tale quid perpetiatur cor, quale lucernæ ellychniũ, dum plurimum eſt exuſtum. Differt autem tabida febris à tabe, ſiue maraſmo. Maraſmus ſiquidem etiam abſq; febre in decrepita ætate ſolet accidere, extincto natiuo calore: id quod nihil aliud eſt, q̃ mors, quæ

Durities unde
accidat arte-
riarũ tunicis.

Heſticae ma-
gna ex parte
ardẽtib⁹ ſolent
ſupuenire.
Tabidæ fe-
bres.

Heſticas fe-
bres interdum
ab initio inua-
dere, ſimilẽ cõ
ephemeris ha-
bentes genera-
tionem.
Heſticarũ non
nullas quidem
facile: alias æ-
gre curatiſſem
recipere.

Maraſmus.

tio difficilis, vbi præterierit principii tempus: quod nõ dierum aut horarum numero, sed ipso dispositionis modo determinandum est. Cæterum quum naturalis temperies cordis primùm inuerti inceperit, neq; natiua humiditas protinus dissipatur, neq; virtus laborat plurimùm: sed primò fit veluti quædam effernescentia ipsius humiditatis: quo tempore facilè est eiusmodi febrem sanare, tanq̃ nihil adhuc virtute perpeffa. Tantùm autem virtus laborat, quantum siccitas & caliditas in ipso corde iualuerit. Iam verò, quæ febris æqualiter ab utraq; distat, ab ea scilicet quæ exquisitè tabida existit, & ab illa in qua nihil est adhuc tale, median quodammodo se habet ad curationem, dubio ad partes ambas momento inclinās. Quæ autem tabidæ proximior existit, est vicinior periculo: quum quæ alteri primæ magis adhæret, non paruam salutis spem possit nobis promittere. Fingamus igitur aliquem eẽ cor repleum febre, quam præcesserant conspicuæ & procatarticæ causæ. Si enim febris ipsa ad sequentem diem extendatur, neq; integrè desinat, neq; exaspere tur magis, ariditatem tamen maiorem in corpore repræsentet, talem hecticam fore tibi suspicandum fuerit. Quòd si & in tertio die sine cibo pmanere voluerit æger, doneq; tertiæ accessionis præterierit horas suspectas, nihilq; effatu dignū priori accesserit febre, aut imminutum fuerit, sed tantummodo quædam exiguæ reliquæ primæ febris procedant, permaneantq; cum ariditate corporis, & caliditate, quæ primo quidem tactu mitis sentiatur, processu verò, acris, mordax & sicca: huiusmodi febrem hecticam esse existimandum est. Maximum verò & indubitatum erit eius naturæ indicium, si cibum homini post suspectas horas obtuleris. Statim siquidem vna vel altera hora post cibum exhibitum, quicumq; ægrotantem tetigerint, alteram febris accessionē opinabūtur adesse. Oi-

*Hæc febris
inuestigatio.*

Hecticas febres post sumptum cibum, excandescere, exacerbantur æqualiter.

Hecticas febribus nulla adest accessio.

Synochos febris est tota vna febris continua.

Hecticæ omnes pusillæ & æquales semper a principio vsque ad finem existunt.

Tabidarum februm proprium est siccitas.

Hecticas sæpe absque siccitate consistere.

Febricunque alterari pulsus post cibum, in magnitudine atque velocitatem.

bus namque hecticis febribus hoc proprium inseparabileque adest indicium, scilicet quod allato cibo accendatur calor, pulsusque ad magnitudinem & velocitatem augeatur, sic ut videatur oborta esse incompressa quedam accessio: hoc est libera ab omni inæqualitate, qualis comitari alias febres solet. Nam tamen in aliis non nullis febribus huiusmodi insultus incompressi cernantur, ii tamen absque cibo solent accidere. In febribus autem hecticis, nunquam aliqua accessio conspicitur, sed perpetuo cernitur vna febris continua, ut illa quæ synochos appellatur. Ea tamen quandam veluti flammam plurimam admoventi manum possidet occurrentem: pulsusque ædit celerrimos, frequentissimos, atque maximos. In hecticis autem febribus, neque multa occurrit caliditas, pulsusque tanto minores, rariores, atque tardiores sunt iis, qui per synochos fiunt, quanto etiam caliditas ipsa est minor. Commune itaque omnibus hecticis febribus est, quod pusillæ, & semper a principio vsque ad finem æquales existant. Proprium autem est tabidarum siccitas. Nam sine siccitate sæpius hecticæ febres consistunt, quum minimè in tabem degenerant. Iam cæteras febres quæ incompressas accessiones sortiuntur, omnino compressio aliqua comitatur, dum cibus ingestus fuerit in accessionis principio. Hecticis autem, post cibum assumptum, quedam veluti inconcussus insultus fieri contingit: qui tamen non est accessio: sed incrementum caloris, atque promotio pulsus in magnitudinem atque velocitatem, qualis cui cunque alteri, post cibum solet accidere. Quamobrem alteratio ipsa tandiu perdurabit, donec distributus cibus appositusque, humectauerit cordis ariditatem. Postea verò corpus ad pristinum reuertetur statum, in quo antea quæ cibus exhiberetur, conspiciebatur. Quod si rursus nutrire velis, vel in diuersis temporibus, senties semper calorem post cibos adauctum: pulsus autem (ut dictum

dictum est) alteratos: utpote quibus idem videtur accidere, quod calci & lapidibus calefactis: quorum nimirum caliditas arida per aquæ affusionem, ab humida substantia nutritur. Humida enim caliditas, quæ sicca, vires habet non parum euidentiores. At verò siccam in hecticis febribus esse caliditatem, quas consequitur tabes, hinc constat, quod nullus eorum qui habitu corporis sunt humidiori, statim ab initio huiusmodi febre correptus fuerit. Quicumque autem sunt natura sicciores, ac præsertim si temperiem etiam calidiorem sortiantur, vitamque elegerint in laboribus, vigiliis, curis, tenuique victus ratione, hos statim ab initio solet hectica febris inuadere, ex ira, vel tristitia, ac magis æstate, statuque temporis calido & sicco, ac loco præterea consimili. Ac terminus talium hecticarum principii est, si eo tempore, quo solent ephemera ad integritatem desinere, non solum istis nihil tale accadat, sed siccitas et manifestè intendatur. Alter verò cuiusdam veluti ipsius augmenti, atque integræ perfectionis terminus, est tertiæ diei accessio. Nam si tunc nec altera accessio superuenerit, neque ægrotus absque febre fuerit, adaucta insuper siccitate, proculdubio hic hectica febre laborat: quæ progressu temporis cito ad tabidam conuertetur, nisi rectè cûretur. Terminus autem permutatio nis ipsius ad tabem est, dum pulsus debilis simul atque durus sentietur, qui quidem necessario etiam erit parvus & frequens: non tamen propterea febris dicitur tabida: sed ob id potius, quod debilis atque durus existit. Debilitas siquidem, vehementem sequitur febris interperantiam: durities autem, ariditatè. Si igitur huiusmodi affectus cor occupauerit, hinc febre tabida necessum est animal laborare. In eandem verò incidunt febrem ex ardentibus atque acutis febribus plures, qui rectè curati non sunt: quicunque quum egerent potione frigida, non solum eam non biberunt, sed nullum etiam

*Hectica statim
ab initio, qui
prehendantur.*

*Tabida febre
tunc laborabit
animal, quum calor
hecticus in
ipsum cor oc-
cupauerit.*

Tabes quibus
soleat superue
nire.

Tabes corripit
cor quibus ex
causis possit.

Tabes
sup.
causis

aliud refrigerans medicamen applicuerunt thoraci et
p̄cordiis. Quin etiam hepatis ac v̄etriculi inflammationi
bus, nisi recte curentur, tabes superire consuevit: affe
ctione ipsa cordi communicata. Si quidem tabe corri
pitur cor, interdum quidem ex se ipso: sicuti per excā
descendit, vehementesq; atq; diurnas tristitias: non
nunq; verò ex ardentibus febribus: aliquando autem
ex pulmonis ac thoracis affectibus: ac p̄sertim ex em
pyemate & phthisi: atq; adeò, ex diuturnis nobilium
partium inflammationibus. Similiter in liēteria & di
arrhoea, si vel ab initio statim, vel progressu tēporis,
febris inuaserit, tabidæ postea febres succedūt. In vn̄
uersum autem, quando cūq; præexiccatum cordis cor
pus febrilem caliditatem susceperit, & quæ cum diffi
cultate extinguatur, tabida occupatur febre. Quare
& quum arteriæ circumstantibus partibus calidiores
sentiuntur, maximum sunt hecticarum febrium indi
cium. Vbi igitur sola per seipsam consistit hectica fe
bris, perspicua est, an sit absolutè hectica: an simul &
marasmodos. Vbi verò hectica febris vn̄a cum putri
da coit, longè difficilins cognoscitur: quāuis ex arteria
rum p̄seuerante calore, motusq; celeritate & frequen
tia, eam discernere possumus.

Hecticam mi
sceri interdum
cum putrida.

C A P.

X.

Febris ex info
lata.

Febris ex cute
astricta.

PORRò qui ex feruore solis inciderunt in febriem,
his cutis magis ad calorem & siccitatem, q̄ pulsus
ad febrilem vergit dispositionem: nam & minus siti
bundi sunt iis, qui æqualem habent caliditatem: & q̄ pri
mum manus admouetur, ingens calor percipitur. Cō
tra res se habet in iis, qui ex cute densata & astricta la
borant: nam in eis reaccenditur calor. At qui ex feruo
re solis ægrotāt, his maximè deuri caput videt: plusq;
ex balneis frigidis vtilitatis & delectationis percipiūt.
Oculi quoq; in eis rubicundiores & calidiores cū qua
dam ariditate videntur, si quidē sine grauedine ac de

Billatione affligantur. Est autem minus calida cutis iis qui ex frigidityte febricitant: corpusq; eis in maiorem tumorem attollitur: ac nullus in fronte squallor, qualis illis qui ex insolatu febricitant, sine plenitudine capitis. Siquidem magna ex parte his solet caput repleti, nisi quis purum, materiae q; inutilis expers corpus possideat. Solis quippe his caput cal fieri contingit, sine aliqua plenitudinis noxa.

Febris ex frigidityte.

GALENI PERGA

MENI DE DIFFERENTIIS.

FEBRIVM. LIB. II.

CAP. I.



SVPEREST autem nunc, vt de differentiis febrium quæ ex humorum putredine oriuntur, similiter disseramus: idq; vbi admonuerimus prius, non lat esse (quemadmodum multi opinantur) ad omnium febrium generationem si in corpore anara bilis redundet. Alioqui laborantes arcuato morbo, ad vnum omnes maximis corripentur febribus: id quod nequaquam continet, priusq; bilis quæ in illis copiosissima est, computrescat. Absurdum etiam est credere, in quartanis & quotidianis febribus exquisitis, acervari bilem anaram, quemadmodum in tertianis, atq; in caustionide: quum in illis nullum talis succi vestigiū adsit. Etenim febres tertianæ magna ex parte in corporibus natura magis biliosis sunt, in ætate vigenti (quæ omnium biliosissima est) tempore æstiuo (in quo dominatur is humor) in locis præterea quæ calidam & siccam temperiē pos-

Tertianæ febres quibus naturis magis sunt familiares

in
22
218

Quotidianæ
febres quibus
naturis magis
sunt familiares

ident, in similiq; aeris ambientis constitutione, ac bre-
uiter, in homine q laborib⁹, curis, vigiliis, æstu, tenuis
victus ratione, eademq; calida & sicca, ac deniq; medi-
caminum calfacientium & exiccantiū inmodico vsu
fuerit commaceratus. Quotidianæ verò, naturis in q-
bus pituita superfluit, sunt familiares: in hyemeq; præ-
cipue, atq; in omni locorum & temporum statu frigi-
diori atq; humidiori, gignūtur. Ex ætatibus porrò, se-
nilem atq; puerilem infestant magis: præsertim si acce-
dat otiosa vita, quam crapulæ comitantur: atq; etiam
si post pituitosos cibos, quispiam balneis vtatur. Neq;
etiam ii qui quotidiana febre tenentur, amaram euo-
munt bilem, nec per ventrem inferiorem aut sudores
illam excernunt, quod in febribus contingit tertianis.

Tertianæ sunt
a flaua bile cō
putrescente.

Quotidianæ
sunt a pituita.
Quartanis fe-
bribus quæ o-
rigine pntent.

Hæ siquidem flaua bile putrescente gignūtur. At quo-
tidianæ ex pituita: quemadmodum quartanæ ex atra
bile ducunt originem. Proinde corporum naturæ ma-
gis ad atram bilem procliuēs, ex ætatibus, præcipue de-
clinans: ex anni verò temporibus, maximè autūnus,
ac breuiter victus vniuersus frigidus atq; siccus, quar-
tanis febribus originem præstant. Quare & rigor qui
vtrunq; genus febris antecedit, haudquā similis est:
* sed qui in tertianis quidem accidit, representat sen-
sum causæ efficientis, veluti rei cuiusdam pungentis,
ferientisq;. Qui verò in quartanis, tanq; refrigerantis.
Porrò febres intermittentes, quæ nimirum ad integri-
tatem desinunt, ortum habent ab humore qui per om-
nes corporis partes suo motu defertur. At in ætinuis,
humor delitescit atq; continetur in venis.

Rigor qualis
tertianis, quar-
tanisq;.
Intermittentiū
febrium, & cō-
tinuāū disci-
men.

G A L.

I I.

Intermittentiū
febrium tres
differentiæ.
Continuarum
spēs duplex.

Intermittentium igitur tres sunt omnes numero
distingui, quotidiana, tertiana, & quartana: quotidiana
quidem, ex pituita: tertiana autē, ex flauæ bilis: quar-
tana deniq; ex atræ putredine propagata. Continua-
rum autem quæ ex flaua bile proueniunt, duplex spe-

tes habetur: vna quidem, earum quæ appellantur synochi: quarum vniuersum tempus vnica accessio ex-
 stit, à principio vsq; ad finem extensæ: altèra verò e-
 rum quæ idem cum genere nomen habent, cõtinuæq;
 dicuntur, atq; in pluribus * particularibus circuitibus
 continentur. Earum igitur quæ appellantur synochi,
 tres differentie connumerantur. Nam earum quæ dā
 à principio ad finem vsq; perseverant æquales: quæ dā
 paulatim augentur: aliæ decrescunt, atq; minuantur.
 Vnde nonnulli primas quidem homotonas acmasti-
 casq;: secundas epacmasticas: tertijs paraemasticas:
 hoc est vniformes, inualescentes, & decrescentes, no-
 minant. At continuarum duæ sunt differentie primæ:
 Siquidem earum nonnullæ quidem, tertio quodq; die
 inualescunt exaspèranturq;: referentes naturam ter-
 tianæ febris: aliæ verò etiam die intermedio exacerba-
 tionem faciunt: Neutræ tamen harum ad integritatē
 desinunt. Earum igitur continuarum quæ die intermedia
 accessione faciunt, nonnullæ quidem formam quo-
 tidianarum seruant; duas inuicem accessiones simili-
 mas conficientes: aliæ verò, quum duas dissimiles fa-
 ciant, simillimam primæ tertiam efficiunt: atq; secun-
 dæ quartam: instar duarum tertianarum progredien-
 tes. Hæ igitur, ex bilioso magis: alteræ verò quæ sin-
 gulis diebus similem accessione faciunt, ex pituitoso
 humore consistunt. Est & tertium genus febriū con-
 tinuarum, quæ perrarò tamen eueniunt, quarum ac-
 cessiones quartanarum figuram progredientes osten-
 dunt: nec desinunt tamen integrè. Quemadmodū au-
 tem febris tertiana aliquando fit duplex, & aliquñ tri-
 plex: sic hæc etiā non duplex modò, sed triplex potest
 euadere.

C A P.

I I I.

QUæ igitur à flaua bile per sensibiles corporis
 partes delata oritur febris, ea cum rigore in-
 uadit, atq; ardētis febris similitudinem gerit, & bilio-

Tertianæ feb.
symptomata.

sis vomitibus, aut deiectionibus, aut sudoribus, vel horum quibusdam, vel omnibus simul, soluitur. Huius febris accessio duodecim ad summum horarum æquinoctialium intervallo finitur. Vocamus autem ipsam exquisitam tertianam, quæ in temperatura laborantis biliosa, & anni tempore, & regione, & victus ratione calidis & siccis consistit. At verò copiosior bilis, eaque pauca est, longiorem facit accessionem: tenuis autem, crassa brevior. Sic & vigor, maior quidem, brevior: imbecillior autem longior. Præterea corporis dispositio, rara quidem, brevior: densa verò longior. Tempus autem intermissionis in hac febre, nullum habet humoris putrescentis ex pulsu perceptibile indicium, in die, aut nocte, quæ consequitur accessionem. Quum verò parumper succenditur, vix agnosci potest in primis diei aut noctis subinde sequentibus partibus. Manifestius autem circa fines ipsius diei vel noctis: atque adhuc manifestius die proxima, quæ videlicet antecedit accessionis diem vel noctem. In illa verò iam signum evidentius apparet, ac multo etiam magis accessione iam incipiente: atque adhuc plus, inualecente febre. Quum verò iam consistit, minus quam quum augebatur: multoque minus ubi iam declinaverit.

CAP. IIII.

Quotidianæ
febris descriptio.

Est & alia exquisitæ simplicitatis febris, quæ ex pituita trilaginosâ ortum habet, per sensiles à natura partes impulsâ. Incipit autem à refrigeratione extremorum, & horrore magis quam rigore. Cum difficultate periculum accenditur calor, ac longum consumit tempus, dum inualecendo peruenit ad summum. Quoniam verò is ex quo constituitur humor, frigidus est & humidus, ac præterea lentus & tenax, ideo ægrè accenditur, ac tardè movetur, sæpiusque in foraminibus hæret. Opprimit autem atque aggravat aliquando virtutem: unde inæquales ac debiles magis, paruosque efficit pul-

sus, quum primū accessiones inuadunt, atq; in primis incrementi partibus. Fiunt & in biliosa febris circa accessionum principia, singuli quos diximus pulsuum affectus: in ea tamen statim desinūt: cætera verò, nec non inæqualitas, plerunq; tali febre inuadente nō adsunt. At postq̃ cessauerit rigor, nō multum post calor accenditur, veluti ignis effulgens, purusq; , omnis fumosæ fuliginis expers. Pituitosi autem humoris caliditas, ignem humidum ex accensis lignis viridib⁹ refert. Idcirco, & * exiguæ euacuationes ab ipso, & accessionis spatium longius producitur: neq; intermissionis tempus est adeò vt in tertiana syncerum, sed humoris putrefacti seruat indicium. Attamen quum exquisitè suā naturam seruauerit, plerisq; & mihi non raro videtur habere puram intermissionem. Hæc febris naturas cōsequitur corporum & tempora, & loca, & status, artesq; , & victus rationem, aliāq; omnia prorsus alumina pituitæ. Accenditur autem singulis diebus, etsi minus calida sit, q̃ biliosa tertiana. Hæc enim, quū humorem habeat minimo negotio inflammabilem, facileq; quicquid ex eo efferbuerit, totum propter subtilitatē in accessione expurgetur, ad puriorem quandam integritatem terminari videtur: atq; exiguum quoddā vestigium post paroxysmū, putridæ caliditatis relinquere. Quæ autem ex pituita febris accenditur, in accessionum declinationibus nō expurgatur integrè, neq; parum relinquit eius quod veluti succendi videtur: ac proinde intermissio eius longè deterior est: ac secundæ accessionis multo magis festinat insultus.

C. A. P.

V.

Tertium febrium intermittentium genus est exposita quartana, quum ex solo atra bilis humore gignitur, qui frigida & sicca constat temperatura. Succeditur autem paulatim, velut lapis aliquis, aut corpus similiter frigidum atq; siccum. Vbi verò aliqua ex eo

Tertianæ & quotidianæ discrimen penes sensum caloris.

Quotidiana accenditur singulis diebus, quia in accessionum declinationibus nō expurgatur integre, vt exigit tertiana.

Quartana exquiritur gignitur ab atra bile.

possibile arbitrabant veteres, oriri absq; febre rigore.

C A P.

V. I. V.

EX genere quotidianarum est febris quam Hepialam vocant, ubi simul & febriunt, & rigent ægri, atq; eodem tempore in toto corpore vtrunq; sentiunt affectum. Oritur autem hæc febris, ab humore illo, quem vitreū Praxagoras vocat, quicq; est species quarundam pituitæ, satis frigidus atq; tenax existens. Siquidem omnis frigidus atq; humidus succus, ad pituitæ appellationem refertur. Cuius tamen plures sunt differentię. Est namq; vna species pituitæ, vsq; adeo frigida, vt quā detinetur alicubi, dolores acerbissimos excitet. Atq; hæc sanè vitro fusio est persimilis. Est & alia pituitæ species haudquā exactè frigida, quam pleriq; cum ferreati expuunt: sensibilem habens dulcedinem. Accedit tertia species pituitæ, quæ sentitur expuentibus acida: estq; min⁹ frigida, q̄ quæ dicitur vitrea: magis verò q̄ dulcis. Præter has species, est salsa aut ob putredinem, aut ob serosæ humiditatis missionem. Ex qua quidem febricitantes, non rigent, sed tantummodo horrent. Acida verò ac vitrea pituita, si per partes sensiles deferatur, rigores citra febrem inducit. Quod si modica aliqua in ipsis fiat putrefactio, febrem Hepialam conciliant. At si vehementius putrescant, rigor quædam antecedit, febris verò sequitur, à multitudine caloris frigida materia deuicta. At putrescente dulci pituita, rigor minimè antecedit febrem.

C A P.

V. I. I.

Porrò si pituita putrescens misceatur amaræ bili, duplex vt causa, sic etiam dispositio iungetur. Alter siquidem humor afferet quotidie accessionem: alter verò tertio quoq; die. Itaq; alter quidē dies, duas accessiones habebit: alter verò, vnā duntaxat: nisi accessionum tempora sibi mutuò cohæreant: cohærentibus siquidem, fiet vna febris confusa, quæ neq; puræ

Hepiala ē ex genere quotidianarum.

Hepiala oritur a vitrea pituita.

Pituitæ quatuor species.

antipituita A.

Hepialam fieri etiam a pituita acida.

*Tertianæ feb.
& quotidianæ
mistarum, qua-
tuor coniuga-
tiones.*

tertiarum, nec quotidianarum formam præ se se feret. Quo-
niam verò utriusque febris duplex species est, quatuor
ex ipsis fient coniugationes. Vna quidem, in qua ter-
tiana quotidianæ intermittenti miscetur; altera, in qua
tertiana quotidianæ continuæ iungitur. Tertia, in qua
quotidiana intermittens tertianæ continuæ miscetur:
quarta denique, in qua permiscetur quotidiana continuæ
tertiarum continuæ. Harum verò nuper dictarum con-
iugationum omnium, duæ sunt differentiae: quum ali-
quando quidem in eandem horam accessiones occur-
rant: nonnunquam verò diuersis temporibus superueniunt.
Cæterum ex accessionis forma, non ex periodorum si-
mili proportionem, cognoscenda ipsa febris venit. At
quæ singulis diebus accenditur atque intermittit febris,
ea amphimerina, hoc est simpliciter quotidiana vocetur.
Quæ verò, intermissionem non habet, continua

*Amphimerina
febris.*

*Hemitritæus
constat ex quo-
tidiana conti-
nua, & intermit-
tente tertiana.
Hemitritæum
inuadere cum
honore.*

*Hemitritæi du-
plex generati-
onis modus.*

quotidiana dicatur. Idem etiam & in aliis febribus est
faciendum iudicium. Iam verò, ex quotidiana conti-
nua, & tertiana intermittente, hemitritæi natura con-
stat. Quum igitur tertianæ insultus cum rigore inuadat:
quotidianæ autem continuæ, sine rigore: sanè si ambæ
in vnam horam (quod interdum per hemitritæum con-
tingit) conspirent ex æquo, febris conflata ex utraque,
horrorem præ se feret; rem quidem rigore minorem:
sed maiorem refrigerationem. Quo circa dimidiam he-
mitritæi portionem utraque illarum febrium (dico quoti-
dianæ continuæ, & intermittens tertianæ) occupa-
bit. Est autem hemitritæi duplex generatiōis modus.
Nā aut illarum febrium accessiones in vnam eandemque ho-
ram coeunt, quæ altera quidem anticipet, atque altera pro-
rogetur: vel statim ab ipso initio ambæ febres miscen-
tur & confunduntur. Quæ igitur sit, in vnum tempus
conspirante utraque accessione, vnum dūtaxat hemitri-
tæi naturæ paroxysmum sortitur: altera autem om-
nes, à principio ægritudinis, usque ad finem: quæ febris

maximè ab omnibus hemitritæos vocatur. Qui autē intermittētis tertianæ & quotidianæ continuæ formam per se cognorit, faciliè complicatas per symptomata propria distinguet. Porro quæ nā ex eis complicatis citius sit habitura finem, ex ipsarum specie, accessionis prolixitate, magnitudineq; præterea ex more, motu, reditu periodorum, necnon ex concoctionis & cruditatis indicis, coniecturandum.

C A P.

V I I I.

Febbris igitur, quæ ex intermittēte tertiana, & quotidiana continua, composita est (quā hemitritæū vocamus) aut flauam bilem habet exuperantem: atq; ob id, in ea fiunt tertianæ febris accidētia maiora: aut hæc quidem parcior, pituita verò abundantiore existit: ob idq; quotidianæ continuæ affectus firmiores: aut neuter horum humorum alteri vincit, sed ambo æqui pollere vidētur: id quod in exquisitis hemitritæis, hoc est semitertianis, contingit. Ergo si in missione ipsa præualuerit febris tertiana, horridior sit tota febris, & nō nihil sibi in inuasiōne rigoris associat. Confestim verò & feruidior est huiusmodi febris, & incendii plus habet, magisq; ad summum festinat: & aliquid bilis per vomitum, aut per aluum, aut per sudores excernitur. At si altera ex pituita febris sit præpotentior, tunc frig⁹ vehemētius extremas occupat partes, & pauci adsunt horrores, ac pulsus magis, & diutius comprimitur: tardiusq; accessio inualefcit, ac longum post tempus consistit: non tamen aut sitim, aut magnum adfert incendium: nec in ea, vt in alia, bilis excernitur. Itaq; in hemitritæo exquisita, quæ ex æquali duarum febrium: (quandoquidem humorum duorum) temperatura est composita, veluti pugna quædam inter varios affectus oritur: quum æger nonnunq̃ inualecente febre tertiana, atq; ad cutem humores pellente, incalescat vehementi⁹: remorante interim reuellenteq; intrò ipsi⁹

Hemitritæus
exquisita quo
modo consi-
tuatur.

Hemitritæus
non exquisita
quando dicat.

Hemitritæus
continua,
adicit sibi
libro de typis

Continua feb.
nec horrorem,
nec rigorem fa
ciunt.

Hemitritæi or
tus.

motum febre quæ ex pituita ortum habet: * quum
nimirum is humor sit tardi ac difficilis motus, frigida
& lenta existens materia. Dicitur autem hemitritæus
febris nō exquisita, vbi aut bilem, aut pituita n habet
vincētem. Est & alia secūda copula, commissio q; dua
rum febrium, tertianæ scilicet & quotidianæ, ambarū
intermittentium: quæ similem quidem nuper dictæ ac
cessionem facit: hoc tamē interiecto discrimine, quod
hæc quidem intermittatur, atq; necessariò ad integri
tatem desinat: quodq; die secūda cum rigore, aut hor
rore, sola quotidiana febris inuadat. Quamobrem hu
iuscemodi febris nō est dicēda hemitritæus, si quidem
ex numero continuarum hemitritæus existit. At si in
utroq; genere hemitritæus consistat, non hæc tātum,
sed multæ p̄terea aliæ febres, hemitritæi dicentur. Cæ
terum minimè ex duabus continuis, quarum altera ex
bile, altera ex pituita oriatur, potest hemitritæus pro
duci. Quandoquidem hæc commissio, febrem horri
dam, & quæ multas habeat reduplicaciones, nō facit.
Nam quum omnis febris continua, sui quidem ratioe,
si exquisita fuerit, neq; horrorem habeat, neq; rigo
rem: certè quæ ex ipsis componitur, haudquaqu horri
da fiet. Necessum igitur est, si horridus simul atq; con
tinuus sit hemitritæus futurus, ex duabus ipsum febr
bus generari: quarum altera sit intermittens: altera ve
rò continua. Proinde tertiana mista quotidianæ conti
nuæ, hemitritæum producit: quam febrē neq; vtraq;
ptinua, neq; vtraq; intermittens efficere pōt. At verò
si quotidiana intermittens, misceatur tertianæ conti
nuæ, oriri poterit continua simul atq; horrida febris.
Hæc tamen contrario modo se habebit q̄ prior: quo
niam continuitatem quidem, ex bile obtinebit: horro
rem verò, ex pituita: reduplicatiōes autem, ex pugna
mutua: ac tunc p̄sertim, quum humores æquas vires
habuerint. Porro quæ de biliosa & pituitosa febre si-

mul nūstis conscripsimus, ea transferentes ad * melancholicam, poterimus ipsius cum utraq; illarum commistionem & confusionem similiter coniecturari. Voco enim complexionem, dum inuadunt differentibus horis: confusionem verò, si eodem tēpore inceperint. Tres itaq; simul febres complecti quispiam & confundere poterit, ipse per se, ex iis quæ diximus, contemplationem exorsus. Nam horum omnium principiū, fons, atq; elemētum est, singulare febrium formā, atq; figuram exquisitè cognoscere: id quod per facile existit, quum tres tantum existant numero: nēpe quæ ex amara bile, & quæ ex atra, & quæ ex pituita gignitur. Quare singulæ duas habent differētiās, continuæ scilicet intermittētis: ita ut omnium quæ ex humorum putredine ortum habent, fiant sex numero differentia. Quod si quæ alia accesserit particulatim pter has differentia, ea vel ex multitudine humoris, vel ex quantitate vel qualitate putrefactiōis, ac pterea ex modo motus, & particula in qua putredo consistit, habebit originem. Iam verò, quæ intermissionem habuerint minorem febres, nempe accessione ipsa in longi⁹ tempus producta, eæ sanè extensæ vocantur: quæ tamen in eo q̄ magis aut minus, varias dñas recipiunt. Ex accessionis aut & intermissiōis spatio, opportunū ad exhibendum cibum tēpus, cognoscit. CAP. IX.

Quum autem oriri soleāt ephemeræ, sanguine nō putrefacto, sed tantummodo calefacto: inuestigandum nobis iam est, si putrescere illum aliquando contingat, quæ nam species febrium gignatur. Porro ab aliena caliditate exoriri putredinem, rectè professus est Aristoteles. Vocat autem alienam, externā: non familiarem, neque nativā. Hæc siquidem coquere nata est: illa verò corrumpere, * quod est putrefacere, * Incalescit autem externo calore sanguis, & in solari deustione, & pestilenti aeris statu, atq; in febrib⁹

Febrium complexio, & confusio quid.

Putridarum febrium uniuersæ dñæ simplices, senario numero ambiuntur.

Ephemeræ interdum oriri a sanguine calfacto.

Putredo ab aliena produci-
tur caliditate. Calor natiuus coquere: alienus corrumpere est natus.

Sanguis quan-
do ex tempore ca-
lore calefacit.

Sanguis in in-
flammati parti-
culis duplici
de causa cor-
rumpitur.
Febres a putre-
dine sanguinis
ortas, simpli-
ciores esse q̃
ab aliis humo-
ribus.

Sanguinis su-
pra modum af-
fati partem pi-
guorem infla-
uā crassiores,
in atram bilem
conuerſi, atq̃
vnāquāq̃ ipſa
rum pro natu-
ra ſua febres
accendere.

Febres ortas
ex permutatio-
ne sanguinis i
alios humores
mitiores cate-
ris putrididis
eſſe.

Febres putri-
das ex tactu
diuidicandi ra-
tio.

vnuerſis, quacūq̃ ex cā naſcant̃. Vbi verò in aliqua
corporis parte ſanguis plurimus accumulatus, eiufdē
partis vim ſuperat, corrumpi conſuevit: p̃ſertim ſi in
paruis vaſis propter craſſitudinem cōſtipetur, aut ob
multitudinem impingatur: quemadmodum videre eſt
in vnuerſis inflammationibus: in quibus ſanē duabus
de cauſis ipſe ſanguis corrumpitur: & quia ſcilicet nō
diffiatur, & quia à natura non vincitur. Nōnunquā
itaq̃ ſanguis in inflammatis particulis ſubire poteſt pu-
tredinē: ex qua ſimpliciores quidem, q̃ ex aliis humo-
ribus febres oriuntur: ſimilem tamen acceſſionū pro-
portionem ſeruantes, qualem tertianæ febres oſten-
dunt. Sic enim in iis qui laterum inflammationes pa-
tiūtur, eſt obſeruatum: quo tempore maximē rubidū
expuunt. Quòd ſi ſanguis ſupra modum aſſetur, pars
quidem eius ſubtilior, ac pinguior, omnino in ſtauiam
bilem conuertitur: craſſior autem, i atram quod in iis
tumoribus, qui carbunculi appellant, videre licet. Igi-
tur pro varietate humorum in quos conuertitur ſan-
guis, febres ſient, ſola bonitate vel malitia differentes.
Illæ ſiquidem quæ ſanguinis conſequentur tranſmuta-
tionem, ſunt ſimpliciores, tum in reliquis, tum in cali-
ditatis qualitate mitiori. Nā & ſi ſe plurima manui tan-
genti offert, eſt tamen omnino mitis, ſicuti quæ in bal-
neo contrahitur. Semper enim multitudo febrilis cali-
ditatis, in multitudine effluſus conſiſtit. Quòd verò
tangenti manui calor moleſtus ſentiatur, id prouenit
ex humoris acredine. Si igitur calor & vapidus, &
minus inſuauiſ videatur, à ſanguine proficiſcitur. Quæ
verò moleſti, rodētes, atq̃ mordaces exiſtunt, conſe-
quuntur vtrāq̃ bilem. At vbi in primo occurſu, ali-
quid magis vaporoſum, q̃ acre, ſe repræſentat manui:
ſed per moram paulatim creſcit mordacitas, eaq̃ ad-
modum inæqualis, perinde ac ſi per cribrum excolari
videatur: ex pituitæ putredine oriri talem febrem ne

dubites. Indaganti autem mihi, cur in febribus aliis calor æqualis occurrat: quæ verò ex pituita ortū habet, talem caloris inæqualitatem ostendunt, renacitas & pituitæ crassitudo, quæ dissolvitur ægrè, visa ē esse in causa. Siquidem ex eo humore, sicuti ex aliis omnib⁹, ea pars prima omnium expirat, quæ iā attenuata fuerit: vix autem attenuatur, quod valde crassum existit. Quod si etiam natura frigidum fuerit, tunc difficultas augetur: ac proinde nō totus humor, nec ex omni parte æqualiter, sed ex illa tantum, in qua putredo inualuerit, effluat: atq; attenuatum effertur.

C A P.

X.

Solent autem per circuitus affligere, quemadmodum febres, alii etiam morbi particulares: ut lipituidines quædam, nonnulliq; aurium, capitis, necnō articulorum dolores. Ut igitur per hosce affectus videre licet, venas quidem in partibus quæ exacerbantur in tumorem attolli, atq; inflammationem augeri, doloresq; intendi, ac deniq; affluxum materiæ inutilis ad exteriora fieri: sic etiam in interiorib⁹ oportet imaginari ea omnia, quæ quum minimè cadāt sub sensum nostrum, eandem tamen cum illis perpetuò analogiā sortiuntur. Itaq; in laterum & pulmonis inflammationibus, circa accessionum quidem principia, tumores crescunt: in declinationibus autem, euaporāt, & submittuntur. Porro alibi à nobis est proditum, esse quatuor naturales potentias, à quibus dispensantur tum plantæ, tum animalia. Quarum prima quidē est, similitum attractrix: secunda, eorundem retentrix: tertia post has, alteratrix: quarta deniq; alienorum expultrix. Duplex autem est in omnibus rebus alienum: alterum quidem, qualitate: alterum verò, quantitate. Aceruatur autem hoc, ob earum potentiarum quæ in membris sunt, vel imbecillitatem, vel robur. Etenim si æquè valentes ipsæ partes extiterint, & meatus qui

Pituitosa, feb,
aur inæquali-
tatem caloris
tactui obiciat

Affectus infe-
rantes per cir-
cuitus.

Naturales po-
tentiæ a quibus
dispensantur,
tum plantæ, tū-
animalia sunt qua-
tuor.

Aliæ num du-
plex.
Excrementa,
qñ accruari cō-
tingat.

Sanitate quan-
do fruatur me-
bra.

3. 3.

Excrementa
semper a for-
tioribus ad p-
tes omniū im-
becillimas tru-
di.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

inutilem materiam deducunt, secundum naturam se habuerint, tunc membra sanitate fruentur. Vbi verò plus assumptum fuerit, quàm alterari possit, omne id quod superfluum est, à virtute expultrice trusum, excernitur. Quod si hæc imbecilla fuerit, in eodem residet loco: ac si multum sit, grauat, distenditque: sicut acere, exedit, ac mordet: sicuti & quod calidum est, calfacit: quod frigidum, manifestè refrigerat. Solet autem sæpe excrementum ab aliis in alias partes transfluere: fortioribus nempe id semper à se pellentibus: suscipiētib; autem imbecillioribus. Qui motus non cessat, donec in eas quæ omnium imbecillime sint, oberrans humor inciderit. Hinc verò ad fortiores relabi est impossibile. Idcirco per plethoras atque cacochymias, imbecilliores particule, infestari solent variis fluxionum affectibus. Nihil igitur mirum, vel cerebrum, vel vniuersum caput, excrementum in se collectum, ad partes imbecilliores expellere, veluti ad aures, oculos, tempora, labra, dentes, malas, palatum, gingiuas, gurgulionem, paristhmia, aut denique ad glandulas illic consistentes. Quod si ex his nihil imbecillitatem patiat, ad pectus, pulmonem, fauces, gulam, ventriculum, ipsa fluxio delabitur. Sicuti igitur causa talium omnium morborum sæpenumero est caput, ita & eas quæ in iccinore ac lie ne sunt inflammationes, aliquæ partes vicinæ, vel et ex remotioribus aliqua vna, vel plures, generant, augent, immittunt, ac per circuitum exasperant. Qui igitur nescius non fuerit, primam inflammationis originem, ex fluxione in hepar incidente, suum ortum traxisse: ac quod deinceps exacerbetur, causam in ipsa parte patiente consistere, utique is non mirabitur in febribus quæ accenduntur ex hepate, ordinis proportionem. Constat autem materia inutilis interdum quidē (qua tenus dictum est) impulsā ad infirmiores particulas: interdum ab illis attracta. Etenim calor natura est aptus ad conciliandas

Febres ex hepate accense.

ad conciliandas ac recipiendas fluxiones. Proinde in corporibus plenis, aut in quibus excrementa redundât, magna portio ad eas defluit partes, quæ icauerint vehementius. In iis autem quæ superfluitatibus vacant, admodum pauca. Non parum verò & ad partes dolentes humoris solet confluere. Videntur itaque manifestè fluxionum causæ, quæ ex ipsis partibus laborantibus originem trahunt, esse duplices: quarum altera est in ipsis accensa caliditas: altera excitatus dolor. At verò, quod melius sit, aut deterius, quod infuit, ex partibus mittentibus pèder: quod plus, vel minus, tum ex iis quæ mittunt, tum ex eis quæ recipiunt. Hæ igitur sunt differentia fluxionum, quæ sine partiû, quæ fluxiones admittunt, imbecillitate consistût. Aliæ verò, & propter harum imbecillitatem, & propter earû robur, quæ excrementa transmittût. Cæterum omnes quæ citrà vulnus, & contusionem, partibus adueniunt inflammationes, excrementis quæ à fortioribus membris propulsantur ad infirmiora, gignuntur. Vbi autem constituta excrementa in particula inflammata putuerint, calor quidam præter naturam accenditur, qui ab inflammato membro in alia illi vicina, atque ab his in alia, successione quadam, extenditur: donec ad cor aliquando ipse calor perueniat. Porro vbi superfluitas quæ ab vna in alteram partem transfertur, adeò copiosa & vitiosa est, ut facultatem recipientis particulæ opprimat, dissoluatque, sic ut iam nequeat vincere, quæ antea vincebat, tunc certè necessum est, ut ipse etiam putrescat sanguis: idque ratione duplici, * & quia humori, qui à proprio calore non vincitur, nihil amplius superest, nisi ut in putredinem transeat: & quia cum superfluitatibus putrescentibus simul ipse putrescit. Quod si nec tanta, nec tam vitiosa ipsa superfluitas existat, ut facultatem omnino dissoluat, atque feriari compellat, semiputris, ac semiinitatus in tali statu reddetur sanguis:

Fluere solent humores ad dolentes particulas,

Inflammati partibus quò superueniat febris.

Sanguis quæ necessario putrescat.

ob commercium quidem putrescentiū excremento-
rum, ad putredinem raptus: cārum verò in natura sua
perseuerans, quantum ab ea, quæ exornat ipsum potē-
tia, vincitur. Vt cūq; verò res habeat, qui i prima pu-
tredine accenditur calor, acrior atq; mordacior ē eo,
qui naturalis existit. Tantum autem augetur, quantū
natura superfluitati suppeditat. Hæ siquidem ad eum
qui ab ipsis calor augetur, ferè similem quandam ra-
tionem habent, quam ligna ad ignem. Etenim hæc mi-
nimè in infinitum vsq; tempus ad alterationem suffi-
ciunt: sed est quidam transmutationis terminus: quum
tādiu possint exuri, q̄diu aliquid natui caloris habue-
rint. Qui vbi consumptus ex toto fuerit, tunc ardere
iam desinunt: & quæ supersunt reliquæ, cineres appel-
lantur. Eodem igitur modo putrescentium humorum
caliditas permanet, donec, prorsus fuerint assari. Parū
autem reliquiarum terrestrium restare ex humoribus
est verisimile, quoniam in eorum substantia humidum
& non siccum præualet elementum. Quum itaq; fer-
uentes in putredine humores à calore extenuentur,
substantia ipsorū, vbi febres consistunt, atq; declinant,
in ambientem aerem discutitur: superfluitas autē, vbi
exigua remanet, vel nulla penitus: ex crassioribus qui-
dem humoribus, pauca: ex serosioribus verò nulla.
Quòd si nullam imbecillitatem pars inflāmata contra-
xerit, neq; iterum superfluitates accedant, ægritudo
finietur, nec rursus homo febricitabit. At si illæ nūq̄
tūtur denuò, aut nē mittantur quidem, sed adsit solā po-
tentia imbecillitas, hominem secundo febrire est ne-
cesse. Fingamus enim, primū quidem validam esse
particulæ facultatem: interim verò easdē in partibus,
quæ prius transmiserunt, aceruatas esse rursus super-
fluitates, & quātitate, & qualitate pares, iis quas antea
immisserant: certè nemini dubium est, quin eodē quo-
que circuitu ad eas expellēdas versus imbecilliora nē

Excrementa
fouent calorē
præter naturā
quemadmodū
ligna ignem.

Febres per cir-
cuitus moueri,
vnde accidat.

bra, mouebuntur ipsæ immittentes partes. Siquidem vis excretoria, tunc primum excitatur ad proprium opus, quando aut multitudine superfluitatum grauatur, aut qualitate pūgitur. At verò quum i lippitudine quæ per circuitus accedit, medici qui se ocularios vocant, semper oculis negotium facessant, nos aliquando purgatione, aliquando balneo, interdum meri positione, interdum missione sanguinis, atque interdum clystere vsi sumus. Qua industria nonnunq̃ statim est subsequuta sanitas: nonnunq̃ post curationem capiti adhibitam. Nam quādiu humor qui ad caput confluit similis fuerit, eadēque dispositio capitis, tandiu superfluitates æquali tempore, & similes & æquales acerbuntur: similesq̃ oculorum exasperationes orientur. Quod igitur contingit in oculis, idem in pulmonis, cerebri, laterum, & aliarum partium inflammationibus accidere potest, si illis quæ superfluitates trāsmittunt, sint eodem tempore imbecilliores. Mirandum autem non est, si non iisdem stasis temporibus eadem excrementa acerbentur. Nam quum is qui pro alimento sanguis defertur, non semper vsquequaq̃ sit similis: nec item nutriendarum particularum eadē dispositio: alii aliud sufficit tempus ad colligendam tantam superfluitatem: à qua quidem vbi primum membri natura læditur, cogitur eam tanq̃ alienum onus protrudere. Sed neque ob accessionum imparitatem mirari oportet. * Nam si non eadem est nec species, nec multitudo superfluitatum, non oportet eas similiter omnibus aut accendi, aut discuti. Nam quæ plura & frigidiora, tenacioraque & crassiora excrementa sunt, faciunt accessiones longiores. Quæ autem pauciora, calidiora, & subtiliora, breuiores. Præterea, rarior quidem corporis habitus, breuiores sui ratione accessiones reddit: densior autem, longiores. Quinetiam potētia robur, minus diurnas efficit accessiones: imbecillitas autē,

Excretrix facultas quando morietur.

Lippitudinem accedentem ꝑ circuitus quō curari galen?

Accessionū imparitas vnde accidat.

Accessiones longiores aut breuiores fieri, vnde accidat.

Accessio longis-
sima a qui-
bus fiat.

Accessio bre-
uissima quādo
contingat.

in longius tempus producit. Lōgissima itaq; accessio fiet, ob materiæ inutilis multitudinem, crassitudinem, lentorem, facultatis imbecillitatem, ac meatuum angustiam. Breuissima autem, propter materiæ inutilis subtilitatem, paucitatem, potentiæ vigorem, ac laxitatem meatuum. Quum igitur primæ accessionis tempus adeò breue fuerit, vt anteq̃ superueniat secunda, iam prima quieuerit, omne id tēporis spatium, quod secundæ principium, & primæ finem iteriacet, sine febre est. Si verò secunda inuadere anticipauerit, priusq̃ omnino prima soluator, nihil iteruenit medium. Hoc autem fit, quum facultas membri recipientis superfluitates, sanguinem in se contētum, quemadmodum antea conuincit. Quòd si quando imbecillior reddatur, non solum materia inutilis, sed sanguis etiam cum ea corrumpetur & putrescet, ex eoq; accendetur febris: atq; hinc orietur aliud principium earum, quæ per circuitum fiunt; accessionum. Si igitur caliditas ab excrementis orta, etiamnum perseueret, duplex febriū seinuicem complectentium species gignetur. At si illa cessauerit, membri verò fluxioni recipientis dispositio remanserit, quæcunq; de parte mittente prius exposuimus, eadem de hac quoq; intelligantur. Nam et ipsa aliquas in se superfluitates gignet: idq; duplici ratione, quemadmodum illa: & quia vitiosum sanguinē continet: & quia facultas eius est imbecilla. Eodem modo si ex aliqua quauis causa membri vis adeò debilitetur, vt is qui adiacet sanguis, illi sit potius oneri, q̃ nutrimento, cōtinget vt corrumpatur: aut si calidior sit, putrescat. Nam si frigidus fuerit, & pituitę naturā gerat, non subito, sed tempore ad eandem veniet dispositionem. Porro si eas quæ in ipsa genitæ fuerint superfluitates, nequiverit particula aut coquere, aut ad aliā partem detrudere, tale sibi ipsi febriendi principium cōstituit, quale ea quæ transmittit alteri, affert. Nequie

autem aliò superfluitates transnittere, aut ob propriâ imbecillitatem, aut propter recipientis robur, aut deniq; ob constipationes meatuum, quæ fieri à lentis & crassis, & multis humoribus consueverunt. Quæcūq; autem naturales meatus obstruxerint, hæc necessario putrescunt tempore, atq; etiam in causa sunt, ut in ea parte multitudo coacervetur excrementorum, cuius solitam euacuationem & difflationem prohibet. Vnà igitur cum illis putrescunt & alia quæ postremo acervantur: statimq; simul omnia in membro febrilem caliditatem accendunt. At verò, ubicunq; accendit atq; augetur caliditas, illuc ab aliis partib⁹ sanguis solet cōfluere. Quo igitur tempore confluit, illas quidem priuari sanguine est necessarium: quod verò patitur membrum, grauari & distendi: ipsumq; confluentem sanguinem alterari: & q; aliis quæ iam putruerunt superfluitatibus permisceatur, & quod diffilari, utpote impatiunt, non possit. Proinde fit, ut instar lignorum humidiorum quæ super exiguan flammulam proiciuntur affatim, succendatur. Quod totum est accessionis principium. Vbi autem caliditas iam materiam cōuicerit, id tempus augmentum vocatur. Vbi verò calore per vniuersum corpus disperso, inflammati humores ad summum feruorem peruenerint, id accessionis tempus, dicitur consistentia. Hinc igitur, si humores fuerint tenuiores, potentia robusta, corpus rarum, maxima humorum putrescentium pars, in sudorem resoluta euacuatur. Sin verò hi crassi fuerint, & vis expultrix infirma, necnō meatus angusti, nihil quidem defluit sensibile: sed id solū, quod ita est extenuatum, * vt in subtilioris vaporis naturam transierit. Atq; id sane tempus declinatio appellatur, humorū effervescentium diffusus quidam existens. Caterū quum in parte adhuc remaneat affectus, necessum est, in ipsa aliam gigni superfluitatem: quum nimirum id quod denuo

Excrementa
cur neqat p
vna mittere
ad aliam.

Accessionis fe
brilis tempora
describuntur.

Declinatio ac
cessionis febr
lis, est humorū
effervescentiæ
di' flatus.

ad ipsam trahitur alimentum, non conficiatur ex quâ
tè vniuersum. Quæ quidem superfluitas rursus à pu-
tridis excrementis in parte relictis, necnon proprio
ex vicio, initium putredinis suscipit: quûq; satis calue-
rit, rursus ad ipsam influit, quemadmodum antea, ex
reliquis animalis partibus sanguis: ac sic eodem rursus
modo, principium, ascensus, status, & declinatio, alte-
rius fit accessionis. Nec hoc per circuitus desinit fieri,
quâdiu in particula gignente superfluitates perseverarit
affectio: quæ quidem existit duplex. Altera quidē, im-
becillitas partis, à qua superfluitates gignuntur: alte-
ra, quæ ex iisdem quotidie genitis ducit originem. Im-
possibile autem est, solui remanentem illam dispositio-
nem, si vniuersum corpus multis ac variis excremen-
tis refertum fuerit, ac multò etiâ magis, si his accedat
omnium, per quos excrementa membri excernuntur,
astrictio meatuum. Sanitas autem succedet, si & mea-
tus aperti sint, & facultas vegetior, & corrigatur affe-
ctus partis, vniuersumq; corpus nec multis nec vitio-
sis humoribus opprimatur. Nā quâdiu hæc perdurauerint,
tâdiu accessionum circuitum perseverare est necesse.
Quemadmodum in mulieribus accidit, in quibus quâdiu
æquales ac similes menstruorū causæ perstiterint, idem
circuitus seruabitur. Earum igitur febrium, quæ p cir-
cuitum accessiones faciūt, nescio an aliqua fuerit no-
bis ommissa causa: aliarū autem quæ carent ordine, non-
nullæ ex transmutatione humoris, nonnullæ ob victus
errorem, ad talem dispositionem deueniunt. Maxime
autem transmutatur, atq; in alteram transit naturam
sanguis, dum putrescit. Nam pars quidem ipsius vna
fit flaua bilis: alia, nigra. Quantum verò in ægrotantiū
corpore humores mutantur, tâtum etiam accessionū
circuitus. Quæcunq; autem circa victus rationem er-
rata ab ægrotantibus sunt, ordinem circuituum per-
uertunt. Sæpe verò, ob complicationem circuituum,

**Affectio
duplex.**

ptis

**Accessionum
circuitus quan-
do desinent, &
quando perse-
uerabunt.**

**Sanguis putre-
scens, in aliâ na-
turam transit.**

**Circuituum or-
dinem quæ per-
uertant.**

quæ à medicis ignoratur, videntur absq[ue] ordine accessiones ægrotantibus fieri. Reliquum est id febrium genus, quæ synochi nominantur, quarum vniuersum tempus vnica accessione finitur: quæ vel semper i eodem vigore persistit, vel minuitur, vel augetur, donec finitur. Hæ verò omnes ex tali causa ortum habent, qualem Praxagoras existimabat, humorum videlicet in caua vena putrefactionem. Quanq[ue] absolutior & verior hic erit sermo. Quæcunq[ue] per circuitus aliquos ægritudine accessiones fiunt, ex membrorum dispositionibus ortum habent: quæ vel mittunt, vel recipiunt, vel generant, vel attrahunt superfluitates. At quæ circuitum non habent, in his nulla est corporis pars, quæ præcipue sit offensa. Qui autem in venis & arteriis omnibus continentur humores, præcipue qui in maximis, & plurimo calore abundantibus delitescunt, aut ob aliam quauis causam, quemadmodum in ephemeris, aut ob putrefactionem feruentes, febrem accendunt synocham: quæ à principio vsq[ue] ad finem nullam habet intermissionem: ac tâdiu perseverat, hominemq[ue] deurit, donec humores ipsam gignentes, aut cõsumatur penitus, aut coquantur, aut vtrunq[ue] patiantur.

Synocharum
vniuersum tem-
pus vnica ac-
cessio est.

Circuitus facit
tes morbi, ex
membroru di-
spõsitionibus
vniuersi oriun-
tur.

Synochæ gene-
ratio.

GALENI PERGA

MENI DE MARASMO,

SIVE TABE.

LIBER VNVS.



MARASMVVS Est viventis corporis interitus præ siccitate. Quum autem interitus bifariam dicatur, tũ de eo qui fit, tum de eo qui iam factus est, sanè secundum prius significatur oportet appellationem accipere. Similiter etiam marasmus, hoc est ta-

Marasmus est
viventis cor-
poris interitus
præ siccitate

Marasmus est
duplex.

bes dupliciter dici poterit, nempe quum iam aliquid tabuit: vel quum adhuc tabescit: de qua quidem significatione secunda, impræsentiarum nobis est sermo. Porro quum genera viuientium sint tria, videlicet animalia, stirpes, & semina, ac propter hæc etiam fructus: tabem quidem esse horum affectum, propriè loquentes dicimus, quâuis per translationem & cæteros etiam interitus, quum ex siccitate proueniunt, cõmuniter tabem appellent. Quum igitur primi & simplices modi quibus omnia viuentia intereunt, sint quatuor, si quidem & elementa substantiæ eorum quaternio etiam numero ambiuntur, tabescere sanè ea dicimus, quæ ex siccitate intereunt. Quòd si hæc tantum habeant, quæ siccentur, altera verò contrarietas quæ inter calidum & frigidum intercidit, intra suos terminos maneat, simplex ea tabes erit. At si vel caloris vel frigoris accedat immoderatio, iam modus is interitus, duplex & compositus erit. Simplex itaq; tabes inediis solet superuenire, tam eorum qui inediã sponte tolerant, quàm eorum qui præ alimentorum penuria, fame conficiuntur. Illa verò cui frigus accessit, solet senibus euenire, vel etiã illis, qui malo quodam affectu senectuti simili detinentur. Ea autem quæ cum calore est, in febribus locum habet, quæ hecticæ nominantur. Nec verò impræsentiarum de partibus loquimur, quæ ex aliquo symptomate arescunt: sed potius quum totum corpus hoc se habuerit modo. Quo circa, si tabes affectio est vniuersi corporis, ea fieri nequit, nisi animatis * principium etiani affectum sit. Quin etiam fieri non potest, ut alius affectus totum ipsum animal occupet: ab alio verò principium ipsius detineatur. Ac proinde necessum est, ut in tabidis, ipsius cordis corpus arescat. Quocirca si inuenerimus causas omnes, quibus cor arescere possit, faciliè tunc nouerimus, an omnes tabidi insanabiles sint: an ex iis aliqui potius sanari queant. Optimum autem

Viuentium genera tria.
Tabes quorū esse affectus dicatur.

Interitus modi sunt quatuor.
Elementa viuientium sunt quatuor.

Tabes simplex quæ dicatur.
Tabes composita quæ.
Tabes simplex inediis solet superuenire.
Tabes compositæ quibus superuenire consuecunt.

Tabes fieri non potest, nisi animantis principium affectum sit.

huius instituti principium erit, si perscrutari fuerimus omnes causas senectutis: quandoquidem ea inter omnes rabes usque adeo euitari minimè potest, ut esse secundum naturam videatur. Siquidem ineuitabilia sunt omnia naturæ opera: utpote habentia necessarium suæ generationis ordinem. At non eo modo dicimus senescere esse secundum naturam, quo ali, & augeri (sunt enim hæc naturæ opera: senectus autem non opus, sed affectus quidam necessario consequens illa) verum hoc nomine, quod nullum unquam sit visum animal, quod ortum fuerit, quin idem sit senio obnoxium. Quanquam non defuit nostris his temporibus philosophus quidam, qui librum edidit, quo docebat, quia quis posset ratione seruari penitus senis expers. Qui tamen, postea quam ad octogimum usque annum produxit vitam, adeo gracilis & exiccatus effectus erat, ut verè faciem illam exprimeret, quam descripsit in libro prænotionum Hippocrates. Num igitur propter id siccescunt tum animalia, tum plantæ (quod nonnulli affirmant) quia insitus animantibus calor, veluti ignis quidam, ex ea materia in qua accensus est, suum incrementum sortitur? Etenim illi semper affixus est, nec unquam inde seiungi potest, unde etiam sua omnia habet. Plantæ igitur, animantiaque omnia, quæ diu recens genita sunt, admodum humida existunt. Quamvis calor (ut illi aiunt) in ipsis tunc veluti suffocatus, obrutusque, præ humoris copia, vix se potest exerere: nimirum caliginosus, tardus, ad motumque piger quum sit. Postea verò ipsam humiditatem progressu temporis superat, & cuiuscunque materię præest: quo tempore iam purus æthereusque redditus, suas omnes expeditè functiones ædit. Itaque usque ad ætatem vigoris relucet, augeturque: cuius magnitudo quam plurimum tunc attollitur. Mox verò inopia alimenti contingit, ut contabescat paulatim: atque id ipsum existit senectus. Sed & paulò post extinguitur penitus, id quod mors est.

Senectus vitari non potest.

Ineuitabilia esse naturæ opera.

Naturæ opera que.

Senectus quid Senio animalia orta esse omnia obnoxia.

Calor noster quo augeatur & minuitur in corpore.

Senectus quid. Mors quid.

Hic itaq; sermo omnibus ferè tam philosophis, quàm medicis recentioribus placet, licet verus omni ex parte non sit. Hallucinantur nanque dum flammam ignis obhino cum calore animalium conferunt: idq; minimè animaduertentes, quod ortus flammæ est ex materiæ interitu, de qua ea est accèsa. Animalia verò, non sic sum, ab eo qui illa effinxit, insitū habuere calorem: sed potius vt ab eo auerentur, reuerenturq;. Nec vllum est tempus, quo innatus is calor per vniuersam eam materiam non diffundatur, vires non modò eas continens, quibus animal formatur, verùm & alias præterea plures. Quippe & alimentum attrahit, & materiæ dispensat, apponit, vnit, assimilât, omniaq;, vt in summa dicam, circa sibi congenitam materiam perficit, contrà q̃ flamma faciat. Nam quæ vnq; flamma, materiam cui annexa est, adauget: vel quæ etiam materiæ potius alimenta assimilât, q̃ eam sibi. Et quæ tot excogitavit modos, vt eam tueretur materiam. Itaq; quum illi iidem natuum calorem esse naturam fateantur, non rectè faciunt flammis eum comparantes. Nā quod ait Hippocrates, eum calorem nos interficere, qui genuit corpora, certè si liber illæ referri ad Hippocratem debeat, locus is requirit expositionem. Verum siquidem est, corpora ob innatum calorem senescere, interireq;: modus tamen, quem isti aiunt, verus nō est. Neq; enim vt flamma ligna, ita innatus animantibus calor, eorum corpora absumit. Quod fortassis exemplum illis congrueret, qui ob febrilem caliditatem intereunt. Porro natura, quæ tum animalia, tum plantas procreat, omnino corporeum aliquod principium, ad illorum generationem assumit: quum nihil sit, quod vnq; possit sui ortus initium habere, ab eo, quod penitus est non ens. Inde verò exorsa, semper in eum scopum ordinatè tendit, quem in ea procreatione statim ab initio sibi proposuerat. Id autem est, perfectum il-

Flammâ ignis
non esse com-
parandum cū
calore animalium
Caloris nostri,
& flammæ quæ
igni inest, dissimilitudo.

Caloris opera.

Calorē natium
esse naturam.
Calor qui ge-
nuit corpora,
perimit nos.
Senescunt ob
innatum calo-
rem corpora.

Nihil ex nihilo fieri.

Iud reddere, quod ab ea gignitur. Sanè perfectum est, quando nulla suarum functionum deest illi. Ipsarum autem functionum, complures durioribus instrumentis egent. Vnde postea fit, ut multæ in animâibus particulae duræ euadant. * At principium generationis ipsarum, contrâ quàm in animali perfecto, necessum est ut sit molle, ut & aptè compingi, efformariq; possit, & ad omnia tractabile se suo conditori exhibeat. Ac proinde, quicumq; semen sit durum, mollis tamen planta æditur: moderato nimirum quodam humore prius macerata, ut pro semine fiat natura. Itaq; si opus est, ut generatio animalis à substantia molli sua habeat exordia, quæ ut absoluitur, ita durefcit: necesse utiq; fuerit, ut in prima elementorum, unde illa constituuntur, temperie, tum humidum, tum siccum præpolleat. Cæterum humidum quidem ipsum est aqueum: siccum autem, naturaliter aut est terreum, aut igneum. Fieri verò minimè poterat, ut statim à primis exordiis, plus terreni cômisceretur: quum opus esset, principium animalis fore humidum: reliquū igitur solum est igneum, quod in prima animalis generatione & formatione, obtinet principatum. Si igitur fieri posset, ut natura, quum animal, vel plantam, ad consistendi vigorem perduxerit, aliam rursus elementorum dispositionem, proportionem viribusq; æqualem, apponeret, sic tantummodo sua illi fabrica posset expers tam senii, quàm interitus perdurare: si tamen custodia sapientis alicuius viri mox demandata fuisset: alioqui, si malam adhibuisset victus rationem, ab interitu immunis non esset. Nunc verò postea quàm prima elementa generationis tam animalium, quàm plantarum, nec transferri, nec transmutari possunt: iccirco necessum est, post consistendi vigorem corpus semper siccescere, quàmuis non amplius egeat, ut id ipsum patiatur: quum iam illi vsui non sit, ut siccescat. Verùm ætas

Principiū generationis particularum, cui necessario sit humidum.

Siccescere necessario corp⁹ post consistendi vigorem.

Senectus ab inclinante etate, non genere, sed imaginatione differt.

Seniū nec euitari nec sanari potest.

Aetas vniuersa post vigorem est frigida & sicca,

Senes ab inclinantibus, quibus notis distinguantur possint

Gerocomice.

Vitæ terminus uacuitas cordis est ab actione

Senectutis quare non possit oblati.

Senium detineri potest, ne cito igneat: idque humectante adhibita victus ratione,

inclinationis, quæ siccitatem quidem, quamuis exiguiam, habet, multos lateret: ac si nondum aliqua tabes sit. Senectus autem, quæ ab ea non genere sed tantum magnitudine differt, facile deprehendi potest. Hæc igitur causa est, quæ vniuersam animantibus tractu temporis siccitatem præstat: perspicueque ostendit senium nec euitari, nec etiam sanari posse. Etenim vniuersa ætas, quæ vigori succedit, frigida est & sicca. Manifesti autem fines, inter eorum ætatem qui iam declinant, & eorum qui senescunt, humidorum est excrementorum exuperantia. Vnde quidam decepti, statuerunt senium esse humidum. Cæterum & omnes actiones statim in his fieri imbecilliores, manifestè videri possunt: atque etiam via ad mortem, quæ latebat in inclinantibus, iam omnibus fit conspicua. Quamobrem senectutis tabes nequit vlla ratione dissolui: licet ipsam plurimum remorari possimus: quod munus ad gerocomicem, hoc est ad artem senum curatricem, spectat. Quæ quidem hoc sibi proponit, ut quoad eius fieri potest, obsistat, prohibeatque, quo minus ipsum cordis corpus eo usque areseat, ut ab omni opere vacet. Siquidem vitæ terminus vacuitas cordis est ab actione: quoniam impossibile sit mori animal, quandiu cor sua actione moueatur. Quare si possit substantia corporis ipsius cordis humidior fieri, vel per Iouem etiam iecioris, poterit senectuti obsistat. Si verò nemo est, qui queat iecur vel cor humidiora reddere, quæ ipsa sint ex sese, sed potius semper tempore procedente ea necesse est indies sicciora fieri, cum eisque arterias & venas: senium quidem prohiberi non potest: potest tamē detineri, ne cito igneat: idque humectante adhibita victus ratione: qua nimirum augere possumus illam humiditatem, quæ in corde, iecioreque est dispersa. Quum autem cor (cui valentissima est attractrix facultas) sit origo pulsuum & arteriarum, quemadmodum venarum atque sanguinis hepar,

contingit utiq; ut hæc viscera nunq̃ moderatis alimē-
tis destituatur, nisi quum valida sanguinis penuria vni-
uersum occupauerit corpus. Vnde vbi corpus ex lon-
go morbo extenuatum fuerit, putandum non est, cor
quoq; atq; etiam iecur, esse pro aliorum proportionē
extenuata. Cæterum, vera tabes, similiter partes om-
nes occupat, propterea q̃ etiam *principia ipsa. Atq; hæc
tabes in ætatibus quidem, est senium: in iis verò q̃
p̃ter naturam affecti sunt, febris tabifica, & alia p̃terea
affectio, quam senectam ex morbo conimodè appella-
uerimus, idq; longè melius q̃ Philippus, qui eam etiam
tabidam febrem nominat. Nam neq; febris, vnq̃ huius
modi erit affectus, vbi cor frigidius redditum est, q̃
ratio naturæ postulet. Quòd autem per eum affectum
sit talis ipsius cordis temperies, indicio est pulsus rarus
& paruus, similiterq; spiratio rara simul & parua: nec-
non qui expiratur aer, minimè calidus. Quæ sanè ta-
bis species fit, febribus ob intempestiuam immodera-
tamq; refrigerationem, in eam transeuntibus. Est &
alia tabis species quæ dicitur torrida, sicuti & tertia, quæ
syncopalem appellant, quarum illa quidem, ortum ha-
bet à calore, febribusq; ardentissimis: maximè verò
vbi habitus fuerit siccior: hæc autem gignitur, quan-
do iis qui correpti fuerint deliquio animi, vbi vehemē-
tiam periculi effugerint, aliquid ex eo affectu remanet
ita, ut adhuc defectum illum animi sapiant. Est autem
duplex ipsa extenuatorum affectio: vna quidem, vbi
is humor solidorum corporum perijt, qui eorum
proprium est alimentum, & præterea molliores car-
nes liquatæ sunt: altera verò, dum solidiora etiam
corpora sunt exiccata: quæ utiq; & prima, & simili-
laria appellantur. Hæc igitur nequit curari, sicuti nec
senectus. Altera verò, periculo quidem non caret: non
tamen eo vsq; ut nullo modo curari possit. Igitur hu-
mectare oportet tres illas species tabis iā dictas: & hoc

Cor est origo
pulsuum & ar-
teriarum.

Hepar est san-
guinis origo &
venarum.

Tabes vera
cur ex æquo
omnes partes
occupet.

Tabes, quæ ex
morbo senium
appellatur, non
est tabida fe-
bris.

Seniū ex mor-
bo quō intro-
ducatur.

Tabes torrida
vnde gignat.
Tabes synco-
palis quando
accidat.

Extenuatorū
affectio est du-
plex.

Tabes incur-
bilis quamnam
sit.

Tabes vniuer
ſe quō ſunt cu
randæ.

Exiccatoſ ma
niſeſte videtur
reficere bal
neum.

Balnei vſus.

Februm tres
differentiæ ge
neraliſſimæ.

Putridiſ febri
bus, peſt cou
coctiōnem hu
morū, balneū
opitulatur.

Hecticiſ febri
bus quibus aliæ
non copulātur
balnea quouis
tpe conferūt.

Ephemere que
dam cum he
cticiſ habent
neceſſitudinē:
quibus aqua t
intrepide pro
pinanda.

eſt illiſ commune: quippè quæ communem ſiccita
tem ſortiantur. Sed earum vna, eger vt calſiat: ea
nimirum, quam comparauimus ſenectuti. Altera
verò, quam eſſe torridam diximus, refrigerari poſtu
lat. At tertia, quæ habet animi deliquium cōiunctum,
ſi nondum facta ſit, ſed etiamnum fiat, ita vt humidi
tas ſolidiſ membris innata abſumatur, miſcellaneam
curationem deſyderat. Conſpicuè autem humectare
reficereq; exiccatoſ videtur balneum: vt facile poſſu
mus in iſ obſeruare, qui æſtate ſub ſole vel iter faciū,
vel alio quopiam modo exercentur, aut exuruntur.
Hoſ enim omneſ, atq; etiam eoſ, qui ſticuloſi ſunt, hu
midoſ reddit, & ſiti liberat. Sed & alioſ omne� quacunq;
modo exiccatoſ, ſiue ex vigilia, ſiue ex curiſ, ſiue ex
venere, ſiue ex eduliſ, vel medicamentiſ exiccanti
bus, ſiue ex ira, hoſ inquam omneſ madefacere fo
uereq; balneum videtur. Quum autem ſint treſ diſfe
rentiæ februm generaliſſimæ, in præſentia quideſ
omittamus diariā: conuertamus verò ſermoneſ ad
eaſ, quæ ab humoribuſ proficiſcūtur, & ad illaſ etiam,
quæ quòd in habitu ſint, hecticiæ nominantur. Illiſ igi
tur, quæ ex putreſcentibuſ humoribuſ accenduntur,
ſi concocti ſi fuerint, balneum remedio eſt. Hecticiſ
verò quæ ſolæ conſiſtunt, nec aliud quodpiam genus
febris ſecum habent, balnea quouis tempore confe
runt. Sin autem illæ ſecum febrem aliam habuerint,
ex iſ quæ ab humoribuſ pendent, quum ſi concocti
iam fuerint. Eadeſ etiam tempora putandum eſt eſ
ſe commoda, ad propinandam frigidam: præterq;
quòd ſi in hoc aberraueriſ, id minimè fiet ſine ma
gno incommodo. At balnearum vſuſ in iam dictiſ fe
bribuſ, procul eſt ab omni periculo: niſi forſitan vi
rium imbecillitaſ ſit ſuſpecta. Cæterum quædam ex
diariſ febribuſ, cum hecticiſ communionem quandā
ſortiuntur: quæ ſanè ſtatim in prima die exactè diſcer

ni nequeunt, sed circa secundam, vel omnino tertiam. Quo tempore, vbi quis primum eas nouit, intrepidè offerre aquam frigidam poterit: quum nimirum tunc & vires validæ sint, nec desit adhuc corpori sanguinis copia. Vbi verò immoratae diutius fuerint, tunc sanè vires imbecilliores redduntur, & sanguis exiguus fit: vnde duplex ex potu frigida sequi solet incommodum. Primum, quod interim dum aquam bibunt, percutitur & refrigerescit aliquod membrum. Deinde, quod qui aquam exhibent, nisi debitam mensuram sint assequuti, præter alias particulas, illam etiam refrigerabunt, in qua est situm principium generationis febris. Vbi verò super quod par sit, cor refrigerescit, si naturam suam adhuc humiditatem seruet, vires concidunt. Si efficiatur siccius, ab eo affectu arripitur, qui similis senio existit. Sed eodem ipso tempore, quo primum signa febrium hecticarum fuerint conspicua, expedit ut refrigerantia medicamenta adhibeant extrinsecus, & super ipso febris * foco, & origine. Porro cor primum, si plus e quo incalcescat, hecticam febrem affert. Dein verò iecur: hoc tamen non habet ex se, perinde ut cor, sed ob id, quod illud secum in consortium trahit. Mox verò ventriculus: & post hunc, quæcunque alia, consortii lege, possunt secum cor calfacere. At pulmo, hecticam febrem non gignit, propterea quod hoc viscus humidum est, & per inspirationem assidue refrigeratum, non facile in similem occasionem incidit. * Ut plurimum autem secundum reliqua viscera febris hectica gignitur, in fuso bilioso humore in ventrem ipsius loci patientis. Quum itaque sola febris constiterit, absque vlla alterius morbi mistura, balneum exposcit, non secus ac cæteræ siccitates, quæcunque vel calidæ fuerint, vel frigida. Nam id sanè mirum balneis inest, quod tam calidis prosint, quam frigidis siccitatibus: quemadmodum & illud, quod eos

Frigida potus in hecicis quæ incommoda inferas.

Hectica febre cognita, refrigerantia esse extrinsecus ad mouenda cordis. Hepar ventriculusque ratione febre hecticam inferas.

Pulmo cur hecticam febrem non gignat.

Hectica febris quæ ratione secundum reliqua viscera oriatur.

Balnea tam ca-
lida, q̄ frigi-
dissiccatibus
conferūt eosq;
siticulosos red-
dūt, q̄ siti sunt
uacui, atq; siti
a sitibūdīs abi-
gunt.

Hecticæ cui
erysipelatosus
affectus sit cō-
iūctus, curatio.

siticulosos efficiat, qui sitis sunt vacui: à siticulosi ve-
rò, sitim abigat. Quandoq; tamen cum hectica, tabifi-
caq; febre, adest etiam erysipelatosus affectus: qui exi-
git, vt prius cibo & potu, & iis etiam quæ apponuntur
exterius, refrigeretur. Quo tēpore omnino est super-
sedendum à balneo: frigida autem confertim in ipso
morbi. vigore viriliter exhibenda: à cuius tamen vsu
abstinendum est in principio, nisi nos forsitam ipse co-
gat ægrotus, quippe qui sit assuetus potui frigidæ, nec
sitim perferre velit. Exterius autem sunt applicanda
ea quæ refrigerent. Quæ si nihil profecerint, cogendi
vt illa etiam intra corpus assumant. Præcipue vero il-
lis profunt molles lactucæ, recentesq; solummodo in
frigida aqua demersæ, ac ita assumptæ: vel si pla-
cet, prius aceto diluto intinctæ. Extrinsecus etiā eius-
dem lactucæ succ^o vtiliter adhibetur: sicuti & semper-
uiuæ, & intibi. Præstantissimum verò ad id etiam est,
medicamen confectum ex succo vitiæ acerbæ, necnon
portulacæ, cui parum albæ farinæ miscetur. Quod
quidem exceptum duplici linteo, præcordiis est præte-
dendum, donec tepescere incipiat. Dein verò, ipso abla-
to, alterum admouendum est. Nonnunq; iis & oleum
imaturum miscemus, vel rosaceum, præsertim ve-
rò, si aliquid inflammationis detinuerit præcordia. Scien-
dum tamen est, fieri non posse, vt vbi erysipelatosi vi-
sceris dispositio constiterit, ea sit febris exquisitè hec-
tica. Siquidem exquisitè febris hectica est, quæ nullum
habet particularis accessionis principium, nullum in-
crementum, nullum vigorem, nullam inclinationem.
Solummodo autem hecticæ febres post assumptum ci-
bum, perinde vt calx, inspersa aqua, effervescunt. Quod
incrementū si abstuleris, semper æquales permanent.
Tabi igitur torridæ, quæ ab ardentibus febribus suā
ducit originem, obsistitur remediis refrigerantibus:
quæ tum exterius secundum locum affectum admini-
strantur:

Hectica exq̄
ta nec princi-
pium, nec aug-
mentū nec sta-
tum nec decli-
nationem par-
ticularis ac-
cessionis forti-
tur, ed eārum-
modo post as-
sumptum cibū
effervescit.

strantur:

strantur: tum interius accipiuntur. Quā verò senectus quæ ex morbo est, inuaserit, ea quidem quæ absoluta est, nequit curari, quæ autem nō est perfecta, eò tamē accessit, vt ferè iam facta sit, hūc solum habet curatio nis scopum, quem refectionem, & nutritionem vocamus. Nam corpora solida, dum arescunt, cibis sanat. Quum autem alimentum omne, non ipsum per se deferatur ad alendas particulas, sed potius ab eis trahat: ob ariditatem verò, atq; frigiditatem, in tabidis sint illæ ad trahendum inualidæ, semimortuæq; , vtiq; alimēta desyderant, quæ facile possint attrahi: vt imbecillitatem attrahētium virium, suppleat promptitudo materiarum. At ea sunt tractu facilia, quæ tenuioribus partibus constant, suntq; natura calida: quæ sanè cum difficultate nutriunt: quum alimentum omne debeat esse crassum & lentum, vt & permaneat diu, nec facile possit diffusiari. Quare aliquod inuestigandum est, quod in mediocritate consistens, mediocriter vtraq; possit persistere. Ac mihi sanè nihil ad hæc omnia lacte videtur persistentius: præcipuè si quis ore apprehensa mamma muliebris, lactet. Quòd si id fieri nequeat, bibat saltem lac asininum, dum adhuc calet, temporeq; breuissimo aeri expositum fuerit. Quæ quidem alimentorum ratio tribus illis speciebus marcoris conuenit. Quin etiam ptisana & alica illis ex usu sunt: aceto tamen condiri debent, vt facilius distribuantur. Porro mel, vt frigidiore affectibus prodest plurimum, sic calidioribus obest summopere. Quare torridæ quidem febri inimicissimum ē: iis autem qui senili affectui expositi sunt, vtilissimum. At illis qui tabescunt ex defectu animi, nisi obstat ventriculi ratio, poterit coctum vel solum, vel aliis intermixtum cibis offerri. Opportunus balnei usus, optimum erit auxilium etiam ad alimentorum distributionem. Erit tamen administrandum, vbi cibus coctus fuerit, nec longior inedia præcesserit. Iam &

Tabi torrida
qua ratione ob
sistatur.

Seniū ex morbo absolutum quidem, est incurabile: non absolutum autem, est cibo instaurandum. Solida corpora dū arescunt cibis sanat. Tabidæ præqualia alimenta postulent.

Alimenta tractu facilia q. Alimētū omne cur esse debeat crassum & lentum.

Lac muliebre statim ex mammis suctum eō modissimū est febribus nutritimentum.

Lac asininum tabidis vtile.

Ptisana.

Alica.

Mel cui marcori sit vtile.

Balneum quādo administrandum tabidis.

Vinum cui ta-
bi conferat.

vinipotus, vt summopere frigida tibi prodest, sic
torrida fugiendus est. At ea quæ in animi defectu con-
sistit, sicuti affectus medius & miscellaneus est, sic in hoc
mediani rationem obtinet.

G A L E N I P E R G A

M E N I C O N T R A E O S

qui de Ty pis siue circuitibus scripserunt.

L I B E R V N V S.

Periodus.
Circuitus.
Typus.
Ordo.

Accessionē fu-
turam cogno-
scere, in febrī-
bus est maxi-
me vtile.



B I Quid specie idem, rursus æqua-
li sit tēpore, totum ipsum curriculū,
Græci periodum, siue circuitum: at-
que inter eos nonnulli typum etiam,
atq; ordinem vocant. Cæterum quū
nihil vtilius sit, præsertim in febrīb^{us},
q̄ futurarum accessionum principia prænosce, is pluri-
mum ægro proderit per totum ipsi^{us} morbi spatium,
qui nominum disputatiōe neglecta, statim à morbi ini-
tio, artificiali quadam coniectura poterit id ipsum asse-
qui. Quòd si quis prima statim die peruenire ad talem
cognitionem non possit, poterit certè secūda, vel ter-
tia, vel quarta. Si quis verò sit, qui neq; in hac, morbi
speciem nouerit, is non exiguam artis partē ignorat.
Etenim tum alia, tum febrīum accessiones, vel quoti-
die, vel tertio, vel quarto quoq; die inuadunt. In q̄ plu-
rimis siquidem morbis, vbi sanè maximè vtilis sit fu-
turæ accessionis prænotio, ea vel alternis diebus fit,
vel quotidie, ī paucis verò quibusdā per quartum. Qui
verò præter has tres periodos, & quitanā, & sextanā,
& septimanā, aliasq; innumeras esse arbitrātur, p̄ter q̄
q̄ inania producunt, infinitosq; cogūtur dare periodo-
rum cōplexus, nunq̄ poterūt futuram accessionē præ-

noscere. Porro quis fuerit huiusce attonitæ sectæ author primus, ignoro: dicā tñ, qñ primum illā explicari audiuerim. Deceſſerat paulò ante de vita Antoninus: q Adriano in imperio ſucceſſerat. Regnabat aut Seuerus, qui ſeipm nomine mutato, Antoninū appellauit. Lucium verò, quem Imperii participem fecerat, Seuerum appellauit. Cæterum præſtat illorum abſurditatis ne meminiffe quidem, Pythici præcepti memores, eſſe parcēdum tempori. Nos verò in præſentia diem, tempus id vniuerſum dicimus quòd diem atq noctē cōplectitur. Qua ratione dicunt annū conſtare diebus tercentis & ſexaginta quinq, & quarta vnus parte. Horæ itaq quatuor & viginti, diem abſoluunt: duos autem, octo & quadraginta: tres duo & ſeptuaginta. Typis autem nomina indita ſunt, non ex diebus ipſos complentibus, ſed ex acceſſionum reditu. Tertianā quippe appellamus, vbi acceſſio tertio quoq die inuadit, duobus interim abſolutis: quartanam, in qua videlicet quarto: in hac quoq tribus iam perfectis: & in aliis quoq ſecundum eandem rationem. Si igitur periodum inueneris typi alicuius, quatuor continentem compleros dies, illum quintanam dices. Neq enim eſt idem acceſſionem quinto oboriri die, et eſſe quinque dierum circuitum. Siquidem numerus horarum periodicarum, qui inter duo initia acceſſionum eſt medius, conſyderandus eſt: atq ex illo typus februm metiendus. Sic enim dicimus quotidianum typum ſortiri horas. 24. Tertianum. 48. Quartanum. 72. Quintanum. 96.

Quo ſimiliter pacto cæteri perficiuntur, ex horarum, 24. multiplicatione.

Rrr ii

Antonin⁹ Imp.
Adrianus Imp.
Seuerus muta
to nomine uo
catus fuit An
toninus.

Lucius fuit ap
pellatus Seue
rus.

Tempori eſſe
parcendum
Dies quod tē
pus ſit.

Ann⁹ ex quos
diebus cōſtet.
Horæ.

Tertianā quæ
dicatur.

Quartana quæ
dicatur.

Typus febris
vnde metien
dus ſit.

Februm inter
mittentium ty
pi ſinguli, quos
expleant ho
ris.

GAL. PER. DE GALENI PERGA

MENI DE TYPIS.

LIBER VNVS.

Typus accessio-
nism quid.
Periodus accessio-
nism quid.



Typis carentes febres.

Typorum differentie.
Typi primi.

Typi secundi.

Typi permanentes.
Typi mobiles

Typi pleptici.
Typi hysterici
Typi simplices
Typi compositi.

TYPVS Est ordo intensiōis & remissionis: periodus verò, est tempus intensiōis & remissionis: qđ in morbis existit. * Pauci autem ex affectibus carent typo: vt atrophia, neruorum resolutio, elephantiasis, & quicunq; his proportionē respondent. Plurimi verò affectus typum quidem præ se ferunt, verum rariis. Porro omnium maximè, febres typos admittunt, iis continuis exceptis, quæ vel remittunt nunq̃, vel inordinatæ existūt. Typorum itaq; alii quidem sunt primi, alii verò secundi: alii permanentes, alii mobiles, alii simplices, alii compositi. Primi igitur sunt, qui breuē habent inuasiōem, longam autem remissionem: quales tertiani & quartani existunt. Secundi verò, qui longam habent inuasiōem, breuem autem remissionem: vt quotidianus & valde extensus semitertianus. At permanentes sunt, qui iisdem horis perpetuò inuadūt, remittuntq;: Mobiles verò, qui diuersis semper horis accedunt. Ex quibus qui præueniunt, & celerius horas præoccupant, proleptici: qui verò tardius morantur, hysterici nominantur. Simples sunt, qui vnum tantum modo insultum faciunt: compositi, qui ex pluribus inuasiōibus & remissionibus constant. Cæterum compositorum quidam ex homogeneis, idest genere similibus: quidam verò ex heterogeneis, hoc est, dissimilibus, constant. Ex genere quidem similibus, quum quotidianus typus, exempli gratia, simplex, duplici quotidiano implicatur: aut duplices tertiani, aut tres tertia-

ni existunt: vel rursus duo & tres quartani. Ex diuersis autem genere, quum quotidianus, exempli causa, tertiano connectitur: aut tertianus quartano. Etenim quotidianus est, qui quotidie vnam inuasionem longitudine commensuratam, vnamq; similiter remissionem efficit. Tertianus aut, qui tertio quoq; die, vnam inuasionem & remissionem similiter commensuratam adducit. Quartanus deniq; qui quarto quoq; die suam inuasionem & remissionem molitur. Atq; eadem intelligentur de quintano & septimano, & si quis alius typorum ordo inuenitur. Porro quotidianum consequit typum humiditas habitus, vomitus pituitosi, sitis non admodum intensa, totius corporis grauitas, somnus grauis atq; profundus, pulsus magnus, rarus, & laxus, facies subliuida, laxa, & p̄mollis, & quæ multam præ se ferat materiæ tum prauitatem, tum mutationem. In hoc etiam typo splen durior euadit. Quod si protrahatur diutius, tremuli & veternosi sopores sequuntur: & thoracis fluxiones, & aquæ inter cutem affusiones. Potissimū autem hi stomacho male affecto constituuntur. Tertianum verò comitat sitis intensa, æstus, acres atq; biliosi vomitus, inedia, inquietudinesq;. Vt plurimum autem rigores hunc præcedunt: nonnunq; verò etiam refrigeratio. At pulsus in his qui tertiano typo vexantur, paruus & frequens subsequitur. Noctes, quæ accessionis dies præcedunt, molestæ admodum sunt. Vbi autem morbus producit, nō amplius molestæ existunt, sed febrem ipsam compescunt. Qui verò ita febricitant, quandoq; à tertiano in semitertianum transeunt. Hic autem tertianus typus, omnium minime vexat: p̄sertim si æstate fuerit cōtractus. Quod sanè indicauit Hippocrates dicens. Tertianæ exquisita septem circuitibus, quod longissimum est, indicatur. Raro autem diuturna fit, nisi desinente autumnō, aduentanteq; hyeme gignatur. Vrinæ sunt flauæ, necnō

Typus quotidianus.

Typus tertianus.

Typus quartanus.

Typum quotidianum quæ consequantur.

Quotidianæ laborantibus febre induratur lien.

Quotidianus typus ventriculo male affecto constitui solet.

Tertianum typum quæ consequantur.

Hippocrates.

Hemitritico ad
esse quæcunq;
comitantur ter
tianam.

Hemitriticoꝝ
typorū ppria.

Hemitriticoꝝ ty-
pus est ferus,
periculūq; vn-
decunq; por-
tendens.

Hemitriticus
quibus magis
sit familiaris.

Hemitriticus
aliquando in-
termittit.

vigilia infestant. Omnia autem quæ comitant tertianam, eadem & semitertianæ contingunt, quum eiusdem generis ambæ participes sint, tertio quoq; die molientes remissionum & accessionum repetitiones. Proprium autem semitertianorum typorum existit inuasionum extensio, & q; plerunq; cum refrigeratione, & statu nondum completo, rursus accessiones infestent. Atqui semitertiana periculum semper minatur, eo q; non solum os ventriculi & nervosas partes attingat, & i vniuersum eas adhuc, quæ media compositione consistunt, verumetiam veterinosos inducat sopores, & cum deliriis vigilias annexas: nonnunq; & resolutiones, quas syncopæ comitatur: linguam etiam valide siccet, atq; animi defectum efficiat, ea quæ sunt in profundo vehementius commouens. Vt autem summarim dicam, typus hic ferus est, periculumq; vndecunq; portendens. Quandoq; autem primo die constituitur, quemadmodum cæteri typi: interdum verò & à secundo & tertio incipit. Oritur autem nonnunq; à tertiana producta: nonnunq; etiam solutus, in tertianam degenerat: interdum verò & in duas tertianas et quotidianas, ob longitudinem inuasionis, dirimitur: Plerunq; autem, quod attinet ad naturas, virilem corripit: quòd ad ætates, florentem maximè: quod verò ad anni tempora, in autumnino præsertim: quando & valde periculosus existit. At non perpetuò continuus est, sed & intermittens quandoq; inuenitur. Habet autem & tres quo ad eius magnitudinē differentias. Alia siquidem semitertiana ē exigua: alia media: & alia magna. Exigua igitur est, quæ circa vigintiquatuor horas torquet. Media, quæ circa triginta sex. Magna quæ circa quadraginta octo: quæ & cōtinuæ feбри est propinqua. Porro Agathinus à relatione ad tertianam, semitertianam fieri cēset. Etenim, tertio quoq; die vtriusq; sunt inuasiones. Quartanū verò typum rigores qui-

dem validi consequuntur, & vomitus pituitosi, & lie-
 nis inflammatio, & tumor: nonnunq̃ & abolita appetē-
 tia, & salivæ copia. Interdum etiam ex contrariis appe-
 titus intensus. Quandoq; & tussicula simul adest, si cor-
 poris habitus corrumpatur. Iecirco typi quartani diffi-
 cile solubiles sunt, cæterisq; omnibus diuturniores: ita
 ut vsq; ad biennium perdurent. Quum autem inuale-
 scit quartanus typus, ipse sibiimet complicatur, ut
 duas & tres quartanas efficiat, aut ad aliquam etiā de-
 ueniat cōtinuitatem. Rursus verò quum moderatio-
 fit, in vnā conuertitur. Interdum autem & ob sym-
 ptomata quæ complicantur ipsis, adeo periculosa hu-
 iusmodi febres euadunt, ut ad phthisim tandem, aut
 ad aquæ inter cutem affusiones perducant. Frequen-
 tiores autem sunt q̃ aliis temporibus in autumno po-
 tissimum: quò etiam tempore solvuntur ægrè. Quæ
 verò æstate fiunt, omnium minimè infestant: & magna
 ex parte aliis præcedentibus morbis superueniunt inor-
 dinatè. Quandoq; etiam, sed raro, ab initio cōsistunt.
 Cæterum pulsus eis qui tertiana laborant, nō tantum
 magnitudine exiguus sit, q̃tum iis qui vexantur quarta-
 na: neq; vsq; adeo in tumorem attollitur, quātum illis
 qui quotidiana occupantur. Namq; in hoc typo, pulsū
 quædam mediocritas inuenitur. Est autem quandoq;
 & in accessionum initiis rarior eo qui secundum natu-
 ram est. Verū præter has tres, inueniuntur etiam fe-
 bres, quæ typicos dierum motus seruant: sicuti & aliæ
 typorum prorsus expertes, præter vnā. Quæ igitur
 seruant typicos dierum motus, vel ante horas con-
 suetas corripiunt, vel retardant. Fiunt autem inor-
 dinatæ, sed præter motus formam. Quare interdum
 præoccupant: interdum tardius morantur: at citra or-
 dinem vtraq; præter id tamē q̃ modò inordinatè mo-
 ueant, modò sistant, nusq; autem ordinem habeant, ubi
 etiam à nullo impediuntur: verū manente semper

dierum figura, quam solæ particulares inordinationes comitentur. Quæ verò omnino typoꝝ expertes sunt, & præter omnes modos enumeratos, & adhuc citra dierum ordinem fiunt. Quædam enim inuasiones adducunt: quædam existunt prorsus inordinatæ. At speciei huius differentias plures esse contingit. Licet itaq; modo prædicto cuiq; speculari, necnō vtcunq; voluerit, prædictorum typorum proprietates complicare.

*Typi admittē-
tes duplicatio-
nem qui sint.*

*Quotidianus
duplex.*

*Tertianus du-
plex.*

*Quartanus du-
plex.*

Porrò ex typis duplicantur ii, qui primi appellantur: ut quotidianus, tertianus, atq; quartanus. Quotidianus itaq; duplex est, qui diebus singulis similiter bis inuadit, & bis remittit. * Duo autem tertiani sunt, qui per singulos dies diuersis acceseionibus sibi inuicem succedentibus, tertio quoq; die apprehendit. Quartani verò, quum die vno salubri succedere, duobus deinceps sequentibus diebus contingat febricitare, in singulis inuasionum horis seruatis figuris, quæ nimix ex quaternario circuitu sunt æstimandæ. Quotidianus verò tertiano adiungitur, quum primo quidem die, bis inuadit, & bis remittit: die autem sequenti, semel: tertio verò, rursum similiter primo. Quartano aut quotidianus miscetur, quum primo quidem die, bis inuadit: duobus sequentibus, semel: quarto verò die, bis: primo similiter. Porrò quotidianus, tertianus, atq; quartanus, inuicem commiscetur, quum dies quidem prima tres habet inuasiones, & totidem remissiones: secunda, vnā: tertia duas: quarta tres: quinta vnā: sexta duas: septima rursum tres: atq; in reliquis diebus idem cum primis ordo seruatur. Tertianus autem quartano iungitur, vbi prima dies duas inuasiōes adducit, totidemq; remissiones: secunda verò nullas omnino: tertia vnā: & quarta vnā similiter: quinta vnā: sexta nullam prorsus: septima duas: atq; in sequentibus pari modo. Commiscentur adhuc tertianus typus, quartanus, & quintanus: quum scilicet primo die acceseiones conti-

*Quotidianus
typus tertiano
iunctus.*

*Quotidianus
typus quarta-
no iunctus.*

*Quotidianus
typus tertiano
& quartano iū-
ctus.*

*Tertianus ty-
pus quartano
iunctus.*

*Tertianus ty-
pus quartano
& quintano
iunctus.*

gerint: secundo quieverint: & tertio tertianus, quarto quartanus, quinto verò tertianus simul & quintanus inuaserint. Sed aliter etiam quodammodo huius typi inuasio contingit, in eundem nihiminus typi ordinē incidente tertiani cum semitertiano coniugatione.

GALENI PERGA

MENI ARS MEDICINALIS

CAP. I.



TRES Sunt omnes doctrinæ quæ ordini inherēt: Prima quidem, ex notatione finis, quæ per resolutionem fit. Secunda ex compositione cōstat, eorum quæ per resolutionem inuenta fuerunt. Tertia ex definitionis dissolutione, cui nunc incumbimus. Ex quibus sanè primā, quæ oritur à finis notatione, & ex qua omnes artes via quadam atq; ordine cōstituuntur, neminem antè nos scripsisse comperimus. Hic itaq; definitiuam faciemus doctrinam: quæ quātū ab ea quæ ex resolutione consistit, & dignitate, & ipso docendi ordine linquitur, tantum & ad totius compendium, & ad singulorum memoriam præstare inuenietur. SuffICIENTER siquidem, ac facillimè commendantur memoriæ vniuersa, ex definitionis dissolutione. Quoniam totius artis capita in se optima definitio complectitur: quam quidam substantialem appellant: ex aduerso distinguētes eam ab aliis, quæ notionales vocantur. Illæ siquidē, ab iis quæ accidunt rebus definitis: hæ verò ab ipsa cētia cōstituunt.

Doctrinæ ordinatæ sunt tres.

Doctrinā à finis notatione ortam, nemo arte Galeni exposuit.

Doctrina definitiuæ vtitur Galenus in arte medicinali.

Definitio optima in se capita totius artis complectitur.

Definitio est duplex: substantialis & notionalis.

QVID SIT MEDICINA. CA. II.

Medicina est scientia salubrium, & insalubrium, & neutrorum. Nomen autē scientiæ communiter,

Medicina est
scientia salu-
brium, insalu-
brium, & neu-
trorum.

Salubria que
dicantur.
Insalubria que
sint.
Neutra, quæ.

non propriè, accipere oportet. Porro salubre ipsum, insalubre, & neutrum, vñquodq; tripliciter dicitur: hoc quidem, vt corp^o: hoc autem, vt causa: hoc verò, vt signum: Etenim corpus quod natura suscipere sanitatem est aptum, & causam quæ eadem efficere aut conseruare, & signum quod potest indicare, hæc omnia salubria Græci appellare consueuerunt. Eadem ratione & susceptiua morborum corpora, & eosdem efficietes, conseruantesq; causas, & signa indicantia, insalubria vocant. Nec aliter corpora neutra, causas, signa ue dixerunt. Cæterum secundum quidem primam rationem, atq; præcipuam, causarum salubrium est Medicina scientia. Propter eas autem, & aliarum: secundo autem loco, insalubrium: & tertio neutrarum. Et post has eodem modo corporum, primò quidem & hic, salubrium: secundo loco, insalubrium: tertio, neutrorum. Itidem & de signis dicendum. In actionibus autem prima quidem est corporum cognitio, quæ habetur ex signis: post hæc, earum quæ in ipsis cognitio causarum.

QUOT MODIS DICATUR EF-
FECTIVVM, INDICATIVVM,
& susceptivum. Cap. III.

Simpliciter dici
modis duobus

Neutra dici
tripliciter.

Sed quoniam & effectiuum, & indicativum, & susceptivum, dupliciter vñquodq; dicitur, hoc quidem simpliciter, hoc verò vt nunc, nosse oportet, am-
borum esse medicinæ scientiam. Ipsum verò simplici-
ter, duobus dicitur modis: & quod semper, & quod vt plurimum: de quorum utroq; Medicina præstat. Neutra verò, & causa, & corpus, & signum, & quod simpliciter dicitur, & quod vt nunc, tripliciter vñquodq; appellatur: hoc quidem, quia neutrius contrariorum est particeps: hoc verò, quia vtriusq; atq; hoc deniq; quia aliquando huius, aliquando illius. Horum autem ipsorum secundum, rursus duobus dicitur modis: aut

quia utrumque contrariorum ex æquo participat: aut quod aliquando plus alterum. Primum igitur de corporibus ipsis dicemus, qualia nam sint, & salubria, & insalubria, & neutra: post hæc de signis & causis differemus.

DE CORPORE SALVBRI. CA. IIII.

Salubre simpliciter corpus est, quod ab ipso naturæ ortu bonam temperaturam fortitur in simplicibus ac primis particulis: estque in his quæ ex illis constât instrumentis commensuratum. Salubre verò nunc est corpus, quod in præsentem est sanum. Est verò & hoc, eo tempore quo sanum existit, bonam habens temperaturam & commensurationem: non tamen optimam: ac sibi propriam. Ipsius verò salubris simpliciter corporis, semper quidem est tale, quod optimè temperatum ac maximè commensuratum existit: ut plurimum autem, quod à constitutione optima, non valde admodum deficit.

Salubre simpliciter corpus quod sit.

Salubre ut nunc, quod sit corpus.

DE CORPORE INSALVBRI. C. V.

Insalubre verò simpliciter corpus est, quod ab ipso ortu naturæ, vel in consimilibus partibus malam temperiem possidet: vel in instrumentalibus incommensurationem: vel utrumque vitium. Insalubre verò nunc, est illud, quod eo tempore, quo tale dicitur, ægrotat: vel in consimilibus pravam temperaturam: vel in instrumentalibus incommensurationem: vel utrumque vitium tunc habens. Est verò & semper insalubre, quod ex ipso naturæ ortu vel pessimam temperiem possidet in simplicibus & primis particulis omnibus, vel in aliquibus, vel in iis quæ obtinent principatum: vel in instrumentalibus incommensuratum existit: idque vel in omnibus, vel in nonnullis, vel in illis quæ principatum obtinent. Ut multum verò insalubre est corpus, quod ab huius quidem vitio recedit: nodum tamen medicritatem attingit.

Insalubre simpliciter corpus, quod sit.

Insalubre ut nunc, quod sit corpus.

DE CORPORE NEVTRO. CA. VI.

Neutrum cor-
pus quid sit, iux-
ta primum si-
gnificatum.

Neutrum iux-
ta secundum si-
gnificatū quid
sit.

Neutrū iuxta
tertium signifi-
catum quid.

Quoniam verò & neutrum corpus dicebatur tri-
pliciter, vnum quidem, quod neutrius erat ex-
tremæ dispositionis particeps: aliud, quod vtriusque:
aliud quod aliquando huius, aliquando illius: iuxta pri-
mum significatum, neutrum erit corpus, quod exqui-
sitè medium est, & saluberrimi, & insaluberrimi cor-
poris: & huius, hoc quidem simpliciter tale, quod ab
ipso naturæ ortu, ita est constitutum: hoc autem ut nunc,
quod in præsentī tempore, exquisitè medium existit,
& saluberrimi, & insaluberrimi corporis. Ipsius verò
simpliciter, semper quidem tale est id, quod in omnib⁹
ætatibus perdurat tale: ut multum autem, quod non-
nullas recipit mutationes. At iuxta secundum signifi-
catum, neutrum erit corpus, quod ab ipso ortu natu-
ræ, contrariarum simul est particeps dispositionum:
aut scilicet in vna parte, aut in duabus differentibus.
In vna quidem, si secundum alteram oppositionem ef-
fectiuarum qualitatum bonam habuerit temperiem:
vel etiam secundum vtranc⁹: sed in formatione, vel
magnitudine, vel numero partium, vel situ, deliquat:
aut cōtrā, in his quidem rectè se habeat, vel omnib⁹,
vel quibusdam: peccet autem in ipsa temperie. In dif-
ferentibus verò partibus, & iuxta omnes oppositiōes
potest quicq̃ simul esse particeps contrariorū. Et sem-
per quidem est tale, quod per omnes ætates in eodē
perseuerat statu. Ut multum verò, quod aliqua ex par-
te euariet. Ita etiam, & nunc neutrum erit corpus iux-
ta secundum significatum, quia vel parte in vna, hæc
quidem sibi salubria sunt, illa verò insalubria: vel i dif-
ferentibus ita afficitur partibus. Iuxta tertium signifi-
catum, neutrum erit corpus, quod aliquando quidem
salubre, aliquando verò insalubre existit. In vno autē
tempore, quod ita est neutrum, * exactè quidem cō-
sistere nequit: latius verò si accipiatur, potest.

DE SIGNIS SALVBRIBVS. CA. VII.

Sunt autem ex signis salubria quidem, quæcunq; præsentem indicant sanitatem, & futuram prænu-
 ciant, & præteritam memoriæ subiiciunt. Insalubria ve-
 rò, quæ & præsentem indicant ægritudinem, & futuram
 prænunciant, & præteritam memoriæ subiiciunt. Eadem
 ratione neutra dicuntur, quæ neutram dispositionem
 ostendunt, prænunciant, & memoriæ subiiciunt: quæq;
 partim quidem salubrem, partim insalubrem disposi-
 tionem indicant: & quæ aliquando quidem salubrem,
 aliquando verò insalubrem; & hæc quoq; secundum
 tria tempora, veluti salubria & insalubria, appellatur.
 Dicuntur autem nonnunq; à vetustioribus Medicis hæc
 omnia, signa prænunciatiua, quæ sint præsentium &
 præteritorum indicatiua. Porro usus non paruus ex
 prænunciatiuis atq; indicatiuis accedit: minor autem
 ex his quæ memoriæ subiiciunt.

DE SIGNIS OPTIMAE CONSTI-
 TUTIONIS. CAP. VIII.

Salubrium autem corporum dignotiones sumen-
 dæ sunt ab iis quæ secundum essentia rationem eis
 insunt: & ab his quæ necessariò sequuntur ipsa functio-
 nibus atq; symptomatis, quæ propriè accidèria appel-
 lant. Ab essentia quidem ipsa, eorum quæ optimam ha-
 bent constitutionem, commensuratione: consimilium
 quidem, in caliditate, frigidityte, humiditate, & siccita-
 te: instrumentorum verò, in quantitate ac numero eo-
 rum ex quibus constant: ac præterea formatione, situ
 partium singularum, & totius instrumenti. Ex his ve-
 rò quæ necessariò consequuntur consimilia: quantum
 quidem ad tactum attinet, à mediocritate quæ in mol-
 litie & duritie consistit: quantum verò ad aspectum, à
 colore optimo, & leuitatis, atq; hispiditatis mediocri-
 tate. In functionibus à perfectione, quam ipsarum es-
 se virtutem dicimus. Ab iis verò quæ instrumentarias
 sequuntur partes, à commensuratione & pulchritudi-

Salubria signa
 quæ sint.

Insalubria si-
 gna quæ sint:

Neutra signa
 quæ sint.

Signa prænu-
 ciativa, indicat
 iacq; esse vti-
 liora iis, quæ
 memoriæ subii-
 ciunt.

Salubrium cor-
 porum digno-
 tiones unde pe-
 tendæ sint.

ne omnium totius corporis instrumentorum: ac præterea, ab earum quæ ipsis insunt, virtute operationū. Optimæ igitur cōstitutionis corporum signa indicatiua sunt hæc. Eorum autem, quæ ab ipsa deficiunt, & adhuc tamen salubria existunt, nonnulla quidem in cōsimilium temperatura vitium aliquod paruum habet: nonnulla verò in instrumentariorum vel omnium, vel aliquorum commensuratione, & hoc quoque perexiguū. Sunt quæ in vtrisque vitium aliquod habeant. Vitiōrum verò genera, eadem sunt his quæ virtutem perficiunt: temperatūra quidem in cōsimilibus: numerus autem, & formatio, & magnitudo, & situs instrumentariis: vtrisque verò communis vnitas, quam ipsorum continuitatem vocamus. In his autem ipsis generibus sunt corporū insalubrium vitia, secundum vtrūque salubritatis significatum. Terminus autem qui vtrūque distinguit, est operationū læsio sensibilis. Etenim quæ simpliciter insalubria sunt corpora, distinguuntur ob id, quod facile à causis morbificis superantur: & quoniam in vigore operationum deficiunt plurimum. In medio autem salubrium & insalubrium collocantur ea, quæ neutra exquisitè appellantur: & cum latitudine quadam. Quo fit, ut tota sanitatis latitudo in tres partes, quarum singulæ latitudinem habent non parvam, diuidatur. Erit autem prima quidem salubrium corporum: secūda neutrorum: tertia insalubrium. Post hæc deinceps sequuntur quæ iam ægrotant corpora: quæ sensibilibus operationum læsionibus distinguuntur. Hæc autem omnia sensu diiudicantur, non ipsa natura rerum. Signa itaque sanorum corporum, siue ea salubria, siue insalubria, siue neutra existant, quantitate diſtantiæ differunt: duobus inuicem contrariis terminis à nobis constitutis, optima videlicet constitutione corporis, & nuper genito morbo: ac deinceps considerantibus, vtri eorum sint viciniora, quæ ad examē corpo-

Insalubria simpliciter corpora facile a causis morbificis superantur.

Sanitatis latitudo vniuersa in tres partes diuiditur.

Ægrotantia corpora a cæteris, sensibilibus operationum læsionibus distinguuntur.

ra veniunt. Quæ enim proximiora sunt optimæ constitutioni, salubria: quæ verò ab hac longi distant, atq; ad ea quæ iam ægrotant, magis accedunt, insalubria: quæ autem intermedia, atq; æqualiter ab verisq; distare videntur, neutra existunt. Optimæ igitur constitutionis corporis indicia explicauimus. Eorum verò quæ ab ipsa deficiunt, totidem sunt numero genera quæ in magis & minus secari possunt.

Salubria & insalubria corpora, quomodo discernenda.

QVOT SVNT DIFFERENTIAE

partium.

CAP. IX.

Partium vniuersæ differentiæ sunt quatuor. Siquidem earum nonnullæ principia quædam existunt: aliquæ ab ipsis originem habent: aliquæ neq; aliarum gubernationi p̄sunt, neq; aliunde gubernantur: quum insitas habeant à natura potentias, à quibus reguntur. Quædam verò sunt, quæ insitas simul & aliunde emanantes fortiuntur. Principia igitur sunt, Cerebrum, Cor, Hepar, atq; Testiculi. His verò, & originē debet, & famulantur, nerui quidem & spinalis medulla, Cerebro: Cordi autē, arteriæ: Hepati, venæ: vt testiculis seminaria vasa. Quæ autem à seipsis, gubernantur, sunt Chartilago, Os, Copula seu ligamētum, Membrana, Adenes, Adeps, & Caro simplex. Reliquæ verò partes, quum vnà cum istis habeant ex seipsis regimen, arteriis, neruis, & venis insuper indignerunt. Capillorum autem atq; vnguium neq; regimen vllum est, sed generatio tantummodo.

Partiū vniuersæ differentię sunt quatuor.

Principes partes sunt cerebrū, cor, hepar, atq; testiculi.

Capilli, vnguesq; minime gubernantur, sed gignuntur duntaxat.

DE SIGNIS CEREBRI.

CA. X.

Cerebri autem naturam, quinq; indiciorum genera ostendunt. Primum quidem, totius capitis dispositio. Secundum, sensibilibus operationum virtus & vitium. Tertium, actiuarum. Quartum, earum quæ principatum obtinent. Quintum deniq; naturalium. Est & aliud sextum genus præter hæc dicta, alteratio quæ extrinsecus aduenit. Porro totius capitis disposi-

Cerebri naturam quinque indicatorum genera ostendunt.

tio, ex magnitudine ipsius atq; figura sumitur: necnō ex capillis.

DE PARVITATE ET MAGNITVDI
NE CAPITIS. CAP. XI.

PAruum igitur caput vitiosæ cōstitutionis cerebri proprium indicium est: magnum verò, non necessariò indicat bonam cerebri compositionem: sed si quidem ob insitæ virtutis robur, quæ multam ac optimam materiam afformarit, eueniat, optimum signum ē. At si ob materiæ tantū multitudinem, haudquāq; bonum. Distinguenda verò sunt hæc, & ex figura ipsa, & ex his, quæ ab eo habent ortum. Ex figura quidem, si sit concinna: semper nāq; hoc, bonum signum existit. Ex iis autem quæ ab eo ortum habent, si ceruici validæ insideat, aliisq; ossibus optimè constet: atq; omnis præterea substantia boni sit habitus, ac robur habeat intentum. Propria autem capitis figura est, veluti si excogitares sphaeram exquisitè rotundam ex cera constructam, paulatimq; vtrinq; depressam. In hac enim necesse est, vt posteriores * prioresq; ptes plus gibbæ fiant, q̃ sphaeræ conueniat: quæ verò vtrinq; cōsistunt, magis rectæ. Quòd si ea quæ secundum occiput eminentia, aliquatenus minuatur, simul intueri oportet neruos, atq; ceraicem, vnā cum ossibus aliis. Nam si secundum naturam constiterint, materiæ defectu, nō virtutis imbecillitate, cōtingit. Illis verò nō rectè se habentibus, principium est debile. Vt plurimū verò existit optimum signum figura concinna parencephalidis, quā nonnulli medici posterius cerebrum vocant, vt est re vera posterius, distinctum labdoide futura. Est verò hæc pars principium spinalis medullæ, ac proinde neruorum omnium, per totum corpus animalis, actionibus subseruientium. Ipsa siquidem cerebri pars posterior, p seipsam, paucos admodum sensituios possidet neruos: plurimos autem actiuos. Anterior verò

contra

Caput magnū
quando sit bo
num indicium.

Capitis natu
ralis figura
qualis nam es
se debeat.

Paracephalis.
Labdoides
futura.
Cerebellum ē
principiū spi
nalis medullæ.

contra, sensitiuos quidem plurimos: actiuos autem p
paucos. Quare vbi vtracq; fuerit optimè affecta, robu
stas habebunt eas, quæ ab ipsis pendent, deriuationes.
Egedem quoq; distinctiones faciendæ sunt ad partes ca
pitis anteriores, quæ etiam ad posteriores: earūdemq;
paruitatem, magnitudinem, & figurā, necnon sensus
ibi collocatos, visum, gustum, & odoratum, expende
re oportet. Siquidem sese inuicem indicant, attestan
turq; & quæ à principiis oriuntur, principii virtutem
& vitium: & principium ea quæ ab ipso nascuntur.

Principia & m
quæ ab illis o
riuntur, sese in
uicem attestan
tur, & indicat

DE OPERATIONIBVS OBTINEN TIBVS PRINCIPATVM.

C A P. X I I.

E Arum autem operationum quæ obtinent princi
patum, virtus ac vitium sunt ipsius principii scor
sum tantummodo indicia. Voco autem operationes
principatum obtinentes, quæ à solo principio proue
niunt. Sagacitas igitur, subtilem cerebri substantiam
indicat. Tarditas verò intellectus, crassam. At discendi
facilitas, formarum faciliè susceptiuam. Memoria, sta
bilem atq; firmam. Difficultas discendi, formarū non
faciliè susceptiuam. Obliuio, fluidam. Mobilitas in opi
nionibus, calidam: vt stabilitas frigidam.

Principaliū
animæ actionū
singulæ, quid
significent.

SIGNA BONAE TEMPERATURAE CEREBRI. C A P. X I I I.

S I quidem cerebrum sortiatur bonam primarum
quatuor qualitatum temperiem, omnia quæ dixi
mus, habebit quāmodō moderata. Excremēta quoq; quæ
ab eo expurgantur, moderatè se habebunt: atq; ab iis
quæ extrinsecus alterādo occurrant, nequaquā lædatur.
Talibus igitur capilli capitis, quum adhuc sunt infan
tes, subrussi: quum verò pueri, subflauī: quum iam ado
lesuerint, flauī sunt: mediiq; inter omnino crispōs * &
lenes. Nec verò caluescunt faciliè.

SIGNA CALIDI CEREBRI. C. X I I I I.

autem ad vigilias prompti, & capillos habet robustos, crispas potius q̄ rectos & qui celerrimè eis genitis innascuntur. Cito autem caluescunt.

HVMIDI CEREBRI INDICIA.

C A P .

X V I I .

Humidioris verò cerebri indicia, capilli plani: quodq; minimè calui fiant: sensus turbulenti: multitudo excrementorū: somni multi & profundi. Atq; hæc quidem simplices sunt intemperies.

Cerebri humidioris indicia.

SIGNA CALIDI SICCIQVE

cerebri.

C A . X V I I I .

Qui calido & sicco sunt cerebro, superfluitatib; carent, sensibus vigent, plurimū vigilant, atq; cito fiunt calui. Prima autem capillorum generatio in illis celerrima est, ac plurimo alimento abundans. Capillos verò habent nigros & crispas: tangentibusq; caput sentiuntur calidi, rubicundiq; sunt, vsq; ad consistentiæ ætatem.

Cerebri calidi & sicci indicia.

SIGNA CALIDI ET HVMIDI

cerebri.

C A P . X I X .

Si verò humiditas caliditati iungatur, sed parum utraq; qualitas mediocritatem superet, adest color bonus, calorq; & quæ i oculis sunt venæ, magnæ. Præterea excrementa plurā, & mediocriter cocta, & capilli recti, & sufflavi: nec facilè calui fiunt. Implentur verò, atq; aggrauantur eorum capita à calidis. At si humectentur, tunc multo magis: & præcipuè vbi multitudine excrementorum redūdant. Quod si plurimum caliditas atq; humiditas creuerint, iis caput est morbis obnoxium, excrementisq; abundans: ac facilè à calfacientibus & humectantibus lædit. Proinde Auster semper talibus aduersatur: atq; optimè in Aquilone se habent. Ii non diu vigilare possunt: & quum se ad somnū conuerterint, simul graui somno tentantur & vigilant & somnia habent imaginationibus plena. Visus est eis

Cerebri calidi & humidioris indicia.

Cerebro calido & humido præditis, ut aduersat Auster, sic confert Aquilo.

turbulentus, nec satis sensibus vigent. Pro ratione autem ipsius qualitatibus in missione excellentis medio critatem, solent etiam signa ipsa excellere.

SIGNA FRIGIDI ET SICCI

cerebri.

Cap. . . X X.

Cerebri frigidi & sicci indicia.

Frigidæ verò & siccæ cerebri intemperantiæ, frigidum & minimè coloratum, sui ratione, caput efficiunt. Qui autem sic sunt affecti, in oculis nullas habent venas conspicuas, facileq; à frigidis causis læduntur. Quare & inæquali sanitate fruuntur.

DE SENSIBVS. C A P. . . X X I.

Sensus autem eorum, in iuuentute quidem, omnes vigent, atq; omni vitio carent: sed progrediente ætate, cito marcescunt. Vt autem summam dicam, omnia quæ ad caput pertinent, celerrimè illis marcescunt. Quamobrem cito cani fiunt. Capilli verò ipsis quidem genitis, vix exeunt, & malè nutriuntur, & rufi sunt. In progressu autem ætatis, superante magis frigiditate caliditatem, q̃ siccitate humiditatem, non caluescunt. Contra verò, si contigerit siccitatem quidem plurimum dominari humiditati: frigiditatem verò parum calori, calui fiunt hi.

SIGNA CEREBRI FRIGIDI ET

humidi. C A P. . . X X I I.

Cerebri frigidi & humidi indicia.

Humidæ verò, & frigidæ cerebri temperatura, graues somnos conciliant, sensuum hebetudine pariunt, vni excrementorū accumulante: caputq; red dunt frigori & plenitudini obnoxium. Sic affecti, destillationibus & grauedinibus facile corripunt: at minimè calui fiunt. D E OCVLIS. C A P. . . X X I I I.

Oculorum temperamēta quō cognoscantur. Oculi a simili bus temperaturæ suæ causæ

Qui oculi tangentibus manifestè calidi apparēt, & faciliè ac crebro motu mouentur, & venas latas habent, ii calidi omnes sunt: frigidi verò, his contrarii. Et humidi quidem, molles, multa q; humiditate referti: sicci verò, duri simul & aridi. A similibus autē

fu & temperaturæ causis facillè offenduntur: iuuantur
verò, à modico cōtrariorum vsu. Sed hoc quidem cō-
mune in omni cuiuscunq; partis temperiei dignotio-
ne meminisse oportet.

leduntur faci-
le: iuuatur ve-
ro à modico
contrariorum
vsu.

DE MAGNITVDINE OCULO-
rum. Cap. XXIII.

Magnitudo oculorum quidem, vbi concinnitas
adsit, & operationum virtus, multitudinem be-
ne temperatæ substantiæ ostendit, ex qua sunt
conformati. Quæ si desint, multam quidem substan-
tiam, non tamen bene temperatam indicat.

Oculorum ma-
gnitudo quid
indicat.

DE PARVITATE
oculorum. CA. XXV.

Paruitas verò oculorum, adiuncta quidem concin-
nitate, atq; operationum virtute, paucam qui-
dem, sed bene temperatam substantiam ostendit, ex
qua sunt conformati. Si verò inconcinnitas adsit, atq;
functionum vitium, paucam simul atq; vitiosam maté-
riam demonstrat.

Oculorū par-
uitas quid si-
gnificet.

DE COLORE OCULORVM.
CAP. XXVI.

Glauci oculi, qui pura humiditate, ac non multa
fulgent, tales sunt, ob splendidi luminis abundan-
tiā. Contrā verò, nigri, & qui intermedia naturā ser-
uant, causas quoq; intermedias sortiuntur.

Oculi glauci
& nigri vnde
siant.

DE GLAUCEDINE ET NI-
gredine oculorum. CA. XXVII.

Glaucus igitur ocul⁹ fit, vel propter magnitudinē,
vel propter splendorem crystallini humoris, vel
propter situm prominentem, vel propter tenuis &
aquei humoris, qui in pupilla existit, paucitatem, & pu-
ritatem. Omnibus autem his in vnum coeuntibus,
fit glaucissimus oculus. Si verò aliqua adsint, aliqua de-
sint, tunc maior minor ve glaucedo contrahitur.
Niger verò oculus fit, aut ob paruitatem crystalli-

Glaucedinis
oculorum cau-
sa.

Nigredinis o-
culorū causa.

dis, aut propter profundum situm, vel quia splendidus ac fulgidus exquisitè non est, vel quia tenuis humor, vel superabundat, vel impurus existit, vel propter vnam ex hisce causis, vel propter omnes fieri consuevit. Tenuis igitur humor, quo magis ad aquæ naturâ accedit, & superabundat, humidior em ostendit oculû: quemadmodum si crassior ac minor fiat, siccior em. Crystalloides autem humor, si quidem durior existat, siccior em efficit oculum: si verò mollior humidior em. Sic & si plus modico tenuem humorem excesserit, siccior em: si relinquatur ab illo, contrarium.

DE CORDIS TEMPERATURIS.

CAP.

XXVIII.

Cor frigidissimum erit calidius calidissimum cerebro.

V Nâquancq; partem calidior em aut frigidior em dicimus, non alicui rei alteri, sed ad seipsam, eam comparantes. Sic enim vteuncq; extiterit cor natura frigidissimum, multo sanè calidior em temperiem sortietur calidissimo cerebro.

SIGNA CORDIS CALIDI. Cap. XXIX.

Cordis calidi indicia.

C Alidioris igitur cordis, * q̃ pro naturali symmetria, indicia quædam sunt inseparabilia, & propria, magnitudo respirationis, pulsus velocitas, & frequentia: audacia, & ad actiões natura prompta. Quòd si multum in caliditate excesserit, tunc furibunda quædam iracundia, & temeritas adsunt. Est autem his thorax hispidus, & præsertim pectus, & quæcuncq; hypochondriis partes proximiores. Magna verò ex parte calidi cordis temperies vniuersum corpus calidum reddidit, nisi hepar vehementius obstiterit. Est præterea & latitudo thoracis, caliditatis indicium, nisi & hîc quoq; cerebrum plurimum reluctetur, cui spinalis medullæ magnitudo proportionem respondet. Tantæ verò erût magnitudine vertebræ, quanta spinalis medulla: quare & spina vniuersa. Compingitur autem thorax ad eam spinæ partem, quæ iuxta metaphrenum, hoc est

Toracis latitudo quæ sit caliditatis indicium.

dorsum, cōsistit, tanq̃ ad naui carinam. Quare necessariò eius longitudo æquabitur dorso. Latitudo verò, erit pro vertebrarum ratione: quando ad proportionem crassitudinis earum fuerit compactus. Quum verò cordis caliditas superàs perflauerit ac dilatauerit in primo sui ortu thoracem, erit eiusdem caliditati proportionē respondens. Quare quū caput paruum, thorax autem latus extiterit, maximū hoc tibi fuerit cordis caliditatis indicium. Quum verò magno existente capite, paruus fuerit, propriissimū hoc tibi sit cordis frigidioris signum & argumentum. Si verò capiti fuerit proportionē respondens, tunc alijs signis de corde distigues, ex ipsi⁹ thoracis amplitudine nihil iudicans.

SIGNA CORDIS FRIGIDI.

CAP. XXX.

IN frigidiore verò corde pulsus minores existunt, q̃ modo naturæ conueniat. Non tamen necessariò tardiores, vel rariores. Respiratio autem, si quidem tāto thorax minor extiterit, quanto cor frigidius, pulsus erit proportionalis. Si verò maior fuerit, q̃ pro frigiditatis portiōe, non solū minor, sed etiam tardior & rarior ipsa respiratio erit. Sic affecti sunt, naturaliter timidi, pusillanimesq̃; atq̃ tardi: pectusq̃ glabrum sortiuntur.

Cordis frigida indicia.

SIGNA CORDIS SICCI. Cap. XXXI.

Cor autem siccius, pulsus duriores efficit: iramq̃; non promptam excitat, sed ferinam, quæq̃; facile compesci non possit. Magna aut ex parte sic affectis vniuersum corpus siccius existit, nisi hepar obstiterit.

Cordis siccioris indicia.

SIGNA CORDIS HUMIDI.

CAP. XXXII.

Cordis verò humidioris signa, pulsus molles, & mores ad iram quidē procliuēs, sed talem, quæ sedari possit: at vniuersum corpus humidius existit, nisi hepar obsistat.

Cordis humidi indicia.

GAL. PERGA.
SIGNA CORDIS CALIDI
& sicci. Cap. XXXIII.

*Cordis calidi
& sicci idicia.*

Calidi & sicci cordis, pulsus duri sunt, magni, veloces, atq; frequentes: similiterq; respiratiões, magnæ, veloces atq; frequētes. Multo autem magis ad velocitatem ac frequentiam vergunt, thorace cordi non aucto proportionaliter. Sic affecti, præ cunctis, pectus habent maximè hirsutum, & hypochondria. Ad actiones autem sunt prompti, iracundi, & * celores, moresq; præ se ferunt tyrānicos. Sunt etenim ad furorem faciles, inexorabilesq;.

SIGNA CORDIS CALIDI
& humidi. CAP. XXXIII.

*Cordis calidi
& humidi in-
dicia.*

Si verò caliditas cum humiditate præcellat, minus quidem eis quos antea diximus, hi sunt hirsutit: ad actiones verò nihilo minus prompti: non tamen ferus ipsis est animus, sed ad iram tantum proclivis. Pulsus verò magni ac molles, velocesq; & frequētes existunt. At respiratio, si thorax quidem cordi fuerit proportionalis, eandem cum pulsibus speciem servabit. Si verò minor extiterit, tãto illis velocior, atq; frequentior erit, quanto & thorax minor extiterit. Quod si multa facta fuerit eversio in ipsa temperatura, atq; in humiditate præcipuè, præter ea quæ diximus, contingēt etiam ex putredine morbi: his, qui in ipsis fuerint, humoribus corruptis ac putrefactis. Expirationes autem maiores fient, ac velociores inspirationibus: necnon arteriæ contractio velox.

SIGNA CORDIS HUMIDI
& frigidi. CAP. XXXV.

*Cordis frigidi
& humidi in-
dicia.*

Qui humidior & frigidiore sunt corde, pulsus molles sortiunt: minimeq; audaces, sed timidi & segnes existunt. Tales etiam possidēt glabrum pectus: minimeq; iracundiam cōservant, ad quam etiam non sunt admodum prompti.

SIGNA CORDIS FRIGIDI

& sicci. CAP. XXXVI.

F Rigidius verò atq; siccus cor, pulsus quidem duriores reddit & paruos: respirationem autem, si quidem thorax paruitatem cordis frigiditati proportionalem habuerit, moderatam: si verò maior extiterit, raram & tardam. Hi verò præ omnibus minimè ad irascendum sunt prompti: quum autem coacti fuerint irasci quibusdam, retinent iracundiam. Habent autem maximè omnium pectus glabrum. * Cæterum quæcumque de moribus, siue nunc, siue quouis alio sermone explicata sunt ad temperaturæ cognitionem, sciendum est, ea non de optimis moribus, aut vitiosis, qui ex philosophia hominibus adueniunt, sed de insitis unicuique, naturalibusque, à nobis exposita fuisse.

Cordis frigidi & sicci argumenta.

SIGNA CALIDI HEPATIS.

CAP. XXXVII.

H Epatidis calidioris indicia, venarum laticudo, flaua bilis abundantior: in consistente verò ætate, etiam atra: calidior ipsis sanguis atq; eadē ratione vniuersum corpus, nisi cor obliterit. His venter & hypochondria hirsuta.

Hepatitis calidæ indicia.

SIGNA HEPATIS FRIGIDI.

CAP. XXXVIII.

F Rigidioris verò, angustia venarum, pituita abundantior, sanguis frigidior, adeoque totius corporis habitus, nisi calefiat à corde. Venter illis glaber est, atq; hypochondria.

Hepatitis frigidi indicia.

SIGNA HEPATIS SICCI.

CAP. XXXIX.

S iccioris autem, sanguis quidem crassior, & minimè abundans: venæ duriores & totius corporis habitus siccior.

Hepatitis siccorum indicia.

SIGNA HUMIDI HEPATIS.

CAP. XL.

Hepatis humi
di indicia.

GAL. PER. DE J A

HUmidioris autem sanguis quidem copiosior, hu-
midiorq; atq; venæ molliores: ita verò & vniuer-
sum corpus, nisi cor reluctetur.

SIGNA CALIDI ET

Hepatis calidi
& siccī indicia

siccī hepatis. CAP. XL I.

CALIDIORIS verò simul ac siccioris hepatis sunt indi-
cia, hypochondria plurimum hispida, sanguis cras-
sior & siccior, flaua bilis plurima: consistente autē eta-
te, etiam atra: venarum autem latitudo & durities. Sic
verò & vniuersum corpus se habet. Nam quæ ex cor-
de caliditas originem duxit, potest obtundere eā, quæ
ab hepate nascitur, frigiditatem: sicuti & frigiditas ca-
liditatem. Siccitatem verò nō potest humidius cor ad
habitum contrarium perducere. At media inter has
quæ dictæ sunt, ea quæ ab hepate humiditas nascitur,
Magis enim à cordis siccitate superat, q̄ siccitas ab hu-
miditate: minus autem à caliditate: adhuc verò multo
minus à frigiditate. Hæc enim inter omnes qualitates
quæ eueniunt ab hepate, facillimè superatur. Vbi igitur
in vnum conuenerint vtriusq; principii tempera-
ruræ, totum exquisitè secundum illas afficitur corpus.

SIGNA HEPATIS CALIDI

Hepatis calidi
& humidī si-
gnā.

& humidī. CAP. XL II.

HUMIDIUS autem, ac simul calidius hepar, minus q̄
dem q̄ calidius & siccius hispida hypochondria red-
dit. Plurimum vero sanguinis, & venas amplas, habi-
tūq; calidiorem, & humidiores facit, nisi obstiterit
cor. Si verò amplius in ambabus qualitatibus à natu-
ræ modo recedat, à morbis q̄ ex putredine, ac vitiosis
humorib; sūt, sic affectus minimo negotio corripit: p̄-
sertim si plurimū augeat humiditas: caliditas verò, nō
ita: Sin autē contra, minimè humorum vitio laborat.

SIGNA HEPATIS HUMIDI

Hepatis humi-
di & frigidi in-
dicia.

& frigidi. CAP. XL III.

HUMIDIUS autem atq; frigidius hepar habet hypo-

chondria glabra, sanguinem verò, accedentem ad pituitæ naturam gignit, cum venarum angustia. Sic & reliquum afficit corpus, nisi à corde ad contrariâ transferatur naturam.

SIGNA HEPATIS FRIGIDI
& siccæ. CAP. XLIII.

Frigidius & siccus hepar, parum sanguinis, & exiguas venas exhibet corpori: ipsumq; frigidius reddit, & hypochondria glabra, nisi & hic cor dñetur.

Hepatis frigiditatis & siccitatis indicia.

SIGNA CALIDAE, FRIGIDAE,
humidæ, & siccæ tēperaturæ testiculorū. Ca. XLV.

Temperatura verò testiculorum, calida quidem, proclivis ad venerem, masculorūq; productrix, atq; fecunda. Eadem celerrimè genitales partes obsepi pilis. Frigidior verò, contraria efficit. At humida, multo & humido semine abundat. Sicca, paucum & modicè crassum generat semen.

Testiculorū tēperaturæ significancia.

SIGNA CALIDAE ET SICCÆ
tēperaturæ testiculorum. Ca. XLVI.

Calidior verò & siccior, crassissimum semen habet, & fecundissima est, ac celeriter ab initio protinus ad coitum excitat animal. Sed & his genita

Testiculorū caliditatis & siccitatis indicia.

les partes citissimè hispidæ fiunt: atq; omnes quæ circumstant, supra quidem, vsq; ad umbilicum: infra verò, vsq; ad media femora. Petulca igitur est, & ad libidinem prona, cuiuscemodi temperatura: statim verò satiatur, & si cogatur offenditur.

SIGNA CALIDAE ET HUMIDAE
tēperaturæ testiculorum. Ca. XLVII.

Sed in autem caliditas humiditati iūgatur, hirsuti quidem tales minus: plus verò semine abundant: non tamen plus cæteris appetunt, sed minori detrimento præter modum veneris indulgent. Quod si caliditas & humiditas abundanter exuperaverint, non sine detrimento à veneris abstinent.

Testium caliditatis & humiditatis indicia.

SIGNA HUMIDAE ET FRIGIDAE
temperaturæ testiculorum. Ca. XLVIII.

Testium frigidorum & humidorum indicia.

SI verò frigidiorē & humidiorē temperaturā testiculi habuerint, partes circumpositæ glabræ sunt, & tardè rein exercere veneream incipiunt, nec proni ad actum huiusmodi sunt. Aquosum verò & tenue ipsis est semen, infœcundumq; & fœminarum generatium, vel omnino non generans.

SIGNA FRIGIDAE ET SICCAE
temperaturæ testiculorum. Ca. XLIX.

Testium frigidorum & sicciorum indicia.

AT frigidior & siccior temperatura, similis quidē in reliquis est antedictæ: crassius tamen in ipsa semen existit, atq; paucum omnino.

DE TOTIVS CORPORIS HABITU. C.L.

Totius corporis habitus in illis maximè consistere dicitur partibus, quæ primæ oculis subiciuntur. Sunt verò hæ, muscoli, qui omnia ambiunt ossa, existentes quædam carnes compositæ, ex prima & simplici carne, & præterea fibris, quibus innascuntur. Propria siquidem musculorum substantia constat ex his duobus. Quæ verò ad ipsos vasa ptingunt, veluti riuus quidam sunt, qui non substantiam complent, sed eis subministrant, ut in vita permaneant.

SIGNA MODERATÆ TEMPERATURÆ. Cap. L.

Temperamenti moderati indicia.

MOderatæ temperaturæ indicia secundum totius animalis habitum, sunt, color quidē ex rubeo & albo commixtus capilli: flauis & ut plurimum medio ceteri crispis: carnositatisq; mediocritas in qualitate & quantitate. Medium namq; est exquisitè ac veluti Polycteti regula huiusmodi corpus, inter omnes excelsus: ceu ad quod ipsi & dicantur, & cognoscantur.

DE CORPORE CALIDIORE. C.LII.

Temperaturæ calidioris indicia.

QUæcumq; autē in caliditate à medio recedunt, non tamen in humiditate, vel siccitate, hæc,

quantum ad carnosum genus attinet, videntur quidē tangentibus calidiora tantum, quātum & eorum temperatura calidior. Tanto verò magis hirsuta sunt, quāto & calidiora, & minus pinguedinis habent. Colore autem rubrum, & capillos nigros sortiuntur.

SIGNA FRIGIDAE TEMPERATURAE. Cap. LIII.

Frigidioris autem temperaturæ indicia sunt, pilorum priuatio, pinguitudo, & occursans frigiditas. Color autem, vnā cum capillis rufus, & vbi frigiditas excesserit, liuidus quodammodo existit.

Temperaturæ frigidioris indicia.

SIGNA SICCAE TEMPERATURAE. Cap. LIIII.

Siccior temperatura tātō gracilior & durior est bona temperatura, quanto maior est siccitas.

Temperaturæ siccioris indicia.

SIGNA HUMIDAE TEMPERATURAE. Cap. LV.

Humidior autem temperies, carnosior atque mollior existit.

Temperaturæ humidioris indicia.

SIGNA CALIDAE ET SICCAE TEMPERATURAE. Cap. LV I.

Calidior simul & siccior, magis hirsuta, necnō calida & dura existit: itaq; pinguedine caret, tenuisque est, & capillos nigros sortitur. Si verò multū in caliditate excellat, color quoq; niger illi adest.

Temperaturæ calidæ & siccae indicia.

SIGNA CALIDAE ET HUMIDAE TEMPERATURAE. Cap. LV II.

Calidior autem & humidior temperatura, mollior & calidior, & carnosior tanto existit bonae temperie, quantum & utriusq; qualitibus aucta fuerit. Quod si plurimum augetur, cito similiter à putredinis corripitur morbis. * Si verò parum, quidem humidior sit, multo autem calidior, molliores quidem parum huiusmodi sunt, iis qui bonam habent temperiem, & magis carnosī: nō parum verò hirsutiores,

Temperaturæ calidæ & humidæ indicia.

& tangentibus etiam non parum calidiores. Nigri vero eis sunt capilli, & caro pinguedine caret. Sin autem paulo quidem calidior, multo vero humidior, mollis his caro est, & multa: colorq; miscellaneus, ex albo simul & rubeo: tangentibusq; paulo calidiores apparent. In summa autem, omnibus temperaturæ coniugationibus semper excellentis qualitatis indicia eminebunt.

SIGNA FRIGIDAE ET HUMIDAE

temperaturæ. Cap. L V. I I I.

Temperaturæ
frigide & hu-
midæ indicia.

Frigidior autem atq; humidior temperatura, si parum quidem utraq; augeatur, capillis nuda est & alba: mollisq; & crassa, & pinguis. Si vero magis excesserit, reliqua quidem sunt secundum proportionem qualitatum atctarum: color autem, una cum capillis, rufus. Queniammodum si plurimum utraq; augeat, humidus. Si vero qualitatum augmentum inæquale fuerit, eius quæ superauerit, indicia eminebunt.

SIGNA FRIGIDAE ET SICCAE

temperaturæ. Cap. L I X.

Temperaturæ
frigidae & sic-
cæ indicia.

Si autem frigiditas una cum siccitate augeatur æqualiter, natura durum, ac tenue, & glabrum corpus sic affecti fortiuntur, ac tangentibus frigidum: pinguedo tamen ipsis, & si graciles sint, per carnes dispersa inest. Capilli autem & color, frigiditatis modum, ac proportionem sequuntur. Vbi vero calida & sicca temperatura, per decrementi tempus, in frigidum & siccum labitur habitum, graciles hi tunc sunt, & duri: atq; atrabilis i eis dominatur: & ob id nigri simul, hirsutiq; erant. In uniuersum autem, si membrum facile frigesit, vel frigiditatis, vel raritatis est signum: si vero non facile, vel caliditatis, vel densitatis. Si à desiccantibus offendatur, atq; aridum & siccum, nec facile mobilè fiat, siccitatis: quemadmodum & si ab humectantibus graniter se habeat, humiditatis. Porro pauca simul & dura caro, membrum siccius efficit: multa autem & mol-

lis, humidius. Sic & intermedia spacia corporum similariū, vt plus vel minus humidæ substantiæ in se continent, vel crassius, vel tenuius, vel humidius, vel siccus membrum ostendant: humidius quidem, vbi subtilior & plurinia est humiditas: siccus verò, vbi crassior simul & minor. Ipsæ enim solidæ partes, quæ verè solidæ sunt, ac primæ, nullo modo effici humidiores possunt: intercepta autem in ipsis spacia, hac vel illa humiditate complere, possibile est. Hoc verò est proprium partium similariū alimentum, quod ex appositione fit, & non per vasa attrahitur.

Solidas partes non posse vltimo modo humidiores effici. Solidorum corporum alimentum quod sit.

SIGNA SICCI VENTRICVLI. C.LX.

Ventriculi indicia sunt, eius quidem qui natura sicciior existit, si celeriter sitibundi fiant, & paucus eis porus sufficiat: à plurimo autem aggrauetur: fluctuationibusq; infestentur, aut superfluitet id quod abundat, cibusq; delectentur siccioribus.

Ventriculi siccioris indicia.

SIGNA HUMIDIORIS

ventriculi. Cap. LXI.

Humidioris autem, si neq; sitibundi fiant, & superabundans humidum facile tolerant, & cibus humidioribus gaudeant.

Ventriculi humidioris indicia.

SIGNA CALIDI VENTRICVLI. C.LXII.

Calidior verò natura ventriculus, melius quidem concoquit, q̄ appetat: & multo magis quæcunq; sunt dura, & non facile alterationem suscipiunt. Nam quæ facile alterantur, in eo corrumpuntur: gaudentq; calidis potibus, ac cibus: nec à frigidis vllam percipit noxam, si modicè ipsis vtatur.

Ventriculi calidioris indicia.

SIGNA VENTRICVLI FRIGIDI. C.LXIII.

Frigidus natura ventriculus, ad appetendum quidem, plurimum viget: ad concoquendum autem, minimè: tales præsertim cibos, qui & frigidi sunt, & non facile alterationem suscipiunt. Cito itaq; in ipso aescunt: ac proinde acidis ructibus talis ventriculus

Ventriculi frigidi indicia.

Intemperies
morboſæ, a na-
ſuralibus inre-
perantiis, quo
diſſerant.

abundat plurimum: gaudetq; frigidis, ſed ab eorum
uſu immodico offenditur. Sic & ea quæ extrinſec' fri-
gida occurrant, nequit longiori tpe tolerare: quæadmo-
dum neq; calidus calida. Malæ verò tēperaturæ, quæ
morbi ratione ventriculum occupāt, hoc differunt ab
iis quæ naturales exiſtunt, quoniam contraria, non at-
tem ſimilia, appetunt, quemadmodum naturales.

DE SITIA CORDE ET pulmone proſecta. Cap. LXIII.

Sitis a viſceri-
bus thoracis
aborta, quō di-
ſtinguenda ab
illa quæ excita-
uit Vētriculus.

Nec verò tantum ventriculus ſitibundos, mini-
meq; ſitiētes reddit, & frigidi, calidiq; potus ap-
petētioreſ, ſed ea quoq; viſcera quæ in thorace
ſunt, vt cor, atq; pulmo. Cæterum qui ob horum ſi-
tiunt caliditatem, plus inſpirant, & longius expirant:
atq; æſtum in thorace percipiunt: non ſicuti qui ven-
triculi ratione in hypochoſdriis caliditatem patiunt.
Præterea bibentes, non ſtatim quieſcunt, & frigidus
potus magis eorum ſitim reſtinguit. Refrigerat autē
eoſdem, & frigidi aeris inſpiratio: quæ nihil illoſ iuuat,
qui ventriculi ratione ſunt ſitibundi. Sic qui contrario
modo ſe hñt, ſenſibiliter à frigida inſpiratiōe lædunt.

SIGNA PVLMONIS FRIGIDI. C. LXV.

Pulmonis fri-
gidi indicia,

Et hoc maximum ſit frigidi pulmonis indicium.
Vt enim frigidum inſpirantes, manifeſtè dolorē
ſentiunt, atq; frigiditatem, ita & caliditas eſt iſſis
amica. Sed & pituitosa excrementa tum loquentes,
tum tuſſientes reiiciunt.

SIGNA PVLMONIS SICCI. C. LXVI.

Pulmonis ſic-
cioris indicia
Vocem raucā
quæ efficiat.

Pulmonis autem ſiccitates excrementis vacant,
& pituita: vocemq; claram efficiunt: quæadmodū
humiditates obſcurā eam reddūt, ac raucam. Ec-
quum vehementius aut acutius loqui ſtuduerint, tunc
intercidunt excrementa.

N DE VOCE. Cap. LXVII.
Non tamen ipſa vocis magnitudo à caliditate, ſi-
cuti neq;

cuti neq; paruitas à frigiditate oritur, sed altera quidem, asperæ arteriæ latitudinem sequitur, & vehementiorem efflatum: paruitas verò, à contrariis procedit causis. Quare nec semper, nec primò, sed ex accidenti, & solas naturales temperaturas, non autem aduentitias, vocis magnitudo aut paruitas sequit. Quia enim talia instrumenta, temperaturæ ratione sunt facta: ad hæc autem consequitur huiuscemodi vox: ob id nimium contingit ex voce de naturali temperie rōcinari.

Vocis magnitudo & paruitas ad quæ cōsequantur.

DE LENI ET Aspera voce. C.LXVIII.

NAm lenis vox, arteriæ lenitatem cōsequitur, sicuti & aspera asperitatem. Lenitas igit arteriæ, moderatam temperiē sequitur, vt asperitas siccitatem. Asperitas quippe fit, à duri corporis inæqualitate. Arteriam verò duram, simularium partium, ex quibus cōstat, siccitas efficit: at inæqualem, dispersā in eisdem humiditatis defectus.

Vox lenis asperaq; quid consequatur.

DE VOCE ACUTA. Cap. LXIX.

Eodem modo neq; acuta naturaliter vox, sine angustia faucium, nec gravis, sine latitudine fieri potest. Angustia igitur ab insita atq; innata frigidityte nascitur. Latitudo autem à caliditate. * Porro cuiusq; facultatis virtus & vitium, à temperie ipsa, ceu à causa præcedente, exoritur.

Voci acutæ, grauiq; quæ requirantur. Virtus vitiūq; cuiuslibet facultatis a temperie ipsa exoritur.

DE HOMINE PITUITOSO.

bilem vomente. Cap. LXX.

VIdi equidem hominem, cuius totus habitus pituitam præ se ferebat: quotidie tamē biliosum euomebat humorem. Censui itaq; inspiciūda alui excrementa esse: in quibus minimè apparebat bilis. Quare coniectura quadam comprehendī, eum meatum, qui biliosum humorem egurgitat, non minimā ipsius partem ad * inuū orificiū ventriculi, quod græci pyloron vocant, effundere: vt in quibusdam animalibus cernitur. Plurimum itaq; ad eorum quæ latēt sensum

Bilem cur petuosi nonnulli assidue vomant.

cognitionem conducit, ea quæ ex sectionis inspectioe
habetur peritiam, operationūq; atq; vtilitatū inuentio.

QVOMODO COGNOSCANTVR

ægotantia corpora. Cap. LXXI.

VBi igitur iā corpora ægotant, ipsorum partes
quæ quidem subiiciuntur sensui sunt dignoscen-
dæ, ex eorum quæ insunt eis secundum naturam,
permutatione, in magnitudine, colore, figura, nume-
ro, situ, & ea quæ est secundum duritiem, mollitiem,
frigiditatem, & humiditatem differentia. Quæ autem
visum effugiunt, ex operationū lesionibus, aut iis quæ
excernuntur, aut doloribus, aut tumoribus præter na-
turam, aut horum quibusdam, vel omnibus.

DESIGNIS PATIENTIS

cerebri. Cap. LXXII.

IGitur cerebri ægras dispositiones, aut ex desipien-
tiæ speciebus, aut sensuum, aut imaginationum læ-
sionibus, aut actuum qui secundum electionem fiūt,
aut ex iis quæ excernūtur per palatum, vel nares, vel
aures, aut ex dolorum, qui ei eueniunt, differentiis, co-
gnoscere oportet.

SIGNA CORDIS PATIENTIS.

Cap. LXXIII.

QVæ verò in corde fiunt, ex difficilis anhelitus
speciebus, & tremulis motibus, qui ipsi contin-
gunt, & pulsibus quoq; eius & arteriarum,
& ex iræ excandescantis celeritate, vel tarditate, &
ex febribus, & refrigerationibus, & in colore differē-
tiis, eisq; quibus conflictatur, doloribus.

SIGNA PATIENTIS HEPATIS.

Cap. LXXIII.

QVæ in hepate fiunt, ex defectu humorum atq;
abundantia, & ad id, quod præter naturam est,
euerfione, & colore malo. Sed & ex gravita-
tibus, & tumoribus, & doloribus, non modò his qui in

Ægotantes
particulas di-
gnosendi rō.

Cerebri mor-
bi quō digno-
scendi.

Corbis morbi
vnde noscant.

Hepatis affe-
ctus vnde sint
cognoscendi.

eo ortum habent, verum & ex illis, qui consortii lege proueniunt: vt per aliquam difficilis respirationis, aut etiam tusis speciem.

SIGNA PATIENTIS

uentriculi. Cap. LXXV.

Sic & ventriculi affectus agnoscitur, vbi in concoctione, & appetitu humidi vel sicci alimenti, vel superfluitatum excretionem delinquitur. Nec secus ex singultibus, eructationibus, nauseis, vomitibus, & ipsis eorum quæ vomuntur, speciebus.

Ventriculi affectus quo pacto deprehendendi.

SIGNA PATIENTIS

thoracis. Cap. LXXVI.

Thoracis dignoscuntur affectus ex spirandi difficultatibus, tussibus, & doloribus qui in ipso fiunt: & ex eorum quæ cum tussi expuuntur, differentia. Sic & asperæ arteriæ ægritudines, spirationes difficiles, & tusses, & dolor in loco, & quæ expuuntur, & vocis offensiones ostendunt. In vniuersum autem, ex tumore, dolore, operationum læsione, & excrementorum differentia, omnium partium affectus noscuntur. Tumores igitur præter naturam, in inflammationibus, scirrhis, atque iis quæ vocantur œdemata, explorandi sunt. Dolor autem, quemcūq; obsederit locum, aut solutam cōtinitatem, aut subitam alterationem indicat. Soluitur autem continuitas incisione, excisione, fractione, & tensione. Alteratur verò substantia, à caliditate, frigidityte, humiditate, & siccitate. Tripliciter autē læditur operatio: aut quia debiliter, aut quia vitiosè, aut quia nullo fit modo. At verò quæcūq; ex cernuntur, nonnulla quidem sunt, veluti partes locorum patientium: nonnulla verò, cū excrementa. Etenim quæ in ipsis naturaliter continentur, singula propriam facient indicationem.

Thoracis affectus vnde sint dignoscendi.

Dolor quid indicet

Solui vniuersas quot modis possit.

Operatio tripliciter læditur. Excrementorum differentia.

SIGNA FVTVRAE AEGRITUDINIS.

Cap. LXXVII.

Tec il

Eorum autem indicia, quibus ægritudinis periculum imminet, mediam formam habent, inter ea quæ sanis, & ægrotantibus accidunt. Siquidem sanis omnia secundum naturam isunt: præter naturam verò ægrotantibus, quatenus ægrotant. In confinio autem horum, indicia neutrorum consistunt. Quocirca, dispositiones corporum, quæ casura in morbum videntur, sunt ex neutroque genere: simulque; etiam, quæ ipsa indicant signa. Primò siquidem hæc, sanitatē ostēdunt: secundò autem ægritudinem. Ac proinde eadē signa, secundum habitudinem, quæ ad aliquid est, neutra & insalubria dicuntur: quæ quidem præsentem dispositionem ostendunt, neutra: quæ verò futuram præmonstrant, insalubria. Eadē verò ratione, & quæcumque ægrotantibus signa salutaria apparent, dicuntur quidem salubria, quia futuram sanitatem ostēdunt: ægra autem, quatenus præsentem indicant ægritudinem. Nec in ambiguo est, quæ quæ sunt utrorumque indicativa, neutra dicantur, secundum vnum quoddam neutrius vocabuli significatum. Quum igitur eorum signorum quæ futuram ægritudinem indicant, duplex sit differentia, prius ea pertractemus, quæ quantitativis, vel qualitativis, vel temporibus, non autem propriis speciebus, ab eo quod secundum naturam, evariant: veluti ciborum appetentia intenta, vel dissoluta, vel quæ non servat consuetum tempus, aut quæ ad edulia non usitata fertur. Ad hoc etiam genus pertinent excretiones cibi superfluitatum, quæ aut pauciores, aut plures, aut humidiores, aut duriores existunt. Sic humidiorum excrementorum vel defectus, vel præter consuetudinem abundantia: aut in colore, aut in consistentia varietas, aut in excretionis tempore. Præterea vigilæ plures, somnique; aut non consueto tempore obiti. Eodem modo potus plurius, aut paucioris, calidi, aut frigidi insolens appetitus: venercorumque; immodica, aut intem-

Morbum futurum signa indicantia, ex neutrorum genere existunt.

Ægritudinem futuram indicantium signorum natura duplex

pestiua concupiscentia. Adhæc plures aut pauciores su-
dores his qui sunt opportuni, & ad motus corporis:
vel si moueri tentauerint, tarditas, exolutio ue insi-
gnis. Huc pertinet mēstruorum suppressio, vel immo-
dica, aut diminuta euacuatio. Similiter de fluxu hæ-
morrhoidum est distinguendum. Quòd si non eadem
quæ prius ex cibo potuq; voluptas capiatur, est futu-
ræ ægritudinis signum: quemadmodū hebetudo men-
tis sensuumq; minimè naturalis, aut obliuio insolita:
somnia ue turbati imaginibus. In summa verò, quæ-
cunq; secundum naturam inerant, hæc quidem supra
modum aucta: hæc verò imminuta: hæc temporibus
quibusdam, aut qualitibus, aut quantitibus immu-
tata, futuros morbos prænunciant. Porro morsus vē-
tris, vel in ore ventriculi, vel in aliquo intestino, aut
quum aliud subducitur, aut quum vomitus excitatur,
aut quum mingitur, siue alius aliquis dolor mediocris,
ex genere quidem existit eorum quæ p̄ter naturam:
non tamen qui sic se habent ærotare dicuntur: sicuti
nec qui capite grauantur, aut dolent, aut vigilāt: quū
nondum solitæ ipsorum impediuntur operationes.
Hic siquidem in huiusmodi operationibus terminus
est. Atq; ideo in eo qđ ad aliquid, eandem dispositio-
nem ægram atq; neutram dicemus. Nam pro vigore
potentiæ, quæ vel facillè sustinet, vel vincit, vnaquæq;
ex his quas antea diximus, vel morbus est, vel dispositio
neutra. Sic & quæcunq; in sensibus, non in eo quod
magis aut minus inuicē differunt, sed toto genere sunt
præter naturam, signa morborum existunt, qđiu mo-
dica fuerint, ac nondum sufficiunt hominem a consue-
tis operibus amouere. Ea autem contingunt, vbi sen-
sus ipsi, circa sensibilia propria palam hallucinantur.

S I G N A C O R P O R V M

ærotantium. Ca. LXXVIII.

Tcc. iij

Morbus futu-
ros prænnciāt
quæ, a naturæ
ordine recesserunt.

Signa salubria

Signa pernici-
osa.Excrementa
quid indicent.Decretoria ac-
cidentia.Salubriū cau-
sarum differē-
tia duplex;

AT quæ iam in ægrotantibus signa videntur, nõ-
nulla quidem salutem: nonnulla mortem porten-
dunt. Ac prima sanè, salubria: secunda verò, ge-
nere quidem ægra: secundum speciem autem, perni-
tiosa dicuntur. Sumuntur autem, ut dicamus vniuersa-
liter, ex operationum virtute ac vitiis: secundum par-
tem verò, ex particularium operationibus: quarum
genera prius diximus. Porro excrementa, quando quĩ-
dem coctionis & cruditatis signa continent, fieri non
poteest quin omnino significet, aut naturam materici,
aut materiam naturæ, aut neutrum alteri dominari.
Salubria igitur signa dicuntur, superante natura: insa-
lubria verò deuicta. Neutra autem, quæ pugnas habet
æquales. Cæterum quæ manifestam coctionem indi-
cant, ex salubribus sunt: sicuti quæ cruditatem, ægra.
Quæ verò neq; coctionem nec cruditatem, ex neu-
trorū natura existunt. Sunt verò & neutra, quæcunq;
nunc qdē hoc, nunc verò p̄trariū significant: veluti de
nigrati digiti. Ac talia sanè sunt decretoria accidentia.

DE CAUSIS SALUBRIBVS,
insalubribus atq; neutris. Ca. LXXIX.

QVoniam verò causarum hæ quidem salubres,
hæ autem insalubres, hæ deniq; neutræ: primū
de salubribus differemus. Cæterum quando
quidem nonnullæ earum conseruatrices, nonnullæ ef-
fectrices existunt: sunt q; & tempore & dignitate prio-
res conseruatrices, ab illis nobis est auspicandum. Quū
igitur non vnum tantum sit sanum corpus, sed plura,
in eorum singulis, propria erit causa conseruatricis. Siq;
dem omnis causa, in eo quod ad aliquid, est. Hic igitur
denuo sumendum initium ab optima corporis consti-
tione: & quæ illi salubria sint, considerandum. Eorum
autem inuentionem ipsius rei natura indicat.

QVOT MODIS ALTERE-
tur corpus. Cap. LXXX.

Secundum quot igitur corpus nostrū alteratur mo-
dos, tot causarum p̄seruatricium genera habebit:
quas liquet etiam correctrices existere. Alteratur
autem corpus, à nonnullis quidem, necessario: à qui-
busdam verò non necessario. Necessariò enim alterāt
quæ nulla ratione cuitari possunt: non necessariò au-
tem, reliqua. Nam aerem quidem ambientem semper
attingere, comedere, bibere, vigilare, & dormire, est
necesse: ensibus autem, & exitialibus feris occurrere,
non item. Quare iuxta primum causarum genus ver-
satur pars corporis conseruatricis: circa secundam autē
minimè. Quot igitur sint ea quæ ex necessitate corp⁹
alterant, distinguentes, proprium in singulis corū cau-
sarum salubrium genus inueniemus. Inest igitur vnū
ex ambientis aeris adhæsu. Alterum ex motu & quie-
te totius corporis & singularum particularum. Tertiū
ex somno & vigilia. Quartum, ex his quæ assumunt.
Quintum, ex iis quæ excernuntur & retinentur. Sex-
tum, ex animi affectibus. Ex his itaq; necesse est aliquo
modo affici corpus. Ab aere quidē ambiente, quia vel
calfit, vel frigeat, vel exiccatur, vel humectatur: vel se-
cundum horum patitur coniugationem: aut in tota al-
teratur substantia. Ex motu verò & quiete, quū vtrāq;
motum excesserint, aut calfactum, aut frigefactū, aut
humectum, aut exiccatum, vel aliquid secundum ho-
rum patiens coniugationem. Sic & ex somno & vigi-
lia ipsū pati est necesse, iuxta eandem rationem. Præ-
terea & ex animi affectibus, & ex iis quæ assumuntur,
aut excernuntur, aut retinentur. Hæc siquidē omnia,
partim quidem euidenter, partim verò per alias cau-
sas medias, alterant corpus, & sanitatem corrumpūt.
Omnia igitur nunc dicta genera, materiæ quædā sunt
salubrium causarum. At vsu opportuno adhibito, cau-
sæ fiunt conseruatrices, atq; salubres: si verò à modo
aberrauerint, redduntur insalubres. Quo circa, singu-

Cōseruatrices
cæ quæ sunt.

Corpus neces-
sario alterāta;
q̄ sint, & quot
numero.

Aer cur nos a-
ficiat.

Motus.
Quies.

Somnus.
Vigilia.
Animi affect⁹.

Salubriū cau-
sarum materiæ
quæ sunt.

Intentiones cir
ca salubre in
salubreque sunt
qualitas exi
genderum &
quãtitas.
Occasio tps.

Mediocrutatis
termini in iis
quibus vti cor
pus debet.

Natura opti
ma, quantum
appetit tantũ
concoquit.

læ earum rerum, quandoque salubres, quandoque insalu
bres sunt: quum ad aliquid referantur. Quippe vbi mo
tum corpus desyderat, exercitatio quidem salubris:
otium verò insalubre existit. Quum verò eget quiete,
otium salubre est: insalubris autem exercitatio. Eodem
modo de cibus & potibus, ac de aliis omnibus statuendu
m. Horum namque singula, quando vt necessitas cor
poris exigit, cū mensura, & opportuna qualitate adhi
bentur, salubria fiunt. At quum citra omnem neces
sitatē, ac præter modum afferuntur, insalubria. Atque
hæ duæ sunt circa salubre & insalubre intentiones: rei
scilicet, quæ adhibetur, qualitas, & quantitas. Non est
autem rationi consonum, etiam temporis occasiōē,
quæ in iis quæ dicta sunt, continetur, veluti tertium ali
quod ab eisdem diuersum, introducere. Nam si tanta
& tali re allata egeat corpus, nemini dubium est, quin
etiam in tempore opportuno afferatur. Siquidem idē
temporis occasio est nata, quæ fluxile & transmutabile
mortale corpus quum sit, pro modo transmutationis,
alia alio tempore auxilia postulet. Optimæ igitur cor
poris constitutioni, quum circumfusus aer optimè tem
peratus fuerit, omnium earum rerum, de quibus nu
per sermonē fecimus, quantitas moderata conueniet.
Quum verò aer à temperie recesserit, tantũ illas à me
diocritate euariare oportet, quātus fuerit aeris ab opti
ma temperatura recessus. Hiverò mediocritatis termi
ni existunt: in aere quidem ambiente, vt neque horreat
propter frigus: nec sudet propter æstum. In exercitiis
autem, quum primum lassari cœperit corpus, confe
stim quiescere. At in cibus, coctiōis perfectio, & excre
mentoꝝ modus, in quanto & quali conueniens. Aequa
lis verò in his quodammodo est coctiōi appetitus.
Optima quippe natura, quātum appetit, tantum etiā con
coquit. Sic & somno modum ipsa natura præfinit his,
qui optimam corporis constitutionem sortiuntur: nã

ut tunc à somno excitantur, quum corpus ampliori qe-
te non eget. Quinq; talem victus rationem adhibue-
rint, nullum est in eorum excrementis delictum, quæ
vel per ventrem, vel vrinæ meatum, vel per totū cor-
pus vacuantur. Liqueat igitur ipsos cauere debere ab i-
modicis animi affectibus: ab iracundia videlicet, tristi-
tia, furore, timore, & inuidia. Hæc siquidem alterant,
atq; à naturali statu corpus immutant.

DE VENEREIS. Cap. LXXXI.

Venereorum verò iuxta Epicuri sententiam, nul-
lus est vsus salubris. Re vera autem confert, si tã-
tum interualli in eorum vsu adhibeatur, vt nec
resolutio aliqua percipiatur, & ipse seipso homo, quo-
dammodo leuior factus, ac melius spirare videatur.

Venus quate-
n' sit salubris.

Tempus autem ad vtendum opportunum, quum in
omnium rerum circumstantium exquisita mediocrita-
te corpus fuerit cõstitutum: vbi scilicet, nec supra mo-
dum plenum, nec vacuum extiterit: aut in calore, aut
frigore, aut siccitate, aut humiditate excesserit. Quod
si aberrare contigerit, paruus sit error. Melius autem
illi calefacto magis q̃ frigefacto, & pleno q̃ vacuo, &
humecto potius corpore, quàm exiccato, vt vene-
reis. Horum autem singulorum quæ dicta sunt, quali-
tas, in * optima corporis constitutione est eligenda:
exercitii quidem, in quo totius corporis partes, æqua
proportionē mouentur ita, vt non aliæ quidem vltra
modum fatigentur: aliæ verò citra. Cibi autem & po-
tus optimam habeāt temperiem. Eadem in reliquis et̃
est ratio habenda. At si ab optima constitutione aliqd̃
defecerit corpus, non autem vehementer, & hæ quæ
ipsius sanitatem conseruant causæ, ad proportionem
mutabuntur. Sed quum multa sint huiuscemodi cor-
pora, per singula genera est seorsum dicendum. Quod
igitur in partium simularium temperie euariet, instru-
mentariarum autem partium seruat commensuratio-

Veneris tps
aptū quod sit.

Optime cõstl-
tutē naturę oīa
requiri medio-
cra.

nem, duplicem habet salubrium causarum formam : alteram quidem, earum quæ ipsius conseruant temperiem: alteram verò, earum quæ ad optimam transeunt. Quæ itaq; ipsius temperaturam conseruant, tantum à causis optime temperatæ naturæ distabunt, quæ & totius corporis temperatura ab illa euariabit. Calidiora siquidem corpora, calidiorem victus rationem postulant: frigidiora autem frigidior: sicciora siccior: & humidiora humidior. At secundum coniugationem, calidiora & sicciora, calidiorem simul atq; siccior: eadem in reliquis quoq; coniugationibus proportionem seruata. Rectè siquidem causarum vtetur materia, qui naturales earum potentias agnouerit: videlicet, quæ motus, alimenti penuria, vigiliæ, excretio, & omnes animi affectus, corpus exiccant: at quæ hisce contraria existunt, humectant. Ita verò, & calfacientia, & refrigerantia vitæ instituta, & ciborum, ac potuum, vtq; simpliciter dicam, omnium quæ corpori afferuntur, materias quis noscens, atq; potentias, salubribus vtetur causis, similia similibus adhibendo, si quidem eandem in qua acceperit, seruare corporis temperiem sit animus. Quod si permutare, atq; ad melius eam traducere studeat, alterum est hic salubrium causarum genus, his quidem quas nuper diximus, contrarium: æqualiter verò declinans ad alteram partem à bene temperatis & mediis, quæ optimis naturis conueniunt. Calidior siquidem & siccior temperatura, à calidioris ac siccioris victus ratione, ad exactissimum bonæ temperaturæ habitum non transfertur. At taliū erit vsus necessarius, quæ tantum eis quæ probè temperata existunt, frigidiora atq; humidiora sint, quantum & natura naturam, in caliditate & siccitate superabat. Nam tale causarum genus insitas corrigit intemperantias. Alterum verò de quo supra diximus, temperaturam conseruat. Est autem vtriusq; vicissim apud medicos vsus

Exiccantia corpus quæ sint.

Similia similibus eē adhibenda dum seruare corporis temperamenta est animus.

necessarius. Nam quum plurimum suppetit otii, corrigere oportet, ac sensum ad meliora transferre. Neque enim natura patitur repentinās alterationes. Hominē autem occupationibus necessariis districtum, in eodē præstat habitu conseruare. Porro quæ similem habet in omnibus corporis partibus intemperiem, eadem egent procuratione: dissimili, quæ dissimilem.

*Intemperantiæ
quā ad melius
sint traducēde
& quando sic
conseruandæ.*

DE CAUSIS SALUBRIBVS partium instrumentalium. Cap. LXXXII.

Instrumentariarum autem partium causæ salubres, quatenus & hīc ab optima constitutione delinquit, ita & inuicem distabunt. Aliæ namque sunt salubres erroribus qui in formatione consistūt: aliæ iis qui in magnitudine, vel numero, vel positu. In formatione igitur plures contingunt errores: nam & figura partis, & si qua in ea cauitas est secundum naturam, vel meatus, vel orificium, vel asperitas, vel lenitas, si quidem parū à naturali symmetria recesserint, salubrium corporū retinent appellationem: si verò amplius, insalubrium. Quod si tantus fuerit recessus, ut operatiōi afferat detrimentum, iam ægrotare dicentur: Secundum quantitatem autem, excessus atque defectus ad easdem ducit differentias. In numero verò, siue vna, siue plures, quæcūque ex similaribus partibus fuerint, aut deficiāt, aut superabundēt. Ex hoc genere etiam sunt, quæcūque in nobis substantiæ præter naturam consistunt. Reliquum est aliud genus, quod ad situm cuiuslibet simplicis attinet partis: in quo & ipso quatuor sunt omnes differentiæ. Prima quidem, quæ optima existit. Secūda, quæ parum euariat, ob idque salubre adhuc efficit corpus. Tertia quæ insalubre, quando amplius à modo recesserit. Quarta quæ iam ægrum recessu plurimo reddit. Quæcūque igitur partes in figura delinquant, veluti quæ blæxæ, varæ, & obliquæ appellantur, hæc quum foetus nuper natus atque tenellus est, formatione & li-

Errores in formatione, quotupliciter consistere possint.

gatura, ad naturalem habitum traducuntur. At si iam aucto infante, ad duritiem peruenerint, emendari nō possunt. Sic errores quidem qui ad cavitatem attinēt, quum adhuc augeri perseuerant, correctionem admittunt. Quum autem iam ad vltimum peruenerint, nullus est remedio locus. Cavitates igitur quiete atq; alligatione paruæ reddunt: magnæ verò in partiū opatiōe & retētiōe spiritus. Sic & quæcūq; foramina, oraq; . Et qdem, quæ naturalem magnitudinē partes exuperāt, quiete, ac commoda ligatione, minores redduntur: augentur autem, & naturali motu, & frictione moderata, & quibuscūq; aliis plus sanguinis conciliare valentibus. Deficientes autem partes, quæcūq; ex sanguine duxerunt originem, corrigi quidem non est impossibile. Quæ verò ex semine, propemodum impossibile existit. Licet tamen aliquando loco earum alias facere, quæ vsum haud dissimilem præstent. Earum verò omnium natura opifex ē. Medicus autem minister. Porrò quæ numero excedunt, iis ablatio, causa salubris existit. Inspicere verò oportet, in quibus id fieri possit. Nam si impossibile appareat, transponere tantandum est. Eadem est & eorum, quæ in situ vitia sunt, emendatio. Nec verò in ambiguo est, quod duo sæpius aut tria vitia, eandem præsentem partem comprehendere. Reliquum est id morbi genus, quod similaribus & instrumentalibus partibus existit commune, vnitatis diuortium.

DE CAUSIS SALVBRIBVS

ceu ad eos, qui morbo tenentur. Ca. LXXXIII.

Salubrium causarum, aliæ quidem occurrunt * in temperiei iam genitæ: aliæ illi quæ in generatione consistit: aliæ illi, quæ futura est. Igitur harum quæ sunt postremæ, hæ quidem in præseruatiua artis parte continentur: hæ verò in salubri. Primæ autē illæ inter omnes, in curatiua tantummodo. At illæ quas inter vtrasq; collocauimus, in præseruatiua simul & curati-

Partes ex sanguine cretas, posse corrigi si deficient: ex semine autē ortas vt instaurētur esse fere impossibile. Naturam esse opificem generationis particularum, Medicus naturæ minister.

na. Si quidem factam iam ægritudinem, curare oportet: eam verò quæ nondum adest, sed futura est, prohibere ne fiat, ab ea quæ est in corpore dispositione. Eius autem quæ adhuc fit, quod quidem factum est, curare expedit: quod verò futurum, prohibere ne fiat. Prohibetur autem, sublata ea dispositione, * quam sequi morbus natura est aptus. Talis etenim dispositio, causa antecedens dicitur. At facta iam ægritudo curabit, soluta ea dispositione, à qua primùm læditur naturalis functio. Quam sanè ipsam dispositionem, morbi causam vocamus.

DE COMMVNISSIMA INTENTIONE curatiua. Cap. LXXXIII.

Curatio verò vnum præcipuum cõmunissimũq; habet scopum, nempe tollendæ dispositioni contrarium. Ex hoc siquidem genere sunt causæ illæ omnes, quæ sanitatem efficiunt. Particulatim verò, ex vnicuiq; dispositioni contrariis. Calido igitur affectui, causa frigida contraria existit: frigido autem calida: eademq; in cæteris proportionem. Etenim si omne immoderatum præter naturam est: moderatum verò secundum naturam: necesse est omnino, vt immoderatum ab immoderato cõtrario, ad mediocritatem trahatur. Cæterum secundum potetiam, non secundum imaginationem, calfaciens refrigeransq;, & alia id genus, sunt accipienda. Fingamus itaq; in humoribus putrescentibus febrem accedi. Indicatio in huiuscemodi affectu, est euacuatio simul & alteratio: hæc quidem, quæ putredinem finiat, nãtente adhuc substantia: euacuatio verò, quæ totam ex corpore substantiam putrem educat. Sed dicta quidem alterationis species cõcoctio existit. Euacuationes autem fiunt, & per sanguinis emissionem, & clysteris vsum, & per vrinæ vias, atq; eam, quæ per cutim fit, transpirationem: ac præterea, per eam quæ fit ad partes oppositas attractionem,

Curationis scopus.

Immoderatum omne est præter naturam.

Febris putridæ indicatio duplex.

Alteratio putrum humorum concoctio est. Euacuationis species.

atq; ad alias propinquas deriuationem. Nam & ad hoc ipsum genus pertinet citare menstrua, hæmorrhoidesq; aperire, ac deniq; expurgare per palatum & nares. In vniuersum autem, si vnâquaq; prius effectricem causam resciderimus: dein verò ad illam quæ ab eadē causa facta est, ægritudinem accefferimus, causarum salubrium inuentionem habebimus. At secūdum compositiones intemperies, ex simplicibus compositio, cōmonstrabit salubria præcepta. Etenim si decem quidē gradibus ad caliditatem maiorem ea quæ naturæ conueniat, labatur corpus: septem verò ad siccitatem maiorem: tunc salubrem causam in huiuscemodi affectibus esse oportebit, decem quidem gradibus frigidiorē: septem verò humidiorē. Quòd si particula affecta in penitioribus locis sit sita, machinari oportet insuper tale remedium salubre, cuius vis nequaquā in itinere antea exoluatur. Si itaq; calidius esse oportuerit eo quod est moderatum, non solum tantam habeat caliditatem; quāta exigit morbus, sed vltra eandē mensuram, tantum adiiciatur, quantum ex situ, vt pertingere possit ad locum patientem, sit necessarium. Si verò frigidius, non simpliciter tantum frigiditatem oportet augere, sed & materia quoq; prius animaduertēda est. Si enim crassa sit, non admodum poterit penetrare ad profunda. Sed potius contrarium præstabit effectum, spissando superficiem, atq; densando. At si tenuioribus partibus cōstet, poterit sanè plurimum subire profundum. Idem in humectantibus atq; exiccantibus accidit: in quibus crassitudo & subtilitas partium substantiæ inspicunda venit. A situ itaq; loci, inuenit indicatio salubre remedium. A formatione autem, & situ simul, quando effluxus sensibiles, atq; ad alium locum foraminibus patentes habuerint, aut his omnino caruerint. Quos enim effluxus ad principales efferri partes cognouerimus auertemus, atq; ad illas impellemus, quæ

Affectus in alto sitos, vehementiorē medicamentivim requirere, quā ex sua ipsi natura possulent.

Auertendos effluxus esse a partibus principalibus, ad ignobiliores;

minimè principatum obtinent. Porro causarum quæ intemperaturam efficiunt, curatio fit per euacuationem. Nam ipsæ intemperaturæ, sola alteratione sanantur.

C U R A T I O S O L V T I O N I S

continui in parte carnosa. Cap. LXXXV.

Continuitatis autem solutionis curatio, intentionem quidem habet vnionem, quæ in partibus quædam instrumentariis impossibilis est: in similaribus verò, non semper possibilis. Quandoque verò, sicuti in carnosiss, sanitas conglutinatione perficitur. Ipsam verò antecedit si vulnus maius extiterit, partium applicatio distantium, quæ ex formationis genere existit.

Vt autem hæc ipsa firma & stabilis fiat, alligatio coe gens in vnum, & fibulæ, & futuræ, viles sunt. Coalescere autem facit ea quæ distant inuicem, ac pristinam restituit, vnionem, ipsa natura. Nostrum verò opus est primò quidem applicare extrema distantium partium. Secundo autem, quæ in vnum coacta sunt, sic conseruare. At tertio, cauere, ne quid labris intercedat vlceris. Quarto denique, ipsam partis substantiam conseruare salubrem, id quod per mediocriter exiccantia fiet. Hæc igitur est solutæ cõtinuitatis curatio: quum ipsa sola seorsum in carnosa parte consistit.

D E S O L V T I O N E C O N T I

nuitatis in osse. Cap. LXXXVI.

Actio fractio est in osse continuitatis diuortium: quod quidem quātum ad intentionem primam, insanabile est: quo verò ad secundam, quodammodo recipit curationem. Prima igitur intentio est coalitus partium, qui ob ossis duritiem fieri non potest. Secunda, alligatio, quæ fit, callo supernato partes fractas circumligante. Calli autem generatio, qua quidē ex materia, & à natura fit, est & ad alia communis. Quatenus verò formam ossi vicinam habet, ex eiusdem fit alimento. Molle verò & puerile os, coalescere

Vnio I partib⁹ instrumentariis solutis est impossibilis.

Vnionem carnis solutæ, q præcedant.

Vnionem præstat natura.

Solutę partis substantiã conseruare medio criter exiccantia.

Fractura quod pertinet ad intentionem primam est incurabilis.

Calli gñatio.

Ossa puerilia coalescere posse.

Fractio offe si-
mul affici mu-
sculos.

potest: sed perrarò fit talis affectus, quin associetur al-
teri. Magna enim ex parte adiacentes muscoli, vnà cū
corporibus aliis, per fracturam ossium patiūtur. Quo
circa & curationis intentio oritur duplex: quarum al-
tera quidem, circa ossa: altera verò, circa corpora ad-
iacentia versatur. Quum igitur fracturæ sanitas, callo
adueniēte fiat: ad huius autem generationem, proprii
ossis alimenti superfluitatem naturæ suggerere oport-
eat, quæ quidem superfluitas in qualitate & quantita-
te debet modum seruare: talis certè victus ratio adhi-
benda est, quæ influxurum ossibus sanguinem tantum
ac talem præparet, qualis & quantus generando cal-
lo sit opportunus.

Fracturæ sani-
tas fit callo ad-
ueniente.

Fracturæ qua-
lis victus ratio
conueniat.

DE PUNCTURA NERVI, & tendonis. Cap. LXXXVII.

Punctura nervi,
cur ad excitā-
dā cōuulsionē
sit prompta.

Nervi verò & tendonis punctura propter sensus
vehementiam, & quoniam hæc pars principio
continuatur, prompta est ad excitandam cōuul-
sionem neruorum: ac tum præsertim, quum nil ex-
trorsum expirat: obcœcato cutis vulnere. Aperiendū
est igitur, atq; exiccandum substantia tenui, quæ vsq;
ad ima nervi oblaxi possit descendere. In simplicibus
igitur huiusmodi affectib⁹, salubrium causarum for-
ma talis existit. In compositis verò complicatur vlce-
ribus: prima quidem cavitās: quæ non differentia vlce-
ris, sed est alterius ægritudinis genus, in quo facta est
substantiæ iactura. Curatio autem in morbo dupli-
ci, duplicem exigit intentionem. Nam continuitatis so-
lucio, vnitate: substantiæ autem iactura, generatione
indiget. Quòd aut primo quidem hunc affectum oport-
eat sanare, ac dein vnitatem restituere tētare, ipsa na-
tura rerum nos docet. Vbi verò repletum vlcus iam
fuerit, ad æqualitatemq; perductum, cute inducendū
est: id quod si fieri non possit, saltem carne, quæ cuti vi-
cina sit, communiēdum. Est autem huiusmodi, quæ
& sicca

Puncturæ cura-
tio.

Cui curatio
vulceris.

& sicca, & calli similitudinem præ se fert. Ad cicatricē igitur inducendam, necessaria exiccantia erunt, ac sine mordacitate astringentia medicamēta. Sic & si fordities aliqua fuerit adnata, intentio abstergerendi erit. Præterea si inflāmatio aliqua, vel attritio, vel scirr⁹, vel tumor mollis & laxus, vel intemperies vnā cum vlcere adsint, prius quidem eorum curationi insistendum est, ac dein ipsum vlcus curandum.

Cicatrici inducendæ, siccantia desiderari

Vlceri si adsit tumor hic prius curandus est, quæ succurram⁹ illi;

DE SPECIEBUS MORBORVM

qui iuxta formationem cōtingunt. C.LXXXVIII.

QUod verò ad figuræ permutationem pertinet, in iis sanè qui adhuc crescunt, possibile est plurimarum partium peruersionem corrigere: In eis autem, qui iam sunt aucti, minimè. * Scopus igitur in iis quæ curationem recipiunt, est in contrarium peruersionis adducere. Si verò fractione aliqua non rectè cōformata, alicuius membri figura vitiata fuerit, cui substantia callosa innasce præuenerit, si quidē hæc adhuc recens extiterit, perfringere os compactum, oportet, ac rursus rectè afformare. Deinde callum superinducere.

Peruerti membri curatio.

DE OBSTRUCTIONE. Cap.LXXXIX.

Est verò & obstructio ex eodem morborum genere fitq; ex crassis, & lentis humorib⁹: vnū & ipsa scopum habens morbo perarum, videlicet apertionem. Causæ autem salubres sunt abstergentia & incidentia medicamēta. Quæ verò fit ab stercore duro, intersepiente intestinum, obstructio, primū quidem habebit duritiei remedium, ex humidis pinguibusq; clysteribus. Postea dāmum ab acribus euacuationem exposcet. Quæ autem à lapide fit in vesica, subitò quidem, illius transpositionem requirit: integræ verò sanitatis gratia, incisionem, & extractionem. At humiditatis quæ præter naturam cōtinetur sanatio, in * exacta totius euacuatione consistit: quemadmodum etiā

Obstructionis curatio.

Lapidis in vesica curatio.

*Pectoris ex-
crementa edu-
ci cum tussi a
medicamentis
tenuantibus.*

*Diuretica qua
lia esse debeant*

*Cauticis in q
bus utendum
medicamentis.*

*De asperitate et læ-
uitate.*

Cap. XL.

*De asperitate et læ-
uitate.*

Cap. XL.

*De asperitate et læ-
uitate.*

Cap. XL.

*De asperitate et læ-
uitate.*

Cap. XL.

*De asperitate et læ-
uitate.*

Cap. XL.

*De asperitate et læ-
uitate.*

Cap. XL.

*De asperitate et læ-
uitate.*

Cap. XL.

*De asperitate et læ-
uitate.*

Cap. XL.

*De asperitate et læ-
uitate.*

Cap. XL.

*De asperitate et læ-
uitate.*

Cap. XL.

*De asperitate et læ-
uitate.*

Cap. XL.

*De asperitate et læ-
uitate.*

Cap. XL.

*De asperitate et læ-
uitate.*

Cap. XL.

*De asperitate et læ-
uitate.*

Cap. XL.

*De asperitate et læ-
uitate.*

Cap. XL.

*De asperitate et læ-
uitate.*

in suppuratis. Immodica autem repletio, immodica
evacuacione curatur. Quæcūq; igitur in pulmone vel
pectore continentur, * educuntur quidem per tussim,
sed à medicaminibus extenuantibus. Quæcūq; verò
in hepate, vel venis, vel arteriis, vel renibus, aut p
vri-
nam, aut per * inferiorem ventrem. Sed per urinam
quidem, ab iis quæ vehemēter extenuant: per ventrē
verò, ab eis quæ attrahendi, aut aperiendi ora vim ha-
bent. Quæcūq; in superiori ventre comprehendun-
tur, per vomitum: sicuti quæ in inferiori, per subductio-
nem. At quæcūq; sub cute, per sectionē, vel ignem,
vel adurentia medicamenta. Sic aliquando etiā, quæ-
cūq; in aliqua naturali cavitare, vt in thorace. Vt au-
tem summam dicam, quicquid præter naturā in ali-
quibus partibus continetur, eius sanationis intentio,
est ablatio: vel si fieri hæc nō possit, transpositio. Quæ
verò non sunt ex genere præter naturam, at quantita-
te damnantur, in his scopus detractio existit. At inuen-
tio eorum, quæ ad ipsorum sanationē perducunt, par-
tini quidem ex affectu, plurimum verò ex ipsis affectis
particulis sumitur.

DE ASPERITATE ET LÆA UITATE. Cap. XL.

Quæcūq; verò partes, q̄ exasperatæ sint, natu-
ralem amiserint habitum, iis læuitas naturalis
restituenda est: ossa quidem læuigando: aspe-
ram verò arteriam, vel linguā leniendo, humidis quæ
nihil mordeant, atq; lentorē habeant. At quibuscūq;
læuitas inest non naturalis, cognata asperitas, reuocan-
da est medicaminibus quæ sufficienter abstergant,
astringantq; parum. Quæcūq; verò vel obstructio-
nes, vel angustie meatuum, alios morbos sequun-
tur, eorum curatio prius est perficienda. Quod
si nonnulla ex proximè dictis innicem complicantur,
varias habebunt indicationes. Si igitur in particulam

*Aspera quibus
sint læuiganda.*

*Læuia quibus
exasperanda.*

aliquam tanta sanguinis copia confluerit, vt vniuersæ ipsius venæ intumescant, & distendantur, nō nihilq; in spatia vacua & intermedia transfundant, huius quidem affectus sanatio scopum habebit euacuationem: aut, vt apertiori vtamur vocabulo, detractiōe: quandoquidem morbus est immodica partis repletio. Itaq; necessarium est, vt superfluitas vacuetur, aut retrocedens, aut per ipsam patiētem particulam. Retrocedet autem, vel impulsa, vel attracta, vel trāsmissa, vel vno aliquo horum modorum, vel omnibus. Per locum verò patientem vacuabitur, partim quidem manifestè, sensibiliterq;: partim verò resoluta in vapores. Si igit vniuersum corpus plus æquo plenum fuerit, per patiētem locum minimè vacuare expedit. Nam si scarificationibus, aut sectionibus, sensibiliter aliquid euacuemus, plus ratione excitati doloris attrahemus in partem. Si verò calfacientibus conemur discutere, maior copia caloris ui ad partem trahetur, q̄ dispergatur. Quòd si hac in re laboremus, vt retrocedat id quod in fluxit, corpus quum plenum sit, non admittet. Vt igitur fieri hæc ambo possint, in primis euacuare vniuersum corpus oportet: dein autem id quod in partem in fluxit, ad contraria loca retrahere. Quod quidem vbi fecerimus, prius repellemus à parte, q̄ aggrediamur discutere. At quo mitiora præsidia fuerint, eo erit longè aptior vacuatio. A patiēte verò loco repellemus astringendo, atq; refrigerando. Quinetiam loca inanita attrahunt ad seipsa quæcunq; percipiuntur. Vasa præterea, ui medicaminum astringentium corroborata, à se ad alia reuoluunt. Si igitur superfluum omne hac via retrocesserit, bene se res habet. Si verò aliquid fuerit retentum in parte, id lētum & crassum esse, ob idq; ægrè solubile, conicere oportet. Potest etiā, vel si influens humor non sit eiusmodi, effusus tamen esse ad intermedia spatia. Quo tpe euacuandus est per ipsam

Vacuatiōem per partem lēsam non esse moliendā, vniuerso corpore pleno existēte.

Inflammatæ partis curatio, vbi vniuersum corpus est plenum.

Repercussione fieri per astringentia & refrigerantia.

locum affectum: imponentibus nobis particulis super
 iacentibus ea, quæ repellendi humiorem vim habeant.
 Maximè vero euacuabis quod in spatiis iis deliquescit,
 & scarificationum auxilio, & medicaminū quæ discu-
 tiendi vim habeant. At quia discutientia omnia vires
 calidas habent, effectus autem huius temperaturæ, est
 mordere, vbi caliditatis modum exceſſerint: cauenda
 ex eis sunt vehementissimè calida: ac tum præsertim,
 quum patiens locus in superficie cōsisterit. Neq; enim
 paruus excitabitur dolor, si præter proprium affectū,
 in super mordeatur. Taceo etiam dolorem omnem ir-
 ritare fluxiones. Quod igitur mediocrem caliditatem
 obtinet, in hisce dolorem sedat: ac multo magis si hu-
 midum fuerit. Et quidem quicquid per summa hæret,
 potens est id medicamen digerere, * etiam si validas
 non sortiatur ad discutiendum vires. Quòd si summæ
 quidem partes oī noxa caruerint, id verò qđ euacua-
 ri oportet, in penitioribus partibus hæreat, intenden-
 dus atq; augendus discutientis medicamenti est calor:
 quum dubitandum sit, ne prius q̄ profundas partes at-
 tigerit, interim vires amittat. Nec tamè ex eo superio-
 res partes aliquem dolorem sentient, quum omnes va-
 cent affectu. Quare duo hæc simul inuitant ad calidior
 pariter atq; acrium medicaminum vsum, & summæ
 partes quæ tolerant: & profundæ, quæ egent. Hæc igit
 indicationem, à situ partis desumebamus. Porro affe-
 ctuum partium, in quibus retinetur supfluitas fluctio-
 nis, nonnullæ quidem raræ, laxæ, & molles natura exi-
 stunt: nonnullæ autem densæ, pressæ, ac duræ. Priores
 igitur, euacuantur facilè: reliquæ autem, medicamen-
 tis acrius vacuantibus, ac præterea tenuiores par-
 tes habentibus, egent: atque eo magis, quo profun-
 diorem situm habuerint. Hæc igitur tibi rursus sit in-
 dicatio, vna quidem à particulæ patientis substantia:
 altera verò à formatiōe & situ. Fingamus enim in he

Discutientium
 quæ vehemen-
 tissime calida
 sint in quibus
 sit vltus cau-
 dus.

Dolor omnis
 fluxiones exci-
 tat.

Discutientium
 calorem inten-
 dendum esse,
 vbi humor va-
 cuandus in pe-
 nitioribus par-
 tibus hæret.

Partiū quæ nō
 vacuētur faci-
 le & quæ acio-
 ra medicamen-
 ta desyderent.

pate eē proximē dictū affectū, in angustis valorū finib⁹, impactis humoribus, qui vel lenti & tenaces, vel crassi existant: vel superabundent. Nonne in promptu est, primum quidem crassitiem vnā cum lentore & tenacitate, cibis ac potibus extenuantibus, ad subtiliorum partium substantiam transferri oportere? Secūdo autem, non per angustos tantū, inuisibilesq; meatus, sed per latiores etiam, quicquid inibi infectum est, euacuandum esse? Sunt enim in hepate venæ, non minus amplitudine, q̃ numero, īsignes. Terminantur aut, hæ quidē, in gibbis, ad venā cauam: hæ verò in cauis, ad portam. Vnde haud difficile tibi futurum est, vbiq; pressi constipatiq; humores fuerint, eosdem expedite euacuare: trahendo quidem ad ventrem, cuius his quæ attrahendi vim habent medicaminibus, quicunq; ex ipsis, in venis ad caua hepatis pertinentibus aceruati sunt: ad vrinæ verò meatus promouendo, per cauam venam, quicunq; in venis ad eam p̃tinentibus herent. Est & alia indicatio ab hepate sumpta, veluti à venæ principio. Nam quum non tantū seipsum regere natura sit aptum, sed largiatur etiam virtutem venis, yrendum est, ne si eius vigor fomentis & cataplasmatibus relaxātibus exolutus fuerit, & ipsum primum ad proprium opus, & omnes subinde venæ, ratione illius, imbecilles reddantur. Quare in curationibus eius aliqua ex astringentibus medicamētis semper miscere oportet. Sed quoniam in profundo admodum loco situm est, dubitandum erit, ne astringentis medicaminis vis, debilitetur, nisi ab aliqua altera subtilium partium substantia, qualis aromatum est, traducatur. Melius verò fuerit, si & ipsum medicamē astringens, etiam aromaticum fuerit. Nam si duas habuerit natura insitas qualitates ac potestates, valentius operabitur: ita vt euacuet quidem quod præter naturam in ipsum membrū confluxit: seruet autem humorum modum conueniē-

Heparis ob-
strucri cura-
tio.

Heparis causa,
& gibba, qua
parte vacuan-
da sint.

Hepar vena-
rum p̃ncipiū.

Hepaticis me-
dicamētis cur
aliqua ex astrī-
gētibus admi-
scenda sint, &
quæ aromatis
vim obtineat.

Intemperies ef-
se per contra-
ria curandas.

tem naturæ. Explorandum itaq; est, num quid ab hu-
moris confluentis qualitate, temperies eiusdem mem-
bri sit alterata: vt hanc ipsam curantes intemperiem,
sanitatem parti restituamus. Curabimus autem, con-
trariam ex aduerso afferentes qualitatem: quantum
vnumquodq; calidius aut frigidius redditum est, tan-
tum refrigerantes, aut calfacientes. Quare & hic rur-
sus agnoscenda est ipsius secundum naturâ tēperies.

DE MORBO SECUNDVM

numerum.

Cap. XCI.

Redundantes
partes refecari
sibi posse.

Quibus autem aliqua particula deficit, in iis qui-
dem, scopus est, efficere alteram, subministran-
do naturæ, eo quo diximus modo. Quibus
autem redundat, hanc refecare oportet, aut scalpello,
aut igne, aut caustico medicamine. Hæc igitur omnia
sanare * fermè possibile est: At generari, non omnia
possunt. Quædã verò sunt, quæ & si generari nequeant,
pro ipsis tamen licet alterum substituere: quemadmo-
dum osse ex toto sublato, carnosum quendam callum
inducimus: qui processu temporis duriores naturam
contrahit, quum ab initio carnis imitaretur substan-
tiam. Vbi verò parte quacumq; sublata, neq; eandem
secundum speciem substantiam, neq; similem efficere
possumus, tertius nobis scopus est, inuenire decorem
quendam quemadmodum in mutilationibus.

Motilis mem-
bris arte conci-
liandum esse
decorem.

DE MORBO SECUNDVM

magnitudinem.

Cap. XCII.

Communicat autem hoc genus totum, cum eo
quod ad magnitudinem pertinet. Nā quodcumq;
ex eo est secundum naturam, illi propinquū exi-
stit. Id verò tantum seiunctum est, quod inter minimè
naturalia connumeratur. In quo quidem prima inten-
tio est ablatio. Secunda verò, si illa sit impossibilis, trā-
spositio: quemadmodum in suffusionibus. Quæcumq;
autem non integris partibus, sed earum tantum parti

culis, aut deficiunt, aut excedunt naturæ modum, reſectio quidem, vel generatio, in iis quæ deficiunt: ablatio, verò & abolitio, in his quæ ſuperabundant, ſcopus eſt, Quare neq; in iſſis altera intentio, neq; medicaminum forma eſt diuerſa.

DE MORBO SECVNDVM ſitum. Cap. XCIII.

Sed iam veniendum eſt ad reliquum ſalubrium cauſarum genus, quod ea corpora emendat, quæ in ſitu ſunt vitata: veluti luxationes, & in ſeroto inteſtino. Quæ ſanè vitia contingunt, partim ex violenta tenſione atq; impulſu: partim ex dilatato continente, vel rupto. Quare modus etiam curationis eſt duplex: alter quidem ad oppoſitam partem ei * ad quam facta eſt permutatio, intendendo, & pellendo: alter verò, id quod continet, firmitus ſolidiusq; reddendo.

Luxationum
cauſa & cura
tio.

DE CAVſIS PRÆSERVATIVIS: Cap. XCIII.

Porrò eorum quæ præſervatiua dicuntur, triplex ſecundum genus differentia exiſtit. Prima quidè, hominis qui integra fruitur ſanitate. Secunda verò, eius qui non integrè valet. Tertia deniq; eius qui iam ægrotat. Primum igitur genus, ad ſalubrem artem ſpectat: in duasq; partes diuiditur. Secundum verò, ad præſervatricem pertinet. Tertium ad curatiuam. Hoc autem vniuerſum genus præcipuè circa humores verſatur: quos neq; lentos oportet eſſe, neq; craſſos, neq; aquoſos, neq; plurimos, neq; vehementer calidos, aut frigidos, neq; mordaces, neq; putredini obnoxios, neque veneni naturæ affines. Nam ubi aucti fuerint, generant morbos. Augentur verò nonnunq; eadem ex cauſa, quæ ab initio eos generauit. Illud autem plerumq; accidit, vt ſua alteratione inſiciant illos, qui ſunt in corpore humores. ſcopus verò & horum curationis duplex exiſtit: alteratio ſcilicet, & euacuatio. Alterantur

Præſervatiua
rum cauſarum
differentia tri
plex.

Alteratio hu-
morum a qui-
bus fiat.

Euacuationis
modus multi-
plex.

Reuulsio fit
ad quā maxi-
me distantia
loca.

Deriuatio fit
ad vicina.

igitur, vel concocti à corpore, vel ab aliquibus facultatibus aliis, quæ vim medicamentosanæ sortiuntur. E quorum numero existunt ea, quæ aduersantur exitium ferarum venenis: quæq; etiam pharmaca virulenta transmutant. Euacuantur autem satis calidis medicamentis, purgationibus, clysmis, sudoribus, & vomitibus. Hæ igitur sunt ipsorum communes euacuationes: Propriæ autem, ex locis, in quibus coaceruantur, sumuntur. At verò prout euacuatur per ventrem quæcūq; continent in primis venis superfluitates. Quæ autem in iis quæ in hepate sunt, per vrinæ meatus. At quæ in toto corpore, per sudores: sicuti quæ in capite, per palatum, vel nares, vel per utrūq;. Cæterum quæ in spatiis pectoris laxioribus continentur, per guttur simul cum tussi: quæ in renibus sunt, vel vesica, per vrinam. Communis autem in his indicatio est, * reuulsio quidem ab omnibus partibus, ad quā maximè distantia loca: deriuatio verò, ad vicina. Quæcūq; itaq; huiusmodi curant dispositiones, causas salubres vocamus: sicuti insalubres eas, quæ adangunt: & neutras, quæ neq; obsunt, neq; iuuant. Pars igitur artis præseruatiua talis est.

DE ILLA ARTIS PARTE,
quæ conualescentes reficit, & senibus congruit.
Cap. XCV.

QUæ autem reficit atq; restaurat, in conualescentibus atq; senibus locum habet. Cæterum quæ nam horum sit dispositio, & à quibus præcipue causis ad naturalem habitum reducat, in methodo medendi explicauimus. Dispositio igitur talis est. Optimus quidem, sed exiguus est sanguis: atq; vnà cū ipso spiritus animalis, vitalisq;. Ipsæ verò solidæ partes sicciore: atq; ob id, earum vires imbecilliores: proindeq; vniuersum corpus, frigidius. Causæ verò salubres quæ hanc emendat dispositionem, vt vno eas cō-

Conualescentium senumq; dispositio qualis.

prehendani capite, sunt quæcunq; præsentaneum, tumq; exhibent alimētum. Particulatim autem, in moribus moderatis, & cibis, potibusq; ac somnis consistunt. Sūt porro materiæ motus, vehicula, anibulatio, nes, frictiones, & balneæ. Vbi igitur non parum se ex his profecisse senserint, paulatim se ad consuetæ opera transferant. Cibos autem assumant, in principio quidem, humidos, cōcoctuq; faciles: neq; frigidos: in processu verò, eos qui plurimum alimenti suppeditant. At potus eis opportunus est, vinum: ætate quidem, moderate prouectum: substantia autem, purum, pellucidumq;: quod scilicet vel sufflaum, vel album existat, atq; suauiter olens: gustui verò: neq; aqueum omnino, neq; aliquam qualitatū insignem, aut dulcedinem, aut acritudinem, aut amarorem, aut deniq; astringentem referens.

Conualescentes atq; senes reficiendi ratio.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E M E T H O D O

M E D E N D I. L I B. I.



INTER alias causas quæ à condenda medendi methodo me hæcenus dehortatæ sunt, charissime Hiero, hæc fuit vna & præcipua, q̃ frustra me scripturum tinerem: quum nemo prope dixerim hac nostra ætate veritatis inquisitioni sit deditus: sed pecuniam, & ciuilem potentiam, & inexplēbiles voluptatum delicias, omnes eò vsq; suspiciant, vt si quis sapientiæ quoduis studium sectetur, pro insano hunc habeant. Quippe qui primam ipsam, & verè sapientiam, quæ diuinarum, humanarumq; rerum est scientia, ne

Temporū suorum felicitatē Galenus deporat.

Sapientia est diuinarū humanarūq; rerum scientia.

esse quidem omnino existiment, ac proinde inter eos
 cenſeatur optimius, non qui plurimis instrumentis mu-
 ſicis, aut etiam ſermone vti philoſophico norit, ſed
 qui multos, eoſq; maximos calices exiccarit. Eoſq; ſit,
 vt quum ægrotare ii cœperint, medicos aduocet lo-
 cupletentq; non quidem optimos, ſed eos qui adulen-
 tur iſtis: quiq; & frigidam dabunt, ſi hanc popoſcerit,
 & lauabunt, quum iuſſerint, & niuem, vinumq; por-
 rigent: ac breuiter, quicquid iubebitur, mancipiorum
 ritu facient: contra q̄ veteres illi medici ab Aſculapio
 oriundi: qui veluti duces militibus, & reges ſubditis,
 imperare ſemper ægris voluerūt: nequaquā verò empti-
 riorum Getarum more, parere & obſecundare: id qđ

Medici vete-
 res imperabāt
 ægris veluti du-
 ces militibus.

Theſſalus pol-
 licebatur do-
 cturum ſe artē
 medicam curri-
 culo menſium
 ſex.

Curaturo mor-
 bos neceſſaria
 eſt corporis na-
 turæ cognitio.

Corpus vniuer-
 ſum eſt conſpi-
 rabile & fluxi-
 le.

Miſterum qua-
 litates & facul-
 tates ſunt totæ
 per totas mi-
 ſtæ.

facere Romæ erat ſolitus impudētiffimus Theſſalus,
 eò etiam temeritatis progreſſus, vt ſex tantum men-
 ſium curriculo traditurum ſe totā artē medicā profite-
 retur: citra vllam aliā diſciplinā iſtitutionē. Quā-
 obrē ipſius facilitate allecti, ſutores, textores, fabriq;
 ſeruilib⁹ opificiis relictis, cateruatim hodie ſeſe ſub eo
 præceptore, ad profeſſionem ſacraſſimā conferunt,
 in perniciem humani generis. At verò, minimè licere
 alicui curare cōmodè morbos, niſi prius naturam cor-
 poris vniuerſi pſpexerit, apud omnes ſapientiæ profef-
 ſores eſt in conſeſſo. Totius autem naturæ conſtitu-
 tionem, accuratiſſimè expoſuit nobis Hippocrates.
 Quem quidem Peripatetici, atq; Stoici ſequuti, vtriq;
 ſanè hoc illius dogma recipiunt, nempe, vniuerſum
 corpus conſpirabile & cōfluxile exiſtere, omneſq; ani-
 malis particulas à ſe inuicem affici: diſſident tamen in
 eo, q̄ Ariſtoteles quidem, qualitates tantum in ſe mu-
 tuo tranſire, atq; omnino miſceri: Stoici verò, nō hæc
 modò, ſed etiani ſubſtantias ipſas exiſtiment. Cæterū
 medicinæ fuerit abundè, ſi concedantur ea quæ ab
 vtriſq; ſunt demonſtrata: necnon q̄ qualitates, virtu-
 tesq; in miſtis, totæ ſunt totis permixtæ. Hac autem hæc

mani corporis contēplatione posthabita, nullaq; vñs demonstratione, ille sapientissimus Theſſalus, duos tantum esse morbos, simplices tradit in vniuersum, nempe fluxum & clausum: ex quibus simul coeuntibus gignit tertium vñum compositum: non intelligēs se differentiam quandam morborum, nō numerum in medium adferre. Atqui minimē conuenit, quum de animalium numero quæritur, vñam differentiarum oppositionem producere. Alioqui duo sic vniuersa animalia erunt: vt gratia exempli, rationale, & irrationale. Proinde ad species quæ in substantia, nō quæ in differentia versantur, respicere oportet eum, qui numerum morborum sit traditurus. Porro non omnis differentia generi addita, ad speciei constitutionem conducit aliquid: sed quæ ex generis propria diuisione nascitur. Hæ siquidem differentię sunt, quæ species constituunt: reliquæ omnes, alienæ. Etenim propriæ animalis differentię existunt, mortale, & immortale: rationale, & irrationale: mansuetum, & ferum: aliq; id genus. Molle verò ac durum, graue & leue, rarum & densum, magnum & paruum, animalis differentię nō sunt, sed substantię. Itaq; etiam si cū animali vel molle vel durum componas, ad speciem constituendam nihil sanē cōtulerint. Sin vel rationale & immortale, vel rationale, & mortale, animali adieceris, efficitur iam illic Deus: hīc homo. Ita verò, & si rationali aīali duas illas differentias peculiares addideris, quæ sunt gressile & bipes, sic quoq; hominis speciem effeceris. Vnde fieri non potest, vt vliius rei specificas differentias inueniat quis, nisi prius substantiam illius, aut definiuerit, aut oratione circumscripserit accuratē. Si quis igitur tradere de morborum numero instituat, is non debet statim in prima differētia subsistere, sed diuisa illa procedere, donec ad aliquam īfinitarum specierum, & quæ in aliam distrahi amplius non possit, perueniat: id qđ

Theſſalus constituebat duos tantum simplices morbos in vniuersum.

Differentię specificę.
Animalis differentię, proprię

Deum animal rationale immortale definit Galenus.

facere illi tantum est promptum, qui in diuidendi arte magnopere fuerit exercitatus. Peccauit etiam vel grauissimè Thessalus, quod ne principium quidem in demonstrabile, ac per se notum attigerit, illius rei quam pertractandam suscepit: principium autem intelligo, quæ sitæ vniuscuiusq; rei propriam essentiã: à qua necessario est ordiendum, quum ad inuentionem specierum & differètiarum, tum vel maximè (vt ait Plato) ad diuisionem, atq; ad omnem cuiusvis rei absolutam inquisitionem. Sed nec ratione, nec experientia ad fulcienda sua dogmata vsus vnq; est Thessalus: quæ quidẽ duo instrumenta, iis quæ optinè inuẽta fuerint, apud homines solent semper patrocinari. Cæterum in his commentariis animus nobis est agere, non de experientia quæ ratione nõ vitur, sed de iis præsiidiis, quæ methodo & ratione inueniuntur. Etenim methodo quippiam inquirere, inuenireq; ex aduerso opponitur ei, quod est fortuito & temere. Est siquidem illud, cū via quadam & ordine, quippiam inuestigare: experientia autem à methodos, non artem, aut ordinem certum, sed tantum fortunæ vnius fauorem, ad rei inuentionem desyderat. Qua quidem prorsus neglecta, nos de demonstrationi insistamus, quæ à principiis in demonstrabilibus, & per se notis, intellectuiq; objectis nunq; non proficiscitur. Nam quod intellectui se vno occur su non exhibet, id protinus controuersum existit, demonstrationemq; desyderat: nec artem vllam à tali principio incœpisse conuenit. Quandoquidem igitur morbi curationem inuenire est propositum, haud dubiũ necesse est, prius morborũ numerum sciri. At quoniam fieri nequit, vt aut differẽtias generis vllius morbi, aut species inuenias, ipso quod diuiditur, non planè explorato, oportet profectò nũc, etiam quid morbus sit, enarremus, quo sic diuisionem eius ritè adeamus. Id verò fiet cõ modè, nobis à communi notione au-

Essentiam cuiusq; rei esse principium a quo ordiendũ est ad exactã omnem inquisitionem.

Instrumenta inuentionis duo: ratio & experientia.

Methodo inquirere, qd sit. Experientia a methodos, vnius fortunæ dũtaxat fauorẽ desyderat.

Notio cõis.

spicatis, sine qua inuenire propositæ rei substantiâ non licet. Vt igitur ubi citra offensam, omnium partium actiones obeunt, homines valere se dicunt: sic dum naturalium corporis actionum senserint quampiam vel malè geri, vel prorsus non geri, & ægrotare se illa corporis parte existimant, cuius actionē oblâsam vident, & medicum de remedio consulunt. Ac tales sunt vniuersis hominibus notiones & sanitatis, & morbi. Ergo accepto illo, quod omnes confitentur, principio, nempe id in medendi methodo propositum esse, vt ægra corpora in sanitatē restituamus, hoc est, naturales partium actiones, si quæ oblâsæ sint, emendemus: claritatis gratia, oculum proponamus, cuius nimirum partikulæ opus esse vt videat, inter omnes homines conuenit. Nec verò refert partem ne, an particulam, quispiam oculum dicat. Siquidem quicquid totum cõplet, atq; integrat, id, corporis totius, quod complet, particula siue pars nominatur. Est namq; pars ex iis quæ dicuntur ad aliquid. Quippe pars totius integriq; pars dicitur: æquè profectò vt totum, integrumq; , per relationem ad partes, & particulas suas nominatur. Cæterum à rerum, non nominum differentia, in omni comentatione principium sumendum est. Est itaq; visio, oculorum actio: quemadmodum locutio, linguæ: icsus autem, crurum. Ipsa rursus actio, motus est actiuus. At motus est prioris habitus immutatio. Qui quidem actiuus dicitur, quum à se æditur: passiuus verò, quum ab alio posito extrinsecus, excitatur. At verò immutatio prioris habitus dupliciter fit: nempe aut in qualitate: aut in loco. Cæterum quæ circa locum versatur, latio dicitur: alteratio autem, quæ in qualitate cõsistit. Porro instrumentum appello eam animalis partem, quæ perfectè ædere actionem potest. Qua significatiõe oculi pars animalis, & particula: & instrumentum vocatur. Cornea verò tunica, particula quidem & pars;

Valere et ægrotare qñ se dicant homines.

Pars quid dicitur.

Visio est oculorum actio.
Actio quid.
Motus quid.
Motus duplex
Immutatio duplex.

Latio.
Alteratio.
Instrumentum quid.

Oculi tunicæ,

Similaris particula quæ dicitur.

CrySTALLINUS humor primū infimū visionis

Nihil sine cā contingit.

Sanitatem & morbum sub eodem genere contineri. Contraria quæ dicantur.

at instrumentum non item. Simili modo & quæ rhagoides, & quæ arachnoides, & quæ amphiblestroides, dicuntur: quarum nimirum singulæ, primum quidem, ac maximè, oculi particulae sunt: & quia is etiam faciei pars est, itidem & illæ faciei sunt partes: sed secundaria ratione. At verò similarē partem appellant, quæ undiq; in particulas similes dividi potest: veluti vitreus humor, & crystallinus, & tunicarum propria cuiusque substantia. Est itaq; instrumentum oculus: actio verò, visio: una ex eius particulis similaribus, ac primum instrumentum visionis, crystallinus humor. Id namq; est, quod alterari debet ab aliquo extrinsecus occurrētū colorum, ut animal videat. Alterari verò non potuit, nisi purum omnino, perspicuumq; esset. At purū ita, pellucidumq; esse non posset, sine eo quod nunc obtrinet temperamento. Quippe ostensum est, unamquāq; rem talē esse, qualis est, pp̄ calidi, frigidi, humidi & sic ci temperaturam. Ideoq; si quid horū magnopere immutatum sit, aut planè non videbit, aut male videbit animal. Vbi igitur neutiq; videre oculum cernim⁹, qui tamen probè antea cernebat, subitò nos accingimur ad ipsius læsionis causam inuestigandam: quum si ne causa nihil in natura rerum contingat. Causa inventa, necessariò fatēdum est, aut morbum ipsum eam esse: aut, si morbus læsio actionis existat, affectū qui huic officit, morbi causam existere. Dubitauerit tamen aliquis, ipsum ne oculi affectum, à quo cernendi actio vitriatur, dicere morbum debeamus: an ipsum actiōis vitium. Quodcunq; tamen elegeris, necessum est ut de sanitate enuncies, & quidem multo antea, contraria: nempe eam esse vel incolumen oculi actionem: vel affectum, qui visionem absoluat. Sanitas quippe & morbus, maximè contraria quum sint, sub eodem genere continentur. Contraria siquidem sunt, quæ i eodē genere posita, plurimum inter se disident: veluti album

& nigri: quorum vnum est genus, color. Ergo si sanitas actio est, quæ secundum naturam se habet: omnino morbus, actio præter naturam erit. Sin autem affectio quæpiam, aut constitutio naturaliter se habens, extiterit sanitas: & morbus affectio, constitutio'ue præter naturam, necessario fuerit. Verum quum duo rerum genera sint, nusquam inter se similia, sed tota differentium natura: quorum alterum quidem, corpus, certo modo affectum, vocatur: alterum verò, functio: fatendum proculdubio est, affectum ipsum corporis, causam esse: functionem verò, id, quod ab affectu ipso proficiscitur. Coniungitur quippe necessario affectum naturaliter se habentem, naturalis actio. Contra, si à natura recesserit, actio statim præter naturam se habebit. Atque hoc ipsum est veluti elementum primum totius methodi, quum nihil aliud sit quod curatur à medicis quàm ipsius affectus corporis. Contingit tamen non ex nominum, sed rerum, recta opinione, recta morborum curatio. Vt autem omnia methodo compendiosa explicemus, quatuor in vniuersum res sunt, quæ in præsentī contemplatione proximè inter se coherant. Ac videtur sanè ex his esse vnum genus ipsorum corporum: alterum verò, actionum: ac corporum quidem genus, præcedere actiones, easque gignere: has verò sequi: idque, si corpora se naturaliter habeant, inculpabiles, naturalesque: sin præter naturam sint affecta, aut nullas prorsus, aut omnino certè impeditas. Tertium præter hæc genus est causarum, quæ hos affectus creant. Nam quam rationem habet affectus ad actionem, hanc alterum quippiam ad ipsum affectum omnino habeat oportet: illo duntaxat euarians, quod affectus vnà cum actione consistit: nec potest vsquam aut proba actio esse, si ne corporis naturali affectu: aut vitiosa, nisi quum corpus sit vitio affectum. Ipsius autem affectus, qui actionem impedit, causas possunt & adesse, & abesse. Ab hoc

Affectus corporis existit functionis causa.

Morbus est af-
fectus præter
naturam, fun-
ctionē vitians.

Symptoma
duplex.

Causæ morbi-
ficæ.

Causarum dif-
ferentia.

quartum aliud genus est eorum, quæ quum corporib^{us}
& naturaliter & præter naturam se habentibus insint,
actioni nec commodant, neq^{ue} incommodant: ut exem-
pli gratia, color niger, ob diuturnam in sole morā con-
tractus. Affectū igitur corporis præter naturam se ha-
bentis, qui actionem aliquam vitiat, morbum (si pla-
cet) vocemus. Ipsum verò functionis vitium, insigne
quoddā morbi symptoma. Quæ alia rōne accidūt, ceu
colores, ea symptomata etiā, sed familiaria propriaq^{ue}
possit quispiam vocare. At quartum ab his genus sit in
salubrium siue morbosicæ causæ. Quæ eas quidem,
quæ in ipso corpore animalis consistunt, internas siue
antecedentes: quæ verò extrinsecus accidūt, externas
aut procaciticas appellabimus. Ut autem hæc exem-
plo clarescant, phlegmonem esse pedis morbum
constituamus: læsum autem ingressum, esse insigne ip-
sius morbi symptoma. At rubor, tensio, renixus, & tu-
mor præter naturam, diuersa quædā symptomata no-
minentur. Porro sanguinis redundantia, phlegmones
causa interna dicatur. Sicuti externa, quæ præesit
abundantia ciborum. Cæterū nullus affectus dici mor-
bus meretur, nisi alicui^{us} partis actionem vitiet. Quod
autem postulat curationem, aliud planè non est, q̄ affe-
ctus qui vitiat actionem. Etenim quod primum, maxi-
mèq^{ue} omnium desyderamus, id naturalis est actio. Ut
igitur totam particulam actionis tantū gratia requi-
rimus, eodem (arbitror) modo, & ipsius partis natu-
ralem constitutionem, etiam actionis gratia desydera-
mus. Porro quæ constitutionem ipsam vnde actio na-
scitur, necessariò sequuntur, sanis quidem nobis acci-
dentia: ægrotantibus, symptomata nūcupantur. Atq^{ue}
hæc quatuor genera sunt omnium, quæ in nostro cor-
pore habentur, siue secundum naturam nos, siue præ-
ter naturam habeamus: actiones, constitutiones, quæ
has præcedunt, quæq^{ue} etiam sequuntur.

Accidentia &
symptomata
quō differant.

Rerum quæ in
nostro corpore
habentur qua-
tuor genera.

GALENI PERGA

MENI DE MEDENDI

METHODO. LIB. II.



ERG O Affectus qui actionem vi-
 tiat, morbus vocetur. Hunc si quis se-
 quitur, symptoma. Quod illum exci-
 tat, causa. His ita distinctis, inspecien-
 da diligenter est nominum diuersitas,
 quæ ægritudinibus imposuerūt, ipso-
 rum primi authores. Partim nāq; à læsa particula fue-
 runt indita, vt pleuritis, id est compunctio lateris. Peri-
 pneumonia: id est, pulmonum phlegmone. Ischiās, id
 est coxendicum morbus. Podagra, id est pedum vitium.
 Nephritis, id est renum affectus. Arthritis. i. articulo-
 rum vitium. Ophthalmia. i. oculorum phlegmone. Ce-
 phalalgia. i. capitis dolor. Dysenteria. i. intestinorum
 tormina. Subinde ab ipso symptomate, vt Ileos, hoc
 est voluulus. Tinesmus. i. desidendi assidua cupiditas.
 Spasmos. i. conuulsio. Palpos. i. palpitatio. Tromos. i.
 tremor. Paralysis. i. resolutio neruorū. Apepsia. i. cru-
 ditas. Dispncea. i. difficilis respiratio, vel inordinata spi-
 ratio. Apncea. i. spirandi defectus. Agrypnia. i. vigilia.
 Paraphrosyne. i. delirium. Coma. i. sopor. Sæpe ab ani-
 bob⁹ simul. Vt Cephalalgia, hoc est capitis dolor. Otal-
 gia, hoc est dolor aurium. Cardialgia. i. oris ventriculi
 (quod veteres appellabant cor) dolor. Odondalgia,
 id est dentium dolor. Hystæralgia. i. vteri dolor. Sæpe
 numero à causa putata, vt Melancholia. Nonnunq; à si-
 militudine ad aliquid extra positum, vt Elephas, Can-
 cer, Polypus, Staphyle. i. vva. Leuce. i. vitiligo alba.
 Myrmecia. i. formica. Atheroma. i. tuber, cui pulcicu-
 læ quid simile inest. Steatoma, quod aliquid senu simi-

Morbus
Symptoma.
Causa.

Morborū no-
mina indita a
læsa particula,

Morborū no-
mina sumpta
ab ipso sym-
ptomate.

Morborū no-
mina tracta a
parte affecta,
& symptoma-
te.

Morborū no-
mina sumpta a
causa putata,
vel ab aliquo
simili.

le cōtinet. Staphyloma. i. oculi morbus, quum in summa tunica quiddam acino simile eminet. Meliceris, hoc est capitis vlcerā, sanietem instar mellis fundentia. Anthrax. i. carbo. Alopecia. i. areā in capite. Ophiasis. i. vitium serpentis formam representans. Sycolis. i. ficus. Satyriasmī, & Priapismī, pudēdi erectiones prāter naturam. Ipsorum verō morborum, qui neq; locum affectum nomine representant, nec causam quā eos effecit, perpauca sunt nomina. Phlegmone. Gangræna. Scirrhus, Erysipelas. Apostema. Oedema. Empyema. Vlcus. Exarthrema. Catagnia. Spasina. Rhegma. Coloboma, id est mutilatio. Dorthien, id est furunculus. Ionthos, id est varus. Phyma, laxarum partium phlegmone. Quinquā horum quoq; nonnulla, partim locū corporis, siue particulam affectam subindicare videntur: partim à prægrauante symptomate nominari. Porro vlceris (quod vnitatis solutio est in carnosa parte) differentiæ particulares partim ab iis qui primum eas sahauerunt, dicuntur: partim ab ipsis qui iisdem affecti sunt: vt Telephium. Cancer autem, à similitudine ad animantem. Phagedæna, Herpesq; à symptomate. Verū phagedæna quidem, vlcus depāscens est. Herpes autem non semper existit vlcus. Ac quotiescunq; cum exulceratione inuadit, ritu serpentis bestię, ad vicinas partes progredit, easq; depascit, & populatur. Cauum verō vlcus, & sordidum, & cruentum, & purum, & æquale, & carne excreſcēs, hæc magis proprias appellationes sortiuntur: non tamen similiter omnes. Nam æquabile, cauum, & supercreſcens, à propria differentiā: at cruentum, & purum, & sordidum, non à propriis differentiis, sed ab externis symptomatib; appellatur. Tres igitur esse in corpore affectus præter naturam, ostensum iā est: causas videlicet, morbos, atq; symptomata. Causas, veluti redūdantiā, & corruptelam. Morbos, vt phlegmonē, Vlcus. Sym-

Vlcus quid.

Vlcerum varia nomina.

Phagedæna quid.

Herpes duplex

Affectus præter naturā sunt tres: morbus causa & symptoma.

promata, vt prauum colorem, atq; gracilitatem. Diuerſa ab his ſunt quæ immodicè excernuntur à corpore, aut retinentur præter naturam, & functionum vitia: omnia ſcilicet cõmuni nomine appellata ſymptomata, cæterũ non vni generi ſubdita. Quippè affectus quidam corporis eſt vitioſus color. Quod excernitur autem, aut retinetur, affectus non eſt, ſed affectum ſequitur. Similiter actio vel læſa, vel integra, affectus ſanè non eſt: particulæ autem vnde editur, neceſſariò comitatur affectum. Ac œdema quidem & phlegmone, ex iis ſunt, quæ abſolutè dicuntur eſſe. Eodem modo & redundantia, ſi ea ſit ſanguinis: & corporis pallor. Actio verò, ex eorum numero non eſt, quæ eſſe abſolutè dicuntur: aut certè non ſimiliter ſicut iam comprehenſa. Siquidem nullo temporis ſpatio, eius partes manènt, ſicuti nec ſermonis, nec vllius motus. Sed horum quilibet in generatione cõſiſtit. Quum verò duplex ſit ipſius motionis genus, vnum in loco, aliud in qualitate: prius latio: ſecundum alteratio dicitur. Ac omnis quidem actio, motus eſt actiuus: omnis alteratio, eius quæ alteratur, motus eſt paſſiuus. Patitur nanq; quod alteratur. Ergo affectus, dum alterantur, mouètur: vbi verò à motu ceſſauerint, iam alterati ſunt: non autè amplius alterantur. Quicquid enim quocũq; modo ſe habet, aliquo omnino affectu eſt præditum. Quod autem in conſtanti, ægreq; ſolubili affectu eſt, id habitu iam quodam affectum eſt. Sanè alteratur is qui nigreſcit: alteratus eſt, qui obnigruit. Itaq; alteratio generatio eſt qualitatis. Nā quæ abſolutè dicitur generatio, ad ſubſtantiam via quædam eſt & progreſſus. Aliqua igitur in generatione, alteratione, & vt ſemel dicam, motu, ſuam eſſentiam obtinent: aliqua * permanentè habent ſubſtantiam. At ſanitas quidem & morbus, & quæcunq; ſymptomatum, cauſarumq; affectus, vel habitus ſunt, ex permanentium numero exiſtunt. Actio

Actio cur non
dicatur eſſe
abſolute,

Motus duplex
Actio quid.
Alteratio quid

Habitu quid
affectũ dicat.
Alteratio qd.
Generatio eſt
ad ſubſtantiam
progreſſus,

methodo is comprehendat, qui numerum omnium actionis causarum, corpore secundum naturam se habente, non norit. Qui autem omnem morborum numerum methodo non inuenerit, hic maximè labat. oportet in ipsis medendi auspiciis: quum constet, tot eẽ medendi rationes, quot morborum ideæ existunt. Verũ enim verò, primus omnium ille affectus inuestigandus est, qui dicitur functionis effectrix causa. Hunc sanè eu crasiam nos diximus esse calidi, frigidi, humidi, & sicci, ex intemperie quorum, primus morbus in particulis similaribus nascitur. Quum autẽ à similaribus ipsis, corporis functiones ædantur, meritò instrumentis singulis, vnica tantũ est attributa similis particula, à qua perfici ipsa actio possit. Reliquæ verò quæ cum hac quoduis instrumentum absoluunt, in aliquẽ vsum illius quæ prima existit actionis causa, sunt constitutæ: quãuis & ipsæ retinent suas peculiare actiones. Etenim instrumentum visus, est crystallinus humor. Reliquæ verò partes, eius gratia sunt factæ. Singulæ tamẽ earum aliquam seorsum actionem obtinent: ac vena quidẽ & arteria, & neruus, toti animanti communem: membranulæ autem oculi omnes, quum sint nutriti participes, præditæ omnino sunt naturalibus facultatibus: ac proinde etiã functionibus quæ ab ipsis proficiuntur. Quoties igitur crystallinus humor intemperie laborat, omnino læditur oculorum functio. Nõ est tamen affectus is, eorum, vt organa sunt, morbus. At hypochyma, hoc est suffusio, nullius similariũ morbus existit, sed oculi totius, ceu instrumenti. Ad eundẽ modum si in finibus venarum, quæ sunt in cauo iecinoris, obstructio aliqua oriatur, digestio quidem in corpus per has morabitur: ægritudo tamen totius hepatis, ceu instrumenti censcbitur, nulla similiarium eius partium adhuc egrotante. At si intemperies venas illi infestauerit, ipsarũ quidẽ illarũ morbus primũ erit: ex ac-

Medendi tot esse rationes, quot morborum ideæ existunt: Functionis cã.

Functiones edd a corporibus similaribus.

Crystallinus humor est instrumentũ visus.

Hypochyma, oculi totius, ceu instrumenti, est morbus.

Similares particulae solent octo intemperaturis cruciari, absque humore affluxu totidemque etiam, dum illi affluunt. Morborum genus duplex. Morbus instrumentalis quadriplex. Solutio centum est communis morbus similibus & instrumentariis particulis.

cideti vero, etiam iecinoris. Solent autem similes particulae, octo intemperaturis secundum nudas qualitates cruciari: nempe quatuor quidem simplicibus: quatuor autem compositis. Quod si ad intemperiem accedat & humorum affluxus, toridem rursus intemperies oriatur. Duplex itaque erit morborum genus: alterum in partibus similibus: alterum in organicis. Quod igitur ad particulas similes pertinet, circa intemperantias versatur. Quod vero ad organa, unum quidem in figura: aliud in particularum numero: tertium in magnitudine: quartum denique in positura spectatur. Vtrunque vero partium, id est similiarium, & instrumentalium, communis affectus est, unitatis diuortium. Quare sex in vniuersum morborum genera existunt. Vnum, quod similiarium est proprium: nempe intemperies. Quatuor, instrumentorum cuiusque. Et cum his sextum, quod vtriusque partibus est commune, ipsius unitatis solutio. Porro omnis medendi methodus, sciuncta ab experientia procedit. At medicorum plerique non tantum experientiae applicantes animi (per quam tamen liceret eis euadere in probos medicos) sed perfectioris etiam rationis cupidi, quum ait iis, quae citra demonstrationem sunt enuntiata credant, aut vitiosis fallantur demonstrationibus, non solum nihil excogitant boni, sed etiam quae per experientiam cognita sunt, corrumpunt. Proinde talibus experientiae ut incumbant consulo: quum non leue instet periculum iis, qui supra vires aliquid moliantur, ne & id non consequantur: & quae intelligere alias possent, omnino omittant. Itaque committendum non est, ut utraque simul misceantur, & quae per experientiam inuenta sunt, & quae sola ratione inuestigata. Sed quum utrumque seorsum sit tractatum, post ambo coniungantur. Etenim tota Empiricorum ars, observatio quaedam est, & memoria, eorum quae visa sunt inter se habere consequutionem aliquam. At ex ipsa rei natu-

Experientiae
foti, q. debeat
incumbere.

Empiricorum
ars quid sit.

ra ordiri, atq; ab ea, quod sequens sit, inuenire cōtra experientiam, id est indicatione inuenire. Voco autem indicationem, ipsam veluti consequutionis imaginem. Omnis itaq; medendi methodus donec ad optatum finem perueniat, per indicationes progreditur. Quandoquidem quicquid ab experientia est se iunctum, id totum indicatio vocatur. At finis propositæ tractationis est, inuenire cuiusq; morbi remedia.

Indicatio qd.

Huius autem inuentionis principium, est ipsius morbi cognitio. Ergo primum, quæ nam generalis, communisq; morborum omnium indicatio sit, inuestigandum est. Ab hac deinde ad alias speciatim est descendendum, donec finem eum consequamur. Porro quemadmodum hominibus vniuersis inest quippiam commune, cuius nimirum ratione, omnes dicuntur esse homines, ita & vsu venit in morbis. Vt enim Socrates atq; Plato, specie quidem sunt vnus homo: numero autem varii: sic, mea quidem sententia, morbus qui vtrunq; eorum infestat (sit febris, exempli gratia) genere & specie erit vnus, & si duo numero existunt. Id quod Plato significare videtur, dicens, Multa vnum esse, & vnum multa. Rectè igitur ab antiquis philosophis dictum est, aliud numero, aliud specie, aliud genere esse, quod tū idem, cum vnū est. Quā igitur omnis affectus præter naturam, functionem lædens, sit morbus, necessum haud dubie est, omnes id genus dispositiones, quatenus tales sunt, vel genere, vel specie vnum morbum existere. Quamobrem, vnum genere, specie, ac numero dici & esse qui non intelligunt, asino (quo nullum est animal stupidi⁹) mihi stolidiores videntur. Nā hic aliud esse vnum quidem specie: numero autē aliud, cognoscit. Quæcunq; verò de morbo dicimus, eadem & de optima valetudine, & de aliis etiam dispositionibus, intelligenda veniunt. Nam quemadmodum hominis nomen est vnū in vniuersis hominibus, morbiq; in om-

Multa vnum esse, & vnum multa.

Idem & vnū quot modis dicatur.

Morbus quid.

Asino nullum esse stupidius animal.

Asinus vnum specie, ab eo qd numero est vnū, discernit.

Morbi nomen
est vñ in vñ
vñs morbis.

nibus morbis: sic sanitatis denominatio, vna eademq;
est, in omnibus illorum constitutionibus, qui prospera
sanitate fruuntur.

G A L E N I P E R G A
M E N I D E M E D E N D I
M E T H O D O.
L I B E R. I I I.



Igitur indicatio quæ ab ipsa rei na-
tura primùm oritur, quid agendum
sit inuenit, necesse est remediorum in-
ueniendorum initium, ex morborum
ipsorum natura sumi. Cæterùm indi-
catio ipsa, quæ à morbis sumitur, pri-

cipium tantùm est, vnde medendi ratio promouet: nō
autem ipsius artis medicatricis pars: aut certè, nec ma-
gna, nec propria, sed quæ etiam plebi est cōmunis.

Medicus quis
nam solus exi-
stimandus.

Quamobrem eum solum eē medicum existimamus,
non qui nouit, quid nam morbi prima indicatio dicet,
sed qui illa perficere potest, quæ à tali præscribuntur
indicatione. Is igitur, si per experientiam ea inuenit,
obseruator & Empiricus est vocandus: sin ratione qua-
dam & methodo, logicus, & methodicus, & dogmati-
cus. Empirici quippe, per experiētiam inueniri omnia
contendunt. Nos partim experientia, partim ratione:
quum neq; illa inuenire omnia queat, nec sola ratio.

Empiricus.
Logicus.

Doctrinā Em-
piricam, logi-
cā, non esse
confundendas
sed seorsū vtrā
q; tradendam.

Verùm confusam, mistamq; tradendam esse doctrinā
non censemus: sed seorsum Empiricam: & seorsum lo-
gicam: quo facile appareat, quam vtrāq; earum vim
habeat. Igitur vnitatis solutio (quæ i osse quidem fra-
ctura: in carnosa autem parte vlc^o dicitur) vñitionem
postulat: quemadmodum, & vulnus, & ruptio, & con-

uulſio. E quibus, vulnus quidem ſolutio quædā ex vul-
nerādo in carnoſa parte relictā, eſt: ruptio autem atq;
conuulſio, citra vulnerationem accidunt: ac prior qui-
dem, carnoſæ partis diuiſio exiſtit: ſecunda autem ner-
uoſæ. Hæc itaq; omnibus vnitio molienda indicatur:
quæ an pſtari ubiq; poſſit, an in multis non poſſit, hoc
utiq; internoscere, primū iam artificis eſt. Siquidē hoc
ipſum primum artis eſt opus, vt intelligas ſperare ne
id quò tendis debeas, an ſecus. Eius rei duplex cogni-
tio eſt: nec poteſt addi tertia. Altera per experientiam
cui longo vſu eſt opus: altera per ipſius rei naturam,
Hæc ſiquidem, tum cuiuſq; ſubſtātiā particulā, tum
actionem, tum vſum, ſitumq; æſtimabit. A quibus pro-
cedens, non ſolūm quod ſanari nō poteſt, præuidebit,
ſed etiam quod recipere ſanitatē poteſt, de inuenien-
dis ei remediis deliberabit. Conſtat autem q; à ſimpli-
ciſſimis auſpicabitur. Porro nihil eſt ſimplicius vlcere,
quod in ſumma carnoſa parte conſiſtit. Huius ergo, ſi
quidem vlcus tantūm ſit, vnus curationis ſcopus, vni-
tio eſt. Sin autem cum cauitate adſit, erit duplex affe-
ctus: nempe vlcus, quod eſt vnitatis ſolutio: & cauitas,
quæ ex amiſſa aliqua animalis propria ſubſtantiā con-
tracta eſt. Ac proinde duplex etiā proponitur eius cu-
rationis ſcopus. Nēpe vt inducatur cicatrix, & implea-
tur cauitas. Horum tamen alterum ſæpe fieri non po-
teſt: vt puta, quum non modò carnem, ſed etiam illi
ſubiectum os, perire contigerit. Quippe impleri ad vn-
guem huiusmodi minimè poteſt: cicatrice induci, faci-
le poteſt. Inuentionis autem, vt aliarum rerum, ſic re-
mediorum omnium duo nobis ſunt instrumenta: vi-
delicet experientia & ratio. Cæterū qui ſola experi-
tia vtuntur, quum videant, cui Ariſtolochia vlcus car-
ne non impleuit, huic thus conferre: cui autem thus
non contulit, ei irin admotam eſſe vtilem, iudicant
non omnes ab omnibus medicamentis ſimiliter affi-

Vlcus carni
curationis du-
plex ſcopus.

Instrumenta in-
uentionis re-
mediorum eſt
duo, experien-
tiā atq; rōnem

Empiricos contra defectū in vnum medicamentacōitaria confundere.

ci: ac proinde quamplurima eiusdem speciei medicamenta sarcotica in vnum confundunt, quo nulli corporis naturæ desit, quod sit ex vsu. Atq; hi quidem q̄turpissimè hallucinantur. Primo quidem, nam solius compositionis quæ ex similibus specie medicamentis conflatur, non eius quæ ex contrariis initur, instituūt methodum. Dein autem, quia in eius miscellæ multitudine, vnum fortasse medicamentum laboranti prodesse poterit: fortasse neq; vnum quidem: contra verò septem, aut octo obesse: ita vt pluribus numeris eiusmodi medicamen obsit, q̄ prosit. Ac proinde, quod quidem ad hanc rem pertinet, ii plura mihi ignorare, q̄ nouisse videntur. Etenim oleum cauo vlceri infusum, aduersissimum omnium medicamentum est: ipsumq; & sordidum, & fœtidum reddit. Quod si tempus quoq; anni calidius sit, ac vitio mali succi homo laboret, aut sit natura obnoxius fluxionibus, aut in victus ratione delinquat, timendum est, ne pars illi ea computrescat ex vsu olei, quæ fuerit exulcerata. Periculosus est etiā, & ceræ siue solius, siue in oleo solutæ, vsus. Hæc itaq; putrescere vlcus faciunt. At si æruginem, ad læuorem tusam, inspergas, ea quidē nullo modo putrefaciet: dolorem: tamen & morsum non paruum inferet: præterea exedet, ac phlegmonein excitabit. Quod si largi⁹ vtare, etiam conuulsionem accerset. Quoniam igitur neq; oleum, neq; ærugo, neq; cera, cauū vlcus per se implere carne potest: constat q̄ ex iis qui experientiā profitetur, nemo vsq; miscebit illa: id quod faciet Rationalis intrepidè, videlicet haud ignarus, ex duobus temperamentis immodicis, contrariisq;, confici vnū modicum posse. Non est ergo difficile, ex oleo, cera, & ærugine, medicamentum sarcoticū, & moderatè siccum conficere: quale vlceri cauo est aptissimum, ceu quod mediocriter exiccari postulet. Omnis igitur quæ præter naturam est cavitās, repleri postulat: quare, &

Oleum cauo vlceri aduersissimum medicamentum est.

Ceræ vsus cauo vlceri exitus periculosus. Æruginis vis.

Temperamentum vnum modicū confici ex immodicis atq; contrariis possibile. Sarcoticū medicamentū vlceri aptissimū cōfici ex oleo, cera, & ærugine.

quæ in carnosa accidit parte. Ipsa verò repletio, inueniendorum remediorum finis, quò tenditur, est. Cæterum vt illa quæ implent inuenias, & multa ratione est opus, & multiplici particulatim indicatione, & methodo rationali exacta. Quæ quidem destitutum, vulgus medicorum quum sit, etiam oculorum doloribus illa medicamenta adhibet, quæ ex opio, mādragora, & hyoscyamo parantur: maximam planè oculorum perniciem: vtpote quæ nulla re alia sublata ad præsens speciem doloris præstant, quæ quod ipsum sensum extinguant. Nos verò, dolores oculorū grauissimos, aut balneo, aut vini porione, aut fomentis, aut mischiōe sanguinis, aut deniq; purgatione sanauimus. Vt igitur ad caui viceris curationem reuertar, in eo sanè proponitur nobis, vt quæ perit caro restitatur. Scire autem oportet, generande carnis materiam, sanguinem bonum existere, opificem verò, atq; authorem, naturam, illi videlicet corporis, cui caro superinducti debet. Porro natura cuiusq; corporis, calidi, frigidi, humidi, & sicci temperatura cōstat. Quare perspicuum est, iustum horum temperamentum in subiectis particulis, quibus deficientem carnem sumus restitaturi, opificis habere rationem. Ac primū quidem in omni cauo vlcere hæc duo cōsideranda veniunt: iusta ne sit temperie id quod subiectum est: nempe an secundum naturam se habeat (similariū quippe corporum sanitas, iusta est quatuor qualitatum tēperies) & an sanguis qui infuit, bonus ac mediocris existat. Nam si horum alterutrum sit vitiosum, multi affectus præter naturam cōstiterint. Verū si & sana sit pars, & sanguinis confusus citra omne vitium: nihil obest, quo minus primæ carnis generatio contingat prosperè, idq; nullius externi medicamenti ope. Cæterum quia in ipsa primæ carnis generatione duplex excrementum oritur; alterum quidē tenuius (quod n. vlcere sanies dicitur) al-

Oculis perniciosissimi esse. quæ medicamenta ex opio, mādragora, & hyoscyamo cōstant.

Oculorum dolores quæ namque medendi ratione Galenus sanauit.

Carnis generandi materia est, quibus sanguis opifex ipsa natura.

Natura cuiusq; ex primarum qualitatum temperie constat. Sanitas similium partium est iusta quatuor qualitatum temperies.

terum verò crassius: quod nuncupatur sordes: atq; ex tenui quidem, vlcus humidum redditur: ex crasso autem sordidum: duplicibus sanè medicamentis est op^o: utiq; ut humidum vlcus est, siccantibus: ut sordidum, quæ ipsum expurgent. Ergo quum nullo vnq; tempore natura cesset, certè nec tēpus vllum erit, in quo nō ambo hæc in cauo vlcere colligantur. Quare nec tempus vllū erit, in quo non vtrunq; medicamenti genus, & siccans, & expurgans desyderetur. Sed nō sat est inuenisse genus medicamenti, nisi etiam speciem eius disquiras. Cuius quidem inuentio petenda est ex comenariis medicamentorum simplicium: vbi nimirum omnium medicaminum temperaturas, gradus, & differentias tradidimus. Debet autem medicamen producendæ carni conueniens, ex iis esse, quæ primo ordine tū detergunt, tum siccant. Qualia sunt thus, hordeacea, fabacea, & erui farina, iris, aristolochia, cadmia, panax, atq; pompholyx. E quibus, aristolochia quidem, & panax, tum cæteris plus siccant, tum natura magis calent. At hordeacea, fabaceaq; farina, multo his minus siccant, ac minimè calida existunt. Thus verò moderatè calet: minus tamen illis siccant. Erui farinæ, & iris, horum, atq; aristolochiæ & panacis, medium locū sortiuntur. Cæterum thus in humida corporis natura carnem producere potest: in sicca autem non potest: vim tamen mouendi pus habet: nimirum cum mediis ac temperatis naturis consentiens. Sunt namq; duæ differentię primarum indicationum: quod secundum naturam se habet, custodiā sui indicante: & propterea quæ sibi similia sunt, postulante: quod præter naturam est, sublationem sui, eoq; requirente contraria. Perit enim quidq; in contrarium, & à cōtrario. Vlcus ergo, quo humidius fuerit, eo sanè, medicamento quod magis siccet, indiget. Corporis verò natura, quāto est humidior, tanto quod minus siccet, medicamentum po-

Sarcotici medicamē primo gradu debet detergere, & siccare.
Sarcotica medicamēta quæ sunt.

Thuris facultates.
Naturaliter, se habentia corpora, sibi similia postulant: præter naturā aut, contraria.

stulat. Quamobrem ex vlcerebus æquè humidis, quæ quidem in sicciore temperamento consistit, utiq; magis siccare postulat: quod in humidiori autem, minus: quatenus natura naturæ interest. Siquidem producta carnem, ei quæ antea erat, similem esse oportet. Iam verò, si medicamen vlcere admotum profuerit in minimè, cōtinget utiq; id, aut q̄ exiccarit impensius (hoc enim cognoscitur ex insigni vlcere puritate) aut q̄ parcius id sit molitum: quod sanè ex ipsius vlcere sordibus facillè coniiciemus. Quare haud magno negotio ex notis ipsis corrigemus siccitatis medicamēti & defectus, & exuperatias. Atq; hactenus de cavitatis quæ vlcere inest, curatione, sit dictum. Propria autem curatione vlcere (est enim hoc commune similium atq; instrumentalium particularum vitium) tum à laborantis particulæ temperamento, tum à medicamentorū proficiscitur facultate. Cæterum ambo hæc, à tractatione de elementis pendente: quum nimirum genituræ corruptelæq; quatuor qualitates sint causæ. Quo circa, nec similium, nec instrumentalium partium licet curationem attingere, absq; naturali scientia. Sed iam ad vlcere, quod solum consistit, curationem transire, tempestiuum videtur. Fuerit autem solum, si neq; affectus ullus simul adsit, nec symptoma. Igitur dum solutio cutis contingit, citra fluxionem, aut intemperiem, aut cacochymiam, aut cavitatem, aut aliquam ipsius cutis deperditionem, quemadmodum ubi à re aliquo acuto ipsa cutis conuulneratur, vlcus ipsum est & dicitur simplex, tantumq; agglutinationem desiderat. Quippe si conuulsa simul sint cutis oræ: nulla intercedet cutis diuersi generis: quemadmodum in eo repleto, planoq; reddito. In quo scilicet oræ vlcere se non contingunt: sed totius vlcerate partis cuticula amissa est: quā utiq; prius restituere, q̄ ora iungantur oportet. Quoniam igitur in simplici vlcere sola di-

Vlcere ppria
curatio vnde
proficiscatur.

Genituræ cor-
ruptelæq; qua-
tuor qualitates
sunt causæ.

Vlcus simplex
solum aggluti-
nationem de-
siderat.

uſio proponitur, diducta labra coniungi, coniunctaq;
manere oportet. At verò ex diductis corporibus, alia
quidem per ſe: alia aliorum ope coniuncta manent.
Per ſe quidem, quæcunq; ſecum concreſcunt, coaleſ-
cuntq;: vt caro, & quæ ex carne conſtant. Aliorum
autem ope, tum quæ colligantur, tum quæ vinculo ali
quo continentur: vt offa & quæcunq; ſunt dura. Eſt
autem, ſicuti in cauis vlceribus, vt producaturo caro,
ita in ſimplici vlcere, vt ora ipſæ mutuò coaleſcāt, na-
tura opifex cauſa: ita, vt ſi quæ diſſident, in idem ada-
muſſim componas, citra omnem reliquam extrinſe-
cus molitiōem coaleſcant. Quæ diducta ſunt, in idem
adduces, aut vinculo ex duobus initiis circūdato, aut
ſutura, aut ſibulis impoſitis: aut horum quibuſdā: aut
omnibus. Expediit autem, quod circūiicitur, nec mol-
le nimium ſit, quo videlicet tutò contineat: nec ruruſ
ita durum, vt premendo offendat. Circunductio etiā
ipſa, nec ita laxa ſit, vt nihil efficiat: nec ita vehemens,
vt dolorem premiendo excitet. Hac itaq; medendi ra-
tione, quale diximus, vlcus ſimplex coibit. At ſi ob ma-
gnitudinem eius, vel ob intercidentem ſaniem, vel ob
dolorem, aut inſignem imbecillitatem particulæ, vel
deniq; ob incluſum aerem, diſiunctæ partes exactè ad
inuum uſq; coniungi nequeāt, eiufmodi ſanè vlcus ex
ſola partium cōmiſſione æ glutinari omnino non pō-
teſt. Quare medendum priuſ eſt illis impedimentis, ali
quo medicamento ſiccante: quod quidem ſi qua ſanies
iam ſubſit, abſumat eam: & ſi qua in vacua loca influ-
xura eſt, hanc prohibeat. Etenim medicamen glutina-
torium, aut omnino carnis generatione non eget: aut
planè exigua: ac proinde pluſ ſiccet oportet, q̃ quod
carnem producit. Præterea, quum carnis productiuū
medicamentū, facultate extergendi opus habeat, qua
non modò redundantiam humoris ſiccet, ſed etiam
expurget ſordes: glutinatorium certè nec deterget,

Diductæ par-
tes in unum q
bus modis ad-
duci poſſint.

Glutinatoriū
medicamentū
pluſ ſiccet e-
portet, q̃ qd
carnē pducit.

nec expurgat, sed contrā prorsus substantiam omnem in idem cogit: cuiusmodi facultatem habent medicamenta ea, quæ austera, & astringentia vocantur. Quo circa, ubi carni gignendæ studemus, maximè cauendum est à medicamento astringente: utpote, quod fordes vlceribus arctius affligat, quàm ut facillè possint elui. Vnum igitur, omnis vlceris, quatenus vlcus est, optimū medicamentum existit. Porro ipsa medendi methodus procedet nobis bellissimè, si de singulis simplicibus seorsum aliquid præceperimus: post verò, de compositis omnibus alteram aliquam methodum explicarimus. Quā quidem si ingrediamur viā, omne vlcus tum siccari, tum debere astringi inueniemus: non tamen detergeri. Contra, cavitatem in carne, siccari quidē possulare, & abstergeri: minimè autē astringi. Cæterum quāto corporis natura est humidior, tanto medicamentis minus siccantibus eget. Quanto autem siccior, tanto rursus quæ vehementius siccant, magisquē; astringant, desyderat. Iam verò vlceri mediocriter cauo, statim quicquid volumus applicamus, siue siccum id, siue humidum medicamen existat. At in vulneribus quorum maior profunditas est, id non licet. Etenim & cerussa & lithargyros siccant, astringuntquē; modicè: ad vlceris tamen fundum vis eorum nō peruenit, nisi humori cuiuspiam misceantur. Porro quemadmodum cauum vlcus ut repleatur, carnis generationem (cuius materia sanguis est) postulat: sic plenum, ut perducatur ad cicatricem, generationem cutis, quæ ex carne est, non vnionem tantū, desyderat. Verū caro eadem specie cum ea quæ perlit, gigni in cauo vlcere potest. Cutis talis omnino, qualis erat quæ periit, prorsus restitui non potest: sed simile quiddam cuti, & quod eius officium suppleat, potest, Etenim quā cutis carne ipsa tum siccior, tum densior sit, certè si resiccarimus & astrinxerimus carnem, persimilem illam cuti redde-

Astringentia medicamenta cur fugienda, ubi carnem producere est animus.

Vinum omnī vlceri optimū medicamentū esse.

Vlcus oē simplex tum siccari, tum astringi debere.

Cauum vlcus esse siccandum & abstergendum.

Vlcus in humidiori natura minus siccandum est: in sicciori autem vehementius.

Vlcus tum cauum, tum plenum, quid possit.

Cutem similem ei quæ periit, restitui nō potest.

Cutis gignen-
dæ ratio.
Cicatricē indu-
cturum medi-
camentum qua-
le nam esse de-
beat.

Cicatricē indu-
centia medica-
mēta quæ sunt.

Excrescentia
carnis in vlce-
re a vehemen-
ter siccatibus
medicamentis
exeditur.
Naturæ ope-
ra quæ.

Carnem minu-
entia medica-
menta.

Carnem ex-
crescentia medica-
mēta reddi mi-
nus acria si cō-
burantur: mi-
nusq; adhuc, si
abluta fuerit.

mus. Cæterum multo siccus quod cicatricem inducat
q̄ quod agglutinet, esse oportet medicamentum. Quā-
doquidem glutinaturo, solum id propositū est, vt eius
quod secundum naturam est, redundantiā consumat:
qui autē cicatricem inducet, non hoc modo, verū etiā
vt ei quod secundū naturam se habet, aliquid deradat.
Galla igitur imatura hoc loco, & malicoriū, & Aegy-
ptiæ spinæ fructus, modicē siccantia pharmaca sunt.
Chalcitis, & æs vstum, & æris squama, & misy, multo
his valentiora existunt: misy quidem & chalcitis, præ-
cipuē: mitior autē æris squama: atq; etiā hoc mitius æs
vstum: præfertim si ablutum fuerit. Sed hoc quidē ad
speculationem de cōponendis medicamētis pertinet:
quæ medendi sequitur methodum: quemadmodum
ipsam præcedit, sympliciū pharmacoꝝ notitiā. Dein-
ceps autem agamus de excrescentia carnis in vlcere,
quæ morbus in magnitudine existens, primo omniū
sui ablationē indicat. At hæc, sola vehementer siccan-
tium medicamentoꝝ ope perficitur: haud itē naturæ
opera: contrā q̄ in carne restituenda, aut glutinatione
res habuit. Hæc enī, ipsi⁹ naturæ sunt opera, nec aliud
medicamenta moliuntur, q̄ submouere illa, quæ actio-
ni eius obstant. Porro medicamenta carnem minuen-
tia, proxima tū his sunt, quæ valenter detergant: tum
iis quæ cicatricē inducunt. Cæterū misy & chalcitis, si
humidæ naturæ applicentur, potius carnē exedent, q̄
cicatricē inducant: nisi fortē in pollinem admodum te-
nuē redactis, parcissimē illis quispiā vtatur. Nā sic im-
posita, partibus cicatricē conciliant. Quod si minuere
quæ supercreuere student⁹, liberalius sunt imponēda.
Aerugo autē, magis adhuc q̄ hæc, minuere carnem po-
test: ita vt genus eoꝝ quæ cicatricē inducunt, prorsus
egressa videatur. Iā verò, si exuras hæc omnia, vt mi-
nus acria, sic etiam ad cicatricē inducendā ipsa reddes
aptiora. Si verò etiā laues, adhuc euadēt mitiora. Hoc
autem

autem semper curantis animo hæreat, non omnem naturam eadē remedia requirere: sed infirmiores, mollioresq; , mitiora: validiores siccioreq; valentiora.

Quare natura ægri in primis venit considerāda. Quā autē cuiusq; naturæ proprietas ineffabilis sit, nec exactissima scientia cōprehensibilis, ac præterea cuiusq; hoīs propria curatio habeatur, is erit optimus cuiusq; particularis ægritudinis medicus, qui iam eam metho- dum cōparauit, ex qua & dignoscere naturas possit, & coniectura consequi, quæ sint cuiusq; propria remedia. Vex legitimi vlcera toꝝ partiū tēperamenti, quoties eas vel carne implere, vel glutinare, vel cicatrice inducere studes, maior tibi sollicitudo erit. Nā si ipsa ex ulcerata caro calidior sit, aut frigidior æquo, utiq; melius exigit, quæ nō modè moderatè siccet, sed etiā in tantū calfaciat, refrigeret ne, in quantū subiecta caro à naturali suo recessit habitu: quā fieri nō possit, ut in vlcere vel carnis productio, vel sinus impletio, vel agglutinatio, vel cicatricis inductio, rectè vnq; cedat, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat. Vt igitur si phlegmone vnā cū vlcere vrgeret, priusq; hæc esset discussa, nemo id vel carne implere, vel glutinare, vel inducere cicatrice tentaret: ad eūdē (arbitror) modum, etiā si sine phlegmone sola intēperies subsit, nullum horū fore prius sperabimus, q̄ illa fuerit sanata.

Cauenda tamen sunt interim immodicè quum calfacientia, tum etiā refrigerantia. Ergo hyoscyamum, mandragorā & cicutā, ceu supra modū refrigerantes herbas vitabis: tamen si siccant eā quoq; , quantū sit vlceri ex usu. Resina verò, & pix, & asphaltus, q̄q; modicè siccant, immodicè tamē sunt calida: ideoq; eis solis vretur nemo, nec aliter, nisi admistis cum leuiter refrigerantibus, vnum ex omnibus medicamen fecerit, quod sit tēperatum. Inspiciunda quoq; est, & aeris nos circūdantis tēperies. Siquidem veluti medicamētum quid-

Naturam ægri in primis esse considerāda. Medicus cuiusq; morbi optimus, quis sit dicendus.

Vlcus rectè curari nō posse, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat.

Vlcera curatura cauere debet ab extreme calfacientibus atq; refrigerantibus.

Aeris tempera-
turam ad vice-
rum curationē
esse expendē-
dam.

Naturaliter se-
habentia cor-
pora, similia si-
bi, præter na-
turam autē, cō-
traria postulāt

dam is etiam corporibus nostris forinsecus incidens, vbi immodicus calore, vel frigore est, sanationē moratur. Danda igitur opera est, vt medicamenta eius excessui occurrant. Ideoq; Hippocrates in calidiorib⁹ anni tēporibus, iis quibus frigidior facultas sit, medicamētis vtitur: calidioribus p^r frigidiora. Iā verò quēadmodū hūidior natura, humidiora: sicior siciora medicamēta exigebat: ita nūc, calidior calidiora: frigidior frigidiora regret: p^rtrariā scilicet semper iis, quæ p^rter naturā, & quæ secundū naturam sunt, indicationē præstantibus. Quippe quæ secundū naturā sunt, similiū sibi indicatiua sunt: quæ præter naturā, contrariorū: si modō illa seruari: hæc submoueri est necesse. Quod verò ad contrarias indicationes pertinet, si q̄to ægrī tēperamentū iusto est humidius, tanto particula iusto sit sicior, tale adhibendū est pharmacum, quale si vl-
cus in mediū temperamenti particula, corporis medio crirer tēperati, consisteret, adhiberemus. Sin autē particula fuerit * sicior iusto, q̄ corporis tēperamentum sit æquo humidius: vtq; in tantū intendi siccitatē medicamenti conueniet, q̄tum particulæ tēperamētum, totius tēperamentū excedit. Veluti si exulcerata pars, quatuor numeris sit sicior medio temperamēto: ægrī autē natura gradibus tribus humidior: manifestum est, particulam quæ nūc exulcerata est, siccius vno gradu desyderaturā medicamentum, q̄ quæ sit tēperata parti-
cula. Simili modo & de aliis excessib⁹ licet tibi ratiocinari. Porro siciores particulæ sunt, quæ minus carnosæ existunt: cuius generis sunt, quæ circa digitos articulosq; habentur: p^rterea, quæ circa aures, nasum, oculos, & dentes cōsistunt: atq; ut semel dicā, vbi crebræ cartilagine, & mēbranulæ, & ligamenta, & ossa, & nerui adsunt: adeps verò & caro, vel omnino nulla est, vel perexigua. Ordo autem curandi vlcēis sordidi & caui, à sorde expurganda orietur: quum nec glutinari

Siccæ partes
quæ sunt.

Vlcēis sordidi
& caui curādi,
methodus.

quicq̃, nec carne impleri possit, priusq̃ purum fuerit. Secundum lo cum exigit cavitatis sanatio. Tertium ci catricis obductio. Quod si vnà cum illis vel phlegmone, vel erysipelas, vel gangræna, vel intēperies aliqua simplex, cōposita ue, partem infestet, nisi quis prius eā sanarit, vlcus implere carne non poterit. Carnis siquidem generatio ex subiecta, quæ sana est, ortū ducit. Ex ea verò, quam premit phlegmone, quæq̃; intemperata est, & egrota, gigni caro noua nō potest. Etenim iusta subiecta carnis tēperies, causæ rōnem habet: vt quæ concreescere secum, quod vlceratū est, faciat, & cavitatem impleat. Puritas vlceris, rationē eius sine quo nō: atq; hanc sordes interpellans, curationem moratur. Habet autem & vlcus ad cavitatem, rationē eius sine q̃ non: quandoquidē si vlcus cicatrice fuerit obductū, nō amplius cavitās impleri carne poterit. Ergo si phlegmone, & cavitās, & vlcus, & sordes, in eadem particula simul adsint, primo phlegmonem, secundo loco sordem, tertio cavitatē, & quarto vlcus sanare oportet. Cæterū affectus vnde primum maximeq̃; iminet periculū homini, hic debet primus curari: atq; etiam solus interdū: veluti si puncto capite musculi, conuulsio, quæ congruentiū omniū medicamētōrū vim respuit, accadat, præciso per transuersum toto musculo, conuulsionem quidem sanaueris: aliquem tamen ex particulæ motibus viciaueris. Ad eundem modū, quum ex vena, arteriæue sanguis immodicè profluit, si totū vas per transuersum præcideris, vlcus quidem eius postea sanare non poteris: periculum tamen, quod ex profluvio sanguinis impendebat, sustuleris. Iā neruum punctum sæpe cogimur transuersim præcidere, quoties vel conuulsiones, vel deliria, vel ambo magna, ægreq̃; sanabilia, superuenire vulneratiōi cernimus. Similiter vbi luxatio cum vlcere in aliquo maiorum articulorū incidit, vlcus sanamus: luxationē autem insanatam re

Carnis generatio ex subiecta carne, si sana sit, fieri.

Puncto capite musculi, si conuulsio oritur imedicalis, sciendū esse totum trāsuertum vas musculū. Sanguinē fluentem imodice, supprimi, si per trāsuertum totum vas præcideretur: vlcus tamen eius postea sanari nō posse. Nervus quando trāsuertim secandus. Luxatio cum vlcere quādo debeat insanata relinquī.

**Differētia nul-
lius pōt, qđ p
se cōsistere po-
test.**

**Vlceris simpli-
cis dīrīe pro-
prię vnde su-
mantur.**

**Effluxus moli-
endi ratio i iis
vliceribus quę
apte expurga-
si nō possunt.**

**Deligandī vl-
ceris ratio.**

linquimus. Nā si hanc quoq; sanare conemur, conuul-
siones haud dubiē sequentur. Primus igitur medendi
in hisce est scopus, ille qui veluti à causis sumitur, eius
quod est futurum: alter, qui ceu rationem obtinet, ei
sine quo non. Tertius deniq; is de quo nuper diximus,
qui ad id quod vrget dirigitur. Porro quod consistere
seorsum, & per se potest, id nullius vnq; alterius differē-
tia fuerit, sed quod alteri accidit, nec seorsum p se con-
sistit. Quamobrem vlcus, phlegmone, gāgræna, & pu-
tredo, quum seorsum & per se consistere possint, affe-
ctus quidam præter naturā potius dicenda sunt, q̃ vlcē-
ris differentia. At magnitudo, paruitas, æquabilitas,
inæquabilitas, tempus, & figura, ex eorū numero sunt
quæ aliis accidunt: ac proinde ab iis sumuntur propriæ
simplicis vlcēris differentia. Indicatio autem curatio-
nis à differentiis fit, sed non omnibus. Nam nec recēs
nec vetus vlcus per se indicat aliquid. Siquidem quod
vlcus tantum est, omniq; alio affectu liberum, siue re-
cens, siue antiquum sit, eandem semper curationem
desyderat: nihil planē proprium indicante discrimine
eo, quod à tempore sumitur. At si cavitatem altē recō-
ditam sub cute habeat, consyderare oportet, vtrū ea
ī superiore parte sit sita, vt sanies ex ea prona effluat:
an in inferiore, sic vt illic sistatur. Eius igitur cui efflu-
xus patet, eadem quæ aliorum curatio est. Cui nō est,
huic ipsi moliamur effluxum quendam oportet. Eius
duplex ratio est: aliās tota cavitata defecta: aliās in fun-
do tantum aperta. Quando verò harum alterutra sit
ineunda, docebit tum locorum ipsa natura: tum verò
vlcēris magnitudo. Si namq; & loca ipsa periculosa
sectionem faciunt, & vlcus magnum fuerit, in fundo
aperire, magis expedit. Sin contrā se habeant, perscin-
dere præstat. Deligatio verò eius incipiat quidem su-
perne, sed finiatur infra: vbi scilicet patet effluxus. Iā
verò trāsuerfa vlcera, q̃ eorum labra magis dissideāt,

à seſeꝑ; abſint, diligentius coniungi poſtulant: ideo ꝑ;
tum futuris, tum fibulis, in eis eſt vtendum. Quæ verò
per longitudinem muſculòruin ſunt facta, hæc, ſi du-
plici initio diliges, nec futuris egebis, nec fibulis. Sin ali-
ter deligare placebit, vel fibulis, vel futuris vttere. Suf-
ficient autem pauciſſime omnino futuræ. Et magna q-
dem vlcera, iis quæ valentius ſiccet medicamentis cu-
rabis. Parua verò, vel quæ moderatè ſiccet, abunde
ſanauerint. Cæterum profunda vlcera, eadem etiam
ſunt magna: volunt ꝑ; tum à duobus initiis deligari: rã
verò nec labra ſua præpropere glutinari. At quæ pro-
funda multum, longaꝑ; ſunt, vt duplici ratione ſunt
magna, ſic duplicem quoꝑ; præſtant indicationē. Itaq;
& quæ valenter ſiccet poſtulant, & ne immaturè la-
bra coniungas: & vt à duobus initiis diliges: & vt altis
futuris conſuas.

Transuerſa vi-
cera diligētus
ꝑ; recta iungē-
da eſſe.

GALENI PERGA

MENI DE MEDENDI

METHODO. LIB. IIII.



HST Itaq; vnum morborum genus,
diuortium continui vocatum. Quod
quidē in carnoſa parte, vlcus: in oſſe,
fractura: in neruo, cōuulſio appellat.
Eiuſdē generis ſunt auulſio, ruptio,
& contuſio: illa quidem, in ligamēto:
hæ in vaſis, muſculisꝑ; ex violento iſtu, vel graui ca-
ſu, vel alio quopiam valente motu excitat. Ecchymo-
ſis verò vt plurimum vnà cum contuſione & ruptio-
ne incidit. Fit autem aliquando & ex oris vaſoꝝ aper-
tione, quæ Anotoſiſis dicit, & ex ea quā Diapedeſin
vocant, & ipſam exiſtentem ſolutæ continuitatis aliã
ſpeciem. Iam verò, & ex eroſione etiam ſoluitur inter

Vnitatis ſolu-
tio.
Vlcus.
Fractura.
Conuulſio.
Auulſio.
Ruptio.
Contuſio.
Ecchymofiſis.

Anaſtoſiſis.
Diapedeſis.

Erosionis cau-
sa,

dum in animalis partibus continuitas. Vex is iā mistus affectus est. Porro erosio, si intrinsecus ab ipso animali proueniat, vitiosi succi est soboles: sin extrinsecus, aut a valentibus medicamentis fit, aut ab igni. In vniuersum autem, simplices affectus à compositis distinguere oportet: quū simplici morbo simplex curatio adhibenda sit: composito verò, non simplex. Igitur omne vlcus, aut solum atq; per se, nullo nec cū eo simul inuadente, nec ipsum præcedere, aut sequente alio affectu, partem infestat: aut cum alio quopiā vno, pluribusue coniunctum: quorum alii, non modò statim ab initio excitarunt vlcus, sed nunc etiam maius efficiunt: alii, eius sine quo non, vt ad curandi opus, rationem obtinent. Cæterum qui vlcus maius efficiunt, sub mouendi è corpore sunt, aut peruincendū id, quod inducunt, incōmodum. Hoc autem, si affectus exiguus sit, fieri licebit facile: si verò magnus, duci ad cicatricem vlcus non poterit, prius q̄ illi affectui subuētum fuerit. Ergo omne vlcus subiectam sibi carnem præditam naturali dispositione, optat: & ne quid alienum inter oras conglutinandas intersit, quod curationem morari possit. Subiectæ verò carnis affectus, causæ rationē obtinet: ad id quod efficit. Quippe ex hac, & per hanc tum quæ disident, glutinātur: tum quæ caua sunt, carne implētur: quare pro natura sua se habeat oportet, quo hæc vtraq; cōmodè perficiantur. Rectè autem illa se habuerit, si proprium temperamentum tueatur. Itaq; necessum est ad vlcerā tum glutinanda, tū carne implenda, temperatam esse subiectam carnē. Nec sat hoc ipsum videtur esse, nisi etiam qui affluit sanguis & probus sit, & quantitate mediocris. Quippe ægrè sanabilem, rebelliumq; vlcerum, alia ob intemperiem carnis exulceratæ: alia ob affluentē humorem sunt, talia. Caro autem ipsa, interdum solis qualitatibus naturæ modum egreditur: interdum accedente tumore præter natu-

Vicera curan-
do quæ requi-
runtur,

Vicera cacoe-
the cur talia
curantur.

ram. Iam humor confluens, aut qualitate, aut quantitate, à naturæ modo discedit. Interdum verò miscent dictorū affectuum aut aliqui, aut etiam pariter omnes. Ac carnis quidem intemperiem, si squallens siccaq; videatur, aqua temperata fouens, humectāsq; donec rubescat, attollaturq; in tumorem, corriges. Si verò ultra perfuderis, id quod attraxisti euocabis: ac proinde nihil profeceris. Quinetiam medicamentā humidiōra, q̄ sanæ carni, adhibeantur. Si verò humidior q̄ pro naturali habitu caro fuerit, contraria ratio ineunda est, ac medicamentorum facultas ad siccius transferenda: aqua verò nullatenus admoūenda: sed si lauandum vlcus videtur, vinum, aut posca, aut decoctum austeræ cuiuspiam herbæ, præparandum. Eodem modo & calidiorem, q̄ par est, carnis habitum refrigerabis: & frigidiorē calfacies. Agnosces verò horum utrūq; partim colore, partim tactu, partim laborātis sensu. Quippe aliās vītionem se sentire fatentur: aliās manifestum in particula frigus: gaudentq; vel frigidis medicamentis, vel calidis. Et aliis quidem rubor leuis insidet: aliis color magis albicat. Partium porrò quæ cum aliquo præter naturam tumore exulceratæ sunt, earum prius sanandus est tumor. Vbi labra tantum vlcēis decolorata duraue plūsculum fuerint, excidenda ea sunt ad sanam vsq; carnem. Quum verò altius id malum serpit, deliberatione est opus, excidendum ne omne sit, quod præter naturam cernitur: an temporis spatium curādū: qua in re certè consulendus etiam est æger. Iam verò, si prauus humor in particulas confluens exulceratas, nec vberior sit iusto, nec multum excellat malignitate, auerti hunc, atq; repelli conueniet: astrictis scilicet, refrigeratisq; iis particulis, quæ ante exulceratam consistunt. Inchoanda etiam deligatio est à laborante particula, deducendaq; versus sanam. Quæ autem vlcēibus ipsis admovent pharmaca, siccet, valētius oportet.

Carnis sicca intemperies, quomodo corrigenda.

Carnis humida intemperies quomodo corrigenda.

Carnis intemperies quomodo dignoscenda.

Vlcēis labra quando excidenda sunt.

Æger quomodo consulendus.

Humor in particulas confluens exulceratas, quomodo auertendus & reprimendus sit: & quæ ratione.

tet, quæ simplici applicantur vlceri. Quod si sisti, cō-
pesci q; medicamētis influxus nequeat, causa eius inue-
stiganda est, atq; hæc prius adimenda. Ac si quidem ob
partis, quæ fluxum recipit, imbecillitatem aliquam id
contingat, huic nimirum medendum est. Imbecillitas

**Imbecillitas p-
tis ab intempe-
rie nascitur.**

autem partis, omnino ab intemperie nascitur: non ta-
men ab omni: sed ab excellentiori: quæ sanè per cōtra-
riam est abigenda. Vbi igitur intemperiem ipsam sana-
ueris, te ad curandum vlceris conuerteres: non aliter pla-
nè nunc curata intemperie, q̄ si incidisset extra vlceris.

**Varices prius
sanandas esse,
q̄ vlceris ab eis
fluxū recipiēs.**

Si verò ab alia quauis particula, vel etiam à toto cor-
pore, vitiosus aliquis humor influxerit exulceratis par-
ticulis, medendum in primis est ipsius fluxionis radici.
Ita igitur & varices, quæ sæpe supra exulceratum lo-
cum sunt, prius sanabimus, vt deinde mox vlceris sanē-
mus. Aduertendum autem est interim, nullam primiti-
uarum causarū, quas procatarcticas vocant, nisi etiā-
num affectum producant, esse curationis indicatricem:
sed huius indicationem, ab ipso affectu initiū habere.

**Indicatio vti-
lis, nulla sumi-
tur a causa nō
permanente.
Procatarctica
rum causarum
vltus.**

Siquidem à nullo eorum, quæ adhuc non permanēt,
indicatio sumitur eius quod ex vltu futurum sit, potest. Est
tamen vtilis causarum procatarcticarum cognitio, ad
noscehdos affectus eos, qui tum rationē, tum sensum
latent. Est itaq; rei quidem præsentis, curatio: futuræ
autem, prouidentia. Quod verò nec nunc lædit, nec
læsurum timetur, id ab utroq; artis munere, tum eo
quod curat, tū eo quod prouidet, excelsit. Quare nec
indicatio ab hoc ad curationem vlla: nec prouidentia
ratio sumitur. Si igitur à procatarctica causa indicatio
curationis nō sumitur, vtiq; manifestum euadit, quod
ab ea quæ præsens est, sumetur. Cæterum prospectrix
pars artis, est duplex: altera, quæ morbosum affectum
iam præsentem submouet: altera, quæ illum qui non-
dum vrget, prohibet. Porro contingit vlceris non sanē-
scere, interdum quidem ob labra ipsa. pessimè affectæ

**Indicatio cura-
tionis a causa
præsentē sumi-
tur.
Prospectrix ar-
tis duplex.**

interdum ob intemperiem particulæ, absq; vlllo tumore præter naturam: nonnunq; ob intemperantiã quidam, sed quæ cum tumore aliquo sit coniuncta: non tamẽ qui omnino sibi labra excidi postulet. Fieri etiã potest, vt superiacens varix, vel auctior lien, vel aliquod vitium iecinoris, vel imbecillitas exulceratæ particulæ (quæ ipsa quoq; intensa quædam est intemperies) vel totius corporis cacochymia, vel plethora, vt vlceræ minus sanescant, prohibeat. Quare causa ipsa, quæ cumq; illa sit, circuncidenda venit. Iã verò, vlceris omne cacoethe, hoc est malignantis naturæ, continuò & cauum sit est necesse, quũ ex erosione nascatur. Nunq; autẽ id genus vlceræ, sicuti neq; alia vlla, calido acriq; medicamento exasperes, priusq; vniuersum corpus a recrementis liberares: quemadmodum faciebat imperitissimus Thessalus. Quippe eiusmodi medicamẽta omnia, cucurbitæ ritu ad se trahere à toto corpore sunt habilia. Itaq; nisi id prius vacuaris, materiam fluxiõis acri medicamento relinques. Etenim q; nec rectẽ sanare oculum ante totum caput, neq; hoc ante totũ corpus, vlla ratione liceat, tum philosophis, tum medicis vniuersis, qui methodo mederi sunt soliti, est in cõfesso. Voco autem methodum certam quandam vniuersalemq; viam, quæ sit omnium particularium cõmunis. Cæterũ notitiã quandam habeat oportet, tum similis, tum dissimilis, qui methodo quiduis molitur. At verò, etiamsi in singulis morbis priuata quædã esse methodus medendi videatur, cõmune tamen genus in omnibus vnum existit. Quippe in omnibus curationibus, vnum est methodi ipsius principium, quod ab affectus indicatione sumitur: viaq; etiã quæ ab eo principio ad finem vsq; perducit, est in omnibus particulis similis. Quæ igitur vlceræ, omnibus ritẽ decenterq; factis, non sanantur, ea medici cacoethe, hoc ẽ, maligna, cõtumacia, rebelliaq; nuncupant. Protrahũ-

Vlcera sanescere quæ prohibeant.

Vlcera exasperanda non esse prius q̃ vniuersum corpus sit purũ.

Methodus est certa quẽdam & vniuersalis via, omnium particularium communis.

Vlcera cacoethe quæ dicantur.

tur autē, vbi quis illis, perinde ac si tantū vlcera sint, rhedetur. Cæterū ex diuturnitate ipsius vlcēis, indicatio curationis non sumitur: sed ex ipsius particulæ affectu. Si ergo tantū exulceratæ partes affectæ sint, si eas curaueris, continuò sanaueris vlcus. Sin verò vn̄uersum corpus prauo succo redundet, si hunc euacaueris, idem haud dubiè molieris. Ac signum quidem vitiosi succi, est ipsa diuturnitas vlcēis: inuentio autem eius quod expedit, non ex diuturnitate, sed ex succi vitio suggeritur. Quare tria hæc sibi mutuò cohærent: Signum, Affectio, & Curatio: Signū quidem, ipsa diuturnitas. Affectus, succi vitium. Curatio, ei⁹ vacuatio. Veteres autē, vtpote breuitatis studiosissimi, prætermisso medio, interdum teritiū statim primo subiiciūt. Veluti Hippocrates fecit, quum dixit. Tum ab inueteratis vlcēibus confert, vt asiduè sanguinem effluere facias, vtcunq; id opportunum videtur: non vtiq; curationem indicante diuturnitate, sed sanguinis vitio. Porro omne vlcus, quā vlcus est, ut sanetur, mediocriter exiccari postulat. Si verò etiam habeat secum affectum alium coniunctum, primò quidem illius curationem: secundò autem, suam propriam requirit. Sed de curatione vlcēis, sic verba fecit Hippocrates. Quodcūq; vlcus cæsum, peruersim̄ue acuto telo ē diuulsum, medicamentum enāmon, & siccans, & quod suppurari vetet, admittit. Sin caro aliqua telo tum contusa, tū cæsa sit, huic ita medendum est, vt q̄celerrimè suppuraret. Nam & minus phlegmone urgebitur, & necessum est, carnes, quæ contusæ cæsæq; sint, putrefactas & in pus versas, liquare: postea nouam carnē produci. Quò quidem sermone nos docet, oportere omnia siccari, p̄ter ea quæ sunt contusa. Porro omnia quæ putrescunt, ex calido & humido sic afficiuntur. Ideoq; etiam ea cataplasmata quæ ex hordei farina constant, ceu quæ calfaciant, humectentq; , omnibus iis affectibus, quibus

Vlcēis diuturnitas est succi vitiosi idiciū.

Vlcus omne, quā vlcus est, vt sanetur mediocriter exiccari postulat.

Putredinē oriri a calido & humido.

moueri pus expedit, admouemus. Hordei namq; farina, ex aqua & oleo: itēq; panis, ex aqua & oleo: p̄terea fomentum multæ calidæ aquæ: & tetrapharmaci uis: omnia deniq; calfacientia simul & humectantia, pus q̄ celerrimè mouent. Sciendum tamen est, admoueri cataplasma calidum atq; humidum inflāmationi, haud q̄dem tanq̄ remedium ipsius (phlegmones namq; renedia facultatē sicciorē possident, vt verbascum coctū, & folia trifolii cruda, & epipatri folia cocta, & poliū) sed vt lenimen quoddā symptomaticis. Ac proinde hordei farina, lenit quidem dolorem: minimè autē mēdetur inflāmationi. Igitur vel prauus succus nō amplius confluit ad partem exulceratam: aut etiānum fluit. Si non amplius fluat, ipsi tātūm quod laborat, est succurrendum: si quidem vel liuidum, vel nigrum, vel rubrū conspicitur, scarificando, ac sanguinē emittendo: mox spongiam sicciorē potius, q̄ humidiorē, superimponendo. Post hæc verò etiam siccantia remedia applicando. Ab his, si res postulat, rursus sanguinem auferendo, ac mox iterum eadem peragendo, donec parata sanitas sit. Quòd si labra vlcēris dura, callosaq; appareant, etiam ea excindendo. At si alicunde humor ad partem fluat, fluxionis est occurrendum origini. Si verò valens aliquis morbus, vnà cum virium robore, affligat, vel si redundantis sanguinis concursus nō adsit, nemo est qui non sanguinem detrahat, qui utiq; in artibus operibus fuerit exercitatus. Quippe sanguinis redundantia haudquaq; sanguinem esse mittendum indicat: sed magnitudo morbi vnà cum virtute vegeta: exceptis tamē à sermone pueris. Etenim si quis etianimum sanus, nec adhuc quicq; læsus, sanguinis redundantia grauetur, non statim huic mitti sanguinem est necesse: immo alii satisfacit inedia: alii cibi parcitas: alii soluta aluus, vel purgatio, vel frequentius balneum: alii sola exercitatio, vel multa frictio, abūdè fuit. Sed nec pur-

Pus mouentia
quæ sint.

Inflāmationi
cur adhibean-
tur cataplas-
mata calida et
humida.
Hordei farina
dolorem miti-
gat

Sanguinē mit-
tendum. esse
vbicunq; mā-
gnitudo mor-
bi cū viriū ro-
bore conspica-
uerit, vel si san-
guinis concus-
sus non adsit.
Sanguinis red-
undantiā nō
postulare se-
ctionem venæ.

Purgationē in sola cacoehymia nō administrari cōmode, nisi etiam magnitudo ipsius morbi eā postulet.

Vitia oīa trifariā grauiā redduntur.

Vulnera articularum euidere cacoethe.

Herpetes a bilioso extremēto oriuntur. Reuulsionē esse ad contrariā loca molientem. Deriuatio faciēda est per vicinā. Morbi magnitudinē eē scopum sanguinis mittendi, purgationisq; adhibendā.

gatio in sola vitiosi succi abundantia conuenienter administratur, nisi etiam magnitudo ipsius morbi sit ipsi cacoehymiae coniuncta. Sic enim vlceribus atq; vulneribus omnibus quoties valida sunt, purgationem esse vtilem est professus Hippocrates, q; nimirum & insigne vacuet, & ad diuersum trahat. Vniuersa autem vitia, trifariam grauiā validaq; redduntur: nempe, vel propter afflictā partis praestantiam: vel propter affectus magnitudinem: vel propterea q; sint cacoethe. Vulnus igitur quod intra thoracē, peritonaeum, ne penetret, non paruum periculum adfert: praecipue si interiorum quicq; sit simul conuulneratum. Quinetiam cacoethe statim fieri, quaecūq; in articulis accepta vulnera sunt, id quoq; omnes ferē sciunt. Vbi enim tendones, & nerui, & carne vacua, osculentaq; sunt loca, hic doloris, vigiliarum, conuulsionis, & delirii periculum instat. Tum haec igitur vulnera, tū quae adeo sunt magna, vt futuris aut ligaturis indigeant, purgationē desyderant. Adhuc, quibus periculum corrumpendi ossis impendit, ea utique non sunt absq; magnitudine phlegmones. Quaecūq; verò exeduntur, ea tū cacoethe sunt, tum malorum succorum soboles. Herpetes quoq; à bilioso excremento ortum habent: ceteraq; diuturna omnia, ex huiusmodi quapian causa proueniunt. Quare in omnibus his meritō purgare per aluū iubet Hippocrates. Si igitur valenter etiamnum fluxio irruat, reuellere ad contraria studebimus: utiq; si in superioribus vlcus consistat, per inferna purgantes: sin autem in inferioribus sit, superiorem ventrem vacuantes. At si iam fluxio restitit, atq; in membro inhaesit, deriuare per vicina magis expedit: quum & in propinqua translatio, & purganti medicamento tum accessus, tum attractus, è vicino, sit promptior. Magnitudo autem morbi, ceu scopus quidam sanguinis detrahendi, aut purgationis adhibendā, à nobis constituenda est.

Vlceri recens
expedire vt ex
eo statim fluat
sanguis.

Quem sanè scopum inuenit primus oninium Hippocrates. Secundum cuius quidem sententiam, omni recens facto vulnere, nisi in ventre consistat, expedit ex ipso statim sanguinem plus minus' ue effluere. Quippe phlegmone sic minus tentabitur, tum vlcus ipsum, tū quæ circumposita ei loca sunt. Idem etiam confirmat, debere scilicet imitatoreni esse medicum, non tantum naturæ, sed eorum etiam, quæ quum sua sponte eueniant, conferunt: necnon conducere, si ab inueteratis vlceribus eorumq; circūiacentibus partibus, crebrò sanguis fluere cogatur. Porro quæ acuti sensus pars est, eā q̄maximè seruare citra dolorem tentandum. Quæ verò parum acri sensu est prædita, hæc, si affectus ita suadet, valentiora præsidia admittit. Rursus principis quidem mēbri robur, seruari oportet. Quod tale non est, licet huic adhibere relaxantem medendi rationem. Quod verò adpositum pertinet, si ventriculus fuerit exulceratus, medicamenta bibenda sunt. Si gula (quæ transitus comestorum bibitorumq; est) nō semel, nec rota simul sumenda: sed paulatim, assidueq; lingenda, & sanè tū crassiora, tum magis lenta esse debēt. Nā ex transitu, contactuq; vulneribus quæ illic habent, emolumentum accedit: non ex cōtinendo, & diutius adhærendo: sicut iis quæ in ventriculo sunt. Quæ verò vlcera in crassis sunt intestinis, iis quæ per sedem iniiciunt remediis, magis egent: quippe cui magis sunt propinqua. Quæ in tenuibus habentur (quoniam & longinquiora sunt, & medio situ posita)ambo requirunt: & quæ supernè sumuntur, & quæ infunduntur per sedē. Communis autem omnium internarum partium est indicatio, vt ea eligantur, quæ animalis naturæ maxime sint familiaria: siue cibi sint: siue medicamenta: fugiantur, respuanturq; his contraria. Quanq̄ in iis quæ foris sunt vlceribus, innoxius etiam taliū medicamentorū sit vsus, æruginis, æris vsti, æris squamæ, cadmiæ,

Gulæ exulceratæ medica-
mēta esse paulatim, assidue-
q; lingenda.

Intestinis exulceratis quō
succurrēdum.

Intro quæ pro
pitanda non
sint.

pompholygis, lithargyri, atq; cerussæ. Hæc igitur & similia, interioribus exhiberi non debent. Eligenda verò alimenta sunt, si quidem ad cicatricem perducere, aut ulcus glutinare studemus, tum austera, tum glutinosa, & quæ minimè rodant. Sin emundare, quæ modicè abstergeant: quod munus mel non coctum, præter cætera præstat. Ac voco sanè austera, id quod astringens dicitur: vt acerbum, quod impense est austerrum.

Mel crudum.

Austerrū quid.

Accidū quid.

Vlceribus internarum partium q̄ proficiunt medicamenta.

Ergo internis vlceribus opitulantur, hypocistis, balauftium, punicorum cytin, galla, malicorium, terra Samia, Lemnium sigillum, rhois, rosarum succus, acacia, aliaq; id genus, quæ citra incōmodum viscerum, præsidium internis visceribus afferunt. Danda verò hæc sunt, ex aliquo astringentiū decocto: vel mali cotonei, vel lentisci, vel clauiculorum rubi, vitis ue, vel myrtorum, vel deniq; ex vino aliquo austro. Cauendum tamē à vino est, vbi phlegmones suspicio adest.

Vinum fugiendum esse, vbi phlegmones suspicio adest.

Sunt autem & præparanda id genus medicamenta, cæcisq; miscenda etiam, tum tragacantha, tum gummi: præsertim si ob gulæ vlcera exhibeantur. Sed & gargarizare quoq; iubendus est, qui ad fauces & parihisia his vtetur. Ad vlens autem, quod in aspera sit arteria, vt supinus q̄ diutissimè in ore teneat, ac omnes qui illic sunt musculos laxet, remittatq; præcipiendum. In finit namq; sic sensim & paulatim de medicamento aliquid sensibilibiter & manifestè in ipsam arteriam. Nam

Asperæ arteriæ vlceribus quæ ratione mededum sit.

& quū naturaliter sese habet, scire licet potionis non nihil illuc percolari. Semper autem cauendū est, ne largius quicq; & per mediam spiritus viam, insinuat: alioq; excitabit tussim. Iam verò medicamentis omnibus, quæ thoracis & pulmonis vlcerib⁹ sunt destinata, mel admiscendum est. Quod quidem digestionis eorum in corpus, ac celeris trāsitus, veluti vehiculum erit, cum eo, q̄ neq; nocebit vlceri. Ad eundem modum, quoties in vesica & renibus consistit vitium, non solū mel

Potionis non nihil semp in asperam delabi arteriam.

Mel permiscendum esse medicamentis, quæ thoracis pulmonisq; vlceribus insinuantur.

ipsum, sed etiam diureticorum aliquod, vlcera medicamentis miscere oportet. Cæterum partes exulceratæ, tum ex earum substantia, tum functione, tum utilitate, tum positu, tum figura, faciliè discernuntur. Ita quæ non modò illa quæ diximus, sed etiam complura alia, ex figura partium, posituraque indicantur. Etenim cathetere omnino probè uti nequeas, nisi & positum, & figuram totius vesicæ planè perspectam habeas. Ergo in hisce omnibus nò parum ad totam curationem locus affectus indicat. Porro valentiora medicamenta requirunt, affectus in alto delitescètes corpore, quàm qui in summa superficie consistunt. Ecchymosis omnis, vacuatio nem pro curationis remedio indicat. Quare calfacientibus huic, & modicè siccantibus medicamentis est opus. Quòd si ecchymosis altius descendat, non fuerit usus cucurbitulæ inutilis. Quod quidem instrumentum fuit à medicis, ad violentam attractionem, excogitatum. Ergo si euocatum celeriter ecchymoma sit, faciliè coalescet rupta ipsa caro. Sin longiore spatio, sordes multa subnascens, medium inter vlcera labra spatium occupat, ita ut iam coire ruptio non possit, sed tantum ipsa labra prope admoucantur.

Diureticorum aliquod, melque ipsum miscendum esse medicamentis quæ ad vesicam & renes faciunt exulceratos.

Affectus in alto sitos, valentiora medicamenta requirere, quàm qui in summa superficie consistunt. Ecchymosis curationis. Cucurbitulæ usus.

GALENI PERGA

MENI DE METHODO

MEDENDI. LIB. V.



ONSTRATVM igitur est, omne vlcus siccantia medicamenta requirere. Cæterum quod sinum habet, ut minus sanè quàm reliqua, sic ea quæ præter quæ modicè siccant, etiam abstergendi facultatem possideant, desyde

Vlcus causâ modo dice siccantia necnon detergentia postulat.

Glutinantia
medicamenta
qualia nā esse
debeant.
Cicatricē indu
centia medica
menta qualia
esse oporteat.
Excrefcens ca
ro qualia re
quirat medica
menta.

rare. Quod verò coniungi sibi labra postulat (cuius
modi sunt cruenta) huic tum quæ magis etiam siccet:
tum quæ citra abstersionē leuiter astringant esse opus.
Iam, quæ vlcera perducī ad cicatricem postulāt, hæc,
non solum magis adhuc siccantibus, sed etiam strenuē
astringentibus remediis egere. Quòd si caro eorum p
ter naturæ modum intumuit, acria & demolientia de
syderare. Si quod verò aliud symptoma vlceri adiun
ctum erat, ab eius natura curationis indicatio sumeba
tur: atq; ex hac rursus petebatur remediorū facultas.
Si nanq; sordes innasceretur, quæ hanc tollerēt opus
esse: eaq; omnia abstergendi vim habere, multo sanè
maiores, q̃ ea quæ carne implerent. Ac si agglutina
turum medicamentum esset, siccans, astringensq; id
esse debere. Si carne impleturū, siccans, & abstergens:
atq; in singulis reliquorum, vti dictum est. Si verò intē
perata subiecta caro esset, primum per contrariā suc
currendum esse illius intemperantiæ. Nihil siquidem
redire ad propriam naturā potest, sine iis quæ ipsi fa
cultatē habent contrariam. Considerandas præterea
esse & ipsius intemperantiæ causas: ac primum quidē
medendum esse causæ quæ adhuc intemperiem foue
ret: post hanc verò, & ipsi, quæ iam facta esset, intēpe
rantia. Ostendimus autē, tum ab ulcerū differentiis
diuersas indicationes p̃beri: tū eas quæ à laborātis cor
poris tēperamento sumuntur, diuersam ab his habere
rationem. Siquidem illæ, quū ex iis, quæ sunt præter
naturam, sumuntur, oēs cōtraria esse adhibēda dictāt:
hæ, quum ab ipsa natura capiuntur, similia. Nec illud
omissimus, ex præcellētia membri, aut contrario sta
tu, itemq; ex sensu acri, hebetē ue, diuersum medican
di consiliū peti. Quum autem non modò in similari
bus, sed etiam in organicis partibus solutio continui
oriatur, remediorum indicationes, aliæ quidem à simi
laribus, aliæ ab instrumentalibus desumuntur. Cæterū
quandoquidem

Indicationes a
laborantis tem
perie sumptas
diuersam habere
rationem il
lis, quæ ab vl
cerum differē
tiis sumuntur.

quādoquidem satis superq; de iis vlceribus quæ in car-
 nosis accidunt partibus differuimus, tempestiuum vi-
 detur nunc de illis agere, quæ in arteria, vena, & neruo
 contingunt. Ergo si cui arteria, vena, ue magna sit vul-
 nerata, copiosum sanguinis profluuium subito super-
 uenit, & glutinari id vulnus difficile quidem in vena po-
 test: in arteria autem (sicuti nonnullis medicorum est
 visum) fortasse omnino non potest. Sanè profuit ex
 vena aut arteria sanguis, aut reserato earum ore, aut
 tunica earum diuisa, aut transcolatus, siue sudoris istar
 transfusus. Porro diuiditur ipsa tunica aut vulnerata,
 aut contusa, aut rupta, aut erosa. Anastomosis (hoc est
 reseratio) accidit, propter tum vasis imbecillitatem,
 tum sanguinis qui ad os eius impetu ruat, copiam: ad
 hæc, acrem quāpiam, quæ illic extrinsecus icidat, qua-
 litatem. Diapedesis verò, ex tunica rarefacta, & atte-
 nuato sanguine oritur. Accidere tamen potest, & ob
 gracilium vasorum os adaperitum. Quæ igitur vulne-
 rant, ea sunt acuta, atq; ad secūdū habilia. Quæ contū-
 dendo solunt, dura, grauiq; existunt. Quæ rumpūt,
 omnia tensionis interuentu id faciunt. Idem & inten-
 sior actiōis vehemētia facit: tum plenitudo illa quæ re-
 spectu vasorum dicitur: tum casus ab alto: necnō gra-
 ue quippiam durumq; incidēs. Ac si ex vulnere, vel cla-
 more, vel casu, vel contusione, perruptū vas sit, utiq;
 in iis, causa ipsa desit. Si verò ex abundantia, fieri po-
 test vt vas etiam amplius rumpatur, effectrice saltem
 etiamnum causa manente. Quare in tali affectu, q̄pri-
 mum est ipsa plenitudo vacuanda: dein, supprimēdus
 sanguis: ac demum vlcus curandū. Vbi verò effectrix
 causa iam desit, primò quidam sanguis sistendus est:
 ac mox vlcus sanandum: idq; obturato perrupto ua-
 se, translatoq; aliorum quod per id ferebatur. Porro,
 vlcus ipsum claudetur, vel labris eius, quæ disfidēt, in
 idem adductis, vel osculo ipsi^o obstructo. Adducunt in

Sanguis qua-
 tuor modis, et
 fluere a vasis
 potest.

Anastomosis
 vasorum vnde
 accidat.

Diapedesis
 causæ.

Uendum arte
ix aut venæ
vulnus nō esse
as apertum
bstrui quoru.
liciter possit.

anguinem de
uari ad vici-
a, & reuelli
d contraria.

Menses reuelli
rsum, admo-
a cucurbitula
mammiis.

anguinem ex
extra nare
uentem sup-
rimi, admo-
a cucurbitula
hepati: ex sini-
ra autē sieni.
anguine per
nares fluente,
quando & qua
is secanda sit
vena.

Deriuandi mo-
di diuersi.

idem labra, tum nostrarum manuum opera, ubi sic ad manus ulcus se exhibet: tum per deligaturam: tum per refrigerantia, astringentiaq; remedia. Neq; enim sue-
re fas est, arteriæ uenæ uel vulnus. Obstructæ uasis oscu-
lum & sanguine ipso concreto, & iis, quæ foris illi ad-
mouentur emplastris, linimentisq; , necnon igne, &
medicamentis inducentibus crustam. Potest etiam su-
perimponi ulceri circūiacens caro, atq; ipsa in nonnul-
lis uulneribus cutis. Auertitur autem sanguis, tum ad
proxima deriuatus: tum ad cōtraria reuulsus. Deriua-
tio ad uicina loca fit, quum id quod per palatū uacua-
tur, deriuatur per nares: reuulsio autem ad contraria,
quum ad inferna reuellitur. Rursus, quod per sedem
profluit, id deriuamus per uuluam, sursum uerò reuel-
limus. Ita namq; & natura ipsa facere solet. Mulieri enī
(inquit Hippocrates) sanguinem uomenti, menses su-
peruenientes remedio sunt. Hac de causa, si uel men-
ses confertim eruperint, uel sanguis ab utero quoquo-
modo profluxerit, sursum reuelles, cucurbitam maxi-
mam suffigens mammiis. Eandem ob causam, si ex do-
extra quidem nare profluat sanguis, eum retinet maxi-
ma cucurbitula hepatis admota: Si ex sinistra autem, lie-
ni. Queniammodum si per utranq; fluat, utriq; uiscerū
cucurbitulæ applicandæ sunt. Quod si resolutus adhuc
æger non sit, etiam uena ex eodem cubito incidenda
est, qui profusioni è directo responderet. Cæterum
ubi paulum detraxeris, mox unam horam intermit-
tens, rursus detrahes: post iterum, atq; iterum, pro la-
borantis uiribus. Ad eūdem modum, quæ per aluum,
fluunt, ea uel per urinas, uel per uterū deriuabis: quæ
per urinas, ea uel per uterum, uel per sedem transfe-
res. Pari modo, quæ per uterum erumpunt, uel per uri-
nas, uel per aluum. Quæ uerò in oculis, aure, uel pala-
to, fluxiones accidunt, earum ad uicina deriuatio per
nares est. At reuulsio in iis quæ supra sunt omnibus,

deorsum semper agitur: sursum in iis quæ sunt infra. *Reuellendi rō.*
 Præterea à dextris ad sinistra: sicuti ab his rursus ad
 illa. Similiter ex iis quæ intus habentur, ad ea quæ fo-
 ris sunt: contraq; ab his, ad illa. Ergo & frictio contra- *Frictio.*
 positæ partis, potissimum per ea medicamenta quæ *Vincula.*
 calfaciant: præterea vincula arctiora, iis quæ ad cōtra-
 rium reuocant remedijs annumeranda sunt. Non secus
 profectò, & naturalium meatuum qui positi ex aduer-
 so sunt, reclusio. Porro vinculum ipsi profluentibus
 vasis injectum, fluentem sanguinem sistit: nostriq; simi-
 liter digiti appositi: atq; adeo dissidentium vulneris la-
 brorum ligatio, quam epidesim vocant. Situs autem *Epidesis.*
 particulæ vulneratæ sit talis, vt & spectet sursum, & *Vulneratæ par-*
 ipsam indolentem conseruet. Si vas vnde sanguis pro- *ticulæ situs.*
 fluit, altius demissum sit, vñco attollendum est, modi- *Sanguis profluens*
 ceq; in torquendum. Quod si ne tunc quidem sistatur, *ex vasis demis-*
 ipsumq; vas vena fuerit, suppressendus est cataplasma *sis altius, quò*
 tis quæ ex frixa resina, & farinæ triticeæ tenuissimo *suppressendus.*
 polline, & gypso, alijsq; id genus confecta sunt. Sin sit
 arteria, aut vinculo amplectens, aut totum vas præci-
 dens, profluuium sistes. Sed vinculū etiam iniicere ma-
 gnis venis compellimur: interdumq; transuersim co-
 tas præcidere: vbi rectè ex profundissimo loco assur-
 gunt, ac præsertim per angustias quasdā, vel per prin-
 cipes partes. Tutius tamen est vtruncq; moliri: & vincu-
 lum vasis radici iniicere: & quod deinceps habetur, præci-
 dere. Vasis radicem voco priorem eius partem, quæ
 vel iecinori est propior: vel cordi. His peractis implē-
 dum carne vuln^o est, prius q̃ vinculum à vase decidar.
 Itaq; sistendo sanguini lōgè sunt commodiora empla-
 stica, q̃ inducentia crustas: quandoquidem in his est ve-
 rendum, ne vbi crusta deciderit, rursus sanguinis pro-
 fusio ab ipso vase exciteretur, quū vas magis nudatum
 carne, q̃ pro ipsius naturali habitu derelinquat. Siquidē
 generatio crustæ, ex subiectis fit, circūpositisq; corpo-

Sanguini sup-
primendo cur
emplastica sint
aptiora crustis.

ribus semiustis. Optimum igitur omnium quæ novi me-
dicamentorum, quo etiam ad cerebri membranarum
necnon sphagitidum venarum hæmorrhagias tutissi-
mè utemur, est quod subiiciam. *℞. Thuris partem. j.
Aloes partē. S.* Misceantur ita cum oui candido, ut per-
ueniant ad crassitudinē mellis. Postea verò leporis mol-
lissimis pilis excepta, tum vasi, tum vniuerso vlceri,
liberaliter admoveatur. Alligandū autem id forinsec,
fascia est ex tenui linteo. Cuius fasciæ primi quatuor
quinq; ve amplexus, ipsi profluenti vasi iniiciuntur:
ducenturq; mox versus eius radicem: nisi in quibus
partibus id non licet: ut in cerebri inuolucris. His
factis, ubi tertio die solueris, si tutò adhuc medicamen-
tū adhæret, aliud rursus superimpones, deligabisq;
ut antea, similiter. Quòd si prius linamentum decide-
rit, impones alterum, ac sic, quoad carne munietur, cu-
randum ipsum vas est: necnò, à principio ad finē vsq;
vulnerata particula, mediocriter supina seruanda. Vi-
tādum autem est ne dolor incidat, ac rursus profluuiū
excitet: quum nihil sit, quod profluuium magis q̃ do-
lor proritet, & phlegmonas augeat. Iam manna thu-
ris magis q̃ thus estringit: est autem minus emplastica.
Constat verò in duris corporibus plus aloes immiscē-
dum esse prædicto medicamento: in mollibus autem,
plus thuris. Cæterum ubi medicamentū id facere ma-
gis emplasticum optas, deligere thus resinosius opor-
tet: quod quidē & mollius est, & candidius: mansumq;
non cōminuitur, sed partes suas sibi co hærentes tuet,
ut mastiche. Maximam autem necessitatem vel crusti-
ficis medicamentis, vel ignitis ferramentis utendi ad-
nerti, ubi ex erosionē putrescētis alicuius, profluuium
sanguinis excitat: ut i pudēdis & sede: quæ pres, & pp
naturale humiditatē, & excrementorū canales sint,
ex leui occasione putrescunt. Vbi igitur totum quod
iam computruit sublatum fuerit, tūc in hisce opus est,

Sanguini sup-
primendo op-
timum cata-
plasma.

Dolor, omniū
maxime tum
ipsum proflu-
uium excitat,
cum phlegmo-
nas augeat.
Māna thuris.
Thus.
Mastiche,

Cauteris, cau-
sticisq; in qui-
bus cogamur
viti.

radicē ipsam exurere, idq; aut ferro candenti, aut me-
dicamentis excitantibus crustari: sed quæ etiam facul-
tatē astringendi possideant, qualis in chalcitide, &
myfi, & atramento sutorio visitur. Porro quæ ex cal-
ce non extincta conficiuntur, ea utiq; valentiora his
sunt: cæterum calx vim astringendi non habet. Exci-
dunt igitur citius quæ ab his fiunt crustæ: hærent autē
diutius, quæ ab astringētibus: quod utiq; longè est uti-
lius. Quare nec festinare quidem debemus ad amolien-
das crustas, ubi hæmorrhagias periculum adest, nisi in
illis tantum affectibus depalcētibus, in quibus propter
putredinem, candens ferrum admouere corpori fui-
mus coacti. Porro qui è vasis profuit sanguis, aut pro-
pterea q̃ amplius non cōsuet, sistetur: aut quia occlū-
sa diuisio erit: aut etiam ob vtrancq; causam: id quod tu-
tissimum fuerit. At confluere prohibetur, & propter
deliquium animi, & quum ad contraria reuellitur, &
quum deriuatur ad proxima: & per refrigerationem;
tum corporis toti⁹, tum præcipuē partis affectæ. Hæc
etiam ratio, frigida tum pota, tum parti foris affusa,
sæpe hæmorrhagias supprescit. Idem etiam moliūtur;
& posca, & vinum acerbum, aliq; oīa quæ vel astring-
endi, vel simpliciter refrigerandi vini habent. Clau-
ditur ipsa diuisio, si vel contrahatur conniueatq; id qđ
diuisum est: vel obstruatur. Sanè contrahitur tum astring-
itione, tum refrigeratione, tum deligatura, tum vin-
culo exceptum. Obstruitur vel intrinsecus, vel extrin-
secus. Et intrinsecus quidem, à concreto sanguine. Ex-
trinsecus verò, tum ab hoc ipso: tum à linamento, &
spongiis, & crustis, & medicamentis iis, quæ lentitia,
erasiticiq; sua, meatus obserant: adhæc, corporibus
iis quæ circuniacent, propius admotis. Atq; hætenus
de profluuiis sanguinis, quæ à partibus expositis sen-
sui oriuntur. Nam quæ de profundo sanguinis proflu-
uia exumpunt, ea nec vinculo nec deligatura sanantur.

Adurentia &
mul & astringen-
gentia, q̃ sunt.

Crustas a cau-
sticis astringen-
tibus excita-
tas, hærere diu-
tius viceri.

Refrigeratio
totius corporis
& particulæ af-
fectæ, fluentem
sanguinem sup-
primis.

Sanguinis pro-
fluentis ex pro-
fundo etumpē-
tibus qua ra-
tione occurren-
dum sit.

Plantaginis suc-
cus remedium
optimum est
sanguinis effu-
sionibus.

Astringentia
medicamēta.

ris, veluti neq; candenti ferro: sed per reuulsionem, ac ad vicina loca deriuationem: necnon per cibū, atq; potionem, quæ & emplasticā vim sortiantur refrigerentq;: necnon per medicamenta astringentia. Pro differentia autem & proprietate partium quæ profluentium patiuntur, variis vtimur instrumentis. Siquidem per clysterem, in intestina: per metrenchytas in vterū: In vesicam deniq; per catheteras, idoneorum aliquod medicamentorum immittimus. Equidem quaternis diebus vidi sanguinem ē vulua profluere, nec potuisse vllō remedio sisti, quoad quarto die plantaginis succo vtentibus nobis, prorsus constiterit. Est quippe hoc medicamen & ad ea quæ ex erosione excitantur profluentia sanguinis vtilissimum. Cui etiam valentius aliqd hoc casu medicamentū, aliās aliud miscere soleo: vtiq; ad totum respiciens affectum, id quod perpetuū est faciēdum. Etenim in his ipsis quæ ex vulua, vesica, & intestinis profluentia oriuntur, æstimari debet ipsius profusionis quantitas: vt videlicet hanc ipsām, vel vt primam, vel vt secundam indicationem curatiōis habeamus: nec tamen negligentes affectum. Nam si perruptum vas aliquod magnum est, aut vehementer reclusum hiat, vtq; astringentibus medicamentis est opus, veluti balauustio, hypocistide, rhoē, omphacio, acacia, gallis immaturis, & malicorio. Sin vel exiguum vas ē, quod perruptum est, vel modicē reueratum, sic vt non multus sit ex eo sanguis profluens, etiam aloē, & manna, & pini cortex, & lemnium sigillum, & spinæ Aegyptiæ fructus, & crocum, & lapis hæmeatites, aliaq; id genus, ex vino nigro austero, vtilia medicamēta sunt. Quōd si nec genus id vini adsit, nec plantago, nec solanum (quippe hæc quoq; sunt idonea) rubi, & cynobati, & myrti, & lentisci, & hederæ, & cotoneorum, & mespilorum, breuiterq; astringentium omnium decoctum ex usu est. At si ex erosionē profluentū aliquod

Incidit, erit utiq; id exiguum, atq; paulatim effluens, Quare Passionis, uel Andronis, uel Polyide pastillis utendum est: aut etiam nostro qui ex charta cōstat. Sin profusior hæmorrhagia sit, iis quæ uehementissimè astringant utendum medicamentis, quoad uehemens eius frangatur impetus. Mox deinde admiscēdi illis pastilli sunt: postea ad ipsos solos ueniendum, cum aliquo ex ante dictis succis, aut decoctis. At uerò, quæ extrinsecus profluenti particulæ admonentur, cum astringentia, cum citra astrictione uel frigida, hæc ipse non ubiq; probō. Sed mihi contra omnino q̄ fieri res postulat, ipsum sanguinem intrò compellere, ac uenas quæ in alto sunt implere, uidentur. Vidimus enim quosdam eorum, qui sanguinem à pulmone reiicerent, ex thorace refrigerato manifestè læsos: æquè ut qui sanguinem vomuerunt nonnullos, q̄ uenter esset foris refrigeratus. Eodem modo & eorum quibus ex narib⁹ sanguis profluxit, aliqui ex capitis refrigeratione, deterius habuerunt. Quare nec omnino, nec sine discrimine, nec omni tempore loca quæ circa particulam, vnde sanguis profluit sunt sita, refrigeranda suaserim: sed postea q̄ in alia diuerteris: ut exempli gratia, in naso, vbi sanguinis missione usus fueris, uel artuum frictione, deuinctione q̄; uel ad præcordia cucurbitis defixis. Quin ne sic quidem ad frontem caput q̄; refrigerantibus utendum est illico, sed reuellendum prius ad contraria: utiq; affixa in summa ceruice cucurbita. Quippe duplex est in sanguinis è naribus profusione auersio: & quæ est ad totius corporis inferna: & quæ ad capitis posteriora. Propterea uidelicet q̄ ipsæ nares & in superiore, & in anteriore parte sunt sitæ. Iam uerò sanguinis effusio diapedesis dicta, refrigerantibus & astringentibus est curanda: necnon victu crassiori, si ob tenuitatem sanguinis accadat. Porro qd̄ uenæ insedit vlcus, si ad manum est, eandem curationem cum iis desyde

Pastilli diuersi contra profusum uia sanguis ex erotione oborta

Astringētium simul & refrigerantiū, quæ ad supprimendum sanguinē applicantur extrinsecus, non ubiq; probat vsum Galen.

Refrigerantibus quādo circa partē vnde fluit sanguis utendum.

Cucurbitam summæ cervici affixam, reuellerē à naribus sanguinem. Sanguinis fluxus per nares, reuulsio duplex. Diapedesis quomodo sit curanda.

*Dura omnia
egre consoli-
descere.*

*Vero tempo-
re sanguinem
mittere, græcis
etiam erat cō-
suetum.*

*Vesica pro cly-
stere Galenus
vitiur.*

*Lemnia terra.
Romā esse ma-
xime obnox-
iam fluxionib⁹
Pulmonis vice
ra cur diffici-
liora sanatu
sunt.*

rat, quæ in carne consistunt. Enimuero quemadmodū dura omnia ægrè consolidescunt (chartilago enim cū chartilagine per coitionem haud coalescit, sicuti nec os cum osse, sed per callum tantū coniungitur) sic etiam solutæ arteriæ, cum difficultate ob substantiæ duritiem coalescunt : & si eas aliquando cōglutinari uiderimus: idq; in mulieribus atq; pueris, tum circa frontem, tum circa malleolum, carpumq; , ac medium extremæ manus. Simile quiddam aliquando & agresti cōtigit iuueni, dum sanguinem sibi mittendum verno curaret tempore, quod nostratibus est maximè i vsu. Illi siquidem prò vena fuit secta arteria in cubito, quā postea nos ipsi conglutinauimus. Est autem sanatu difficilior arteria incisa q̄ uena, tantoq; siccioribus medicamentis eget, quanto ipsa est suapte natura q̄ illa, siccioris temperamenti. Cætera uerò, eiusdem speciei ambæ medicamenta desyderant. Porro ad ea quæ in recto intestino sunt ulcera, per uesicam, cui sit fistula recta ad finem annexa, iniicere liquatum medicamen, atq; tepidum, licet. Cæterū sicca medicamenta magis sunt idonea, q̄ quæ liquabilia uocantur: quoniam facile uel plātaginis, uel alterius eius generis succo, miscentur. Eiusmodi medicamenta sunt, & crocum, & pompholyx, & aloe, & quæ dicuntur cephalica. In ipso autem primo producendæ carnis tempore, quod suppressione sanguinis continenter excipit, etiam lemnia terra salutare est præsidium. At quæ pulmoni adhæserunt ulcera (cuiusmodi sæpe i urbe Roma uisuntur, loco profectò maximè obnoxio fluxionibus) difficiliora curatu existunt, ob assiduam ipsius visceris agitationem. Quod quidem laxum & spōgiosum quum sit, minimè etiam mirari conuenit, si sanguis aut pus in thorace cōtentum, aliquando per membranam illius transmittatur ad arteriam asperam: quandoquidem per aliam longè duriorem in ossiū fracturis effunditur sanguis cras-

sus ad calli generationem. Vbi igitur vel ex casu, uel
 præualida acutaq; voce uas aliqd i pulmone rūpitur,
 citraq; dolorem confertim sanguis feruens, floridus,
 multusq; cum tussi expuitur, scire licet, in viscere vul-
 nus consistere. Itaq; laboranti iniungēdum est, ut nec
 respiret uehementer, ac semper silentium agat. Præte-
 rea uena cubiti interna, proxius incidenda: a qua bis
 terq; postea sanguis est detrahendus: utique auertendi
 gratia: tum artus omnes fricandi, uinciendiq;. His per-
 actis, primum posca tum diluta, tum tepida, potui offe-
 renda est, quo si quis in viscere cruor cōcretus latitet,
 solutus expuatur. Atq; hoc nihil uetat bis ter ue ternis
 horis facere. Ab iis uerò etiam aliquod eorum quæ tū
 emplasticā uim hñt, tū astringunt, medicamētū ē exhi-
 bēdū: idq; aut ex posca diluta primūm, aut ex maloꝝ,
 myrtorum uel decocto. Rursusq; uesperī medicamen-
 hoc similiter dandum: circunciso (si ualētior sit æger)
 omni nutrimento. Sin aliter, sorbitionis quod satis est
 exhibendum. Maximè uerò ad rem pertinebit, si etiā
 postero die (modò æger robustus sit) parum sangui-
 nis rursus ab incisa iam uena detrahas. Victu autem,
 medicamentisq; eodem modo in quartum usq; diem
 utatur: pectore iterim, si æstas sit, undiq; melino & ro-
 saceo, in adfecto: sin hyems, nardino unguento. Iuue-
 rit etiam uel maximè, nō modò ad uulnus pulmonis,
 sed ad alia omnia, illud medicamē emplasticum, quod
 ex bitumine, acetoq; & aliis quæ illi misceri solent, cō-
 stat. Quòd si mulieri, puero uel, aut corpori quod mol-
 lis sit carnis, medearis, quod ex chalcitide sit, satis habi-
 le medicamētum fuerit. Cæterum si rupturæ uasis suc-
 cesserit inflāmatio, exigua spes est cōglutinādi ipsius:
 quandoquidem inflammationis solutæ pus, expurgari
 sine tussi nō potest, quæ maximè rupturæ aduersatur:
 in longius tamen tempus produci ipse affectus potest.
 At septi transuersi uulnera, quæ foras non perueniūt,

Pulmonis exul-
cerati indicia.

Hæmoptoici
morbi curatio.

Posca dissoluūt
grumos.

Sanguinem ex
punctibus re-
petendam esse
missionem san-
guinis.

Pulmonis vasi
disrupto si in-
flammatiō suc-
cesserit, cur af-
fectus nequeat
consolidari.

in carnosis quidem partibus subinde uisa sunt coalescere, eius motu minimè obstante. Quæ in nervosis eius hærent, insanabilia sunt. Sanè difficilis grauisq; curatio est, etiam eorum quæ in carnosis sunt partibus, si has iam phlegmone obsederit, id q; nō in diaphragmate solū, uerū etiam in omnibus quæ intra peritonæum ambiuntur: quod in ea scilicet sanies defluat. Danda tamen opera est, ut illa quacūq; ratione sicce mus, tum per ea præsidia quæ extrinsecus imponuntur: tum per ea, quæ ex aqua, uinū tēnui bibuntur. Horum maximè idonea sunt, quæ diaspermation vocant: & quod ex assia componitur. Immutatur autē plurimum ipsa curatio ulcerum, per singulas animalis partes. Indicat siquidem, ueluti uicium ipsum, ut curetur, sibi applicandū esse contrariū: sic particula quæq;, quod sibi sit q̄ simillimum. Quamobrem, aurium ulcerā, quum eæ partes longè siccissimæ sint, glaucio ex aceto curantur: necnon (si ualentiore sit opus) medicamine Andronio, scoriaq; ferri in pollinem tenuissimū læuigata, & cum acerrimo aceto, quousque ad lubrici mellis consistentiam deueniat, coacta. Porro quod tetrapharmacum dicitur, siccare ulcera id genus prorsus nō potest: at maturare phlegmonem potest, augereq; affectæ partis putredinem. Itaq; audiendi locus, quoniā siccissimus est, ideo medicamentis eget, quæ uehementissimè siccent. At oculo exulcerato, collyriū fortasse quod ex thure conficitur, expedit: naribus uerò, quod multo sanè magis siccet, q̄ ut conueniat oculis: niū autem, q̄ ut auri quadret. Vlcera uerò quæ in ore accidunt, quæcūq; admodum humida existūt, præsertim si proximè adhærent ossibus, ea medicamentis egent, quæ uehementer siccent: ueluti diphryge, tū ipso per se, tum ex melle, & uino, & mulso: præterea & ea quæ iris dicitur, & quæ anthera: hisq; uel siccis, uel ex melle, uel mulso, uel uino. Vtile uerò ad talia est

Vlcerū curatio
nem immutari
plurimū p̄ sin-
gulas animalis
partes.

Aurium ulcera
quibus medi-
camentis cu-
rantur.

Tetrapharma-
cū coquit phle-
gmonem, au-
getq; affectæ
partis putredi-
nem

Oculi ulcera
qualia medica-
menta postulat

Nasi ulcera
qualia medica-
menta postulat.
Oris ulcera q̄
medicamenta
requirant.

& Musæ medicamentū, præterea rhois succus, & omphacium, aliaq; strenuè siccantia. At quæ simpliciora oris ulcera sunt, hæc sanare commodè possunt etiam medicamenta quæ modicè siccant: ueluti quod ex moris conficitur: & quod ex rubi fructu: & quod ex succo corticis iugladium uiridis, atq; etiam his magis, quod ex musto & cupressi sphaerulis constat. In uniuersum autem, genus quidem medicamenti, ab ipsa curandarum partium substantia, & affectu est sumendum: utendi uerò modus, à figura, & situ. Siquidem quæ in uentriculo, pectore, & pulmone ulcera constiterunt, per ea quæ eduntur, bibunturq; curanda sunt. Quæ uerò in intestinis, bifariam. Nam quæ vicina uentriculo sunt, his per comesta bibitaq; succurritur. Quæ uerò inferius sunt sita, per ea quæ iniiciuntur. Quippe neq; ad ea quæ vicina uentriculo sunt, subire potest quod per sedem infunditur: nec integris viribus ad inferiora pertingere, quod per os sit ingestum. Quamobrem thoracis atq; pulmonis ulcera, tum difficilius iis quæ in uentriculo sunt, sanantur, ut quorum situs longius absit, atq; ideo medicamentorum vis remittatur: tū propter hoc ipsum multo ualentiora ea quæ deuorentur præsidia requirunt, q̄ si ipsis statim ulceribus adnouerentur. Quod igitur pulmonis atq; thoracis ulcera expurgentur per tussim: uentriculi autem per vomitum & deiectionem, id, ob ipsarum partium contingit formam. Cæterū qui è uentriculo eluere pus uolunt, non sine periculo vomitum prouocant, sicuti si aliter infixam illi pituitam per oxyneli & radiculam detergerent. Tutius itaq; est deiectione uti: quum vomenti periculum sit, ne & quod exulceratum è dilaceret, & succum quempiam inutilem ex vicinis attrahat. Porro si in pulmone ruptum vas sit, scire licet, nisi protinus, ante q̄ excitetur phlegmone, glutinetur, id postea insanabile fore. At ulcere interioris tunicæ asperæ arteriæ, &

Diamorō otis
ulceribus com
modum.

Medicamen
genus a substā
tia partis affe
ctæ, & ab affe
ctu ē sumēdū.

Utendi modus
a figura & a si
tu sumitur.

Intestinarū vl
ceribus, quæ ra
tione mēden
dum sit.

Clysmos non
posse perueni
re ad intestina
uentriculo pro
xima.

Thoracis atq;
pulmonis vlce
ra, ualentiora
præsidia requi
tere q̄. si. ipsis
statim ulcerib⁹
adnoueretur.

Ventriculi exul
cerati pus, tu
tius expurgari
deiectione, q̄
vomitu.

Pulmonis vas
ruptum, q̄ si sit
insanabile.

Asperæ arte-
rix vicerū me-
dicatio.

Tabiari lac.

Lac bubulum.

Lac asininū.

Lac caprillum

Lac muliebre

tabidisse ma-

xime congruū.

Lac asinæ ani-

mali, statimq̃

mulctum, bibē-

dum esse.

Lacū quando

sal & mel ini-

ciendum.

Sanguinis reie-

ctiois a catar-

rhoprodeuntis

curatio.

Theriaces qua-
drimestris fa-
cultas.

præcipuè laryngis, curationem sanè recipiunt, per me-
dicamenta humida quidem, sed facultate exiccantia;
quæ retinentur ore, paulatiniq̃ per fauces defluunt,
idq̃ agro iacente supino. Lac etiā, ad talia vlcera vni-
cè commendatur, sed præcipuè quod Tabiis habetur:
quum nimirum illic locus sit satis æditus, & aer circum-
datus siccus: & pascuum pecoribus salubre. Lieebit au-
tem tibi similem locum etiam arte parare, inserereq̃
in eo agrostim, lotum, polygonum, melyssophyllum,
lentiseum, arbutum, rubum, hederam, cytisum, & alia
id genus. Iam verò, lac bubulum, crassum natura est:
asininum, tenue: caprillum deniq̃, mediam consisten-
tiam sortitur. Verum muliebre lac tabidis auxiliatur
eximiè, quum naturæ humanæ sit admodum familia-
re. Hoc tamen de lactis vñ sit maximum, & commu-
ne præceptū, vt it quibus eo est opus, omnino id asan-
te animali statim mulctum ebibant: etiam melle inie-
cto, si cui cogi in ventriculo solet: nec non sale, si ipsum
citius ad aluum descendere cupis. Quod verò ad san-
guinis reiectionem ex catarrho ortam pertinet, quum
olim accersitus fuisset ad splendidam quandam matro-
nam Romanā, tali affectu prehensam, incidere illi ve-
nam non placuit: quādoquidem iam quatrimum sine
cibo egerat propter catarrhum: sed iussi vt acri vtere-
tur clystere: tum crura manusq̃; calfacienti pharma-
co plurimum perfricaret, vinciretq̃;: mox caput rade-
ret: cui deinde medicamen, quod ex palumbium ster-
core constat, imposuit: interpositisq̃; horis tribus, i bal-
neum duxi, ac laui, nullo caput contingens pingui.
Dein caput idoneo pilo contexi, & pro eo qui tū erat
temporis statu, nutriui sola sorbitione: post quam, sta-
tim fructum aliquem autumnalium austerum dedi.
Quum autem dormitura esset, theriacem propinaui,
circiter quatuor menses ante confectam. Habet enim
id ætatis adhuc præualētem papaueris succum (qui in

antiquatis ignauus redditur) ideoq; & somniferus est,
 & fluxiones tum siccat, tum leuiter crassat. Secundo
 autem die, iussi omnes eius partes fricari, vno capite
 excepto: ad vesperam verò, porrexi rursus theriaces
 ceu fabæ nostræ magnitudinem. Erat enim quod pri-
 die acceperat, hoc longè amplius. Postea verò q̄ hac
 quoq; nocte probè dormiisset, tertio die mane mel co-
 ctum copiosè exhibui, & in quiete seruauì. Procedēte
 die totum corpus similiter fricui, ac ptisanæ cremorē
 cum pane exiguo, pro cibo sumere iussi. Mox quarto
 die mane dedi theriacem consistentem in ætatis vigo-
 re, idq; cum melle copioso. Capiti verò mulieriseodē
 pharmaco, quod vehemēter tum siccat, tum calfacit,
 imposito, ac dein ipsa lota, nutritaq; modicè, valenti-
 iam pulmonem expurgare sum in quinto conatus. Ac
 dehinc rursus, rursusq; ex interuallo, ad caput qui-
 dem consueto cerato, quod thapsiā recipit, sum vñus.
 Totam verò corporis curam, in gestatione, frictione,
 ambulatione, lauandiq; abstinētia, ac victu tum mo-
 derato, tum boni succi, ad reficiendum direxi. Qua in-
 dustria rectè se habet mulier, minimè lactis opem req-
 rens. Alteri verò adolescenti, cui ex refrigeratis spiri-
 tus instrumentis orta tusilis fuerat, quum sanguinem
 ipse reiecisset ad dimidiam heminam, statim venam in-
 cidi, ac bis eodem die ex ea detraxi sanguinem: dein-
 de rursus postridie bis, sed artuum frictione & vñctura
 priore die vñus, ad vesperam dedi pharmacum nostrū
 quod diaspermation dicitur. Secundo die post alteram
 detractionem imposui toti pectori ceratum quod ex
 thapsia conficitur: mox vespere, ne supra modum cal-
 faceret, id aufereus. Tertio die rursus ad treis horas
 imposito, hominem laui. Cibaui autem similiter tribus
 his diebus: prioribus quidem duobus, sorbitiunculis;
 tertio verò, ptisanæ primum cremore: dein, pisce sta-
 tim aliq̄, qui facilis concoctu esset, adiecto. Dedi quoq;

Sanguinē bis
 eadem die &
 ex eadem ve-
 na detraxit Ga-
 lenus reiciēti
 sanguinem ob
 refrigerata spi-
 ritus instā.
 Diaspermation
 medicament.
 Ceratum ex
 thapsia.

Diaspermaton
medicaminis
vltus.

Pulmonis vice
ra cōtracta ex
vitiosi succi
erosione, esse
prorsus insana
bilia.
Pulmonis ex-
ulcerati cura-
tio.

Catapotia de-
scripta a Ga-
leno.

Pulmonis vice
ra in iis qui de-
plorati nō sunt
curari per de-
tractionem san-
guinis, purga-
tionē, et ea quę
caput roborāt.

medicamentum diaspermaton & secūdo & tertio die
similiter circa vesperam. Quippe & somnū conciliat,
& sensum doloris leuat, & siccādi vim habet. Vbi au-
tem & spiritui delegatę partes in naturali essent ten-
perie, & totum corpus vacuatum, ac nulla phlegmo-
nes suspicio iuxta ruptum vas superesset, tunc expur-
gare incepimus. Mox propinata theriace vigentis æta-
tis, illum ad Tabias dimisi. Ex iis verò qui vlcus in pul-
mone habent, ii demum insanabiles mihi esse viden-
tur, qui ex succi vitiosi erosione id possident. Oportet
autem in principio nullius rei æquę esse sollicitum, q̃ vt
neq; tussiant, neq; ex capite aliquid in pulmonem de-
fluat. Canetur id triplici præsidio: purgatione primū:
secundò, medicamine quod diaspermaton dicitur: ter-
tiò, ipsi capiti prouidendo. Quod purget, diuersas fa-
cultates habeat oportet: cuius generis nostrę sunt pi-
lulę, quę ex Aloe, Scammonio, Colocynthide, Agari-
co, Bdellio, & Gummi Arabico conficiuntur, ad plu-
res videlicet purgandas species excremētorum. Capi-
ti prouidebitur cerati vsu quod ex thapsia cōstat. Atq;
hęc quidem sunt peragenda in principio. Post verò re-
ficiēdus est æger salubriter, cibis boni succi, frictione,
in ambulatione, & balneo, ac præterea lacte fouēdus.
Quicunq; parum habere sanguinis videbuntur, iis ad
quendam succum probiorem reductis, detrahre san-
guinem poteris: tum rursus reficere: eosdem etiā rur-
sus purgare, ac rursus reficere: denuoq; si res suadeat,
sanguinem mittere: potissimum quibus veluti limus q-
dam vitiosus & crassus, tot⁹ est sanguis. At qui sangui-
ne abundant, statim iis à principio minuēdus est. Itaq;
per hęc tria, qui planē deplorati non sunt, omnes ser-
uantur: nempe per detractionem sanguinis, & purga-
tionem, & ea quę caput roborant. Quare minimē à
parnis incipiendum auxiliis est, in quibus morbis ma-
ximum impēdet periculum: Ac in leuioribus, licet q-

dem leuifora experiri remedia. Sciendum autem est in
ferim, fieri non poffe vt glutinetur vlcus, fi phlegmo-
ne pulmone inuafert: omninoq; , fi inuafert, febrici-
tatum hominem effe, ac purulenta deinde, quā fol-
uetur phlegmone, exputatū tuſi. Porro vlcera quæ
citra phlegmonem in pene, fedē ne cōſiſtunt, nullum
cataplaſma deſyderant, ſed medicamen quod cicatri-
cem inducat: non tamē eius naturæ, quæ vlcera, quæ
in carne ſunt, inducere cicatrice poſſit: imò quæ tanto
magis valeat ſiccare, quanto hæ partes carne ſicciores
exiſtunt. At talia ſanē medicamenta ſunt, quæ ex char-
ta combuſta conſtat: anethūq; vſum, atq; reſperſum:
ac deniq; colocynthis combuſta. Verū ipſorū, quæ
in pene ſunt, vlcerum, magis ſiccari poſtulant quæ in
to to cole hæſerunt, & quæ ſolam glandulā occupant:
minus verò quæ iu præputio ſunt: atq; etiam hiſ mi-
nūs, quæcunq; in reliqua ſunt cute, quæ totum colem
veſtit. Recentibus & ſiue madore tum ſedis, tum pudē-
dorum vlceribus, ſola aloë redacta ī tenuiſſimū pol-
linem, inſperſaq; , ſalutare medicamen exiſtit. Similli-
mam huic vim habet cadmia vino elota, & ſicca. Ab
hac non lōgē abeſt lithargyros. Deinceps verò molib-
dæna ſequitur. Cæterū omnibus tum minus inferēs
doloris, tum nullo minus efficax, panpholyx eſt. Sin
humidiora ſint vlcera, ipſe per ſe pini cortex, itēq;
lapis hæmatites, idone⁹ eſt. Quòd ſi profunditas
quæpiam adſit, vbi exiccata fuerint, dicto-
rum alicui tantum mannæ admiſcen-
dum eſt, quātum ſit ad carnem
gignendam ſatis.

Extremis mor-
bis extrema re-
media adhibē-
da eſſe.

Pudendorū vl-
cera qualiā me-
dicamenta po-
ſtulant.

Aloem inſper-
ſam, eſſe ſalutā-
re medicamen-
tum ſedis &
pudendorū vl-
ceribus.

Medamina
vlceribus ſedis
& pudendorū
aptiſſima.

GALENI PERGA

MENI DE MEDENDI

METHODO. LIB. VI.

Solutio unitatis
species.



Punctura cu-
ratio.

Punctio nervo
vulnus est dila-
tandum.

Puncti nervi
curatio.

Aquam calidā
esse vulneratis
nervis inimi-
cissimam.

SOLVTIO continui, in carne qui-
dem, vlcus: in osse, fractura: in neruo
sis fibris, spasma: in musculis deniq;
vlcus atq; ruptio vocatur. Singuli ve-
rò horum affectuum, quatenus qui-
dem affectus sunt, sui per contraria
sublationem indicant: quatenus autem solutiones cō-
tinui, vnitionem. Igitur si cutis tantum acu (exempli
gratia) alicui sit puncta, facileq; in eo sanescant vlce-
ra, etiam si citra medicamentum, nudoq; mēbro, ipsa
ad consueta dimittas opera, nihil sentiet mali: sin ve-
rò ægrè in illo sanetur, primum quidem dolebit: post
etiam tum pulsu particula infestabitur: tum phlegmo-
ne. Quare minimè imponemus medicamen quod glu-
tinet, sed molle, & blādum, & quod dolorem mitiget.
Siquidem vbi magna diuisio est, ibi studium impendi
debet, vt magis siccantibus remediis labra vlcis, &
vniantur, & coalescant: vbi autem acu stylo ne facta
diuisio fuerit, id duntaxat curandum est, ne phlegmo-
ne tentetur particula. Porro vbi aliquis nervus est pun-
ctus, cutini ipsam apertam seruare oportet: aut (quod
tutius est) latius incidere, vt per eam ex neruo vulne-
rato effluat sanies: Dein verò admouenda quæ simul
dolorem mitigent, & exitum saniei patefaciant. Si vir-
tus vegeta sit, sanguinis missio est expediens, purga-
tioq; vniuersi corporis, si vitiosis succis redūdet. Aqua
verò calida, q̄q̄ reliquas phlegmonas valde mitigat,
vulneratis tamen nervis inimicissima est, quum præ-
sertim eorum substantia ex refrigerata cōcretaq; hu-
midiore

midiore materia sit condita. Omnis quippe eiusmodi constitutio per ea quæ simul calfaciunt, humectantq; , resoluitur, atq; putrescit. Quare præstat oleo tenuium partium & veteri, & calido nervos punctos fovere. Hoc siquidem, si frigidum applicetur, tenues meatus obstruit: sin calidū, digerit. Etenim medicamenta quæ nervi puncturæ auxiliantur, debent esse facultare tenuia, modiceq; calfaciētia, & quæ siccare citra dolorem possint: quādoquidem sola hæc trahere ex profundo saniem, nec demorsa, nec contracta particula, valent. Ego itaq; sum vsus primū resina terebinthina, tum per se, in iis qui molli erāt carne: tum cum euphōrbio, in iis qui dura. Non secus etiam & propoli, non per se modò, verū etiam cum euphorbio ipsam emolliēs: quòd si durior esset, cum aliquò tenui oleo. Quin & sagapeno, opopanaceq; , sum in duris corporibus vsus, utiq; cum oleo & terebinthina id miscens. Sed emplastrum ex lachryma Cyrenaica nō inutile ad id fore mihi videtur. Nec secus sulphur viuum, ac minimè lapidosum, tenui oleo permistum, donec sordium crassitudinem contrahat. Calx etiam lota, oleoq; commista, similiter auxiliatur, præcipueq; si in æstu caniculæ bis ter'ne aqua marina abluatur. Ego verò ad nervos punctos hoc uti consuevi emplastro. Cera partā. j. Resinæ terebinthinæ, aut (loco eius) humidæ pineæ, aut colophonix, aut abietinæ, vnius partis dimidium. Picis, tantundem. Si itaq; modicam resinā miscebis, tum sum cribratumq; euphorbium reliquis immittes liquatis. Esto verò pondus eius, pars ceræ duodecima. Sin siccam, sicuti quæ colophonia dicitur, utiq; oleum pusillum desyderabit euphorbium. Itaq; vulnerati nervi curatio medicamenta postulat, quæ & tepidum calorem excitent, & valenter siccant: tum quæ ex substantiæ suæ natura & attrahendi vim habeant, & tenuium sint partium. At si nervus non punctus, sed per directū

Nervos punctos oleo calido foveōdos eē.
Puncti nervi qualia medicamenta postulat.

Terebinthina auxiliari punctioni.

Punctis nervis emplastrū optimū.

Punctis nervis qualia desyderentur medicamenta.

Nervi per os
rectum cæsi cu
ratio.

sit cæsus, nudusq; , diuisa cute ostendatur, vim euphor-
bii nō feret, ita vt quum interposita cutis est, ferre po-
test. Quare tñc optimè calce elota, & in plurimo oleo
soluta vtère. Salutare etiam est medicamen, quod ex
pompholyge medicamentum sit, si in largo sit rosaceo
liquatum. Quod utiq; melius fuerit, si tum rosaceum
ipsum, tum oleū, salis sit expers. Porro quæ ex metal-
lis pstant medicamenta, ea elota omnia esse debent, si
citra morsum sint siccatura. Salubre verò medicamē-
tum est, quod ex melle soluto in oleo insulso constat.
Cera præterea, terebinthinaq; , si his misceantur, elui
prius debent. Quippe medicamentis omnibus, quæ la-
ueris, acris mordensq; sanies eluitur, abstergiturq; . Si
verò robustus sit, qui vulnus accepit, & cui corpus sit
à superuacuis humoribus mundum, in hoc fas est, va-
lentioribus remediis nonnullis vri. Cuiusmodi sunt li-
namenta imbuta pastillis polyidæ, sapa solutis, & sup
aqua calida tepefactis. Nā eorū quæ vulneratū neruū
cōtingūt, nihil esse frigidū debet: qñquidē ea pars ma-
ximè sensibilis est, & principū partium primati cōtinua,
& temperamento suo frigida. Quorum omnium oc-
cassione facilè à frigido offenditur, & suā offensam in-
pertit cerebro. Quod si ex iis fuerit, qui pernentiunt ad
musculos (sunt enim hi instrumenta voluntariæ mo-
tionis) etiam conuulsionem facilè accersit. Idem fore
& in tēdonibus expectabis iisdem de causis. Sanè oleo
perfundere tale vlcus non conuenit: nam oleum viri-
bus illius pastilli est aduersum, vlcusq; sordidum red-
dit. Nec enim parum inter est, nudo ne neruo, an per i
terpositam cutem admoueas. Abluēda igitur à vulne-
re est sanies per lanam mollem specillo circūuolutā,
ac in principio quidem sapa madefactā, expressamq; :
postea verò etiam vino dulci, sed omni mordente qua-
litate carente. Nam quæcunq; dulcia pariter & fulua
sunt, vt Falernum, ad id inutilia existūt. Quippe acria

Metallica me-
dicamenta, de-
bent elota esse
si citramorsum
sint siccatura.

Nervis vulne-
ratis nihil de-
bere admoueri
frigidum.

Musculi sunt
intra volunta-
riæ motionis.

Oleum reddit
vlcera sordida

sunt omnia talia, & supra modum calida. Ulcere vero iam ad cicatricem veniente, quæ alba planè sunt, & tenuia, nec multam aquam tolerant, nec odora sunt, ea dulcibus præstât. Aquæ verò vsum ad nervum vulneratû perpetuò fugies, sicuti & cataplasma relaxans. Ad iam dicti pastilli vsum proximè illud medicamentum accedit, quod diachalciteos vocant. Liquari autè id debet, æstate rosaceo, hyeme Sabino oleo. Quòd si polyidæ pastillus nō suppetat, Andronis vel Pasionis, loco eius sumendus est: uel noster, qui etiam omnibus eis est valentior. Vbi uerò nervus alicui trāsversim est vulneratus, detrahare largius sanguinem expedit: ac tenui magis, q̃ in illis, uti uictus ratione: tum in quiete omnino ac lectulo molli hominem continere: tū oleo calenti ubertim in axillis, collo, tendonibus, ligamentis, & capite uti. Quòd si uulneratus nervus ex iis sit, q̃ in crure habentur: sicuti quum in manu est, alæ: ita in his, bubones largo oleo imbuendi: tum per rotam spinam ad collum, & caput ascendendum. At cōtusi nervi, vbi cum eis est simul & ipsa cutis contusa, cataplasmate ex oxymelite & fabacea farina curâtur. Qui verò absq̃ cutis simili affectu, contusi sunt, iis oleum calens, atq̃ tenuium partium, auxilio est. At si dolor vnâ cum contusione cutis & nervi infestet, etiam picem liquidam immiscere illi cataplasmati, ac bene coquere, tum calens medicamentum imponere oportet. Vbi verò magis siccans efficere voles, erui farinam iniicies. Quòd si ut amplius quoq̃ siccet desyderas, irim immittes Illyricam. At si totus præcisus nervus sit, metus p̃terea nullus instat: debilis tamen remanebit particula. Curatio verò eius cōmunis est, cum ea quæ aliorû est ulcerum. Ligamenta autem, quum simillimam habeant speciem tendonibus, valentissimorum remediorum vni tolerant: q̃ neq̃ ad cerebrum pertingât, & sensus sint expertia. Nā nervi omnes, alii ex ipso statim cerebro

Nervus vulnerato neq̃ aqua nec relaxas cataplasma ad-movere oportet.

Nervi transuersim vulnerati, curatio.

Nervis vulneratis in brachio, axillas in crure, bubones largo oleo fovendos esse. Contusi nervi curatio.

Ligamēta sunt sensus expertia, neq̃ cōsentiunt cerebro.

Nervi oriuntur
a cerebro.

Tendones con-
stāt ex ligamē-
to & nervo.

Ligamēta oriū-
tur ab ossibus.

Ligamenta ob
nexia periculo
si vulnerentur
quæ sint.

Abdominis de-
scriptio.

Peritonæum.

habent ortum: alii spinali interueniente medulla. Ten-
dones quoq; quoniam ex nervo & ligamento cōstāt
quatenus nervi participes sunt, eaten^o ex cerebro ori-
untur: minus tamen q̄ ipsi nervi convulsionem accer-
sunt. Ligamenta verò, quum ex osse ortum habeant,
quæcunq; rotunda sunt, ea nervis sunt consimilia: du-
ritie tamen plurimum disident. Verum in eo q̄ alba
sunt, & exanguia, & cavitate carentia, & in fibras diui-
duntur, similitudo illis cum nervis & tendonibus con-
stat. Ligamentum igitur vulneratum, si id est quod ab
osse ad os permeat, & maximè sine periculo est, & si id
ficces quibuslibet medicamentis, nihil hominem offen-
deris. Sin id quod se in musculum inserit, quāto est ner-
uo & tendone minus opportunū periculo, tāto utiq;
nisi rectè curetur, reliquis ligamentis magis terrere de-
bet. Sed iam operæpretium est, ut de abdominis vul-
nere aliquid etiam dicamus. In abdomine extrinsecus
cutis omnibus antestat: quæ in membranam finitur.
Post cutem, medio circiter loco, nervæa tenuitas mu-
sculorum gemina tenditur, membranarum ritu. Post
has deinceps habentur duo muscoli recti, & carnosī, q̄
à pectore ad ipsa pubis ossa perueniunt. Atq; hæc qui-
dem omnia sibi mutuo cohærent, abdomenq; consti-
tuunt. Quod verò deinceps hoc excipit, peritonæum
vocatur, estq; ex corporibus duobus exanguibus &
nervosis conflatum. Verum alterum eorum nervosa
tenuitas eorum musculorum est, qui per transversum
se agunt: alterum, mēbrana prætenuis, veluti aranea,
quæ utiq; verè est peritonæum. Ac tale quidē in me-
dio sui est abdomen. Partes verò eius, quæ vtrinq; ad
latus ad quatuor quasi digitos recedunt, hæc statim à cu-
te obliquos musculos habet: priores quidem, qui à pe-
ctore demittuntur: secundos, qui ab ilibus ascendunt:
dein post hos, transversum vtrinq; musculum, sub quo
est peritonæum. Ergo & minus periculi in hoc loco

cōuulnerato est, q̄ in medio : quoniam tenuem aponere
 sim nullam habeat, & futura in medio difficulter admi-
 nistretur: quoniam nimirum, & hac parte maximè proci-
 dant intestina, & ægrè inibi contineri queant. Si igitur
 maius sit abdominis vulnus, tum plura necesse est inte-
 stina excidere: tum difficilius denno immitti : quanq̄ &
 parua vulnera tractatu etiam sunt difficilia. Nam nisi:
 quod procidit, illico in suum reponatur locum, infla-
 tur, surgitq̄; in tumorem: quo fit, ut per angustum fo-
 ramē immitti nequeat. Quare minus graue per huius-
 scemodi vulnera mediocriter foramē est. Principio itaq̄
 id agendum est, ut intestina quæ exciderunt, in suum
 recondantur locum. Secūdo, ut vlcus suatur. Tertiò,
 ut medicamen imponas: Quartò, ut ne qua præstan-
 tior pars simul afficiatur, prospicias. Si ergo adeò par-
 uum sit vulnus, ut inflatum intestinum ex frigore am-
 bientis aeris, remitti nequeat, discutienus flatum, spō-
 gia molli, & ex calente aqua, madenti, moxq̄; expres-
 sa, intestinum ipsum calfacientes. Præparetur verò
 interea vinum austerum calidum. Quippe id magis
 calfacit quàm aqua, roburq̄; intestino addit. Quod si
 huic quoq̄ præsidio, intestini inflatio non cesserit, in-
 cidendum peritonæi tantulum Syringotomis est, q̄tū-
 ci quod excidit, reponendo sit satis. Scalpelli verò qui-
 bus acies utrinq̄ habetur, aut quibus cuspis acuta est,
 sunt omnino fugiendi. Situs autem laboranti sit talis,
 ut quæ vulnerata pars est, sublimiorē semper locum
 obtineat. Cauendumq̄; magnopere est, ne id quod ex-
 ciderit, degrauetur quicq̄ ab intestinis aliis. Quæ igitur
 intestina per magnū vulnus prolapsa, reponere in pro-
 priam vult sedem, is ubi totum vulnus manibus suis
 extrinsecus apprehenderit, debet intro reprimere,
 tum constringere, ac exiguum semper sueti prænuda-
 re: quinetiam id ipsum quod assutum est, modicè com-
 primere, quoad totum persuatur. Quoniā igitur coi-

Abdominis
 partem ante-
 riorem si vulne-
 retur, Aegrius
 curari iis, quæ
 consistunt ad
 latera.

Abdomine vul-
 nerato, cur me-
 diocriter foramē
 sit salutaris
 angustio.
 Intestinis exci-
 dentibus per
 abdominis vul-
 nus, qd agēdū.

Abdomen vul-
 neratum cōluē-
 di ratio.

re coalescereq; oportet cum peritonæo abdomē, inci-
piendum quidem à cute est, atq; ab externo introrsus
acus iniicienda. Vbi verò tum cutim, tum rectum mu-
sculum totum transierit, præterito quod ei subest peri-
tonæo, per reliquum peritonæum eam ab interno ex-
trorsus iniicies, atq; inde per reliquum abdomen ab in-
terno extra transiitres. Vbi hoc penit⁹ penetrauerit,
rursus ab externo introrsus idem abdomen est perfo-
randum. Mox vbi peritonæum quod illi quoq; subhæ-
ret præterieris, atq; ad cōtrarium veneris, hoc quoq;
ab interno extrorsus est perpungendum, vnaq; cū eo
totum ipsi coniunctum abdomen. Deinde ab hoc inci-
piendum rursus, atq; id cum contrario peritonæo cō-
suendum: ac rursus vicina quoq; cute transmissa, ite-
rū ab ea parte acus introrsus est traicienda, cōsuendūq;
abdomen id, cum peritonæo contrario: etiam inibi vi-
cina cute transmissa. Atq; hæc iterum, iterumq; faciē-
da, quoad totum vulnus similiter consuerimus. Quòd
verò ad intervallum punitionum earundēq; altitudi-
nem pertinet, mediocritas eligēda est. Filum etiam in-
ter durum & molle medium quoddam obtineat. Ac
verò medicamenta, quibus in his utemur, eiusdem ma-
teriæ sunt, cum uulnera glutinantib⁹. Sunt q aliter vul-
neratum abdomen consuant, ad hunc modum. Opor-
tet à vicino nobis abdomine incipere, atq; ab exter-
no introrsus per id tantum acum transmittere. Post, p-
teritis vt isq; peritonæi labris ex aduersa parte ab
externo introrsus per vtrunq; eius labrum acum reuo-
care: dein rursus hæc reuocare, atq; ab interno extror-
sum per aduersum abdomen traicere. Atq; ita totum
peritonæum sibi mutuo coalescens, prorsus intra ab-
domen absconditur. Deligatio verò extrinsecus, vel p-
cipuè in his necessaria est. Adhæc quod inter bubones
& axillas est, id totum molli lana ex oleo mediocriter
calido imbuta circumdare oportet. Satiùs itēm fuerit,

Abdomen vul-
neratum cōsuē-
di secūdus mo-
dus.

& si per clysterē intestinis aliud simile infundas. Quod si quid ipsorum intestinorum sit vulneratum, quæ extrinsecus fieri debet, omnia similiter, ut diximus, sunt peragenda. Cæterum quod iniicitur, vinum nigrum, austerum, & tepens erit. Ac crassa quidem intestina, sanatu facilia sunt: è cōtrariò difficilia, quæ tenuia existunt. Ieiunum autem est omnino incurabile: tum propter magnitudinem multitudinemq; vasorum: tum quia tunica eius nervosa, prætenuisq; sit. Adde quod tum bile synceram hoc intestinum recipit vniuersam: tum quod omnium maximè est vicinum iecinori. Ventriculi autem quæ carnosæ partes infernæ sunt, curare cum fiducia tentabis: quæ verò in ore eius sunt, ex sensus acumè, quo minus sanentur, obest: atque hoc etiam quod medicamenta illic diu hæere nō possint. At verò omētum si per vulnus exciderit (præstat enim hæc pars animali vsum non vsq; adeò magnum: constatq; ex membrana tenui, arteriis atque venis contexta) si quid ex eo nigricans sit, excipiemus id vinculo: ac sic, quod post vultum est, amputabimus: atque ut in imo sine iam prædictæ suturæ abdominis, pendeant ipsius vinculi extremitas, curabimus: quo nimirum ea, quæ ex vulnere suppurante euomentur, facile recipiamus. Sed iam ad fracturæ curationem veniendum est: cuius quidē scopus vnitio existit. Cæterum coalescere nequeunt ossa iuuenum, adolescentum, consistentium ætate, necnon senum, ob eorum maximam siccitatem, duritiemq;: tametsi interueniente alia quapian substantia crassiuscula (quæ ex proprio eodemq; crasso ipsorum ossiū alimento redundat) concresecntesq; in labris fracturæ, possint ceu quodam glutino, separatæ ossis partes connecti inuicem, atque conglutinari. At verò quæ abudè sunt mollia, qualia in puerulis conspiciuntur, ea sola vnitionem recipiunt. Ergo si os aliquod per transfuersum frangatur, sic dissident à se eius partes, ut è dire-

Intestino aliquo vulnerato quid agendum. Intestina crassa esse sanata facilia: difficilia autem, quæ tenuia existunt. Ieiuni intestini vulnus, cur incurabile.

Omento excludente per vulnus, quid agendum.

Fracturæ scopus vnitio.

Ossa ut coalescant inepta, quæ sint.

Callū glutinans ossibus nasci ex alimento eorundem.

Ossa puellorum sola, posse in vnu coalescere.

Fracturę cura-
tio.

cto non iaceant: quare primò curādum est, vt in directum & contrarium agantur, iuxta integrę exemplū: à qua nimirum certissima trāspositionis fractorum ossium indicatio sumenda est. Quęcunq; igitur retrorsum (exempli gratia) magis sunt acta, ea prorsum magis impelli conueniet: nec minus alteram quoq; fracti ossis partem modicē ad contraria retrudi. Cōtrā, quę prorsum sunt emota, hęc rursus ipsa quidem retrorsum: reliquam verò partem sensim duci prorsum: nec secus de cæteris differentiis. Cauendum tamen est interim, ne in adducendis contrario motu partibus, extantię fractorum ossium frangantur. Quibus sanē cō fractis, non poterunt ad amussim inter se coaptari fracti ossis fines. Ob idq; dissidentia ossa, è directo admota esse oportet: quod commodē fieri nequit, nisi retracta sint: idq; aut manibus, aut vinculis, aut instrumentis. Postea verò quā abundē reuulsa fuerint, nec vllus supersit metus, ne se in adducendo tangant, tum in directum opponere, vinculaq; remittere, ac musculis ipsis diductorum in idem commisionem permittere expedit: interim verò te ipsum quoq; manibus subseruire: & sicubi aliquid paululū subsulter, corrigere atq; formare. Ab iis secundum, quò diriges, fuerit, vt immotum prorsus membrum consistat: ne quid eorum quę effinxeris, moueatur. Ne verò per motiones ipsas disiungantur ossa commissa, tuta delegatura completi fracturam oportet. Quam sanē deligaturam nec aded debemus arctare, vt eam comprimat: nec remittere ita, vt sit laxa. Ac pectori quidem latissima fascia congruit: artubus autem & iugulo angusta, sed qua tantum ex versuum numero, securitatis adiiciat, quantum ex angustia deficit. Adhęc deligaturę principium debet super ipsam fracturam iniici ac circumduci bis ter'ue: hinc verò ad membrum reliquum dispensari. Siquidem qui sic deligat, & ab integris ad la-

Fracta ossa de
ligandi ratio.

borantem partem sanguinis cōfluxum arcet: & quod iam collectum in ea est, exprimit prohibetq; circa fracturam excitari tum phlegmionem, tum sphacelum, quæ ossis caries, & corruptela existit. Cæterum quæ duæ partes sint, quæ & recipere aliquid à laborante particula, & transmittere ad eam possint: utiq; quæ superiacent, tum propter multitudinem, tum magnitudinem, ad ambo magis sunt habiles. Extreme verò, propter causas contrarias, exiguum quidem aliquid vel recipere, vel transmittere possunt: at multum, nec ægris subministrare, nec ab ipsis recipere. Sed nec sola deligatura fasciarum est satis ad commissorum ossis tutelam, nisi etiam & splenia vnà cum fasciis exterioribus adhibeantur, quæ hæc quoq; ipsa stabiliant. Ne autem phlegmone oriatur, cerato est humido utendum. Iam verò repositionis figura eligenda est, quæ à dolore maximè sit immunis: quo nec phlegmonem particula contrahat: & æger persistere in vna ea diutissimè immotus possit. Ac talis sanè est quæ maximè naturalis mēbro: ut brachio quidē, angulosa: cruri verò, quæ paulo minus porrecta est. Verum ad dolorem vitādū, non modò naturalis habitus cuius instrumento est utilis, sed etiā consuetudo quoq; conducere nō nihil videtur. In vniuersum autē tum extendere, tum effingere, tum deligare, tum reponere, vna ea figura, quæ doloris minimū habeat, est studendum. Soluere autem deligaturā tertio die debes, ne in membro præter solitū cooperto dolor aut pruritus creetur: nec eius quod iā fracturæ est infixum, perspiratio prohibeatur. Cuius occasione nō modò noxius pruritus quibusdā accidit, sed etiam cutim ob acrimoniam saniei erosam exulcerari. Infundendū igitur tantū tēperatæ aquæ est, quā ad euocandū eiusmodi saniem sit satis. Quod si rursus quoq; simili modo facies, utiq; septimo id à primo die facere debebis. Apparuerint verò iā omnia phlegmo

Sphacelos est
ossium caries,
& corruptela

Splenia fractis
ossis confirmā
dis requiri.
Ceratum humi
dum.

Figurā eā ossi
fractio eligendā
esse, quæ mini
me dolorifica
sit.

Fracta ossa, ter
tio die soluenda esse.

Ferulis quādo
utendum ad
fracta ossa sit
manda.

Perfusioeque
calide quādo
utendum circa
ossa fracta.

Callo gigen-
do qualis vi-
tus ratio con-
ueniat.

Callos promo-
uent emplasti-
ca medicamen-
ta, quæ modi-
ce calfaciunt.

ne libera, & quæ pro naturali habitu magis aliquādo gra-
cilia. Tunc igitur licebit & ferulas circūponere, & sol-
uere ex maiore interuallo. Nam antea quā phlegmo-
nes periculum esset, non erat tutum ferulis preinere,
Quod si ex longiori interuallo eas soluas, callus multo
feliciter concresecet. At ubi adeo exiccata sunt ossa, ut
callus produci nequeat, tertio vel quarto die modicè
aquam calidam infundemus, donec carnes in rubrum
tumorem attollantur: desistemusque prius quæ subsidere
incipiant. Vbi verò aliquid digerere volumus, non pri-
us est desistendum, quæ quod ex perfusione intumuit, sub-
sidat. In quibus autem, quo minus callus in fractura pro-
ueniat, humiditas abundantior obstat, ibi hanc siccare
conuenienti deligatura, & perfusione aquæ, quæ vel
minima omnino sit, vel plurima, conabimur. Minima
quippe, humores qui in superficie sunt, per spiritum di-
gerit: & qui in alto hærent, modicè liquat. Plurima
verò, digerit plus quæ attrahit. Constat autem, in ea qui-
dem deligatura, quæ exprimet, minus esse arctandos
fasciarum fines: in ea verò quæ ad renutriendum est com-
parata, nec minus hos esse arctandos, & vniuersos cir-
conductus laxiores faciendos. Quo tempore callus gi-
gnitur, nutriendum corpus est cibus optimi succi, & qui
multum nutrant: ex quibus provenire succus consue-
vit, non solum bonus, sed etiam tenax: qualis desydera-
tur ad calli generationem. Magnitudo autem calli ea
sit, quæ & ossibus tuto vinculo existat, nec musculos
tamen comprimat. Quare data opera est, ut si minor
iusto proveniat, augeatur: vel inhibeatur, si immodi-
cè crescat. Sunt verò quibus hæc efficies, ipsius perfu-
sionis quantitas, qualitasque: præterea ciborum quanti-
tas, & medicaminum quæ illi imponuntur extrinsecus,
facultates. Etenim quæcunque emplasticam substantiam
habent, ac modicè calfaciunt, ea callos tum promo-
uent, tum verò augent. Quæ verò digerendi vim ob-

tinent, ea magnos iam callos diminuant. Conseruant in proprio statu, medicamenta quæ cruentis adhibentur vulneribus. Atq; hæcenus de transuersis fracturis. Longæ autem, similiter sunt curandæ, cæterum comprimendæ magis in ipso fracturæ loco: tū quod recessit, retrudendum introrsum est. Quæ verò multifariâ confracta sunt, iis splenia circūdētur fasciæ ritu incurua, vt monet Hippocrates. Medicamēta etiam omnia ex siccantium sint numero, atq; ex iis quæ enæma vocant. Capitis autem fracturæ simplices, quæ ad secundam vsq; laminam caluarie perueniunt, scalpellis angustis indigent. Expedit autem hos, vt numero multos, sic esse magnitudine impares. Atq; vbi os vitiatū nudatum fuerit, primò quidem, vtendum latiore est: secūdo loco, eo qui sit illo angustior. mox ita deinceps reliquis, vsq; ad angustissimum omnium: quo sanè est in ipsa secunda lamina, quam diploen appellant, vtendum. Post hæc tum protinus, tum ad finem vsq; siccis est medicamentis medendum, quæ ob id cephalica vocitantur. Ea componuntur ex iri Illyrica, & erui farina, & manna, & aristolochia, & panacis radice cortice, & in summa, omnibus quæ extergere citra morsum possunt. Ipsa nanq; generatio carnis, naturæ opus est. Itaq; ægro ad eam rem nihil est opus arte medica. Vt autem quæ prouenit caro coalescat, circūhæreatq; omni ossis parti, id inde maximè eueniet, si nec sordes super eo sit, nec oleosa quæpiam pinguitudo. Id igitur est, quod ægris medici ad carnis productionem præstant, vt totus locus siccus sit, tum quælibet ossis vitiatæ pars planè pura. Ex fracturis verò quæ ad cerebri vsq; membranas perueniunt, si simplex tantum fractura sit, angustis scalpellis vtendum. Sin cum cōtusione aliqua, quod contusum est, excidi debet: idq; vel terebellis prius in circuitu foratum, ac mox scalpbris admotis: vel protinus ab initio cyclis. At quæ p

Callos minuet.
 Callos in statu proprio seruantia.

Fracturas longas curandi rō.

Capitis fracturarum curatio.

Cephalica medicamenta.

Carnis productio, naturæ opus est.

Fracti simul & contusi capitis ossis, curatio.

Terebellæ usû
in fracturis capi-
tis, ceu parū
rutū Galenus
dānat.

Cycliscorum
usum i magnis
fracturis capi-
tis, quādo pro-
bat Galenus.

Lenticularia
scalpra,
Caluariæ forā-
dæ ratio,

Ostagræ usus.

Dimidium fa-
cti qui bñ cœ-
pit habet.

terebellam quidem ratio fungitur, parū tuta est: pro-
pterea q̄ dum audacius eam tractāt, duram membra-
nam, quæ osi substernitur, non raro violāt. Quod ve-
rò per cycliscos opus administratur, ne id quidem om-
nino vitio caret: quum quatiat immodicè caput: quod
potius quietem postulat. Cæterum si magnæ sint fra-
cturæ, & ossa quæ fracta sunt vehementer mota, inih
cycliscorum vsus perplacet. Quippe paucis excisioni-
bus facies lenticulatis excisoriis locum. Sin firma pluri-
mum ossa sint, foranda sunt terebella. Terebellis autē
ipsis, vt mergi non possint, parum supra cuspidem, nō
nulli supercilium extans efficiunt. Expedi itaq; id ge-
nus complures præparatas habere ad omnem calua-
riæ crassitiem. Commodissimè tamen cycliscis vteris:
& primo quidem aggressu, latioribus: postea, magis an-
gustis: donec ad crassam membranam perueneris. Ve-
rū quod excidi oportet, id totum cycliscis nudandū
non est, sed ex ea maximè parte, qua fractura est gra-
uissima. Nam præter alia, etiam membrana ipsa ab os-
sibus quæ sunt vehementer afflicta, recedit celerrimè.
Si verò vnam semel partem nudaueris, atq; scalprum
in cuspide habens præfixā, obtusamq; et læuem len-
ticulæ speciem, aciem verò per longitudinem erectā,
submiseris, vbi latam partem lenticulæ statueris su-
per membranam, feries malleolo, ac sic caluariam q̄
rutissime diuides. Neq; enim qui minus cum periculo,
nec qui celerius perficiatur, forandi modum alium in-
uenias. Iam verò instrumento, quod ostagram vocāt,
nonnulla osium vehementer cōminutorum vel exal-
tantes, vel conuertētes, per eam potissimum partem
lenticulato scalpro præparabimus aditum. Quod qui-
dem vbi demissum fuerit, dicere possis illud prouer-
bium celebre. Dimidium facti qui bene cœpit habet.
Igitur qđ vehementer confractum est, id totū est ause-
rendū. Si verò ab eo fragmenta quædā longius excur-

rant, hæc persequi ad finem non expedit: illud persuasum habentibus, minimè futurum vt ex eo noxa sequatur vlla, modò reliqua ritè sint nobis peracta. Atq; indicatio agèdorum hic quoq; ex natura ipsarum partium affectarum subministratur. Necessum itaq; in capite nobis (quarenus dictum est) primò fracturæ aliqd denudare: quo videlicet detergere & abluere à membrana saniem possumus. Post verò, quum phlegmones tempus præterit, omniaq; ad vnguem sunt sicca, carnem producere, ac cicatrice locum includere. Porro quum vnus atq; alter homo occurrisset mihi habens sincipitis atq; temporis os confractum, equidem superius, hoc est sincipitis, os exemi: à temporali autem abstinui: cui callum inducendum curavi. Nec infeliciter cessit nobis negotium. Quòd verò ad medicamenta post foratum os infundenda pertinet, quandoquidem auditorius meatus (qui non solum vsq; ad cerebri duram membranam penetrat, sed etiam neruum contingit, q in ipsum descēdit à cerebro) vehemētissima medicamenta tolerat: nihil miri sit, si crassa membrana cerebri, anteq notabiliter occupetur phlegmone, valētissimis post forationes etiam medicamentis gaudeat, ceu naturaliter siccam substantiam possidens.

Cranio forato, valētissimis, & siccissimis medicamentis gaudet dura membrana cerebri.

GALENI PERGA

MENI DE MEDENDI

METHODO. LIB. VII.



EDENDI Methodum Eugeniæ charissime, quā olim In Hieronis gratiam scribendam susceperam, postea q̄ illum functum vita intellexi, ipsi quoq; persequi destitimus. Tu nanq; mihi conscius es, neq; hoc me opus,

Laudem popu-
larem meritis
nihil prodesse,
sicuti nec viu-
tium quibusdā

Galenī iactan-
tia.

Galenus nulli
librorum suo-
rum proprium
nomen præscri-
psit.

Similaribus
partibus pri-
mum animan-
tis functiones
referuntur ac-
ceptæ.

neq; aliud vllum, popularis auræ studio fuisse aggressum: sed quo vel amicis gratificarer, vel me ipsum simul vtilissima ratione ad rem propositam exercitarem, simul ad obliuionem senii (vt Plato inquit) cōmē-
tarios mihi reponerem. Quippe multitudinis laus cō-
modum ad vsus nonnullos instrumentum viuētibz
aliquando est: mortuis certē nihil prodest, sicuti neq;
viuentium quibusdā. Nam qui viuere in tranquillo
optarunt, & fructum ex philosophia cōperūt, suntq;
iis quæ corpori curando sufficiunt contenti, eis vtiq;
impedimento non paruo est apud vulgū fama: vt quæ
iplos à rebus pulcherrimis plus iusto transuersos aufe-
rat. Ego verò (haud scio qua ratiōe) ab ipsa vsq; ado-
lescētia mirificē siue inspiratus, siue furore percitus,
& vulgi famam contempsī, & veritatis scientiæq; stu-
dio flagraui: nullam cē hominibus neq; honestiorem,
nec diuiniorem possessionem ratus: ob idq; nulli meo-
rum librorum meum nomen præscripsi. Quandoqui-
dem igitur in præcedentibus commentariis, quemad-
modum similarium instrumentaliumq; partium com-
munem morbum, nempe solutionem cōtinui, curari
cōueniat, scripsi: deinceps quod reliquum est, in tui, &
aliorum amicorum id flagitantium, gratiam, adiiciā,
reuertarq; ad eum morbum, qui omnium est primus:
nempe qui in similaribus nascitur: quibus scilicet pri-
mum animantis functiones referuntur acceptæ. Est
enim hoc morbi genus cognitu maximē necessarium:
nec ratione curari potest, primis elementis corporis
ignoratis. Ergo quoniam vna quæq; animalis particu-
la propriam actionem ædit, quæ tantum ab aliæ actio-
nibus differt, quantum ipsa particula ab aliis, quæ illas
ædunt, diuersa est, temperamenti ratione: sanē qui tue-
ri partium actionem vult, hic temperiem earum custo-
diat oportet. Custodiet autem, si id quod ad calidius
cōuersum est, refrigerabit: quod ad frigidius inclina-

tum, excalfaciet: ac de cæteris in tēperantiis, tã sint plicibus, q̃ compositis, eadem ratione. Quū enim octo earum sint differentię, octo nimirum erunt & medendi rationes: quibus particula, per cōtraria eorum quæ exuperant, ad naturalem symmetriam reducitur. Erit itaq; curationis vna meta communis (quò diriguntur consilia medentis) ipsius similis corporis alteratio: quandoquidem etiam morbus, ex naturalis temperamenti alteratione est ortus. Medicatio autem particularis, ex materiæ copia, & huius congruente vsu conficitur. Sed horum iam proponamus exemplum, auspicati à ventriculo. Ac facillimæ quidem curatu eius alterationes sunt, quæ ex calido & frigido oriūtur: propterea q̃ maximè actiuis qualitatibus corriguntur. Aegrius verò curantur, quæ in humido, siccoq; habentur, q̃ qualitatibus imbecillis, curatio earum perficiatur. Ac tempus quidem caloris, frigorisq; reparandi, par quodāmodo est: securitas tamen impar. Nisi enim cunctæ quæ ei quod curatur circumdatæ sunt particularæ, validæ planè sint, verendum est, ne ab iis quæ refrigerent, noxam contrahant non leuem. In reliquis duabus qualitatibus est securitas similis. Tempus tamē curationis in sicca intemperie multo amplius est. Quippe quod senium in sanis, id in ægris sicca intemperies existit. Itaq; etiam insanabilis est, si prorsus sit cōsummata: nempe vbi solida partium similarium substantia reddita fuerit siccior. Nam est & altera siccitas, vtiq; quum ea, quorum substantia ex humore concreto cōstat, sicuti caro & adeps, sunt liquata. Etiam tertia, quū propria humiditas, vnde partes nutriuntur, & quæ in illis habetur veluti, ros quidā sparsus, omnino est assumpta. Diuersa ab iis siccitas est, quæ in propriis cuiusque particulæ exilibus arteriis atq; venis consistit. Provenit antè & hæc ex penuria sanguinis. Omnibus igitur his siccitatibus maximè contrarius est austerorum

Intemperantiarum esse differentias octo: totidemq; medendi rationes.

Medicatio particularis ex materiæ copia & huius congruente vsu conficitur.

Ventriculi alterationes quæ ex calido & frigido oriuntur, esse curatu facillimas.

Sicca intemperies in ægris est quod senium in sanis.

Siccitas consummata est insanabilis.

Siccitatis species variae.

Austerorum usus siccitatibus aduersatur maxime.

Siccitatum cu
ratio.

Lac asininum
sicis affecti-
bus maxime
congruis esse.
Lac si in aere
aliquandiu in-
moretur muta-
ri prompte.
Semen genita-
le extra propria
vasa cōtrūpi.
Lac muliebre
esse optimū
tabilis.
Lactis asinini
prærogatiue.

Mel optimum
quale esse de-
beat.

Lac optimum
quale.

vsus. Quippe quæ si quid in iis superest naturalis humo-
ris, id absumunt, partim ebibentia, partim in sinū ven-
tris per exiguos meatus exprimentia, partim ad conti-
nentes partes trudentia. Curabis ergo ipsas, si meatus
qui contracti sunt, dilataveris: ac quod in vicinas par-
ticulas est impulsū, reuellas: præterea singulas simila-
rium partium propria humiditate, humectantis nutri-
menti ope, repleas. Cui negotio lac asininum ex ipso
animali suctum, vel maxime ex vsu est. Quod si asinā
sugere æger ipse grauetur, expedit, ut q̄ minimo tem-
pore lac in ambiente aere moretur, propterea q̄ celer-
rimè mutari ē aptum, genitalis seminis ritu, quod nec
ipsum aliquandiu extra propria vasa morari patitur.
Optimum autem, utpote cognatum, existit muliebre
lac: quod quidem sugendum iis suadet Prodicus, qui ta-
be absumuntur. Sed quoniam id exhiberi sibi ceu pue-
ris pleriq; recusant, utiq; ceu asinis, asininum ipsis da-
ri conueniet. Id si quidem reliquis omnibus ad propo-
situm affectum vtilius est: quum & tenuissimū sit, coa-
guleturq; minimè, & quoquo versus ecysimè digera-
tur in corpus. Est itaq; lac ipsum iis tum per se dādum:
tum pauxillum ei repidi mellis miscendum. Ceterū
quod mel flauo ē colore, odore suavi, tum purū adeò,
ut totum pelluceat, ac gustanti parum acre incundissi-
mūq;: præterea tam sibi hærens, ut si attollatur digi-
to, cōtinuum sibi, nec intercisum, ad humum defluat,
id omnium optimū iudicatur. Si verò abrumpitur,
nec demissum ad terram vsq; continuitatem tuetur,
id aut crassius iusto ē, aut tenuius, aut dissimilium par-
tium. Debet autem nullam penitus alterius cuiuspiam
rei eminentem in se cōtinere qualitatem optimū mel.
Quare quod thymum planè redolet, minimè probo.
Ad eundem modum & lac nullam externam qualita-
tem odore gustū ue præ se ferat: sed esto q̄ dulcissimū,
& sibi ipsi continuum, & prout lacti cōuenit, splendēs,
super

super omnia, quoad eius fieri poterit, similes partes habeto. Quo verò tale lac fiat, & idoneis nutrimentis alè dum animal est, & exercitationibus mediocribus exercendum: & pullus, si quem lactat, auferendus. Quòd autem ætatis quoq; florentis esse vel maximè debeat, id neminem latet. Curandum quoq; ut q̄optimè concoquat: contemptis videlicet iis, qui si asinis quoq; præscribemus victus ratione, ridebunt. Fingamus igitur ægrum aliquem tum lotum esse, tum lac hausisse: hūc ad secundā vsq; lauationem quiescere permittemus, tum modicè fricabimus, & pinguius: utiq; si lac quod sumpsit, iam ad vnguem confecit: id quod tunc ex ruat, tum vetriculi mole, nobis licebit coniicere. Modicum verò tēporis inter primam & secundā lauationē interuallum erit, si quatuor aut quinq; æquinoctialiū horarum interuallū intersit: scilicet si tertio adhuc lauare paras: sin aliter, pluriū. Sanè tertio lauabis, si multis lauationibus fuit assuetus. Quin etiam post quamq; lauationē hominem vngemus oleo, prius q̄ se vestiatur: ne videlicet plus digeratur æquo, sed obstruantur exigua cutis spiramenta. Quippe conducit ad renutricationem id quoq; sicuti & frictio. Iā verò siue cuilibet parti corporis temperatam infundas calidam aquam, siue frices, siue laues, siue aliter quomocunq; calfacias, primū quidem attollitur: mox efficitur gracilis: ideoq; vbi carne implere quodlibet corpus studemus, id eatenus calfaciendum nobis est, dū intumescat: vbi verò primū intumuerit, tunc super sedendum est. At si digerere & euacuare contendimus, eatenus continuū dum est, dum quod prius intumuit subsidat. Si æger igitur delectetur lacte, post secundā q̄q; lauationē id exhibebis. Sin aliter, prisanam diligenter coctam, aut alicā prisanæ ritu præparatam. Hinc vbi rursus quieuerit, ad terciā reducendus est lauationem: aut illico ad cœnam. Sic autem præparatus illi panis purus, probè co-

Animal cuius lacte uti volumus, optima esse victus ratione educandum.

Vnctionem ex oleo obstrare quo minus digerantur ac res soluantur succi. Carni augenda, minuendaq; qualis frictio, per se sioue desyderetur.

*Testes gallina
celi.*

ctus in forno, quiq; tum fermenti, tum salis, quod satis est, habuerit. Opsonium quoq; sit ex saxatilibus piscibus, aut ex albo iure asellus: necnon alæ testesq; galinacei, qui lacte sit altus. Quorum si copia nō est, aliis utendum. Ad eundem modum & perdicibus, & montanis auiculis, quæ mollem carnem sortiuntur, vescendum. Vitanda autē & quæ palustria sunt, & quæ carne sunt dura. In summa verò, alimentum sit coctū facile, & nutriens: minimeq; glutinosum, aut excrementitū.

*Suilla caro est
maximi nutri
menti, ægre tñ
concoquitur.
Vino vtantur
oēs quibus re
fici corpus ex
pedit dūmodo
non febricitet.
Vinū aquosū.
Vinū uinosū.
Vinum nouel
lum.*

Porro omniū ciborū, quos nouimus, maximè nutriens suilla caro est: verū non æquè ac prædicta, concoctū facilis: præterea glutinosum succum, crassumq; generat. Quare hæc uti ad propositū affectum nō conuenit. At vino ut vtantur oēs, quibus relici corpus est opus, consulo: modò non febricitent. Esto tamen id & aquosum, & astringens leuiter. Aquosum natura appello uinum, quod tenue est, & purum, minimāq; aquæ mistionem ferens. Cauendū autem à vinoso est, q̄ feriat vires imbecilliores. Rursus, nouellum vinū tū aquosius, tum imbecillius quodāmodo est, q̄ ut vino conueniat.

*Vinum anti
quius.
Aquæ uitia p
ueniunt ex ei
frigiditate.*

Adde etiā q̄ ægrius concoquitur, ac magis excrementosum est. Antiquius verò, ut uinosius est, ita vehementius existit, q̄ ut propositis sit ex usu. Porro aquæ uitia pendent ex eius frigidityte omnia: cuius culpa, & moratur in præcordiis diutissimè, & fluctuationes excitat, & in statum vertitur, & corrumpitur, adeoq; ventriculi robur resoluit, ut deterius proinde concoquat. Sed nec digerendo per corpus alimento magnopere videtur aqua conducere. Quibus sanè aquæ uitiiis, quale nuper diximus vinum contrarias virtutes obtinet. Potionis itaq; is erit modus, ut neq; in ventriculo inatet, nec fluctuationis ullius sensum inuehat: ciborū verò, ut vel non grauent: vel grauare q̄ citissimè desinant. Ab hoc tensio inflatioq; præcordiorum vitandæ iis sunt. Ergo si ob affectum ventriculi totum corpus

*Aqua distribuē
do alimento p
corpus non ui
detur usq; adeo
conducere.*

macrescat, exquisitior victus ratio desyderatur, propter concoctionis imbecillitatē. Vbi verò æger sanior est redditus, ad refectoriam est transferendus. Id fiet, si pluribus & frictionibus, & gestationibus, quā antea utemur: ac ciborum tum qualitatem, tum quantitatem mutabimus: ita ut plures & valentiores quā prius exhibeantur. Quū verò ad sanitatis statum propemodum ventum iam sit, cibandus volatilibus est: illique iam offerre carnes suillas licet: primum quidem, porcelli pedes in ptisana elixos: dein pernam: ab hac etiam reliquas partes. Quē porcellum, si hyems sit, pridie fuisse iugulatum oportet. Nam hesternus, quā recens necatus, facilius concoquitur. At æstate, sat fuerit, si porcellus mane immolatus fuerit, ac iuxta occasum solis edatur. Quippe semper alimentum valentius ad vesperam exhibendum est. Quū igitur qui macilentissimi sunt, plurimo nutrimento indigeant, nequeant autem vel quod mediocre est concoquere: paulatim eos, sed sæpius cibare erit melius. Atque hac sanè de causa ipse eos ter cibare sum solitus. Verūm quando iam manifestè meliores sunt facti, etiam bis nutriuisse sit satis. Quare tantam exhiberi primam cibationem est rationabile, quanta prius quā secunda sumatur, tota prorsus erit concocta: id quod valentiori contingere alimento non potest. Idcirco primo loco leue sumendum eis est: secundum autem crassius, quandoquidem & quies & somnus, & longius tempus huius naturalem administrationem excipit. Iam verò bibendum illico post cœnam nō est, ante quā cibus fuerit concoctus. Siquidem innatant cibi si bibant, ita ut eos ventriculi corpus, propter humorem interpositum, non contingat. Ceterum si magna siti torqueantur, tantillum est propinandum, quod & molestiam soletur, & sitim leuet. Vbi verò nutrimentum concoxerint, abundè bibere sunt sinendi. Mane autem, post somnū, quū deiecerint, & paulum inambulauerint, modicè sunt

Refectoria vtilius ratio, quomodo administratur.

Hesternum, quā recens necatur porcellum, facilius concoquitur.

Vesperis exhibendum est alimentum valentius.

Macilentissimi sunt cibandi parce, sed crebro.

Cibi aut crassiores in cœna dandi.

Bibendum illico a cœna quibus non sit.

fricandi: videlicet donec corpus incaleat: mox gestationibus utendum. Deinde tum labandi sunt, tum fricandi, idq; intra vel circa meridiem. Quum igitur conualescentium victus ratio media quædam sit inter eam quæ sanorum propria est, & quæ agrorum: difficile minimè fuerit, ex iis quæ de utraq; sunt prodita, ut per seipsum quis mediam inueniat. Domus in qua conualescens nutritur, sit temperata: laborandumq; ut ad eos cibos reducatur quisq;, quibus insuenit: naturarum interim proprietate obseruata, necnon regionis & temporis. Sciendum autem est vniuersum corporis habitum exlicari à vigiliis: ac proinde eas infestissimas esse iis, qui ex siccitate laborant. Quod verò ad nutriendi modum spectat, si corpus modicè siccum sit, vberius nutrire id licet: propterea quod vires eius, quæ utiq; alimentum conficiunt, penitus non conciderunt. Si verò immodicè, parcius, contraria ratione. Porro intemperies sicca, vbi solida corpora contigerunt, si quidem in vna quapiam parte consistant, veluti nunc in ventriculo propositum est, nunq; integrè sanabuntur: neq; in eum statum qui ante morbum fuit, reuertentur: sed in reliquâ vitam particula affecta laborabit imbecillitate. Quod si intemperies sicca etiam solidas cordis partes occupet, celeriter sic affecti inarescunt. Quem marasimum, Philippus vocat ex morbo senium. Is itaq; breui mortem conciliat. Proximè huic, qui à iecinore inceptus est. Mox qui à ventriculo. Qui ab aliis partibus ortum habet, tanto tardius, quanto quælibet harum, ignobilior quæ illæ existit. Cæterum victus ratio eadem genere est, tum in hac siccitate, tum in illa, quæ solam eam humiditatem absumit, quæ nutrit solidas partes. Præterea etiam in tertia, quam supra memorauimus, siccitate. Facillima verò omnium sanatu quarta est, in qua venæ succo suo sunt inanitæ. Immo hic affectus ut frigiditas potius corporis, quàm ut siccitas, est curandus: ac pro-

Conualescentium victus ratio, media est inter eam quæ sanis, & eam quæ aegris debetur.

Cōsuetis cibis utendum.

Vigiliæ quibus sint aduersit. time.

Senium ex morbo.

Siccitatis species quatuor.

inde eius sanatio est celerrima. Scire autē licet, solidorum corporum siccitatibus, si perdurēt, succedere necessario frigiditatem. Celerrimē namq; ex nutrimenti defectu refrigerant partes, propterea q; ex calido sanguinis succo nutriuntur. Si igitur siccitati partium iuncta frigiditas sit, duplex erit medēdi ratio, humectans scilicet, & modice calfaciens. Nam quæ calfaciunt impensē, iis vehementer siccandi vis inest. Quare calfacientis materiæ humectantibus medicamentis tātum miscendum est, quantum particula ad frigus ratione siccitatis inclinat. Proponamus ergo (exempli gratia) ventriculum tum siccum, tum modicē refrigeratum alicui esse. Huic certē simul cum lacte vberius mel exhibebimus. Vinum verò, quod minus aquosum q̄ prius sit, & plurius annorum, dabimus. Quinetiam esculēta omnia calidiora offeremus: idq; tum naturali temperie, tum ignis opera, sic comparata. Nardino p̄terea vnguento vngendus assiduē est venter, sic vt nunq; siccus remaneat. Eius si copia nō adsit, vttere mastichino, aut opobalsamo: & per se, & misto dictis vnguentis. Quod si cupis vt magis ea corpori adhæreant, cerę nō nihil est admiscendum. Si aer ambiens sit frigidus, lannam opobalsamo, aut vnguēto nardino imbutam, in quibus liquata prius chia mastiche fuerit, admouebis ventriculo. Præstiterit autem imbuere optimam purpuram, qualis est Tyria: quando & astringi ipsum modicē, & cutis eius meatus obstrui expedit. Siquidē quæ rarum habitum faciunt, & relaxant, ea tum digerunt succos, tum particulas frigidis extrinsecus aduenientibus obnoxias reddunt. Quæ verò valenter astringūt, ea siccant. Quo fit, vt medicamētum qđ eiusmodi corpora calfacit, id neq; euocantē vim habere expediat, neq; astrictoriam multā sibi immistam. Memineris ēt, qualitatem acerbam, suā quidem ipsius virtute, & refrigerare & siccare: quare etiam prohibenda est in hu-

Siccitati corporū solidorū si perduret, succedere necessārio frigiditātē.

Ventriculo sicco, modicēq; refrigerato, q̄ medendi ratio debeatur.

Ventriculo sicco & frigidiori reddito, quę unctiōes conueniant.

Purpura Tyria

Acerbam qualitatem refrigerare & siccare.

iuscemodi affectibus. At si cum sicca intemperie multa frigiditas adsit, in nardino vnguento similiter Chiā mastichem q̄ pinguisimā solues, ac purpura excipiēs, vteris. Cōmodissimè etiam adieceris opobalsanum.

Mel cum lacte cōferre ventriculo sicco, impenſeq̄ refrigerato.

Dandum præterea vberius cum lacte mel est, sed super prunas ex quercu, vitæ ue, Idespumatum curiosè, quo & minus sit excrementosum, & magis nutriat. Quin etiam mel ipsum despumatum per se optimum nutrimentum frigido ventriculo est, vt aduersissimum calido.

Vinū antiquū ventriculo refrigerato congruere.

Vina amara imodice siccāt. Picatione in quibus vtendum.

Vinum autem eligendum semper antiquū est, eoq̄ antiquius, quo maior fuerit frigiditas. Sed nec adeo eē debet vetus, vt iā amaricet. Siquidem vina amara, immodicè siccant. Sanè optimum medicamentū talibus omnibus sit, quo picatores quotidie utuntur. Ergo ille linire eo totum ventrem, sicuti & alias omnes particulas, quæ alimentorum vsu non promouentur, conueniet, ac post auelli, priusq̄ refrigeretur. Quod quidē

Puellus admotus ventri, fouet calorem illius.

si bis vno die feceris, abundè fuerit. Naturalem ventriculi calorem tuetur & fouet admotus Puellus, qui boni habitus sit, & minimè cute humecta. Sunt qui catellos pingues in hunc habeant vsu: qui etiam ex vsu sunt iis, qui propter siccitatem solam habent imbecillum ventriculum. Nocent autem intemperantiis eiusmodi, fomenta calida: quæ quidem sicca sunt, eo q̄ rorem similarium depascunt corporum: quæ verò humida, q̄ hunc digerunt: potissimum vbi largius his vtimur: præterea q̄ nimis rarum, frigoriq̄ opportunum corpus efficiant. At si multæ siccitati sit calor non admodum multus adiunctus, abstinendum à melle est, vinumq̄; minimè antiquum bibendum. Iam cibos offeremus repentes: sed si æstas sit, qualitate referentes aquam fontanam. Ventriculum autem vngemus oleo tum crudo, tum melino. Ac multo sanè magis, si plusscula caliditas sit, ipsum vinum tum aquosius exhibebimus, tum sub eo frigore, quod fontis aqua per me-

Fomenta calida quibus nocentia sunt.

Ventriculo admodum sicco, & modice incalēscenti præter naturā, quæ is usus ratio est ex vsu.

dium ver exhibet: illud nobis persuadētes, eiusmodi affectum feбри proportionē correspondere. Nam quod illa vel in toto animali, vel in corde est, id propositus nunc affectus est in ventriculo. Cæterū ubi validē in ambabus qualitatibus immutata quætis particula est, omnis eius actio perit, atq; labefactatur: nec facillē qđ sic est affectum, ad suam naturam reuerti potest. Vbi verò altera tantū qualitas plusculū immutata est (veluti nunc siccitatem finximus) reliquarum autem aliqua se habet mediocriter: utiq; qui ita est affectus, sanari potest. Si vētricus intemperie affigatur calida, cui mediocris humiditas iuncta sit, facillē affectus is frigida potione curatur: quum minimē ex ea lædantur partes vicinæ: utpote se habētes mediocriter. Nam in siccis ventriculi affectibus, necesse est, non ea modò, quæ proxima sunt, sed etiam totum corpus gracilius reddi: ac proinde tunc potus frigida maiori cum periculo administratur. Sicubi verò adeò vehemens calor intemperies ventriculum occupet, ut vsq; ad corpus ipsum perueniat, febricitare hominem est necesse. At intemperies humida utcunq; accidat, facillimē oīum curatur. Cuius quidem, si sola consistat, remedia sunt cibi citra valētem calefactionem, refrigerationem uel siccantes: præterea cōsuetæ potionis parcitas. Eius autem quæ cum caliditate coniuncta est, astringentiū tū ciborum, tum potionum minimē calfacientium vsus, nec non potus frigida: quemadmodum illius quæ frigori est iuncta, optima præsidia sunt acris omnia, quibus adq̃uisci debent quæ acerbæ sint, minimē tamen euidenter refrigerantia: præterea potio exigua, eaq; vini insigniter calidi, veterisq;. In vniuersum autē calida intemperies ventriculi, refrigeranda est: frigida calfacienda: humida siccanda: sicca madefacienda. Ad eundem modum quæ ex duabus qualitatibus intemperantiæ constant, reliquis contrariis sunt retundendæ.

Ventriculus in temperie laborans calida, cū humiditate mediocri, facillē frigida potione curatur.

Frigida potus quibus periculum Josus existat. Humida intemperies facillime omnium curatur.

Ventriculi intemperantias esse corrigendas contrariis.

Ventriculi in-
temperies fri-
gida & sicca,
est omniū pes-
sima.

Ventriculi in-
temperantias
quibus copula-
tus est humor,
quæ ratione cu-
rari cōueniat.

Abſynthii po-
tio quibus sit
congruens præ-
ſidium.

Aloem purga-
re humores in
tunicis ventri-
culi imbibitos
Aloes elotæ fa-
cultas.

Hiera picta du-
plex.

Pessima aut̃ omnium est intemperies, inter simplices quidem, sicca: inter compositas verò, sicca simul & frigida. Atq; hæcenus de ventriculi intemperantiis, citra humoris affluxū. Vbi verò aliquis humor aut in ipso si-
nu ventriculi delitescens, aut imbibitus in illius tuni-
cis, author intemperantiæ extiterit, expurgandus ille est. Quòd si ab aliis partibus transmittatur (id quod ex toto corporis habitu, ac tum singularum partium ex-
ploratione, tū ex vacuationibus solitis, retentisq; nec non cōsuetâ victus ratione, cognosces) primò illis est succurrendum. Dein verò, roborandus ventriculus, q̃ eorū quæ ad sese confluunt, minus promptè quicq; ad mittat. Verūm si quidem ex minus momentaneis fa-
cta translatio sit, quod superfluum est, rursus ad ea reuel-
les. Sin ex iis quæ maioris momenti sunt, ambobus si-
mul consules, eū semper affectū submouens, qui fluxio-
nē excitet. Fiet id, si omnes corporis partes ad bonam
reduxeris habitudinem: omnesq; expulsiones naturæ,
fluxiles semper reddideris. Quòd si ob æqualium in to-
to corpore redundantia humorū, ventriculus fluxioē
tēteretur, totū corpus est euacuādū. Si propter mali suc-
ci abundantia, ea purganda est: atq; hinc ad ventricu-
lum conuertenda curatio. Quæ igitur in sinu eius con-
tinentur, cōmodè expurgantur per vomitū. Verūm si
q̃ plures dies prauus humor decubuerit in ipsum, ven-
ter aliquid sibi vitii contraxerit, haud intēpestiuè, qui
sic laborat, absynthii potione vtetur. Per contraria au-
tem corrigi inducta intēperies debet. Si vitiosus succ^{us}
in ventriculi tunicis sit receptus, curari is affectus de-
bet, pharmacis quæ modicè purgent. Cæterū quæ
ex Aloe cōponuntur, omnium sunt longè aptissimæ
nec secus ipsa sola aloë. Quæ quidem si illota sit, valen-
tius vacuat: elota aut̃, purgat quidem minus, sed robo-
rat ventriculū magis. Expediit ergo paratā habere hie-
ram, tū ex aloë illota, tū ex elota confectam. Admiscē

tur aut huius drachmis centenis, cinnamomi, xylobal-
sami, asari, spicæ nardi, croci, & Chia mastiches, sin-
gularū sex drachmæ. Præstantissimū hoc medicamen-
tum est contra vitiosos succos, qui in tunicis ventriculi ha-
bentur: vtiliusq; fuerit eo sicco ex aqua vti duū paruo-
rum cochleariū mensura: vbi mediocriter illo vti stu-
demus. Si quidem maximus eius modus, est magno-
rum duūm cochlearium potio, in aquæ tēperatæ cya-
tis tribus: vt minimus, vnius parui. Vtendū verò hoc
tempore & prisanæ cremore est, qui primus à balneo
sumetur. Nā medicamen ipsum solito purgatiū me-
dicamentorū tempore dabitur. Post id verò, vbi modi-
cè inambulauerit, de reliqua victus ratione nihil est im-
mutandum. Sunt qui reponunt medicamentū, excipie-
tes id despumato melle. Et sic quidem sic durabilius: cæ-
terū nō perinde ad propositos hoc loco affectus vti-
le: quum & minus uentriculū roborat, & magis aluū
subducit. Verūm quibus lenta pituita est infixā ventri-
culo, iis prius sunt exhibenda, quæcunq; eam dissecet.
Post deinde purgandū. Quòd si ad vomendū sint apti,
nō inutile fuerit per radiculā ex oxymelite vomere.
Sin verò nec lentus humor sit, nec crassus, vtq; abun-
dè fuerit, à prisanæ solius cremore vomuisse: itē à mul-
sa. Quo casu sumendū vtrius vis plus est, q̄ vel nutrimē-
ti, vel etiam deiectionis causa sumeretur. Idoneū verò
est, & si mulsā, in qua coctum absinthium sit, bibatur.
At verò si plures affectus in vnum coeant, ad eum qui
magis vrget, dirigi primū curantis consiliū debet.
Vbi aliud efficiens est, aliud quod ab eo efficitur, ipsa
causa spectanda. Sin aut curari hoc ante illud nō licet,
ad id quod ordo dicat, est respiciendum. Atq; in eo q-
dem curationis consilio, quod ab urgente initur, affe-
ctus magnitudo perpendenda est: quæ sanè triplex exi-
sit. Alia namq; ex læsæ actionis præstantia spectatur.
Alia ex propria affectus essentia. Tertia præter has, ex

Hieræ picæ cō-
positio.

Hieræ sicce
vsum ex aqua
unice Galenus
cōmendat, con-
tra vitiosos suc-
cos uentriculū,

Hiera cū melle
cōfecta minus
uentriculū ro-
borat, sed ma-
gis aluū sub-
ducit.

Attenuādos es-
se prius crassos
succos, q̄ cua-
cuādos.

Vomitū qui-
bus & per que
prouocandus.

Affectū oīum
maxime urgē-
ti, dirigi semp̄
curantis consi-
liū debet.

Affectus mag-
nitus est tri-
plex.

facultate, quæ læsum corpus gubernat. In eo verò cōsilio, quod ex causæ ratione inicitur, animaduertendum est quidnā eorū quæ inter se sunt cōiuncta, augere aut gignere reliqua possit: quæ rursus, vel gignantur, vel incrementū ab alio accipiant: at in eo quod ordo præscribit, quid ante quod, vel quid cū quo, vel quid post quod sanari possit. Fingamus igitur in ventriculū defluere ex cerebro superfluū quēdā humorem frigidū: atq; eius occasione intemperie quādam in ventriculo contractā iam esse: vel potius malū iam succū per totū eius corpus media omnia similarium particularū spacia occupasse: ab eo q; si placet, etiā mordicationis sensum, ac proinde tum deliquiū animi, tum sudores, cū syncopes quadā dissolutione excitari. Manifestū utiq; est, in primis esse occurrēdū ei, qđ vires resoluit. Vbi aut vires firmatæ erunt, nec plurimū vitiosi succi in ventriculo aderit, tunc nimirū ad fluxionis causam nos cōuertemus: illud pro cōperto habentes, non posse ad perfectionem ullū affectum sanari, manēte adhuc ipsa, unde natus est, causa. Ergo si sic persanarimus cerebrum, ut sensibile amplius redundantiā non creet, veluti fontē fluxionis in ventriculū, euertemus. Cæterū si neq; copia notabilis excrementorum in ventriculo sit, nec eorū quæ in capacitate ipsius continentur, nec eorū quæ in tunicis, sed nec mordicatio quæ officiat viribus, tū omnium primum sanandū ipsum cerebrū est. Ab hoc, sinus ipse ventriculi vacuandus, extergendusq; est: postea expurgandæ tunicæ: postremò intemperiei mendendū. Ac reliquarum etiam partium intemperantiæ, similiter iis, quas in ventriculo proposuimus, sanabuntur, adhibentibus semper nobis remedium affectui cōtrarium: illiq; remediorū indicationem, quæ à laborantis membri natura sumitur, adiicientibus. Ea aut indicatio est multiplex. Vna quidē ac prima indicatio à laborantis loci temperie sumitur, quæ mensurā introdu-

Ventriculi gravissime laborantis ob defluxum humoris a capite descēditis, curatio,

Affectum nullum perfecte sanari posse, manente adhuc ipsa unde ortus est causa.

Indicatio remedium a natura partis laborantis de sumpta, est multiplex.

tendæ qualitatis præscribit. Secunda ex eo sumitur, quæ actio eius oïbus animalis partibus sit cômunis: aut quæ cômuni virtutem subministret. Tertia, ab ipsa partis figura. Quarta, ab ipsius positura: cuius portio est ad vicinas partes societas. Tum præter hæc omnia, ipsa sentiendi vel acrimonia, vel hebetudo. Porro quæcûq; calidiores natura partes ex frigore laborant, hæc & liberalius, & diutius cal fieri postulant. Si verò calido morbo ægrotent, exigua brevis ue temporis refrigerationem desyderant. Siquidem parvus hic est in id quod præter naturam, lapsus: quare & in id quod secundum naturam, rediens. Eatentis namque redeat ad naturam suam vñ quod quod est necesse, quatenus à natura recessit: ac veluti quadam via retroferatur, quæ in diuersum agat ei, quæ facta in ipso est, transmutationi. Minus itaque periclitantur, qui cunctique cognato naturæ suo morbo laborant. Quemadmodum autem reducendam esse ad mediocritatem diximus calidam & frigidam intemperiem, sic reducetur & cæteræ, siue ex simplices sint, siue coniugatæ. Porro in iis intemperaturis, quæ sunt ex humoribus ortæ, si particula sibi soli inseruiat, audacter euacues licet, prout affectus suadebit: sed tamen etiam virtuti attentus. Sin necessarium opus eius sit omnibus animalis partibus, veluti ventriculi & iecinoris, non levis habenda sollicitudo de robore virtutis est, ne hanc, magna semel vacuatione usus, dissoluas. Est autem cômune opus & venarum, & artiarum, & cordis, & thoracis, & renum, & vtriusque vesicæ. Cerebri verò opus, quum sani sumus, ad voluntarias actiones est necessarium, iis scilicet instrumentis, quibus eiusmodi actiones obimus. Quum ægri sumus, necessarium non est, nisi iis tantum, quæ ad respiratum sunt deputata. Reliquorum verò organorum actio certe non est: ministerium tamen est ad vitam necessarium, veluti pulmonis, & asperæ arteriæ, & gutturis. Ergo ex eiusmodi particulis quæ primum vacuare redundan-

Recessibus a naturali temperie exiguis, exigua mutatione esse opus ut corrigatur: maximus uero maxima.

Cognato naturæ suæ morbo laborantes, minus periclitari.

Vacuare partes affectas, quam audacter & quam debeamus trepide.

Partium officia, quæ nam sint necessaria vitæ, & quæ duntaxat utilia.

tiam licet, prout volueris. Ex ventriculo verò, & iecinore, utcumq; vacuare non licet: sed cum cautione: ut ne quid virtuti officias. Habenda præterea est & dignitatis actionum ratio. Maxima autem est cordis officii dignitas, ægrotantibusq; omnium maximè necessaria. Cerebri verò ad vitam par est momentum: non tamè par robur eius in ægrotis requirimus: quòd necesse omnibus non sit nervorum ac musculorum opera uti. Ac iecinoris opus omnibus particulis per necessarium è: non tamen adeò saltem perpetuam necessitatem habet, sicut ipsius cordis. Ad portionem autem iecinoris, etiam ventriculi opus se habet. Itaq; ex partiũ functionibus facillè intelliges, quatenus cuiusq; robur custodiri expediat. Ad eundem modum, & quæcũq; partes aliis sunt facultatum authores, harũ quoq; robur servare decet, pro facultatis earum vsus portione.

Cerebrum.
Cor.
Hepar.

Vacuationis
modus quomodo
a figura partium
affectione sumatur.

Situs partis aff
fectione quas in
dicationes exhibeat.

Etenim cerebrum nervis ac musculis: cor arteriis: iecur uenis facultatem suppeditat. A figura verò, indicatio ipsius modi vacuandi excrementi, ad hunc modum suggeritur. Ventriculus vomitu, deiectioneq; inanitur. Intestina deiectione tantum: sicuti & iecinoris caua. Renes verò, & vesica, & iecinoris gibba, si multo vitioso succo redundant, per deiectiones & pharmaca deiectoria expurgantur: sin mediocri, per urinarios meatus. Cerebrum, per palatum, & aures, & nares. Pectus & pulmones, per asperam arteriam, & fauces. A situ indicatio dabitur, tum ad solidarum intemperies, tum ad succorum vitium, non levis. Nā qui per summa corporis intemperie laborant, iis medicamenta quæ intemperies requirit, applicabimus. Quibus autem in summo corpore intemperies est, in iis rationem interuallum inibimus. Si enim medicamenti iis utere, quæ intemperies postulat, utiq; multo ibecilliora, q̃ pro vsu tuo, ad affectum locum peruenient. Iā ad vacuationes quæ situs nonnihil indicat; dum societatem laborantis par-

ticulæ cum aliis docet. Non spernenda verò indicatio est, & ea quam sensus partiū acuitas, hebetudoq; sup-
peditant. Quandoquidem omne medicamen contem-
nunt, quæ tardi sunt sensus: etiam si non leuiter mor-
deant. At quæ acuti sunt sensus, earū vires dolore sol-
uuntur. Expedit igitur his nec confertim, nec semel,
valentibus auxiliis mederi tentes: sed tutò potius in tē-
pore. At vbi tardus est sensus, in his etiam celeriter obi-
re qđ iustū est, licet: semel vsis remedio qđ sit idoneū.

Sensus partis
affectæ quas
præbeat indi-
cationis.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E M E T H O D O

M E D E N D I. L I B. V I I I.



Vòd igitur ex calido, frigido, humi-
do, & sicco, similarium particularū
natura cōstet: quòdq; ipsæ simplices
atq; primæ particulæ secundum ta-
les temperaturas inter se dissideant,
alibi à nobis est traditum: quemad-

Similariū par-
tiū natura ex
quibus cōstet.

Similariū par-
tium duo esse
morborum ge-
nera.

modum etiam duo eē morborum genera quæ simpli-
cibus ipsis particulis accidunt: alterum, quod compo-
sitis est etiam cōmune, & dicitur vnitatis solutio: alterū
peculiare ipsarum, quod in calidi, frigidi, humidi, &
sicci intemperie consistit. Quarum sanè intemperan-
tiarum, quatuor diximus esse simplices: quatuor verò
compositas. Simples quidem, quæ secundum vnā
qualitatem à naturæ ordine aberrant: compositas ve-
rò, in quibus secundum oppositionem utrāq; ipsa na-
tura uariatur. Febris autem, unus morborum est, quos
intemperies gignit: utiq; quum adeò immodicè est au-
ctus calor, ut & offendant hominē, & eius functiones læ-
dat. Porro primarum differentiarum febrium, vna il-

Intemperan-
tiarum genus
est duplex.
Febris quando
gignatur.
Febrīū primæ
differentiæ.

*Hæcicæ febres.
Scheeticæ feb.
Febbris indica-
tiones.*

la est, in qua causa adhuc adest febrim creans : aut fe-
bri excitata, iam desit. Altera uerò, qua ægrè solubi-
les, à solutu facilibus febribus distinguuntur: illas hæsti-
cas, has Græci scheticas uocant. At uerò prima indica-
tio omnis febris, ueluti à morbo est, ablationem eius
præscribens. Secunda autem, ueluti à tali est morbo,
quæ certam quandam sublationem indicat: nempe in-
temperiem febrilem, quum sit caloris excessus, per oc-
cursum refrigerantium tollendam esse. Omnis quip-
pe excessus per contrarium excessum sanatur. Ergo si
febris ipsa sit genita, causa autem, quæ eam excitauit,
iam desit, huc tantum sanandæ eius dirigetur cōsiliū,
ut refrigeretur. Si uerò in generatione adhuc febris ē,
causa quæ accendit illam, est submouenda. Sin pars
eius iam genita est, pars etiamnum gignitur, consulen-
dum utriq; fuerit: primū quidem submouendo quæ
eam accendit causam: dein extinguendo, quæ ab hac
accensa est, febrem. Excitare autem uel maximè febrē
solet constipatio meatuum, in iis corporibus, quibus
quid transpirat, halituosum non est, sed mordax, acre,
& fuligini simile. His igitur corporibus saluberrima ē
ex aqua dulci temperataq; lauatio: tum frictio quæ ra-
refaciat: & exercitationes mediocres, & uictus qui dul-
ces efficiat siccos. Aduersissima uerò sunt lauatio frigi-
da, & aluminosa, & lauationis abstinencia, & exercita-
tio acuta, & frictio, uel planè nulla, uel dura, & uictus
mali succi, & uigilia, & ira, & tristitia, & cura, uisioq; ī
sole, & fatigatio. Grauisimè autem peccare mihi uidē-
tur, a carnificibusq; nihil differre, qui medici homini-
bus natura biliosis, tenuissimam per morbos rationē
uictus iniungunt: eosq; tridui inedia conficiunt. Quū
nimirū tales naturæ, ex longiori abstinentia cibi, acer-
rimis acutissimisq; febribus corripiantur: à quibus prō-
ptus est in hæticas transitus: atq; ab his rursus ī mara-
sum torridum: aut (si os uentriculi est iniuriis obno-

*Excessus om-
nes per contra-
rios excessus
sanandos esse.*

*Constipatio
meatū qñ fe-
brim gignere
possit.
Febbris a consti-
patione produ-
citur, curatio.*

*Biliosas natu-
ras, ex longio-
ri inedia febri-
bus acutissi-
mis conipi.*

xiūm Jīn eūm qui syncopen infert. Etenim in quorum temperie siccum præualeat humido, & calidū frigidō: his corporis habitus gracilis, hirsutus, & nigrior est: ac reliquis tribus intemperantiis, quæ hac minus calidæ sunt, tactu calidior aduertitur. Plurima quoq; his flaua è bilis, vrinæq; ac deiectio bili saturā, & pulsus magni, & somni leues & pauci, & animi impetus vehemens. Quare his tum refrigerationem, tum aquæ potiōem, atq; adeò requiem & cibū largiorem congruere proficetur Hippocrates. Quum autem refrigeratio ipsa cōciliet corporibus tum ex aliis quibusdam, tum non minū ex ciborū exhibitione: conueniet utiq; vbi corpus calidius siccusq; solito est redditum, frigidum humidumq; nutrimentum ei exhibere: sed quod nec medicamentosam vllam sensu perceptibilem facultatem obtineat: nec ipsum quod nutrit, plurimum: queniadmodum neq; minus q̄ sit ex vsu. Cōmodissimus itaq; tali corpori est ptisanæ cremor ad vnguē coctus, in quo nullum sit condimentum superfluum: utpote qui & refrigerare, & humectare, ac sine siti seruare hominem potest, cum eo q̄ nec halituosum, nec humidum, nec siccum detinet excrementum: quum nec astringēdi, nec obstruendi, aliquam vini sortiatur. Ac quod nō astringat quidem, vel gustus ipse docet: cuius vnus id iudicare est proprium. Quod verò nec obstruat meatus, hinc licet etiam conicere, q̄ non secus q̄ aphronitroni, sordes cutis extergeat: vomitūq; à ventriculo mediocrem pituitam eliciat, nihilo infœlicius q̄ mulsa: quæ sanè nec sūm restinguit, vt ptisana: & in naturis biliosis bilescit facili. At vero si multa & vehementer glutinosa, & crassa pituita vētriculo adhæreat, hāc radícula ex oxymelite, non mulsa, aut ptisana detergere est habilis. Optimū itaq; biliosis temperamentis nutrimentum est ptisana. Proximum huic, alica, cui paululum aceri ad faciliorem distributionem adiectum fue-

Calidæ & sic-
cæ temperatu-
ræ indicia.

Calidis & sic-
cis naturis qua-
lis victus ratio
conueniat.

Ptisanz cre-
moris facultas.

Gustui quid
propriū.
Ptisanz in ef-
se uim deterse-
riam.

Mulsa in natu-
ris biliosis bi-
lescit facile.
Alica biliosis
naturis conue-
nit.

Pisces biliosus
naturalis con-
gruentes.
Pisces damna-
di qui sint.
Volucris bilio-
sis congruentia.
Exercitatione
carentia, esse
maxime excre-
mentitia.

Hoedi biliosus
apti.

Animalia vetu-
la, recensq; edi-
ra, esui esse in-
epitissima.

Stipitata cutim
quæ sint.

Febrientes a
cōstipata cute
qualiter sint
fricandi et ab-
luendi.
Febris ab ani-
mi affectibus.

rit. Tertium, quæ sine aceto liquida existit. Iniecisse ve-
rò huic, dum coquitur, aliquid porri, satius est. Nam
quod tum anethi, tum salis aliquid necessario habebit,
neminem latet. Quin etiam panis in forno coctus, est
utilis cibus: sicuti etiā omnes pisces saxatiles: nec ipsis
minus aselli. Proximè asellos sunt solea, torpedo, lu-
pus, mulusq;: post, mugil è pelago. Omnis autem piscis
deterior est, qui propè lacū qui mari iungitur, aut ma-
gni fluminis ostium, pascit. Ex volatilibus optimi sunt
perdices, ac montanæ omnes auiculæ. Ab his, gallina-
cei, & phasiani, & columbæ iunenes. Sed nec hæ tamē
intus claudendæ: quoniam excrementosa sint omnia, quæ
exercitatione carent. Excrementosa verò non minus
sunt, tum lacustria, tum palustria omnia. Quo fit, ut ex
ipsis etiam suillis carnibus, optima sit montana. Ab his
deinceps sunt hoedi. In omnibus autem fugienda tum
vetula, tum recens ædita sunt. Illa namq; duriora, con-
coctusq; difficiliora sunt: hæc immodicè humida, & ex-
crementosa. Igitur, quibus acre aliquid quotidie tran-
spirat (revertamur enim rursus ad institutum) ii, si cu-
tis eis constipetur, facile corripuntur febri. Stipant ve-
rò ipsam, tum quæ astringunt omnia: tum quæ ienti-
tia, crassitudine ue sua, in exignis hærent meatibus.
Aliquē etiā ipsius cutis immoderatio siccatas, exiguos
meat⁹ densat. Qui ergo ex stipata cute febri laborat,
ii, inclinante prima accessione, ducendi omnes ad bal-
neum sunt: tum pingniter, molliterq; fricandi: si qui-
dem ex aliquo, quod astrinxit cutim, laborent. Nam
si ex siccitate, fricandi quidem & ipsi, sed parcius: lauā-
di autem vberius. Respicendum verò ad virentis mo-
dum semper est, in huiusmodi auxiliis. Atq; iræ qui-
dem, tristitiæ, vigiliæ & curæ, nec frictione, nec lau-
atione multa indigent. Sed omnibus qui ex eiusmodi
occasione febricitarint, oleum infundendum est tepi-
dum largeq;: cui minimè astringens vis insit: tum pau-
lulum

lulum fricandi, ex consuetudineq; lauandi. Vltio vero, protinus ab initio, refrigerationem desyderat: tū crebriorem lauationem: minimè tamē aut oleum largum, aut frictionem crebram. Sint autē quæ refrigerent, & rosaceum, & omphacinū, salis omnino expertia. Efficies hæc magis frigida, si ita vas, in quo continentur, in puteo suspendas, vt aquā tangat. Præterea, si defluxus frigida aquæ vasi se illidat, magis humorē refrigerat: magisq; adhuc, nix circumposita. Infunde re autem oleum ipsum syncipiti, sublata in altum manu, per mediocrem lanæ modum oportet. Hæc vsq; ad inclinationem faciens, in balneum duces. Si vero qui memorato est temperamento, ex frigore febricitat, etiam ducendus ad balneum in remissione is est. Si autem cum grauedine & destillatione febricitet, prius q̃ hæc sint concocta, lauandus non est. At qui ex vltione febricitant, iis, vel quā hæc adsint, lauari debebunt. Post lauacrum verò, iisdem quibus ante madefaciēda amborum capita sunt: eorum quidem qui ex vltione febricitarunt, refrigerantibus: qui ex frigore, calfaciētibz. Cuiusmodi sunt irinum & nardinum vnguentū. Porro qui ex vltione febricitant, iis intendēda quæ ex refrigerantibus constat curatio est: iis verò qui ex frigore, quæ consistit in calfacientibus remittēda fuerit. Omnium aut conditionum comprehensarum in proposito temperamento, vbi febris diaria laborat, vltus cōmunis est iis, qui & sit boni succi, & concoctu facilis, & qui nūq; exiguis cutis meatibus hæreat. Sed iis qui exusti sunt, cum eo quod refrigeret, & humectet. Pari modo iis, quos ira male habuit. Iis verò qui refrigerati fuerunt, cum eo quod calfaciat modicè. Iis qui peruigilio, & tristitia, & nimia cura confecti sunt, vltus esse debet humectans, atq; somnum concilians. Ad eundem modum iis qui defatigati sunt, magis nutriens: minus autem, iis qui refrigerati. Reliquis, qui

Febris ab ex
stione induc
curatio.

Rosaceū refri
gerandi mod⁹;

Capitis refri
gerandi ratio.

Febris a frigo
re ortę curatio

Diatarum fe
brium in hūio
so tēperamēto
tum cōmunis
omnium tum
cuiusq; ppria
vltus ratio.

Diaria febre
detētis uinum
esse propinan-
dū aquosum.

Vinum acutis
febris Hippo-
crates por-
rigit.

Calidæ natu-
ræ, frigidæ po-
tione iuuātur.

Aquam in fe-
bris nō esse
propinandam
iis, qui uti illa
nō cōsueuerūt

Continētis fe-
bris specie ali-
quam excitari
posse absq̃ hu-
morum putre-
dine.

Sanguinē nec
puero, nec seni
detrahēdū eē.

Sanguinem de-
trahendum in-
terdum esse,
absq̃ plenitu-
dinis notis.

Obstructiones
soluunt, quæ de-
terforia facul-
tate sunt præ-
dita.

medius sit amborum. Vinum verò ipse, his omnibus
exhibere soleo, sed quod tum aspectu, tum viribus sit
aquosum. Id enim ad omnia vtilius q̃ aqua est: utpote
quod & concoctionem iuuat, & vrinas ac sudores pro-
uocet. Etenim constat Hippocratem, nō in diariis mo-
dò febribus, verū etiam in acutis, vinum porrigere.
Cæterū naturæ calidæ, magnopere frigidæ potione
iuuantur: neq̃ in diaria febre, iis quibus i vsu fuit, ipse
eam circuncido. Si quis verò non assueuit, huic per fe-
brim dare non inceperim: nisi pristina sanitate prius
reddita. Porro si propter obstructionē morata sit tran-
spiratio, si parua quidem ea sit, qui rectè deterferit, se-
cundam fore accessionem vetabit: sin momentanea,
non possis ita promittere. Quòd si & multi, & crassi,
& glutinosi impacti sint succi, quæ hos excipit febris,
fieri non potest, ut intra fines diariarum consistat: quā-
do ex necessitate, huic in mali succi naturis ea quæ ex
putredine humorum accenditur, succedet. Nā in aliis
saltem temperamentis, quæ in sequētibus exponam,
excitari ex tali causa potest, citra humorum putredi-
nem, aliqua continentis febris species. Itaq̃ nisi vitio-
sus succus transpiret penitus, necesse est, ut putrescat:
ut transpiret autem, valido auxilio est opus. Ac si qui-
dem vel puer, vel senex sit, sanguinem detrahare non
licet. Inter has ætates, vbi robur ægro non deest, secā-
da vena est, vel si plenitudinis signa nō adsint. Præstat
enim vitiosi succi maiore parte emissa, ad detergēdas
obstructiones accedere: quum alioqui verendum sit,
ne si obstructionibus liberādis, prius q̃ vacaueris, stu-
deas, ipsas multo magis impingas. At soluunt quidem
obstructiones, quæ deterforiam obtinent facultatem,
seu foris admota cuti, seu intrò in corpus accepta. Pe-
riculum verò etiam est, ne quæ foras trahunt, vnà cū
iis quæ obstruunt, etiam aliud quippiam attrahant: &
quæ ab interno sursum feruntur, aliquid secum ex iis

quæ in vasis continentur, rapiât. Quod ipsum si tenax, & crassum sit, obstructionem planè, geminabit: si aliter, multitudine certè sua, non parum omnino nocebit. Ne igitur hæc contingant, vtilissimum est inanisse corpus. Discernetur autem magnitudo obstructionis ex ipsa magnitudine febris: vt quæ ex maiore obstructione, maior: ex minori minor inciderit. Vbi verò modicè iam vacuaueris, haud multo post, aut nutrimentum aliquod, aut pharmacum ex iis quæ detergeant, exhibebis. Atq; in alimentorum quidem ratione sunt prisana & mulsæ: in pharmacorum, oxymeli & quæcunq; incoquere in mulsæ licet, ceu calamintham, hyssopum, origanum, serpillum, iriun, & apium. Verum hæc omnia iusto sunt calidiora, ideoq; febres accendunt, æquè vt vinum. Oxymeli verò solum, nec febres accendit, & strenue deterget, sic vt ea quæ glutinosa crassaq; sunt, dissoluat, & meatus obstructos liberet. Inter mulsam & oxymeli medium locū habet quod apomeli dicitur. Nec immeritò arbitror & saccharum inter hæc numerandum. Ex hoc victu observabis quantum de febrili calore minuitur. Etenim si tertio die mane videris minimū esse quod de febre relinquitur, ac nec putredinis humorū in pulsu nota sub sit, neq; in vrina cruditatis, suspecta verò hora, qua primo die febris occupavit, extra meridiem sit, audacter hominem q̄ ocysimè lauabis, longè ante sextam horam. Abundè tamen sit, si intra tertiam horam luationem compleueris. Ad eūdem modum & si decimā horam suspectam habueris, vsq; ad septimam laues licet: quum tres æquinoctiales horas quatuorue inter balneum accessionisq; tempus interponi abundè sit satis. Debet autem in balneo corpus prius vnctū ac moderatissimè frictū, mox detergeri extrinsec⁹, abluīq; Moderatissimè detergent tum erui, tum hordei, tum fabarum farina. Præterea mulsæ quæ sit aquosa. Magis

Vacuandū aut
prius sit corp⁹
q̄ obstructio-
bus liberandū

Oxymeli esse
aperiendis ob-
structionibus
q̄ aptissimū.
Apomeli
Saccharum.

Balneum triū
ra corpora fe-
bricitatiā pri⁹
inungi debēt,
moderatissi-
meq; fricari,
ac dein deter-
geri.

Detergentia
quæ sunt.

hæc, iris, & panæis radix, & aristolochia, & multa quæ mediocri est mistura: veluti etiam hac magis, quæ meracissima est. Possunt autem vel hac magis detergere, tum spuma nitri, tum nitrum ipsum, tum aphronitrum. Sapo etiam ex iis est, quæ maximè detergere valent. Egressis balneum, præter aquam quæ parum apii incoctum in se habuerit, nihil est offerendum. Iam verò diariæ febres (de quibus tantum in præsentî cōmentario agere est animus) in propositis corporum temperamentis, sæpenumero etiam cruditatibus solent supervenire. Est autem pessima in eiusmodi temperamentis cruditas illa, citissime quæ febrem accendit, in qua cibus in nidorulentam & fumosam qualitatem corrumpitur.

Diarias ex cruditate fieri sæpe in biliosis temperaturis. Cruditatum differentia.

Quando ea quæ in acidam vertit, ut raro talibus naturis contingit, ita minus nocet. Nidorosa tamen cruditas, si alius lubrica sit, minus est noxia. Sin astringitur, gravis existit. Febricitant etiam nonnulli & ex iis, quos diarrhœa ex cruditate malè habet. Quibus utique non minimè proritur febris ex defurgendi frequentia.

Febris ex defurgendi frequentia.

Est autem eorum quibus clausa alius est, & quibus fluens, non eadem sanatio. Si igitur ea tantum quæ corrupta fuere, per diarrhœam vacuata esse videantur, tum lavandum, tum nutriendum in remissione febris est: sed iis quæ circa ventriculum sunt, prius consulto. Sin ita multa inanitio aut prius facta sit, aut nunc etiam in homine duret, ut virtus iam sit defessa, satius est omissa lauatione cibare, sed consulto prius iis quæ circa ventrem sunt. Consultetur ita laborantibus, si modo vacuatio amplius non perseveret, fomento ex oleo & absynthio. Quod si quis morsus, aut doloris sensus in ventriculo adhuc supersit, amiciri peniculo post fomentum debet, qui vel calidus sit, & siccus: vel ex oleo in quo absynthium incoctum fuit, vel ex vnguento nardino madens: ac plurimum expressus. Iam multo etiam satius sit, si purpura marina is fuerit: atque etiam longè

Febris a diarrhœa ortu curatio.

Fomento ex oleo & absynthio quæ utendū.

Purpura marina.

Purpura tyria

optimum, si optima sit Tyria. Quod si os vetriculi imbecillius sit, tanta portione Chia mastiches in nardino tinsa, vnde sordium crassitudo existat, madefacta ex eo purpuram imponemus. Esto autem abunde calens talium quodque quum primum admouetur. Nam quæ tepida sunt, dissoluunt vetriculi firmitudinem. Vnguenta autem ipsa calfacere in duplici vase soleo: quandoquidem aliter calfactis, vitiatur eorum facultas. Cæterum fluente adhuc aluo, vtilius est, optimo recenteque melino, simili modo quo nardino, vti. Vtile autem ad omnia talia est, & mastichinum: nec in postremis conferunt spicata & foliata vngueta, quæ Romanorum luxus inuenit. Mirè etiam vetriculum roborat, hoc ceratum quod subdam. Cera Tyrrhenicæ; Vnguenti nardini, singulorum, vnciam. j. Aloes, Mastiches, singulorum drachmam. ij. Fiat ceratum. Si vero intus vratur vetriculus, ita vt affectus quidam phlegmonæ similis consistere in ipso videatur, vtilius est ceratum quod ex melino conficitur. Porro cibandi sunt, fluente quidem etiamnum aluo, polenta & pane, qui paxillum aceti receperit. Quod si plus æquo aluus excernat, inspergere oportet polentam succo cotoneorum malorum, vel (si ægro magis arrideat) pirorum, aut malorum, aut myrtorum decocto. Sin venter non amplius excernit, suffecerit tamen alica, similiter præparata: hoc est aceti habes paxillum: tum ex ea sine aceto sorbitio: tum gallinaceorum testiculi: & saxatiles ex albo iure pisces: præterea fructuum aliquis ex iis qui astringant, vel solius, vel cum pane. Quod si appetentia deiecta sit, ex medicamento quod ex succo, vel ex carne cotoneorum conficitur, vnum aut duo cochlearia exhibebis. Atque ita sanè in prima remissione iis qui ex cruditate febricitant, ventre excernente, mederi conuenit. At si omnino venter astringitur, si quidem in superioribus intestinis, vel etiam in ipso ven-

Vetriculi imbecillius quæ roborent.

Tepida, si admoueat, dissoluere vetriculi firmitudinem.

Vnguenta esse calfacienda in duplici vase.

Aluo fluenti quæ conferat. Romanorum luxus quæ ungueta inuenerit.

Ceratum roborando vetriculo commodum.

Aluo fluente uictus ratione conueniens.

Appetentiam restitui usu medicamenti ex succo cydoniarum confecti.

*Diatrion pe-
peret esse me-
dicamē crudi-
tatibus utrū-
cū aptissimū*

triculo cibus crudus consistat, aliquid diatrion pepe-
reos propina, eius videlicet, quod in opere de tuenda
sanitate laudauimus, seu & simplicissimum, & aptissi-
mum, iis qui cruditate laborant. Post deinde præcor-
dia, omnemq; ventrē perfundens. Hoc verò, etiam
si inferius descenderint quæ vitiosa sunt, facies, plaris
minorisq; ratione id varians. Siquidem plus & tem-
poris & perfusionis exigunt ad præparationem cordi
quæ deinceps sunt agenda, quibus in superioribus ven-
tris corruptum nutrimentum adhuc manet. Sin mo-
tum id notabiliter ad inferiora sit, adiuuandum aut glā
de subdita, aut leui per inferna infusione est. Vtiq; si
morsus simul adsit, hunc mitigantibus nobis. Sin fla-
tus, hunc comprimētibus. Sin neutrum fuerit, ex mel-
le, aqua, & paululo olei ipsum clystnum facientibus.
Vbi verò morsus vehementior urget, Sabinum ole-
um, in quo aliquid seu anserini, vel gallinacei, vel ca-
prilli liquatum sit, est vtilius. Quorum copia si desit,
iniiciendum oleo parum ceræ est elotæ. Flatus verò
sanandi sunt oleo in quo ruta, & semina quæ flatus
discutiunt, incocta fuere: cuiusmodi sunt apii, cumi-
ni, marathri, sinonis, aliaq; id genus. Vacuata aluo,
nutriendum protinus in cæteris quidem iis quos me-
morauimus similiter est: astringentibus tamen amo-
tis. His igitur prima & secunda die obitis, si secunda
die febris desit, hominem lauare permittes. Ac vbi
sequenti nocte citra offensam dormierit, sanum iam
hominem prorsus existimabis. Si verò qui cruditati
succesit dies cum sequente nocte febrim attulerit,
veluti in secundo die, ita tunc & accurandus, & nu-
triedus homo est. Quod si nox tertiæ diei febrile quid-
dam paululum afferat, ne sic quidem est formidandū,
sed hos quoq; postridie lauabis, nutriesq; ac reliqua
omnia in illis, vt ante definitum est, ad portionem
exequeris. Acida autem cruditas non contingit in

*Intestinarum
morsus leniē-
tia.
Flatus discutiē-
tia quæ sunt.*

*Flatus discutiē-
tia quæ sunt.*

biliosis temperamentis, nisi admodum raro, idq; ex
 cibis qui promptè acefcunt: nec accendere febrem
 diariam solet, æquè vt nec concoctionis tarditas:
 quandoquidem sicubi ob talem cruditatem febrici-
 tant, quibus amara bilis abundat in temperamen-
 to, obstructionis & humorum putredinis est suspi-
 cio. Adhæc, fumidus vapor ex tarditate concoctio-
 nis, aut cruditate, in qua ructus sentiuntur accidi,
 nunquam excitatur. Quippe frigidi halitus abs ta-
 libus succis ascendunt, hiq; omnino paucissimi: mi-
 nimè autem vapores multi, humidiq; ac fuligino-
 si: quum neq; in iis quæ sunt extra, aliter aut fumum
 edi, aut fuliginem videas, quàm fumum ex materiis
 semiustis: fuliginem ex immodicè asfis, vstisq;. Est
 namq; fuligo vapor terrestris. Fumus mistio quædam
 ex terrestris, aqueaq; substantia. Absoluta iam in iis
 naturis, quibus amara bilis redundat, diariarum fe-
 brium disputatione, ad aliud corporum temperamen-
 tum transeamus, in quo vt calidum frigido, sic sicco
 humidum præualet. Est enim hæc intemperies om-
 nium maximè obnoxia putredinis morbis, propterea
 quòd per ipsam sanitatem ad putredinem proximè ac-
 cedit: id quod tum ex sudoribus coniicere est, qui gra-
 uiter his olent: tum verò ex vrinis, deiectione, atq;
 adeò ipsa etiam expiratione. Etenim qualis est hircoꝝ,
 talis est harum naturarum temperies. Ideoq; prom-
 pta est ex qualibet occasione tum aliis morbis, tum ve-
 rò febribus corripì. Siquidem quum eorum cutis est
 stipata, effugere febrem nò possunt. Sed nec quum va-
 lentem cruditatem contraxerunt, aut perusti fuerūt,
 aut tale quippià aliud perpesi. Ià verò à cruditatibus
 nidorosis obstructiõibusq;, naturæ calidæ & humidæ,
 q̃ siccæ, pròptius læduntur. Itaq; oēs diaræ febres ac-
 cenduntur pròptissimè in istiusmodi temperamentis,
 idq; ex qualibet earum causarū, quas in biliosis natu-

Acidam cru-
 ditatē nō con-
 tingere in tem-
 peraturis bi-
 liosis, nisi ad-
 modum raro:
 neq; accedere
 febrem diariā.
 Fumidum ha-
 litum nō exci-
 tari ab acidā
 cruditate.

Fumus ex ma-
 teriis semi-
 ustis nascitur.
 Fuligo ex im-
 modice vstis
 materiis gigni-
 tur.
 Intemperie ca-
 lidam atq; hu-
 midā esse ma-
 xime obnoxia
 morbis putre-
 dinis.

Naturę calidę
& humidę, ma-
gis q̃ calidę
& siccę, famē
& sitim perfe-
runt.

Intēperies ca-
lida & sicca ē
ad excipien-
das febres op-
portunissima.

Intemperantia
rum omnium, q̃
nam sint ma-
gis obnoxie
febris.

Intēperies fri-
gida & humi-
da, q̃ ab ine-
dia inuenitur.

Naturalē ser-
uaria ordinem
semper similia
postulat: vt cō-
traria, quę a
naturę ordine
aberrant.

Febris requi-
rit victus rōnē
frigidam atq̃
humidam.

ris retuli: curationemq; persimilem illis habent, ac in
paucis omnino dissidentem. Nam quā hęc naturę hu-
midiores sint, magis q̃ illę famem & sitim perferunt.
Est igitur illis ex vsu balnenm, quod cutim laxet, nom
autem quod corpus humectet. Quęcūq; verò de eius-
modi natura sunt dicta, eadem & de acquisito habitu
dicta esse censendum. Quum autem octo intemperies
existant in vniuersum, opportunissima ad febres est
calida & sicca: ac nisi quis illam (vt dictum est) cibet,
ocysimē in ea diaria febris in acutam mutatur. Pro-
pinqua huic est, quaten⁹ ad febrem spectat, quīs sit ad
alia deterior, intemperies calida & humida. Tertia ab
his intemperies est, ea simplex intemperantia, in qua
tantum exuperat calidum. Huic proxima est simplex
altera, in qua siccum humido præualet. Ab hac dein-
ceps media omnium est, scilicet quę mediocritatem
in vtraq; oppositione tuetur. Quatuor quę reliquę
sunt intemperies, neq; facillē febribus, occasione iam
dictarum causarum, patent: neq; diaria tentatę, si ine-
diam tolerant, in plurium dierum febres trāseunt: im-
mo aliquę saltē earū, vbi citra corruptelā contraxerūt
redundantiam humbū, vtilitatē ex inedia sentiunt, ac
potissimum quę frigida est, & humida. Ab hac quę
humida est: Tertio loco quę frigida: Quarto, quę si-
mul frigida & sicca. In eiusmodi ergo omnibus tem-
peraturis, temperamenti quidem ratione, victus ra-
tio varianda est. Nam ex eo quod eadem febris fe-
bricitant, non diuersam, sed omnino eandem, sortien-
tur indicationem. Siquidem quod secundum naturam
est, semper similia postulat. Quod autē præter naturā,
contraria. Quum nimirum quod se naturaliter habet,
custodire: quod præter naturam est, tollere expediat.
Porro febris omnis præter naturam est: ideoq; victus
rationem frigidam & humidam exigat. Temperamen-
ta verò ipsa, aliās similia, aliās contraria postulant.

Quæ enim vitio carent, similia perpetuo: quippe quæ
 seruare expedit. Quæ vitium habet, aliàs similia, alias
 contraria. Similia quidem, tum in aliis de quibus mox
 dicemus: tum in viceribus omnibus. Contraria autem
 in eo victu qui per sanitatem adhibetur, dum corrige
 re eorum intemperantiam est animus: necnō ubi eius
 modi vitioſe naturæ à longo tempore, contraria vi
 ctus rationi aſſueuerunt: gaudent enim naturæ conſue
 tis ſemper. Duplex itaq; nobis in iis qui ſani ſunt ſinis
 proponitur. Nempe vel corpus ſanum in priſtina eius
 temperie tueri: vel hanc meliorem efficere. In ea tamē
 natura quæ haud dubiè in medio temperamento con
 ſiſtit, ab ipſa febris contrariorum indicatione accepta,
 eatenus humidum frigidumq; adhibebimus victum,
 quatenus ſiccus calidiusq; antea iam redditum cor
 pus apparet. Humidus igitur victus (vt teſtatur etiam
 Hippocrates) febrientibus omnibus conuenit: maxi
 mē verò pueris, & aliis qui ſic cibari aſſueuerunt. Ete
 nim febrientibus, quatenus februnt, ex ipſa contra
 riorum indicatione humidus victus conducit: pueris
 ex ſimilium. Nam quum ætas ex iis ſit, quæ natura no
 bis infant, ſimilem ſibi victum poſtulat. Quæ verò à
 conſuetudine indicatio ſumitur, ſic ſumpta eſt, ſicuti
 & quæ ab ætate. Quippe ſeruare quoq; hæc iubet Hip
 pocrates, perinde ac proprium ætatis temperamētū.
 Sed à regione etiam & anni tempore interdum indica
 tiones ſumuntur. Cæteræ à conſuetudine quidē, ſenip
 eſt indicatio ſimiliū, quoad ſcilicet ægrotāt homines.
 At ab ætate, natura, regione, anni tēpore, & ſtatu cœ
 li, ubi temperata hæc ſunt, ſimilium ſemper præſidio
 rum eſt indicatio: ſiue valeant homines, ſiue etiam æ
 grotent. Contra ab intemperatis anni tempore, ſtatu
 cœli, & regione, contrariorum eſt indicatio. Verūm
 ab ætate & natura, non abſolutè, ſed cum conſuetudi
 ne. Porro nihil in contrariis indicationibus tam con

Temperamen
 ta inculpata
 miſſa poſtulat.
 Temperamēta
 vitioſa, qñ re
 quirant ſimi
 lia & quando
 contraria.

Naturæ gau
 dēt ſemper cō
 ſuetis.

Humidus vi
 ctus febrienti
 bus omnibus,
 cōuenit: maxi
 me vero pue
 ris.

Conſuetudinē
 eſſe ſeruādam
 non ſecus ac p
 prium tempe
 ramentum.

Indicatio ab
 ætate, natura,
 regione, anni
 tpe, & ſtatu
 cœli, quando ſi
 milium, & qñ
 diſſimiliū ha
 beat.

Indicat iōibus
oppositis oc-
currētibz, ex
pendendam es-
se magnitudi-
nem eorū quæ
ad indicatiōē
conferunt.

Indicatiōem a
febri sumptā
reliquis supe-
riore existerē.

Indicationes
tum diariarū
febrium, tū ea-
rum quæ pluri-
bus diebus af-
fligunt, ex qui-
bus capiuntur
generibus.

Hæcitas fe-
bres nulla ac-
cendit causa.
Hæcitas cum
diariis in quo
conueniant, &
in quo discre-
pent.

uenit expendi, q̄ magnitudinem eorum quæ ad indica-
tionē conferunt: quæ quidē duplex existit: altera, quæ
ex * eorū dignitatibus spectatur: altera quæ ex ipsorū
propriis substantiis. Quas sanē ex collatione cum me-
diocri, & quod secundum naturam est, esse accipiēdas
liquet. Omnibus igitur conspirantibus in vnum indi-
cationibus, vnam prorsus victus rationem constitue-
mus. Dissidentibus verò inter se, quæ valētiores & plu-
res fuerint, eas præferemus, ita vt vict⁹ spēsies, quam
hæ præscribent, anteponamus: minimē tamen negli-
gamus contrariam. Porro quæ à febris sumitur indica-
tio, ea reliquis, quando omnes contrarium esse facien-
dum dicant, numero quidem inferior est: magnitudi-
ne tamen quæ ex dignitate spectatur, vtique superior
existit: potissimum si longē à natura recesit. Quippe
duplex tunc ei magnitudo accedit: & quæ ex febris ge-
nere prouenit, quæ omnibus est cōmunis: & quæ pro-
pria, suāq; ipsius existit. Sin verò parua sit febris, eas ē
reliquas omnes coniunctas indicationes vnā cum ipsa
conferri. Ac si quidē pares videantur, media victus rō
eligenda est. Sin altera indicatio exuperet, tantum re-
cesisse à temperato & medio victu par est, quātum ea
quæ pollent, sua contraria superant. Ac diariarum qui-
dem febrium indicationes ex his capiūtur generibus,
rarōq; à laborātis virium modo. At febrium, quæ plu-
ribus diebus affligunt, indicationes, tum virium respe-
ctum necessariō adhibent: tum causarum quæ ipsas ex-
citant: exceptis tamen hæcticis, vtpote quas nulla accē-
dit causa: quemadmodum neq; corpus id, quod iam
habitu calorem ignis in se recepit: siue id lapis sit, siue
lignum. Illud nanq; commune cum diariis habent, q̄
videlicet non amplius fiant: differunt autem in
eo, q̄ diariæ in leui affectu calorem habent:
hæcticæ in habitu qui ægrē soluatur.

GALENI PERGA

MENI DE MEDENDI

METHODO. LIB. IX.



DIARIARVM igitur curationem præcedenti libro exposuimus. Quæ sanè febrîũ vnica accessio est, vnico plurimum die, ex ipsarum saltē natura, circũscripta. Cæteræ nisi q̃s eas cōmodè tractet in reliqua duo genera febrium, nempe in putridas & hec̃ticas, transeũt. Putridas enim appello, quæ ex humoꝝ putredine: hec̃ticas verò, ex immodica solidæ partium nascuntur calfactiōe. At verò in illo trāsitu à diariis in reliqua illa duo febrium genera, alæ quoddā febrîũ genus mediũ licet imaginari, qđ neutri extremitatũ sit idē. Cæterũ mediũ id, quũ inciderit, nec nosse ii possunt, nec reprimere, qui extremitatũ, quæ existit medium, speciem ignorāt. Ergo ex adustione, cruditate, lassitudine, vigilia, p̃turbatione animi, vel bubone, ab euidēti causa aliqua oborto, nunq̃ ad terciũ vsq̃ diē progrediē febris accessio, nisi qđ delictũ circa laborantē fuerit. At qbus stipatio febris occasio est, iis ēt ultra hos porrigi accessio pōt. Etenim stipatio fit, vel obstructis exilib⁹ meatibus p̃p glutinosos, vel crassos, vel copiosos succos: aut p̃ni uētib⁹, ob ea quæ corp⁹ siccarũt, vel deniq̃ iprobè cōdēsatis, ob occursum causæ refrigeratiũ. Quas igit̃ febres uel conuientia meatuũ, uel recens corpoꝝ densatio excitant, hæ & post primam accessionē desistũt, si quis rectē ipsas tractet: & uerè diariæ tum sunt, tũ dicũtur. At quæ ex obstructione creant̃, si hæc qđ pusilla sit, solui quoq̃ ipsæ sũt ut aliæ diariæ p̃nt: si quis eas legitimè sanet. Sin autem ad cō vchemēter sint humo

Diariarum accessio est vnica vnico circũscripta die.

Diarias transire in putridas hec̃ticasq̃, nisi rectē tractent̃. Putridæ febres quæ.

Hec̃ticæ febres quæ.

Stipatio quod dupliciter fit.

Diariæ febres quæ nam & sint, & dicantur.

res impacti, ut valentius aliquid quod eos eximat, possulent, id genus febres porrigi ultra unum diem necesse est, ac proinde diariarum genus videri egressas. Verum si neque humor putrescens subsit, neque ipsum corpus febrilem calorem susceperit tanquam habitum, utique genus id febris, ab aliis duobus diuersum erit. Quare huiusmodi febris natura quidem eadem est cum diariis: nomen verò non idem. Siquidem quæ febris ab initio ad finem usque unicam accessionem sortiuntur, in multos dies porrectam, eam synochi, hoc est continentes, vocantur. Quarum natura est duplex. Quædam namque earum manifestam habent putredinis notam. Quædam prorsus non habent: quas nimirum ex diariarum esse genere constat. Quam enim accessionis remissio ex feruentium humidorum transpiratu contingere solet: non transpirent autem prorsus in stipatione vehemēti: necesse haud dubiè est, multorum dierum fieri accessionem. Igitur ubi in tali febris nulla subest occasio, quæ alterius accessionis principium excitet, non modò multorum dierum euadit febris, sed absque inuasionē vllius accessionis, ab initio ad finem una febris persistit, nec quotidianam, nec tertianam, nec quartanam referēs. Quoniam igitur ex duobus his foueri febris potest: & quòd totus vapor non transpiret: & quæ idem vapor ea quæ contingit excalfaciat: necessum est tres esse synochorum differentias in vniuersum: nempe vel pari permanente magnitudine ea, quam in primæ accessionis vigore habuit: vel adiiciēte semper exiguum aliquid, minuentē uel: atque hæc vel æqualiter faciente, vel inæqualiter. Ac si quidem quod accenditur, ei quod transpirat par fuerit, nec augeri, nec minui febrilis calor cernetur. Verum si eorum alterum vicerit, utique si quod vacuatur, necessarium est febrem minui: sin quod adii citur, omnino incrementum. Hæc itaque est continentium febrium species una, quæ eandem naturam cum dia-

Synochæ febres quæ vocantur.
Synocharum febrium genus duplex.

Synocharum febrium tres differentie.

riis sortita, absq; humorum putredine in pluris, dies extenditur. Altera verò contingit, vbi in omnibus va-
 sis, ac potissimum maximis, æquabiliter succi putre-
 scunt. Quarum sanè febrium in gracili & frigido cor-
 pore neutra solet cōsistere: sed plurimum in iis qui san-
 guine abundant, & corpulentis: qñ nec obstructio ci-
 tra putredinem excitare febrem valet, nisi id quod trā-
 spirat, & copiosum, & calidum sit: nec humorum pu-
 treado in omneis, quæ inter inguina & alas iter sunt ve-
 nas, æquabiliter ac cito porrigi in frigido habitu po-
 test. Debent enim quæ putrescunt, tum calida & hu-
 mida esse, tum difficilem habere trāspirationem. Eoq;
 fit vt neq; in frigida ætate, neq; in frigido corporis tē-
 peramento, continens excitetur febris: quænammo-
 dum neq; in gracilibus, uel qui raro sint corporis ha-
 bitu, sed prorsus in temperamentis, corporibus,
 atq; naturis contrariis. Proinde fit, vt qui ita febrici-
 tant, iis & pulsus maximus sit, & æqualis, & vehemēs:
 arteriæq; consistētia inter molle & durum mediocris.
 At celeritas atq; frequentia pulsus, pro ipsius magni-
 tudine febris. Hæc itaq; sunt ambarum febrium com-
 munia. Alteri tamē priuatim insunt notæ putredinis:
 non modò in lotio, sed in pulsu etiam, calorisq; quali-
 tate iniucunda. Quarum sanè febrium dignotionem
 & curationem ipsi tum ratione, tum experientia didi-
 cimus, qui statim ab adolescentia philosophiæ studio
 capti, primū nos ad eam contulimus: mox patris eui-
 denti insomnio moniti, ad medicinæ studium excolen-
 dum accessimus. Est porrò continentium febrium p̄si-
 dium maximum, si modò vires valentes sint, sangui-
 nis diminutio, vel vsq; ad deliquium animi. Primum
 namq; in contrarium statum agitur corpus, celerrimè
 ex animi defectu refrigeratum. Hoc verò nihil inueni-
 ri possit neq; ipsis ægris, nec naturæ quæ animantes
 gubernat, iucūdius, vtilius ue. Postmodum in corpo-

Putredini quæ
 requirantur.
 Continens fe-
 bris in quibus
 non possit gi-
 gni corpori-
 bus.

Galenus p̄si-
 somnio admo-
 nitus Medici-
 næ nauauit o-
 peram.
 Continentium
 febrium p̄ssi-
 diū maximum
 est missio san-
 guinis, vel ad
 animi vsq; de-
 liquium.

ribus ipsis necessario superuenit alui deiection: nonnunquam & vomitus bilis. Quas res statim a toto corpore maiores sudores uel excipiunt. Etenim uel sola sanguinis detractio sic obita restitui olim ipse quendam

adolefcentem ardentissima laborantem syncho. Cui sane post duas a sanguinis missione horas paulum nutrimenti exhibui, permisiq; ut quiesceret. Iam uero eorum qui ex sola obstructione febricitantes mihi uidere contigit, nemo in putredinis febrem incidit, quae sanguinem prius detraxisset. Quae quidem ubi ualida uirtus subest, & aetas permittit, usque ad animi defectum (ut diximus) mittere expedit. Vbi horum alterum haud satis respondet, tutius est, quantum satis uisum fuerit statim principio detrudere: quod defuit, iteratione supplere. Quo quidem praesidio omisso, in summum aegri discrimen ueniunt: nisi eos uel uirium robur, uel largum profluuium sanguinis, uel sudor copiosus, ex manifesta perniciem eripiat. Agimus itaque praesentiae de iis febribus, quae ex stipatis per obstructionem meatibus oriuntur. Quas, si sine putredine quidem consistant, ex diariarum esse genere dixi. Sin iis putredo aliqua superueniat, ubi in omnibus uenis ac praecipue magnis, ea praestitit, synochas, siue continentes excitari febres: ubi in unica animalis

parte, exacerbationes quae certo ambitu repetant. Quibus igitur corpus ex succorum abundantia inhabile ad transpirationem iam redditum, tantum caloris congescit, ut inde iam febrat, iis tamen sanguinis detrahendum est, quantum uires tolerant. Alioqui certe verendum est, ne aut suffocentur, aut corripiantur syncope, nisi eos uel uirium robur, uel plurimus sudor, uel largum sanguinis profluuium a morte liberet. Nec uero existimes de plenitudine illa, quae comparatur ad uires, hunc a nobis sermonem fieri (quippe quae nec sic obstruit uenarum ora, ut refrigerationem prohibeat, nec tunicas earum distendit, nec ruborem, nec tumorem iniecit) uerum de ea quae contineri a uasis

Sanguine detractio, in ardentissimis febribus, interpositisq; horis duabus, esse modice alendum aegrum, permittendumq; ut quiescat.

Sanguinis missio quam sit celebranda usque ad animi defectionem.

Synochi quam eriantur.

Accessiones febriles unde originem ducant. Sanguis quibus detrahendus sit.

Plenitudo secundum uires
Plenitudo secundum uasa.

ultra nō valet: quæq; ob id ipsum solet prædicta sympto-
mata inducere. Siquidē copia hæc, dū bonitatem suam
seruat, vt pariter augeri cū virium robore est nata, ita
si qñ has grauat, nec de cætero augebitur, & bonitatē
naturæ amittet: quare tunc fieri nequit vt non putre-
scat. Ergo festinare ad sanguinē detrahendū oportet:
quo valox natura, ex transpirando, ventilandoq; na-
turalē temperiem seruās, humoribus, eo quo inter ini-
tia modo, dominetur: qñ si ad intemperie versā labora-
bit, metuendū est ne hi putrescant. Excitatur autē intē-
peries in ea, ex febris calore. Optimū itaq; est in huius-
cemodi febribus statim non numero dieꝝ, sed vni vi-
rium robori attentū esse. Quo circa non solū sexto se-
ptimoꝝue, sed et sequentibus diebus sanguis mittendus
est. Quod si aut alii medici, aut æger, aut propinqui ip-
sius, nō permittant vt seces venā, ad frigidā exhiben-
dā accedes, sed diligenter ante discernens, q̃tum nocu-
mentū ex ea cōtingere possit. Quippe intēpestiuē imo
diceq; exhibita, lentos & crassos humores attenuari,
digeriq; prohibet. Imbecillas particulas corporis pecu-
tit. Nonnullis illico spirandi difficultatem, cōuulsionē,
atq; tremorem conciliat. Tum verò, quibuscunq; in
particula principe tumor aliq; è phlegmone, œdema-
tos, aut scirri genere constitit, iis frigidam offerre nō
licet. Sed neq; iis quibꝰ obstructio, putridusꝝue humor
non concoctus incommodat. At si per continentes fe-
bres cōcoctionis humorum notas videris, absq; impe-
dimentis expositis, audacter ægris frigidā quātū appe-
tant, dabis: præcipuē si tali portioni afflueuerint. Porro
erysipelas vix, cōsistens in aliquo viscere, non aliter, q̃
frigidæ potu, sanabis. Sin verò mistum cū phlegmone
sit, in hoc cōcoctionis expectādæ sunt notæ. Catex mi-
nus tuta iis q̃ paucillū sanguinis, carnisq; obtinēt, fri-
gidæ potio est. Celeriter nāq; ad solidas animalis per-
uenit partes, nulli quod eius vim frangat, occurrens.

Sanguinem est
se quouis die
mittendū, etiā
septimo, si id
morbus atq; vi-
res suadeant.

Frigidæ potu
utendum, si æ-
ger non patia-
tur sibi secari
venam.

Frigidæ intem-
pestius atq; i-
modicus ulus,
quæ accersat
mala.

Frigida qbus.
nen offerenda
et quibus au-
dacter danda.
Erysipelas ve-
rum cōsistens
in aliquo visce-
re, non aliter
q̃ frigidæ po-
tu sanatur.

Frigidæ potus
cur macilentes
exanguisque
atq; ab id he-
cicos, lædat.

Continentiū
feb. detraçtio
nem sanguinis
atq; portionem
frigidam, esse
summa reme-
dia: atq; illa q
dem, quous tē
pore, si vires
tolerent: hac
aut, apparenti
bus coctiōis si-
gnis vtendum
esse.

Sanguinem de-
tracturo quæ
sint conside-
rando.

Sanguinis de-
tractiōē quæ
prohibeant.

Sanguinis de-
tractiōē quæ
posulent.
Methodus cō-
sistit in vniuer-
salibus.

Exercitatio in
particularibus
constat.

Qua ratiōe etiam hēctica febres nec prorsus frigidæ,
nec multam aquam dēsyderant. At continentium fe-
brium maxima remedia hæc duo sunt, detractio san-
guinis, & portio frigida. Verum illa nullo non tempo-
re: modò vires suscineant: hæc, quum & in pulsu & vri-
nis, concoctionis euidentes cernuntur notæ: febris au-
tem est maxima. Est etiam habenda ratio in missione
sanguinis, tam eorum quæ præcesserunt, q̃ quæ conse-
quentur ipsam. Nam si præcedat ciborum cruditas, tã-
to tempore differre venæ sectionem iubebis, quātum
satisfacere tum ad eorum concoctionem, tum vt ex-
crementa descendant, videbitur. Sin sequetur necessa-
riò vacuatio quæpiam (vt exempli gratia, muliebri
prospuium) tantum illi relinquendum est, ex eo quod
superfluum existit, quantum est per eam vacuandum.
Sed nec negligenda interim natura eius qui venit va-
cuandus: sicuti neq; ætas, nec cœli status, sub quo & re-
gio, & anni tempus comprehenditur. Sunt enim non-
nulli ad extrahendos digerendosq; succos, natura pro-
pensi: nempe qui humidi & calidi existunt: quiq; raro
sunt corporis textu. Adhæc, quibus os vētris aut ama-
ra bile redūdat, aut imbecillum est, aut supra modum
sensile. Pueri. certē propter ætatem perpetuò. Cœli
verò status vbi calidus nimium & siccus est, corpus in
ambientem resoluit. Atq; hi quidem scopi sunt, qui à
sanguinis detractione dehortantur. Eam autem postu-
lant, vnà cum affectu, cuius causa primū requireba-
tur, habitus durus, densusq; , quiq; digeritur ægrè: tū
ambiens humidus, frigidusq; . Quū autem in vniuersa
libus methodus, in particularibus exercitatio cōsistat,
fieri non potest, vt sine multiplici in ægris singulati-
exercitatione, quod ex vsu sit, facias: nec sine vniuer-
salium cognitione, probè exercitatio procedat. Nor-
licet siquidem vllius artis scientiam nācisci, nisi & me-
thodum quādam habueris per vniuersalia theorema-
ta: & in

ta: & in particularibus te exemplis exerceas. Vt igitur reuertar ad methodum, equidem virtutis consyderationem ad curationem morborum sæpe maximè necessariam arbitror: sic, vt quæ circa egrum administratur, omnia ferme eius vnius causa fiant: aliquando nec diocriter necessarium: sic vt aliquid ex hac quoque, ad ea quæ facienda sunt, consilii petatur: non tamen præcipua faciendorum ratio huc omnis dirigatur. Possum rursus ostendere, virtutem ad eò exiguū ad inueniēda remedia cōferre, vt pp exilitatem ēt lateat: aliàs verò p̄termitti, ac silētio p̄teriri: quasi prorsus ex vtiliter cōsyderandis non sit: vt in diariis febribus, in quibus vires nullam prouidentiam requirunt: vtpote validæ. Verum quod in virtute accidit, id in reliquis omnibus quæ aliquid faciendum indicant, vsu venit. Horum autem omnium aditum Hippocrates nobis ostendit, incul tum tamē: quem methodo postea nos explanauimus: perinde vt Traianus, fecit, qui omnes Italiæ vias asperitate difficiles, refecit, instaurauitq;. Vt verò accuratius de ipsis viribus differam, operæpretium est scire, tribus d̄neris generis facultatibus siue animis vniuersum animal gubernari. Quarum sanè prima quæ stirpibus est communis, quāq; vocāt naturalem, atq; etiam appetitricē, iecur pro fonte habet: per venasq; illinc sparsas in vniuersum corpus, id alit. Secunda autem est, quæ non modò vt stirpibus, aut vita præditis, sed etiam vt animalibus anima, est īfita. Hæc in corde, fonte caloris īfici, residēs, ab ipso per arterias ab eodem ortas, in totū corpus disseminat: diciturq; tū vitalis facultas, tū irascibilis aīa. Tertia deniq; ē aīa ratiōatrix, quæ in cerebro domicilium habens, voluntariis actionibus præsidet: per nervosq;, ceu per canales, toti corpori sensum & motum largitur. Has igitur facultates seruare, nihil planè est aliud, q̄ vitam seruare. Siquidē qualibet earū amissa, necessum est, reliquas simul peri-

Artis cuiusvis scientiæ acquirurus opus est vt methodum quādam habeat p̄ vniuersalia theorematæ: & se, in particularib⁹ exemplis exerceat.

Vires in diariis febrib⁹ negligi, q̄ existētes ualide nullam prouidentiam requirant.

Hippocratis documenta inculta explanauit Galenus.

Traianus oēs Italiæ vias difficiles, instaurauit.

Animæ naturalis siue appetitorie sedes, est hepar.

Anima irascibilis colloca-
tur in corde.

Anima rationalis consistit in cerebro.

Diatrion pe-
pered esse me-
dicamē crudi-
tatibus utri-
culi aptissimū

triculo cibus crudus consistat, aliquid diatrion pepe-
reon propina, eius videlicet, quod in opere de tuenda
sanitate laudauimus, ceu & simplicissimum, & aptissi-
mum, iis qui cruditate laborant. Post deinde præcor-
dia, omnemq; ventrē perfundens. Hoc verò, etiam
si inferius descenderint quæ vitiosa sunt, facies, pluris
minorisq; ratione id varians. Siquidem plus & tem-
poris & perfusionis exigunt ad præparationem corā
quæ deinceps sunt agenda, quibus in superioribus ven-
tris corruptum nutrimentum adhuc manet. Sin mo-
tum id notabiliter ad inferiora sit, adiunadum aut glā
de subdita, aut leui per infēra infusione est. Vtiq; si
morsus simul adsit, hunc mitigantibus nobis. Sin fla-
tus, hunc comprimētibus. Sin neutrum fuerit, ex mel-
le, aqua, & paululo olei ipsū clysmum facientibus.

Intestinatorum
morsus leniē-
tia.

Flatus discutiē-
tia quæ sunt.

Vbi verò morsus vehementior urget, Sabinum ole-
um, in quo aliquid seui anserini, vel gallinacei, vel ca-
prilli liquatum sit, est vtilius. Quorum copia si desit,
iniiciendum oleo parum ceræ est elotæ. Flatus verò
sanandi sunt oleo in quo ruta, & semina quæ flatus
discutiunt, incocta fuere: cuiusmodi sunt apii, cumi-
ni, marathri, sinonis, aliaq; id genus. Vacuata aluo,
nutriendum protinus in cœteris quidem iis quos me-
morauimus similiter est: astringentibus tamen amo-
tis. His igitur prima & secunda die obitis, si secunda
die febris desit, hominem lauari permittes. Ac vbi
sequenti nocte citra offensam dormierit, sanum iam
hominem prorsus existimabis. Si verò qui cruditati
succesit dies cum sequente nocte febrim attulerit,
veluti in secundo die, ita tunc & accurandus, & nu-
triendus homo est. Quod si nox tertiæ diei febrile quid-
dam paululum afferat, ne sic quidem est formidandū,
sed hos quoq; postridie lauabis, nutriesq; , ac reliqua
omnia in illis, vt ante definitum est, ad portionem
exequeris. Acida autem cruditas non contingit in

Flatus discutiē-
tia quæ sunt.

biliosis temperamentis, nisi admodum raro, idq; ex cibis qui promptè accescunt: nec accendere febrem diariam solet, æquè vt nec concoctionis tarditas: quandoquidem sicubi ob talem cruditatem febricitant, quibus amara bilis abundat in temperamento, obstructionis & humorum putredinis est suspitio. Adhæc, fumidus vapor ex tarditate concoctionis, aut cruditate, in qua ructus sentiuntur accidi, nunquam excitatur. Quippe frigidi halitus abs talibus succis ascendunt, hiq; omnino paucissimi: minimè autem vapores multi, humidiq; ac fuliginosi: quum neq; in iis quæ sunt extra, aliter aut fumum edi, aut fuliginem videas, quàm fumum ex materiis semiustis: fuliginem ex immodicè assis, vstisq;. Est namq; fuligo vapor terrestris. Fumus mistio quædam ex terrestri, aqueaq; substantia. Absoluta iam in iis naturis, quibus amara bilis redundat, diariam febrium disputatione, ad aliud corporum temperamentum transeamus, in quo vt calidum frigido, sic siccum humidum præualet. Est enim hæc intemperies omnium maximè obnoxia putredinis morbis, propterea quòd per ipsam sanitatem ad putredinem proximè accedit: id quod tum ex sudoribus conicere est, qui grauius his olent: tum verò ex vrinis, deiectione, atq; adeò ipsa etiam expiratione. Etenim qualis est hirco, talis est harum naturarum temperies. Ideoq; prompta est ex qualibet occasione tum aliis morbis, tum verò febribus corripì. Siquidem quum eorum cutis est stipata, effugere febrem nò possunt. Sed nec quum valentem cruditatem contraxerunt, aut perusti fuerunt, aut tale quippià aliud perpesi. Ià verò à cruditatibus nidorosis obstructionibusq;, naturæ calidæ & humidæ, q̃ siccæ, pròptius læduntur. Itaq; oēs diariæ febres accenduntur pròptissimè in istiusmodi temperamentis, idq; ex qualibet earum causarū, quas in biliosis natu-

Acidam cruditate nò contingere in temperaturis biliosis, nisi admodum raro: neq; accendere febrem diariam. Fumidum halitum nò excitari ab aciditate.

Fumus ex materiis semiustis nascitur. Fuligo ex immodicè vstis materiis gignitur. Intemperie calidam atq; humidam esse maxime obnoxiam morbis putredinis.

Naturę calide
& humidę, ma-
gis q̃ calidę
& siccę, famē
& sitim perfe-
runt.

Intemperies ca-
lida & sicca ē
ad excipien-
das febres op-
portunissima.

Intemperātia
rum omniū, q̃
nām sint ma-
gis obnoxie
febris.

Intemperies fri-
gida & humi-
da, q̃ ab ine-
dia inuenitur.

Naturālę ser-
uāria ordinem
semper similia
postulat: vt cō-
traria, quę a
naturę ordine
aberrant.

Febris requi-
rit victus rōnē
frigidam atq̃
humidam.

ris retuli: curationemq; persimilem illis habent, ac in-
pauca omnino dissidentem. Nam quā hęc naturę hu-
midiores sint, magis q̃ illę famem & sitim perferunt.
Est igitur illis ex vsu balneum, quod curim laxet, non
autem quod corpus humectet. Quęcūq; verō de eius-
modi natura sunt dicta, eadem & de acquisito habitu
dicta esse censendum. Quum autem octo intemperies
existant in vniuersum, opportunissima ad febres est
calida & sicca: ac nisi quis illam (vt dictum est) cibet,
ocysimē in ea diaria febris in acutam mutatur. Pro-
pinqua huic est, quaten⁹ ad febrem spectat, quā sit ad
alia deterior, intemperies calida & humida. Tertia ab
his intemperies est, ea simplex intemperantia, in qua
tantū exuperat calidum. Huic proxima est simplex
altera, in qua siccum humido præualet. Ab hac dein-
ceps media omnium est, scilicet quę mediocritatem
in vtraq; oppositione tuetur. Quatuor quę reliquę
sunt intemperies, neq; facillē febribus, occasione iam
dictarum causarum, patent: neq; diaria tentatę, si ine-
diam tolerant, in plurium dierum febres trāseunt: im-
mo aliquę saltē eaz, vbi citra corruptelā contraxerūt
redundantiam humorū, vtilitatē ex inedia sentiunt, ac
potissimum quę frigida est, & humida. Ab hac quę
humida est: Tercio loco quę frigida: Quarto, quę si-
mul frigida & sicca. In eiusmodi ergo omnibus tem-
peraturis, temperamenti quidem ratione, victus ra-
tio varianda est. Nam ex eo quod eadem febre fe-
bricitant, non diuersam, sed omnino eandem, sortien-
tur indicationem. Siquidem quod secundum naturam
est, semper similia postulat. Quod autē præter naturā,
contraria. Quum nimirum quod se naturaliter habet,
custodire: quod præter naturam est, tollere expedit.
Porrō febris omnis præter naturam est: ideoq; victus
rationem frigidam & humidam exigit. Temperamen-
ta verō ipsa, aliās similia, aliās contraria postulant.

Quæ enim vitio carent, similia perpetuo: quippe quæ
 seruare expedit. Quæ vitium habet, aliàs similia, alias
 contraria. Similia quidem, tum in aliis de quibus mox
 dicemus: tum in vlceribus omnibus. Contraria autem
 in eo victu qui per sanitatem adhibetur, dum corrige
 re eorum intemperantiam est animus: necnō vbi eius
 modi vitioſæ naturæ à longo tempore, contraria vi
 ctus rationi assueuerunt: gaudent enim naturæ consue
 tis semper. Duplex itaq; nobis in iis qui sani sunt finis
 proponitur. Nempe vel corpus sanum: in pristina eius
 temperie tueri: vel hanc meliorem efficere. In ea tamē
 naturā quæ haud dubiè in medio temperamento con
 sistit, ab ipsa febris contrariorum indicatione accepta,
 eatenus humidum frigidumq; adhibebimus victum,
 quatenus siccus calidiusq; q̃ antea iam redditum cor
 pus apparet. Humidus igitur victus (vt testatur etiam
 Hippocrates) febrientibus omnibus conuenit: maxi
 mē verò pueris, & aliis qui sic cibari assueuerunt. Ete
 nim febrientibus, quatenus feбриunt, ex ipsa contra
 riorum indicatione humidus victus conducit: pueris
 ex similitudine. Nam quum ætas ex iis sit, quæ natura no
 bis insunt, similem sibi victum postulat. Quæ verò à
 consuetudine indicatio sumitur, sic sumpta est, sicuti
 & quæ ab ætate. Quippe seruare quoq; hæc iubet Hip
 pocrates, perinde ac proprium ætatis temperamētū.
 Sed à regione etiam & anni tempore interdum indica
 tiones sumuntur. Cæteræ à consuetudine quidē, semper
 est indicatio similitudinū, quoad scilicet ægrotāt homines.
 At ab ætate, natura, regione, anni tēpore, & statu coe
 li, vbi temperata hæc sunt, similitudinum semper præsidio
 rum est indicatio: siue valeant homines, siue etiam æ
 grotent. Contra ab intemperatis anni tempore, statu
 cœli, & regione, contrariorum est indicatio. Verūm
 ab ætate & natura, non absolutè, sed cum consuetudi
 ne. Porro nihil in contrariis indicationibus tam con-

Temperamen
 ta inculcata
 missa postulat.
 Temperamen
 ta vitiosa, q̃ re
 quirant simi
 lia & quando
 contraria.

Naturæ gau
 diū semper cō
 fueris.

Humidus vi
 ctus febrienti
 bus omnibus,
 cōuenit: maxi
 me vero pue
 ris.

Consuetudinē
 esse seruādā
 non secus ac p
 prium tempe
 ramentum.

Indicatio ab
 ætate, natura,
 regione, anni
 tpe, & statu
 cœli, quando si
 milium, & q̃
 dissimiliū ha
 beat.

Indicationibus
oppositis oc-
currentibus, ex-
pendendam et
se magnitudi-
nem eorum quæ
ad indicationem
conferunt.

Indicationem a
febris sumptis
reliquis superi-
oriore existere.

Indicationes
tum diariarum
februm, tum ea-
rum quæ pluri-
bus diebus af-
fligunt, ex qui-
bus capiuntur
generibus.

Hæcicæ fe-
bres nulla ac-
cedit causa.
Hæcicæ cum
diariis in quo
conueniant, &
in quo discre-
pent.

nenit expendi, quæ magnitudinem eorum quæ ad indica-
tionem conferunt: quæ quidem duplex existit: altera, quæ
ex * eorum dignitatibus spectatur: altera quæ ex ipsorum
propriis substantiis. Quas sanè ex collatione cum me-
diocri, & quod secundum naturam est, esse accipiendas
liquet. Omnibus igitur conspirantibus in vnum indi-
cationibus, vnam prorsus victus rationem constitue-
mus. Dissidentibus verò inter se, quæ valētiores & plu-
res fuerint, eas præferemus, ita ut victus species, quam
hæ præscribent, anteponamus: minimè tamen negli-
gamus contrariam. Porro quæ à febris sumitur indica-
tio, ea reliquis, quando omnes contrarium esse facien-
dum dicant, numero quidem inferior est: magnitudi-
ne tamen quæ ex dignitate spectatur, utique superior
existit: potissimum si longè à natura recesit. Quippe
duplex tunc ei magnitudo accedit: & quæ ex febris ge-
nere provenit, quæ omnibus est cōmunis: & quæ pro-
pria, suaq; ipsius existit. Sin verò parua sit febris, fas è
reliquis omnes coniunctas indicationes vnà cum ipsa
conferri. Ac si quidè pares videantur, media victus rō
eligenda est. Sin altera indicatio exuperet, tantum re-
cesisse à temperato & medio victu par est, quātum ea
quæ pollent, sua contraria superant. Ac diariarum qui-
dem februm indicationes ex his capiuntur generibus,
raròq; à laborātis virium modo. At februm, quæ plu-
ribus diebus affligunt, indicationes, tum virium respe-
ctum necessario adhibent: tum causarum quæ ipsas ex-
citant: exceptis tamen hæcicis, utpote quas nulla accē-
dit causa: quemadmodum neq; corpus id, quod iam
habitu calorem ignis in se recepit: siue id lapis sit, siue
lignum. Illud nanq; commune cum diariis habent, quod
videlicet non amplius fiant: differunt autem in
eo, quod diariæ in leui affectu calorem habent:
hæcicæ in habitu qui ægrè soluitur.

GALENI PERGA

MENI DE MEDENDI

METHODO. LIB. IX.



DIARIARVM igitur curationem præcedenti libro exposuimus. Quæ sanè febrü vnica accessio est, vnico plurimum die, ex ipsarum saltem natura, circūscripta. Cæteræ nisi q̄s eas cōmodè tractet in reliqua duo genera februm, nempe in putridas & hæticæ, transeunt. Putridas enim appello, quæ ex humorum putredine: hæticæ verò, ex immodica solidarum partium nascuntur calfactione. At verò in illo transitu à diariis in reliqua illa duo februm genera, alteræ quoddam febrü genus mediū licet imaginari, qd̄ neutri extremitatū sit idē. Cæterum mediū id, quū inciderit, nec nosse ii possunt, nec reprimere, qui extremitatū, quæ existit medium, speciem ignorāt. Ergo ex adustione, cruditate, lassitudine, vigilia, perturbacione animi, vel bubone, ab euidēti causa aliqua oborto, nunq̄ ad tertiū vsq̄ diē progrediet febris accessio, nisi qd̄ delictū circa laborantē fuerit. At qbus stipatio febris occasio est, iis ēt ultra hos porrigi accessio pōt. Etenim stipatio fit, vel obstructis exilib⁹ meatibus pp̄ glutinosos, vel crassos, vel copiosos succos: aut p̄nūtib⁹, ob ea quæ corp⁹ siccarūt, vel deniq̄ iprobè cōdēsatis, ob occursum causarū refrigeratiū. Quas igit̄ febres vel conuiuentia meatuū, vel recens corporis densatio excitant, hæc & post primam accessionē desistūt, si quis rectè ipsas tractet: & uerè diariæ tum sunt, tū dicuntur. At quæ ex obstructione creant̄, si hæc qd̄ pusilla sit, solui quoq̄ ipsæ sūt ut aliæ diariæ pōt: si quis eas legitimè sanet. Sin autem ad cō vchemēter sint humo

Diatiarum accessio est vnica vnico circūscripta die. Diarias transire in putridas hæticæq̄, nisi rectè tractent̄. Putridæ febres quæ. Hæticæ febres quæ.

Stipatio quod multiplicet fluxum.

Diariæ febres quæ nam & sint, & dicantur.

riis sortita, absq̃ humorum putredine in plureis, dies extenditur. Altera verò contingit, vbi in omnibus va-
 sis, ac potissimum maximis, æquabiliter succi putre-
 scunt. Quarum sanè februm in gracili & frigido cor-
 pore neutra solet cōsistere: sed plurimum in iis qui san-
 guine abundant, & corpulentis: qñ nec obstructio ci-
 tra putredinem excitare febrem valet, nisi id quoddā trā-
 spirat, & copiosum, & calidum sit: nec humorum pu-
 tredo in omneis, quæ inter inguina & alas iter sunt ve-
 nas, æquabiliter ac cito porrigi in frigido habitu po-
 test. Debent enim quæ putrescunt, tum calida & hu-
 mida esse, tum difficilem habere trāspirationem. Eoq̃
 fit vt neq̃ in frigida ætate, neq̃ in frigido corporis tē-
 peramento, continens excitetur febris: quæ ad no-
 dum neq̃ in gracilibus, uel qui raro sint corporis ha-
 bitu, sed prorsus in temperamentis, corporibus,
 atq̃ naturis contrariis. Proinde fit, vt qui ita febrici-
 tant, iis & pulsus maximus sit, & æqualis, & vehemēs:
 arteriæq̃ consistētia inter molle & durum mediocris.
 At celeritas atq̃ frequentia pulsus, pro ipsius magni-
 tudine febris. Hæc itaq̃ sunt ambarum febrium com-
 munia. Alteri tamē priuatim insunt notæ putredinis:
 non modò in lotio, sed in pulsu etiam, calorisq̃ quali-
 tate iniucunda. Quarum sanè febrium dignotionem
 & curationem ipsi tum ratione, tum experientia didi-
 cimus, qui statim ab adolescentia philosophiæ studio
 capti, primū nos ad eam contulimus: mox patris eui-
 denti insomnio moniti, ad medicinæ studium excolen-
 dum accessimus. Est porrò continentium febrium p̃si-
 dium maximum, si modò vires valentes sint, sangui-
 nis diminutio, vel vsq̃ ad deliquium animi. Primum
 namq̃ in contrarium statum agitur corpus, celerrimè
 ex animi defectu refrigeratum. Hoc verò nihil inueni-
 ri possit neq̃ ipsis ægris, nec naturæ quæ animantes
 gubernat, iucūdius, vtilius ue. Postmodum in corpo-

Putredini quæ
 requirantur.
 Continens fe-
 bris in quibus
 non possit gi-
 gni corpori-
 bus.

Galenus p̃is
 insomnio admo-
 nitus Medici-
 næ nauauit o-
 peram.
 Continentium
 febrium p̃æsi-
 diū maximum
 est missio san-
 guinis, vel ad
 animi vsq̃ de-
 liquium.

Ultra nō valet: quæq; ob id ipsum solet p̄dicta sympto-
mata inducere. Siquidē copia hæc, dū bonitatem suam
seruat, vt pariter augeri cū virium robore est nata, ita
si qñ has grauat, nec de cætero augebitur, & bonitatē
naturæ amittet: quare tunc fieri nequit vt non putre-
scat. Ergo festinare ad sanguinē detrahendū oportet:
quo vasorū natura, ex transpirando, ventilandoq; na-
turalē temperiem seruās, humoribus, eo quo inter ini-
tia modo, dominetur: qñ si ad intemperie versā labora-
bit, metuendū est ne hi putrescant. Excitatur autē intē-
peries in ea, ex febris calore. Optimū itaq; est in huius-
cemodi febribus statim non numero dieꝝ, sed vni vi-
rium robori attentū esse. Quo circa non solū sexto se-
ptimo'ue, sed et sequentibus diebus sanguis mittendus
est. Quod si aut alii medici, aut æger, aut propinqui ip-
sius, nō permittant vt seces venā, ad frigidā exhiben-
dā accedes, sed diligenter ante discernens, q̄tum nocu-
mentū ex ea cōtingere possit. Quippe intēpestiue imo
diceq; exhibita, lentos & crassos humores attenuari,
digeriq; prohibet. Imbecillas particulas corporis acu-
tit. Nonnullis illico spirandi difficultatem, cōuulsionē,
atq; tremorem conciliat. Tum verò, quibuscunq; in
particula principe tumor aliq; ē phlegmones, œdema-
tos, aut scirrhī genere constitit, iis frigidam offerre nō
licet. Sed neq; iis quib' obstructio, putridus'ue humor
non concoctus incommodat. At si per continentes fe-
bres cōcoctionis humorum notas videris, absq; inipe-
dimentis expositis, audacter ægris frigidā quātū appe-
tant, dabis: præcipue si tali p̄otioni assueuerint. Porro
erysipelas veꝝ, cōsistens in aliquo viscere, non aliter, q̄
frigidæ potu, sanabis. Sin verò mistum cū phlegmone
sit, in hoc cōcoctionis expectādæ sunt notæ. Cæteræ mi-
nus tuta iis q̄ paucillū sanguinis, carnisq; obtinēt, fri-
gidæ potio est. Celeriter nāq; ad solidas animalis per-
uenit partes, nulli quod eius vim frangat, occurrens.

Sanguinem ef-
se quouis die
mittendū, etiā
septimo, si id
morbus atq; vi-
res suadeant.

Frigidæ potu
utendum, si æ-
ger non patia-
tur sibi secari
uenam.

Frigidæ intem-
pestius atq; im-
modicus ulus,
quæ accersat
mala.

Frigida quibus
non offerenda
et quibus au-
dacter danda.
Erysipelas ve-
rum cōsistens
in aliquo visce-
re, non aliter
q̄ frigidæ po-
tu sanatur.

ta: & in particularibus te exemplis exerceas. Vt igitur reuertar ad methodum, equidem virtutis confiderationem ad curationem morborum sæpe maximè necessariam arbitror: sic, vt quæ circa egrum administratur, omnia ferme eius vnius causa fiant: aliquando nec diocriter necessarium: sic vt aliquid ex hac quoque, ad ea quæ facienda sunt, consilii petatur: non tamen præcipua faciendorum ratio huc omnis dirigatur. Possum rursus ostendere, virtutem ad eò exiguū ad inueniēda remedia cōferre, vt pp exilitatem et lateat: aliàs verò p̄termitti, ac silētio p̄teriri: quasi prorsus ex vtiliter cōsiderandis non sit: vt in diariis febribus, in quibus vires nullam prouidentiam requirunt: vtpote validæ. Verum quod in virtute accidit, id in reliquis omnibus quæ aliquid faciendum indicant, vsu venit. Horum autem omnium aditum Hipocrates nobis ostendit, incul tum tamē: quem methodo postea nos explanauimus: perinde vt Traianus, fecit, qui omnes Italiae vias asperitate difficiles, refecit, instaurauitq;. Vt verò accuratius de ipsis viribus differam, operæpretium est scire, tribus d̄nerſi generis facultatibus siue animis vniuersum animal gubernari. Quarum sanè prima quæ stirpibus est communis, quāq; vocāt naturalem, atq; etiam appetitricē, iecur pro fonte habet: per venasq; illinc sparsas in vniuersum corpus, id alit. Secunda autem est, quæ non modò vt stirpibus, aut vita præditis, sed etiam vt animalibus anima, est īfita. Hæc in corde, fonte caloris īfiti, residēs, ab ipso per arterias ab eodem ortas, in totū corpus disseminat: diciturq; tū vitalis facultas, tū irascibilis aīa. Tertia deniq; ē aīa ratiōatrix, quæ in cerebro domicilium habens, voluntariis actionibus præſidet: per nervosq;, ceu per canales, toti corpori sensum & motum largitur. Has igitur facultates seruare, nihil planè est aliud, q̄ vitam seruare. Siquidē qualibet earū amissa, necessum est, reliquas simul peri-

Artis cuiusvis scientiæ acquisitus opus est vt methodum quādam habeat p̄ vniuersalia theorematizet: & se, in particularib; exemplis exerceat.

Vires in diariis febribus negligi, q̄ existētes ualide nullam prouidentiam requirant.

Hippocratis documenta inculta explanauit Galenus.

Traianus omnes Italiae vias difficiles, instaurauit.

Animæ naturalis siue appetitorie sedes, est hepar.

Anima irascibilis colloca- tur in corde.

Anima rationalis consistit in cerebro.

re. Ac proinde in opere de sanitate tuenda huc omne consilium direximus. In hoc verò, primum propositū est, morbi sublatio. Nam cuiusmodi in illo est sanitatis tuitio, eiusmodi in hoc est morbi sublatio. Quorum utriq; communis est ipsa vitæ custodia. Hoc tamē interest, quæ secundæ valetudinis tuendæ gratia geritur, eadem statim vitam tuentur: quæ verò affectiōes præter naturam in morbis discutiunt, ea non omnino vitam custodiant. Quippe aliqua eiusmodi prædita sunt facultate, ut si immoderatè aut intensè pestiue vitæ, vitam adimant: quod solent vacuationes immodicæ. Ergo quum virtus tantopere necessaria sit, eam autem lædāt oīa vacuantia remedia, si quis ipsis parū moderatè utatur: utiq; aduersæ inter se faciendorum indicationes in talibus corporibus sunt, in quibus affectus, quo expugnetur, notabilem vacuationem desiderat: virtus autem hanc ferre non valet. Cæterum quemadmodum nihil quod sanitatem tuetur in ualentibus vires corrumpit: sic in ægrotis aliquando virtus succedit iis, quæ veluti in perniciem eius administrantur: ut si euacuemus in plenitudine quæ est supra vires: aliquando ab ipsis dissoluitur. Etenim in synochis febribus: ex meatuum stipatione ortis, quoniam valida plerumq; virtus est, citra periculum vacuatio adhibetur. In aliis verò quæ ex corruptela humorum gignuntur, existit maximè periculosa. Siquidem quod corruptum est, alienum à natura quum sit, id se auferendum dicat, vel vena incisa, vel purgatione. Horum autem præsidiorum neutrum feret imbecilla facultas, si quando cum corruptela coiuerit. Oportet igitur, ubi indicationes ita sibi aduersantur, paulatim quod vitiosum est, vacuare: paulatimq; quod salubre est, in eius locum reponere: quam curationem vitiosi succi Medici epicrasin nominant. Quum igitur sectio venæ, sanguinis sit vacuatio: sanguis autem ipse utilis

Curatiua pars artis & ea quæ sanitatem tuetur, qua in re conueniant, & differant.

Vacuantia remedia omnia virtutem exolunt.

Epicrasis qd.

possessio naturæ existat: sic utiq; oportet venæ sectio-
nem fieri, ut quod inutile ex sanguine ipsi naturæ est,
emittatur. Fit porro sanguis bifariam naturæ inutilis:
vel quum propriam qualitatem ad vnguem non ser-
uat: nec amplius nutrire, sicut pri⁹, potest: vel dum ita
multitudine crevit, ut premat vires, aut distendat va-
sa, vel rumpat ea, vel obstruat. Atq; in his quidem mis-
sio sanguinis utilis est, ceu vacuantium præsidiorum
vnum: in aliis autem, ceu quod humorum vehemen-
torem impetum ad partem diuersam reuocet, vel ad
lateta deriuat. Postulat autem semper valentes vires,
quæ modo vacationis eius respondeant. Quoties
igitur virtuti notabilis ex vacuâtibus auxiliis noxa in-
cidet, toties ipsa vtile aliquid indicabit: æquè utiq; ut
quum manifestè iuuabitur. Vbi verò ex iis quæ af-
fectum submouent, nec commodum illi accedit vl-
lum, neq; incommodum, ibi veluti inutilis prætermi-
titur. Porro quicquid aliquam præstat indicationem,
si natura id simplex sit, etiam quod indicatur, utiq;
simplex erit. At si illud compositum sit, & hoc erit
quoq; compositum. At sanè quædam custodiam sui:
quædam amotionem indicant. Virtus itaq; semper
vnâ rem indicabit: utiq; sui custodiam. Custodietur
autem, primò quidem, si quod ex substantia ipsius vel
inanitum, vel alteratum est, correxerimus. Secun-
dò verò, si quæ ipsius substantiam vacuare, altera-
req; possunt, prohibuerimus. Aestimari autem de-
bebit interim, quod magnitudine, dignitatè ue ante-
cellit. Maxima igitur dignitas, virium ipsarum est:
quando viuere ipsum nobis ex harum custodia con-
stat: utpote quum vitam, aut ipsas esse vires, aut ea-
rum actiones, necesse sit. Virtus ergo omnium pri-
ma custodienda hominibus est. A' virium indicatio-
ne proxima existit, quæ ab affectibus, quos cura-
re conamur, subministratur: postea deinceps reli-

Sanguis pro-
bus est posses-
sio naturæ.
Sanguis dupli-
citer inutilis
redditur.

Sanguinis mis-
sio interdum
est utilis ut
præsidium va-
cuans: interdū
ut reuulsēs, aut
deriuans.
Vires quando
præbeant indi-
cationes uti-
les: & quando
minime.

Virtus semper
custodiam sui
indicat.

Virtus quot
modis seruandâ
sit.

Indicantiū di-
gnitates esse
æstimandas.

Vitâ esse aut
vires ipsas aut
ipsarū actiões.

quæ. Quicquid igitur indicationi, quam vires præbent, aduersatur, id secundi est loci. Quæ verò cum iis quæ conducunt viribus, in idem competunt, hæc utrunq; calculū referunt: & eorū quæ primæ sunt notæ, & eorū quæ secundæ. Quare citra controuersiam faciēda. Quæ verò aduersantur, aliquando administranda prorsus non sunt: aliquando paulatim. Prima igitur indicatio omnium est, quæ à virtute sumitur: non tamē sic prima, vt curationem nos doceat: quum ex numero curatricium indicationum nō sit, sed vitalium. Nā neq; vt valeamus, neq; ut à morbis liberemur ab ea quicquid primum desumimus, sed ut uiuamus: quīs ex accidenti interdum virtutis roboratio ad affectū curationem conducat. At verò medicatrices indicationes à morbo ipso sumuntur, & à temperie corporis, & ab ambiente nos aere: qui causæ sine qua non, rationem obtinet: quum sine ipso nec tolli morbus, nec teneri sanitas possit. In omni itaq; curatione agendūrum indicationes in his tribus ad summū consistunt. Reliquæ autem omnes ab his in partes diductis, oriuntur. Ceterū affectus ipse haudquaquam in causas diduci est aptus, quemadmodum temperies atq; ambiens aer: sed tantummodo in differentias. Nam aut in similaribus consistit partibus: aut in instrumentariis. Ac in similaribus quidem, vel simplex est intemperies, vel composita. In instrumentariis, circa simplicium partium uel posuram, uel formam, uel numerum, uel magnitudinē, tum quæ horum sigillatim traditæ sunt differentię, consistit. Porro affectuum qui simplices partes occupant, vnus est intemperies calida. Quæ si in totum corpus diffusa sit, appellatur febris. Ideoq; omnis febris, qua febris ē, humectatio refrigeratioq; remedia sunt. Ac si sola quidem sit febris, ad refrigerandum humectandumq; ueluti ad finem, dirigetur omne medentis consilium. Quare, materia inuēta, opportunum tem-

Indicatio omnium prima ē q̃ a virtute sumitur, non sic tñ vt curationem nos doceat.

Indicationes medicatrices vnde sumantur.

Morbi differentię.

Febris quid. Febris remedia humectatio, refrigeratioq; exiit.

pns ex quatuor febris temporibus sumes : quātitatem
uerò, ex conferendo cum naturali habitu morbum.

Quippe, quantum is recessit à naturali habitu, tantum
opus est ægrum refrigeres & humectes. Ambiens au-
tem aer (cuius fugere cōmercium non licet) si contra-
rari morbo temperiem habeat, è præsidiōrum nume-
ro est unum: sin similem, vna est morbificarum cau-
sarum. Idcirco tunc inhibenda eius noxa est, scilicet re-
liquorum auxiliorum humiditate ac frigore intensis,
adauctisq;. Ipse autem arte reddendus est talis, qualis ad
profligandam febrim, aut aliam quāpiam dispositionem,
desyderat. Si igit morbus siccus & calid⁹ sit, humidio-
res frigidioresq; domos & eligemus, & pparabimus.
Sicuti ē diuerso, si frigidus, humidusq;, eas quæ calfa-
ciant & siccant. Sunt itaq; deligēdæ quæ ex seipsis eius
modi sint. Alioqui industria nostra pparabimus ipsas,
per æstatem quidem eas subterraneas molientes, & ad
Septentrionem conuersas: ac pauimenta ipsarum aspi-
rantes humore aspergētes: tum vt ex euripo aliq̃ aura ex-
piret, machinantes: flores præterea & germina, quæ
frigidæ humidæq; sint facultatis, per aream disseminā-
tes: per hyemem verò, cōtraria horum facientes: præ-
sertim vbi morbus suadet: vbi non suadet: excessus tã-
tū vtriusq; temporis remittentes. Poterunt rursus
tres illæ indicationes prædictæ ad duas tantū redu-
ci: nempe ad morbum & sanitatem. Neq; enim aliud
ipsa sanatio est, q̃ morbi in sanitatem translatio. Qui af-
fectus contrarii quum sint, necesse est per cōtraria fiat
eorum alterius in alterum trāsmutatio. Atq; ita rursus
vna erit sola curationum indicatio generalissima, vi-
delicet contrarietas. Cæterum ad accuratam contra-
riorum administrationem, necessum est curandorum
corporum prius & naturas & temperamenta cogno-
scere: quæ quidem tum ex iis quæ in libris temperamē-
torum tradita sunt, noscuntur: tum ex ætate, & tōta

Aeris cōmer-
cium nos fuge-
re haudquāq;
posse.

Febrientibus
quales ædes
eligere, præpa-
rareq; debeat
mus.

Sanatio quid.

Indicatio cura-
tionis genera-
lissima, est uni-
ca: videlicet cō-
trarietas.

Contrariorum
exhibitioni,
quarum rerum
desyderetur co-
gnitio.

antec̃ta vita, quæ nimirum in victus & exercitii ratio-
ne consistit, præterea, in hac regione, & hoc anni tem-
pore, & hoc cœli statu, conuersatione. Ex ipso autem
temperamento inuento, administrandorum indicatio
suppeditabitur. Sed neq̃ paruū quid, negligēdum ue,

Consuetudinē
ad inuentionē
remediorū, &
ad sanitatem
tuendam pluri-
mum posse.

Consuetudo
quō curationis
rōnē indicet.

Corpora dissipa-
riu facilia &
difficilia quæ
sūt.

ad remediorum inuentionē consuetudo adfert: veluti
nec ad sanitatem tuendam: quum singulorum corpo-
rum etiam naturam ostēdat. Nos siquidem uia ratio-
neq̃; ab ea procedentes, inuenimus ipsarum partium
affectum: dein ex illo rursus peruenimus ad faciendō-
rum indicationem. Consuetudo itaq̃ curationis ratio-
nem indicat, per corporis naturam intercedentem,
quemadmodum ætas: quæ & ipsa temperamēti inter-
uentu, præstat indicationem. Aduertere autem oportet,
corpora frigida & sicca, quæq̃; ex terrestri natura
constant (cuiusmodi sunt mineralia) q̃ ægerrimē solui.
At quæ calida & humida sunt, eorum substantiam ce-
lerrimē dissipari in ambientem. Quæ verò in medio
horum, ex diametro pugnantium, consistunt, ea cor-
pora quo magis ad hæc, vel ad illa accesserint, eo
vel aptiora ut dissipentur erunt, uel contumacia ma-
gis. In summa, citra calorem non potest in halitum
digeri corpus ullum, quādiu substantia eius coacta
densataq̃; manserit. Puerorum autem substantia, facil-
limē omnium digeritur, dissipaturq̃; propterea quod
est ut humidissima omnium, sic nulla frigidior. Quo-
minus vacuantis præsidii eget: quum ex se ipsa natu-
raliter abundē vacuetur. Fit autem profectō & pro-
pter calidam siccāq̃; regionem, & tempus æstiuum,
& statum cœli impensē siccum & calidum, notabilis p-
curim vacuatio. Itaq̃ hac de causa, qui sanguinis detra-
ctionē desyderāt, iis aut prorsus nō secabimus uenam,
aut pax detrahemus. Eruntq̃; in hac detractiōe quoq̃;
spectāda, natura ab initio, cōsuetudo, ætas, locus habi-
tationis, anni tempus, cœli status, necnon is, quē cura

Puerorū substā-
tia cur omniū
facillimē dige-
ratur.

Puerilis substā-
tia cur minus
ceteris eget
præsidio va-
cuante.

Sanguinis de-
tractiōem p-
hibentia.

nus, affectus: aliaq; ratione, ante hunc, laborantis facultas. Quum verò affectus sint numerosi, cuiq; ipsorum sua est curationis per cōtraria indicatio. Quo circa, octo intemperamenta quum sint, octo erunt etiam morborum, quibus simplicia corpora sunt obnoxia, particulares indicationes. Ultraq; has, una eius affectus, qui instrumentalium communis est, diciturq; continui diuortium: cuius sanè est indicatio curationis, vnitio. Est igitur vnum morbi genus, quod similes & simplices animalis vexat particulas: quam intemperiem vocant. Huius aliquæ differentię oriuntur vbi corpora, nudis qualitatibus alterantur: aliquæ vbi accedente etiam humorum affluxu. Quæ sanè dispositione utraq; vel afficitur vna pars corporis, vel plureis, vel vniuersum corpus.

Sanguinem de tracturo quæ sint consideranda.

Intēperies simplicium partium esse octo, totidēque illarum particulares indicationes.

Solutionis cōtinui indicatio est vnitio.

Intemperiei differentię.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E M E T H O D O

M E D E N D I. L I B. X.



RGO in diariis febribus simplex quædam est in corpore præter naturam affectus: utpote causis quæ primum eas excitarunt, iam ademptis. In quibus verò causa quæ eas accendit adhuc manet, in iis neq; affectus simplex, neq; sanatio est. Siquidem quod febris iam receptum in corpore est, id ex propria ipsius curandi indicatione discutere oportet: quod adhuc est futurum, id propulsare, ac ne fiat, vitare. Vetabit aut, si quæ id excitat causa prorsus summotæ sit. Itaq; in diariis faciēdoq; indicationē maximè ex ipsa febre capiemus. In reliquis verò, quæ accensionis suæ causam intus habent, prima

Diariarū affectus simplex.

Indicatio ipsa
quando a fe-
bre, & qñ a fe-
brii causa su-
menda sit.

Putredinē esse
causam febrū
quæ plures in-
festant dies: ac
proinde prius
tollendam eē.

Indicationes
agendorum in
putridis febrī-
bus sumi a fe-
bre ipsa, & ab
effectrice illius
causa, & a fa-
cultate.

indicatio ab ipsa sumetur causa. Quare si februm, quæ multos dies continuant, rectè ostēdunt putredinem esse causam: hæc nimirū sanāda est prima. Sed nec interim extinguendæ febris, quæ per eam iam accensa est, ratio non habenda. Ac si quidem in idem consentiant, & quæ febrem extinguunt, & quæ oppugnant causam, in quod utraq; conspirant, quum vnum sit, si ne cunctatione est agendum. Sin febris, quæ iam accensa sit, sanatio, causam quæ hanc excitauit, est auctura: aut quæ causam submouent, febrem exasperabunt, diligens habenda consideratio est de remediornm specie. Etenim si intolerabilis ægro sit magnitudo febris, committendum non est, vt per ea quibus causam adimimus, febrē augeamus. Sin ita mediocris sit febris, vt quo tempore contra causam tantū pugnas, obruendæ interim vires ægrotantis non sit, utiq; contemnendus is curationis modus non est. Non contemnendus autem nec ille est, qui contra id, cuius maius momentum est, instare iubet: nec tamen alterius omnino negligentem esse. Quum autem in examinādis iis, ad hominis salutem non parum momēti facultas habere videatur, tria nimirum erunt, quæ in propositis iam ob putredinem febribus, agendorum indicationem nobis prima largiant. Febris videlicet. Eius effectrix causa. Præterea naturalis facultas. Cæterum priora duo submouenda sunt: tertium est custodiendum. Erit itaq; rursus & hic necesse, vt tum febrem, tum ei⁹ causam, cum facultate ipsa conferas. Mox si eadem ambo remedia requirant, ea promptè exequaris. Sin indicationes pugnabunt, vnā præferas, vel quæ à viribus sumitur, vel quæ à causa, vel quæ à febre: sic vt quæ cæteris sit valentior, hanc magis sequaris: nec tamen cæteras negligas. Nunc vero ad particularium præsidiorum differentias nos conuertamus: repetita tamen mentione diariarum: quum & ipsæ, inscitia medicorū,

In plurium dierum febres aliquando degenerent: idq; vel earum effeſtrice cauſa abeunte: vel etiãnum perſiſtente. Porro abiit effeſtrix cauſa, quoties ab ira, dolore, vigilia, cura, æſtuo ſole, fatigue, & bubone qui iam deſiuit, citra ſtipationem febris eſt excitata. Manet, quoties vel ab externa cauſa, vel ab ipſa febre, ſtipatio aliqua eſt orta. Nam & frigiditas, & aſtringentiũ uſus, per mediam ſtipationem, ſemper febrẽ excitant. Uſtio præterea nonnunq; conſtipat corporis habitum. Iam ipſum febris principium, ubi cum horrore inuaſit, ſtipationem ſubinde fecit. Quinetiam glutinoſi, & craſſi, aut etiam copioſi ſucci, ubi mediocriter obſtruxerunt, diariam aliquando febrem accendunt. Dicuntur autem id gen^o febres omnes diariæ, quia ſolui vno die ſunt aptæ: computata cum hoc vnà & nocte. Cæterum non eſt idem diariarum omnium affectus. Sed ab aliquibus inſeparabilis ſtipatio eſt: ab aliquibus minimè inſeparabilis: ſed vel ut plerunq; ſimul adeſt: vel ambigua ſorte: vel raro. Inſeparabilis ſtipatio eſt iis, qui ex aluminofa aqua, vel chalcãthode, vel tali quapiam alia, aut ex frigore, aut leui obſtructione febricitarunt. Plurimum verò iis adeſt, qui ex uſtione febricitant. Ambigua ſorte, iis, qui ex fatigue. Quicunq; verò, ex ira vel triſtitia, vel vigiliis, vel pertinaci ſtudio, vel cruditate, vel bubone febricitant, iis raro adiuncta ſtipatio eſt. Atq; harum omnium febrium nulla (quod utiq; ex ipſa ſit) ad ſecundam uſq; acceſſionem perdurat, ſed intra quatuor & viginti horas oĩno deſinit: idq; cum ſudore, vel niadore, vel tranſpiratione quodam halituoſo. Aut ſi quando earum aliquæ (quæ tamen rarius contingit) longius trahunt, duæ iis accedunt cauſæ, quæ ipſas ſolui verant. Earum vna frigus eſt, quod vel ex ambiẽte aere, vel ex vnctione quapiã extrinſecus admota proueniat. Altera egregia illa diatritos eſt, ſi qui videlicet hanc tranſire, medicorum in

Diarias febres dum imperite tractantur, diuturniores fieri. Diariarũ cauſæ qñ recedãt, & qñ perſiſtãt in corpore.

Stipationem quæ faciunt.

Diarix febres cur ſic dicant. Diariarum affectus multiplex.

Ephemeræ febres cum quibus excretiõibus deſinant.

Diarias produci vnde accidat.

Diatritos.

Diariarū mult-
plex differenti-
a.

Stipatio du-
plex.

Densitudo me-
atū vnde ac-
cidat.

Obstructionū
differentiæ.

Indicatio a vi-
ribus sumpta,
in diariis qui-
dem, exiguius-
plurium autē
diarum febrili-
bus, maximi
solet esse mo-
menti.

Vires prima
aut secūda die
ab initio mor-
bi, vnde resol-
ui accidat.

Nutriendi, et si
in prima inua-
sione accessio-
nis qui sint.
Punicum ma-
lum, ventricu-
lum roborat.

scitia coguntur. Multæ igitur apparent diariarum esse febriū differentiæ particulares. Vna, quando iam pror-
sus recessit ipsarū effectrix causa: ueluti vstio. Altera,
quādo hæc etiam adest: sicuti stipatio. Cuius duæ sunt
differentiæ: nempe exiguorum meatuum & densitas,
& obstructio. Sanè dēstitudo ipsa, aliās ex siccitate pro-
uenit: aliās ex frigore, eoq; uel simplici, uel cum astri-
ctoria ui. Iam uerò obstructionum ipsarū, alia est, quæ
ex abundātia: alia quæ ex qualitate succorum, scilicet
qui aut lēti, aut crassi sunt, incidit. Præferetur aut inter
remedia, in ea quam copia facit, sanguinis missio: in ea,
quæ ex humoꝝ qualitate consistit, attenuantium vsus.
Consilium verò sumptum à uiribus, ut in diariis sanè
est exiguum, ita in iis qui pluribus diebus urgent, satis
magni est momenti, eoq; maioris, quo hæ sunt longio-
res. Enim uerò, ubi naturaliter vires se habēt, ne mini-
mum quidem in diuturnis febribus vacationū vsus
morantur: ubi aut sunt infirmiores, pro magnitudine
imbecillitatis, impeditur vsus auxilioꝝ vacuantū. Ra-
rius aut accidit, ut protinus in primo, secundo uel die,
vires imbecillæ cernantur: id quod tamē interdum ac-
cidit, vel pp ægrotantis malum corporis habitum, vel
pp senium. Nonnullis etiam fatigatio, ubi tristitia, vigi-
liæq; præcesserunt, & inedia per totum secuta est diē,
dein febris prius q̄ homo cibare, circa vesperā occu-
pauit, & nox insonnis est acta, vires ipse resoluit. Por-
rò quibus temperies corporis ad siccum calidūq; puer-
sa, febrem accendit, in interdum vel in prima inuasiōe
accessionis, nutriendi sunt: ne dum ante illam. Eis autē
soleo ipse sorbitionem ex alica exhibere, iniectis in eā
mali punici granis: qui cibus bilioso stomacho est opti-
mus. Nā & roborat hunc, malū punicum: & alica, quū
diutissimè in eo citra corruptionē maneat, sensum con-
coquit, idq; nec acescens, nec ēt innatans. Igit̄ mordēs
halitus, succusq; ubi per sensibilia corpora ferī, hor-

rorēs & inæquales totius corporis concussiones facit, in iis, quibus cute stipata, quæ prius transpirabat, iam sunt detenta. Quæ quidem, si fuliginosa sint, febres accendunt. Eiusmodi autem halitus, succosq; tum multa & vehemens dimotio, tum vigiliæ, & ira, & dolor, & cura, augent: tum proximè ab istis, vnum illud per se interdum augere eos sufficit, utiq; si cibum quis non sumpserit. Efficitur namq; corporis halitus in iis naturis, quæ faciliè amarā bilē gignunt, ex longa inedia biliosus. Cōcussio itaq; siue rigor succedet, propter eorum quæ feruntur excrementorū, tum multitudinem, tum acrimoniam, tum impetus celeritatem, tum laborantis virium imbecillitatem. Horror verò fiet, ubi & qualitas eorum, & impetus velocitas est remissa: tum copia minor: ac potissimū quū vires tristati obsistant. Quod si largius remittantur iam dicta, ne horror quidem continget: sed vel quidam ceu vlcerosus sensus: vel tantū inæqualitas. Porro quibuscūq; virtute exstente imbecilla, squallidoq; ipsius corporis habitu, incipientis adhuc accessionis vidi adesse symptomata, iis omnibus panē ex vino diluto, & calente, maturè exhibens, horrorem statim inhibui. Quāto verò hos citius cibaueris, tāto scilicet magis febrem prohibueris. Sin duæ horæ ab initio inæqualitatis interpositæ sint, nutrities tunc quoq; modò adhuc duret horror: prædicēs tamen, q̄ hi febricitabunt, cæterū innoxia febre, & cui cutis mador succedet: quo factō, tū lauare, tū nutrire debebis. Quòd si horror præterierit, ac iā planè febricitet, id tps nō sunt cibādi: sed decrescēte iā accessiōe, atq; interdū in summo uigore, nutriēdi sunt, solutiōis integritate nō expectata. In nullo nāq; squallido affectu cōmodè finit accessio, prius q̄ illi vel ex lauacro, vel humido victu, humectatio accesserit. Calidis itaq; & siccis naturis, siue à pmo ortu sint tales, siue sint et acquisitig, maximè inedia aduersat, febriū paratissima causa. In

Sucos acres q̄ gignant.
Rigor unde accidat.

Horror vnde proueniat.

Vlcerosus sensus qm̄ fiat.
Horrorem inuadentem in principio accessionis inhibet panis ex vino diluto & calente exhibitus.

Nutriti iterim dum horrent, q̄ possint.

Inedia aduersatur calidis et siccis naturis.

ter alia aut, calidus i summo, siccusq; cœli status, iâ dâ
ctâ tēperaturâ efficit. Hic aut status alio anni tpe, q̄ æsta
te, planè incidere nequit: sicuti nec humidissimus pari
ter frigidissimusq; in alio q̄ hyeme. Corpora igitur ca
lida & sicca, ex inedia facile in febres ardētes incidunt:
à quibus, nisi prius mors occupet, in heclicas transeunt:
atq; ab his, in marasimum: vel protinus ab initio, ardē

Heclia febr
bus a princi
prio corrip
calidas & siccas
dispositiones.

tibus præteritis abeunt in heclicas. Maximè autem sic
cas, calidasq; dispositiones corporum, à principio fe
bris heclia corripit: id quod olim cuidam iuueni con
tingit, qui ex ira febricitauit. Cui quidem, quoties nutri
tus est, fontanæ planè gelidæ dedimus interim binos
cyathos, interim ternos: quando frigidam simul mul
tam sibi dari, qui ita sunt affecti, citra noxam non fe
runt. Quo circa vtilissimum fuerit, vbi febris ideam
perspexeris, i prima statim occasione, minori cum pe
riculo, copiosiori frigida vti: corporibus ad validam
siccitatem nondum perductis. Iam verò quemadmo
dum in quibus febris accenditur propter mordentem
acrimoniam excelsa, attenuatq; à Sole, inedia, &
& laboribus, succi, maximum eius remedium è humi
dum nutrimentum: sic è diuerso, vbi ob copiam, vel
obstructionem, vel phlegmonem, vel humoris alicui
putredinem, febris est orta, maximo malo est cibus.

Nutriendi qui
non sint, ne in
ipsa quidē ac
cessionis decli
natione.

Nutriendi cō
silium sumen
dū esse a sum
mo uigō mor
bi, & viribus
ægotantis.

Quare hos quidem, nec in febris inclinatione, citra no
xam nutrias, nedum ipsa accessione inuadente: illos
verò, omni certè tempore, sed potissimum per incli
nationem. In summa verò, illa duo à primo statim die,
sunt tibi in omni ægro spectanda, morbi summus vi
gor, & ægotantis vires: à quibus cibandi consilia pe
tas. Postea si transiri summum incrementum sine om
ni cibo potest, in cibi abstinentia hominē ipsum serua
bis. Sin exiguum adminiculum requirat, abundè erit
sola mulla. Quod si maius desyderat, q̄ sit ex mulla, pti
sanæ cremor latis erit. At si fas non est summum mor

bi incrementum aut tenui victu, aut inedia transmitti, id agendum, ut homo statim in prima accessiois inclinatione nutriatur. Aliquos verò ipsorum, & quum inuasa adhuc est, & quum incipit, cibabis. Sint porro hi sicco temperamento & calido, oportet: tum viribus necessario imbecillis: quum fieri nequeat, ut abundè siccum, calidumq; corpus, si febricitet, virib⁹ sit valentibus. Si autem cum eiusmodi febris & corpore, momentanei membri phlegmone sit coniuncta, omnino æger morietur: magisq; id certum est, si vel peripneumonia, vel pleuritis vel angina, vel ventriculi, vel iecioris phlegmone infestet. In quibus sanè affectibus vna salus est, virium robur. Nam quod ad phlegmonē quæ in iis est partibus attinet, minimè planè est cibandum. Quod ad virium infirmitatem, utiq; sæpe. Ac proinde necessum est, aut resoluantur vires, aut phlegmone augeatur. Quoties igitur vel ex lassitudine, vel ira, vel pluribus curis, vel vigiliis, vel tristitia, vel longa inedia, vel uniuersis vnâ coeuntibus, siccatum corpus ē, ac febris inuasit, quæ & aridam reddit cutem, & igneum calorem refert, utiq; hunc talem timor est hectica febris correptum iri, potissimum in æstate, ac cœli statu sicco, calidoq; . Oportet autem, q̄ primum ptisanæ cremore, & sorbitione ex alica nutritum, panēq; post oblato, aquæ frigida potione hominem cures. Quippe protinus extinguitur, ac cessat omnino febris: modo nec phlegmone aliqua ei sit adiuncta, nec putridus humor. Quanq̄ ego etiam vel si hæc aderāt, ægrotorum non paucis aquam frigidam dedi, tutius esse ratus, phlegmonas in præsens augere, q̄ sinere hominem in hecticam febrem prolabi. Cæterum si magnum fore iconi modum, vel humori putri, vel phlegmonæ sit suspitio, à frigida quidem danda abstinebis: refrigerantibus autem remediis, quæ foris applicantur, uteris: modo ea super os ventriculi, aut tota præcordia: mo-

*Hectica febris
quando sit ex
pectanda.*

Balnea quib⁹
conueniant.

Phlegmonas
cur febres se-
quantur.

Putredo humo-
rum quæ dupli-
citer accidere
possit.

Remediorū re-
frigerantiū hu-
mediariorūq^{ue},
materia du-
plex.

Refrigeratio i
febris cur
breuis sit tem-
poris, atq^{ue} pe-
riculosa.

Aedes febri-
bus quales,
esse cōueniat.

do super pectus imponens: ubi scilicet plurimum sub-
esse caloris, maximè iudicabis. Balnea etiam, iis qui
siccato plurimum corpore sunt, & citra humorum pu-
tredinem, febriunt, non incōmoda existunt. At phleg-
monas subsequuntur febres, propter putredinem hu-
morum, qui in ipsis impacti habentur. Possunt tamen,
vel citra phlegmonem, in ipsis vasis aliqui humores
putrescere: idq^{ue} aut in vna animalis particula, in fini-
bus ipsorum impacti: aut etiam in totis eorum capa-
citatibus, quæ inter bubones & alas sunt, comprehen-
si. Vbi igitur citra putredinem squallenti corpori fe-
bricitare contigerit, caput totius curationis, in iis re-
mediis quæ refrigerent, humectentq^{ue}, statuere oportet.
Porro duplex genere est harum rerum prima ma-
teria. Vna, eorum quæ foris incidūt: altera, quæ intus
in corpus sumuntur. Extrinsecus corpori incidunt, tū
aer ipse qui nos ambit: tum pharmaca, quæcunq^{ue} hu-
mectandi refrigerandiq^{ue} vini obtinēt: & tertium præ-
ter hæc, dulcis aquæ balneum. Intrō in corpus sumun-
tur, quæ eduntur, ac bibuntur, & inspiratus aer. Ab
his generibus tentandum est propositis hoc loco fe-
bribus tum humiditatem, tum refrigerationem com-
parare. Verū refrigeratio, quoniam per efficacissi-
mam qualitatem inducitur, & parui temporis est, &
periculosa. Contra siccitatis, per ea quæ humectent, cu-
ratio, ut longi temporis est opus, ita minus est, q̄ refri-
geratio, periculo exposita. Si igitur temperat⁹ sit aer,
qualem se exhibet, tali eo est vtendum, nihil amplius
de eo nobis sollicitis. Sin verò admodum calidus, vel
sit admodum frigidus, pro calido inducendus arte cō-
trarius est, subterraneis inuentis domibus, quæ & frigi-
dissimæ sint, maximeq^{ue} perflatæ, & ad septentriona
conuersæ: tum auris quibusdam suauibus opera nostra
paratis: aliàs ex euripis, in quos multi se aquarum fon-
tes precipitent: aliàs aqua frigida ex vasis in vasa trans-

fusa: id quod etiam conciliat somnum: præterea domo assidue aqua, quæ prorsus frigida sit, aspersa: ac rosas plurimis humi fufis, aut vitium capreolis, aut ruborū clauiculis, aut lentisci ramis, aut deniq; reliquarū, quæ refrigerent, stirpium aliquibus, turba quoq; hominū ingredi prohibita: ut quæ domum similiter calfaciat, Ac sic quidem calidissimum aerem, qui scilicet in æstate calida & sicca accidit, refrigerare est tentandū. Qui sanè si modicè frigidus sit, hoc esse cōtētos oportet, nihil de eius temperie alterantes. Qui verò frigidissimus est, utiq; quatenus respirando attrahitur, admittendus est, ut qui admodū calorē cordis refrigeret: nō tamen quatenus extrinsecus ægrum cōtingit. Quippe densat, cogitq; cutim, putrilaginosorumq; humorū fluxum, atq; trāspirationem cohibet. Siquidem p pulmonem, quod rarum est viscus, difficile nō est, ut tum qualitas ipsius, tum ē substantia, faciliē ad cor perueniat: per cutim verò, utpote densatam, fieri id non potest. Cæterum ex frigida inspiratione maius sequitur cōmodum, q̄ incōmodū ex cute densanda: præsertim cum operimentis hanc nobis calfacere liceat. Porro vtendum maximè eiusmodi aere est in iis hecticis, in q̄bus primum qđ afficitur, ipsum est cor: æquē ut si ventriculus primum affligeretur, ipsi per comesta & bibita succurrendū esset. At iecinori ex inspirato aere nulla certè accedit utilitas: à comestis uerò & bibitis, minor planè q̄ uentriculo: aliqua tamen haud obscure aduenit. Cōmunis autem omnium sanatio est, per ea quæ extrinsecus applicata refrigerant, & humectant. Atq; ob hæc quidem viscera, magna ex parte hecticas, marasmodesq; febres accidere contemplati sumus. Superueniunt tamen aliquando & pulmonum intemperantiæ calidæ & siccæ. Incidunt præterea & pectori, & mesenterio, & ieiuno, & colo: interim uerò, & vtero, & renibus. In septo autem transuerso ma-

Somnum conciliari ab aquarum strepitu.

Turba hominum incallescere ambientē.

Aer calidissimus quō refrigerandus.

Aeris frigidi effectus.

Iecinori ex inspirato aere nulla accedit utilitas.

Marasmodes febres ob q̄ viscera maiori ex parte solent accidere.

Hæctica ex fe-
pto transuerso
ortâ, dyspnœa
& delirium ex-
cipit.

Hæctici ex fe-
pto transuerso
quò dignoscân-
tur.

Aer frigidus
quò maxime
conferat.

Refrigerantia
extrinsecus, in
febris qua-
lia eē debeāt.

Aceti facultas

Aceto quomo-
do utendum.

Refrigerantis
humectantisq;
cerati desci-
ptio.

rasmum non vidi : febrem hæcticam vidi . Eiusmo-
di autem affectum & spirandi difficultas, & deliriū ex-
cipere solet. Ex quibus magna ex parte prius moriun-
tur, q̄ hæctica sit prorsus perfecta. Est autem eorū agni-
tio facillima, tum ex pulsus duritia, tum ex eo q̄ præ-
cordia plurimum trahuntur sursum, tum ex difficulta-
tate respirationis, quæ illis est inæqualis, & varia: inter-
dum admodum rara, magnaq; utiq; quum delirii ma-
lum præcipuè dominatur . Frigidus itaq; aer tunc vel
maximè confert, quum quod primum afficitur, ipsum
est cor: quis confert & in reliquis febribus nō parum:
quandoquidem in his quoq; necesse est cor similem in-
temperiem recipiat. Pulmones etiā ubi ii sunt qui pri-
mum patiuntur, plus cæteris omnibus aerem refrige-
rantem postulant. Porro ex medicamentis, quæ admo-
ta extrinsecus in eiusmodi affectibus, refrigerandi hu-
mectandiq; vim possident, deligēda ea sunt, quæ non
modò citra astrictionem refrigerent, sed etiam corpo-
ris substantia sint tenui. Ac quæ quidem absolutissimè
tenuium partium sit, substantiam exactè frigidam in-
uenisse, fortasse non est. Dixi exactè, propter acetum.
Quod quum omnium (quæ nouimus) potestate refri-
gerantium, planè tenuissimarum sit partium, admissā
sibi aliquam habet caliditatem. Præterea corpora que
cōtingit, siccant: quis ad inaginationem sit humidum.
Quo fit, vt ad eos affectus, quos humectari & refrige-
rari expedit, solo eo non vtamur, sed tanto aquæ fri-
gidæ admisto, vt possit bibi. Hoc autem medicamē qđ
subdam, humectantium & refrigerantium oniniū sim-
plicissimum est, optimumq; ad erysipelata, & puden-
dorum phlegmonas inter initia, prius q̄ depascens ali-
qua subindicetur putredo. Olei rosacei ex omphaci-
no oleo citra salem confecti. Vncias. iij. vel. iiii. Cere
albæ, & clotæ, vnciam vnam. Liqueantur simul in vase
duplici, ac fiat ceratum humidum, cui abūdō refrige-
rato,

rato, misceatur paulatim in mortario tantum frigidis
 simæ aquæ, quantum in se, dum cum ea molitur, acci-
 pere possit. Quòd si aceti quoque admodum tenuis &
 clari paululum adiciere uelis, utiq; magis adhuc tum
 refrigerans, tum humectans medicamentum efficies.
 Non debet autem medicamentum hoc eo usq; super
 ægrum corpus manere, dum manifestè incaleat: sed af-
 fiduè subinde mutari. Aliud. Oxalidos, aut oxylapathi
 succus, cum exigua polenta mistus, excipiat duplicato
 & detricto peniculo, aut linteo: affatimq; frigidū
 totum id admoueat. Quin etiam portulacæ, & sem-
 peruiui, & vuæ immaturæ succus, similiter polentæ mi-
 scentur. Adhæc, lens palustris, & viridis tribuli, & poly-
 goni, & lactucæ, & intybi succus, aliaq; refrigerantia,
 cum tenui polenta miscentur. Licet etiam absq; polen-
 ta, uti integris herbis tunsis. Iam verò quod epithema
 ex pinguibus conficitur palmulis, salutare medicamen-
 tū est. Porro coquere oportet harum carnem, omni
 membranoso exempto, aliàs ex solo claro aceto: aliàs
 aqua ipsi permista: atq; hac, ubi tenera satis reddita ē,
 cunsa uti. Est verò salutare medicamen ad talia, etiam
 succus rosarum frigidus, vnā cum polenta. Salutares
 similiter sunt & ipsæ rosæ contusæ. Præterea stirpium
 quæ moderatè astringunt, germina trita. Ad quæ mo-
 dum uti aliquando licet herbis mediocriter astringen-
 tibus: ut solano. Huiusmodi tamen refrigerantia om-
 nia, illi tantum admouenda sunt parri, quæ primariò
 est affecta: non aliis quæ refrigerari non possulant.
 Ego namq; hominem scio, qui imposito præcordiis re-
 frigerante medicamento, laborarit statim dyspnœa:
 sicuti alterum, qui tussierit protinus. Verum ex reme-
 diis ipsis, nonnulla quidem per se, neq; intercedente
 alio, refrigerare sunt nata: ut gratia exempli, frigidæ
 potio, necnon succus vuæ immaturæ. Alia autem ex
 accidenti: ut sanguinis missio, quæ calidam aliquando

*Frigido Gale-
ni cerato, quò
utendum sit.*

*Refrigerantia
pseudia uaria.*

*Refrigerantia
ex palmulis.*

*Rosarum suc-
cus.
Rose.*

*Refrigerantia
remediorum.
alia quidem p
se, alia ex acci-
denti refrige-
rare.*

intemperiem sanat. Ad eundem modum & clystere, & purgatio & fomentum, & cataplasma: quæ videlicet digerant, concoquantur ue. Vtraque verò facultatem in se comprehensam habet, dulcis aquæ balneum temperatum: utpote ex partibus varia facultate præditis constans. Siquidem quum primum in id ægri ingrediuntur, in aere versantur calido: postea in calidam aquam descendunt. Mox ab hac egressi, in frigidam. Postremo sudorem detergent. Potest autem prima eius pars materias per totum corpus, tum calfacere, tum liquare: præterea, quæ inæqualia sunt, æquare: & cutim laxare; & multa, quæ sub hac ante detinebantur, vacuare. Secunda eius pars, ubi quis in sicco corporis affectu ea utitur, potest madorem utilem solidis partibus immittere. Tertia balnei pars potest, ubi quis frigida utitur, & totum corpus refrigerare, & cutim densare, & vires firmare. Quarta verò, corpus per sudores, citra refrigerationis noxam, vacuare. At ubi quis intemperie lauitur, in horrores, cutisquæ; desitundinem incidit. Est autem continens ipsius horroris causa, mordentium excrementorum, aut etiam crudorum humorum, congestio actorum, citatior motus. Proinde, quibus horum est abundantia, caro verò ac cutis densæ, siue balneum sint ingressi, siue steterint in sole, siue quoquo modo vel gestati, vel perfricti, vel exercitati, vehementius dimoti fuerint, utriusque horum horror incidit. Contra, quibus hæc pauca sunt, & corporis habitus, ut remittat, laxeturquæ; à balnei calore, promptus, si non modò non horrent, sed et meliores redduntur: utpote excrementis per id vacuatis. Quo rationabili, neque in primo iuvationis initio, nec in incremento quisquæ ægrotantem lauit. Quippe densata est hoc tempore, coarctataquæ; & cutis ipsa, & quæ sub hac habetur carnea substantia. At in febris inclinatione vel incipiente, vel procedente, vel amplius progressa, sæpenumero nos ægrotos lauantem, non pa-

Balnei dulcis
aque tempera
teque facultas.

Balnei partes
diversæ.

Balneum intem
pestuum, hor
rores, cutisquæ
densitundinem
gignit.
Horroris cau
sa.

Lauandum nec
in accessionis
initio, nec in
ipsius incremen
to, febrientem
esse.

rſi eis conculimus. Si quis igitur balneū ingreſſus, mi-
 nimè inhorruit, ſed laxata illi, necnon rarefacta eſt cu-
 tis, huic ſuccedent planè excrementoꝝ vacuatio, equa-
 lis per vniuerſum corpus calor, exiguorum meatuum
 rarefactio, tenſorum laxatio, deſatorum fuſio. Ac va-
 cuatio quidem excrementorum, omni feбри eſt vtiliſ-
 ſima. Pari modo & rarefactio, & relaxatio. Fuſio tñ,
 & calor, non item: ſed calor omni feбри inimicus eſt.
 At fundi æqualiter, id ſolidis quidem animalis partib⁹
 non eſt alienum. Succis certè non perpetuò eſt vtile.
 Sed q̄ries in animali vel phlegmone, vel affectus phleg-
 monæ ſimilis cōſtitit, vel vtraviſ plenitudo, omnium
 inimiciſſimum. Nā phlegmone quidē, quū calfacti & li-
 quati ſucci ad ipſas confluunt, augentur. Tunicæ verò
 vaſorum, impares plenitudini, quæ iam ex liquatione
 eſt repleta ſpiritu, diſtenduntur, ac vires hoc nomine
 malè habent. Ergo calidis illis, ſiccisq; affectibus, effu-
 ſio mordentium eſt ſalubris: liquatioq; eoꝝ contingit
 citra periculū. Calfactio tñ noxa non caret. Atq; hæc
 quidem ex prima balnei parte optimè adminiſtrata ſu-
 muntur. In ſecunda autem (quæ lauacrum erat) vt fe-
 brilia corpora ex humectatiōe iuuant, ſic ex calore ni-
 hil illis cōmodè accedit. At in tertia, refrigerantur in-
 noxiè, quæ fuerant excalfacta, & vires firmantur. Si
 qua verò & laxata, & iuſto plus ſunt remiſſa, ea in na-
 turalem redeūt mediocritatem, id quod quarta balnei
 pars, quæ deterſio eſt, indicat. Quippe quibus rite ſunt
 omnia adhibita, ii poſt frigida vſum adhuc ſudant, &
 omnia ipſis excrementa vacuantur. A balneis igitur
 (vt vnani omnium veluti ſummam colligam) vacua-
 tur quicquid in corpore vel ſumidū, vel fuliginofum
 præfuit. Reducūtur ad naturalem ſymmetriam, tum
 caro ipſa, tū cutis: corrigitur ſolidæ partiū ariditas:
 & calor non modò iſ qui ex lauacro acceſſit, ſed qui
 et præfuit, ex frigida vſu extinguitur. Maximo huius

Baln eū contu-
 liſſe perſepe i
 acceſſionū de
 clinationibus.
 Balnei tempe-
 ſtui uſus.

Calor omni fe-
 bri inimicus ē.

Phlegmonē qñ
 augeantur.

Balnei ſingule
 partes, quos
 uſus præſent.

rei documento est, præsidium quod sentiunt homines, ex huiusmodi balneo, ubi à feruenti sole exsiccati, lauantur. Quippe quum accedant ad id, ritu stipulæ, aridi, egressi è frigida, illico in naturalem habitum redeunt. Si itaq; certam febricitantium naturæ habere-mus notitiam, nō dubitaremus eorum aliquos assidue in aquis frigidis citra balneum lauare. Quia verò exacta nobis dispositionum nō est notitia, ac maxima ex errore impendet noxa, utiq; eiusmodi recusamus præsidia, potissimum in febribus hecticis: quando per has & pauci sanguinis, & nudum carne, & expers adipis corpus est redditum. Etenim iuuenis corpulentus, æstatis tempore, ac in febris summo, uigore modò nulla viscerum phlegmone subsit, sudabit, si in frigidam se coniecerit. Quod si sit frigida; lauationi assuetas, securè remedio utetur. Qui autem ex calida & sicca inter-perie febricitant hecica: ac potissimum qui iam marasmodies fiunt: his ubi tale præsidium petunt, tutum non est in totam conici: æquè ut nec gracilibus & imbecillis, qui æstate calida & sicca, longa via peracta, refrigeratione indigent. Nam neq; his tutus est frigidi solii usus, nisi prius fuerint in balneo æqualiter excalfacti. Siquidem simile quiddam nobis videtur accidere, quum in frigidum solium post balneum ingredimur, ei quod ferro accidit, quum tingitur. Etenim tum refrigeramur, tum roboramur: quemadmodum & illud, ubi candens iam redditum frigida; mergitur. Atq; huius rei causa ad imbecilla corpora inuētæ sunt balneæ, quæ ea præcalfaciant, atq; ad frigidum solii præparent. Non dissimile quiddam faciunt, & qui sine balneo frigida utuntur, quum scilicet se ab exercitiatione in eam saltu demittunt. Siquidem quod nobis balneum, id præstat illis exercitatio: ut quæ nō calfaciat tantum, sed etiam insiti caloris motum à profundo corpore extorsum concitet, sic, ut & frigida;

Balneum frigidum quibus in trepide & quibus caute debeat administrari.

Balneæ calidæ ad solii frigidi usum corpora præparent.

Exercitatio præparat corpus ad balneum frigidum.

Impetui occurrat, & quo minus viscerum aliquod fe-
 riat, aduersetur, atq; prohibeat. Neq; enim ipsam fri-
 gidæ substantiam, neq; eius qualitatem omnino inte-
 gram, vsq; ad viscera pertingere est salubre. Immo sa-
 tius & tutius fuerit, solam qualitatem, eamq; rerusam
 calidorum occurſu, descendere. Iam verò qui hectica
 febricitantes ad balneum accedunt, nisi in frigidam
 sint dimissi, nihil iuuantur, contra q̃ aliis correpti fe-
 bribus. Nam quū iis solidæ partium affectus cādenti
 ferro sit similis, calfeuisse duntaxat eos, humectasseq;
 haudquaq; videtur satis (sic enim alimentum, incremē-
 tumq; præbuerimus febrī) sed opus est, vt merſis in
 frigidam, extingamus calorem. Quòd si ex violento
 ipſo, subitoq; frigidæ vsu, malè fuerint affecti, utpote
 in contrariam qualitatem mutati, hos licet in toto qđ
 sequitur tempore, calfaciendo sanare: quum neq; par-
 periculum sit in frigido affectu: nec in remediis quæ il-
 li adhibentur. Quum autem insanabilis solidarum par-
 tium summa siccitas sit, ad quam per hecticas febres
 via expeditissima patet, melius est hominem in frigi-
 dam intemperiem transferre, ac cui curationem adhi-
 beamus habere, q̃ tendentem rectè ad interitum sine-
 re, desperatamq; illi salutem facere. Ergo eos qui he-
 ctica febriunt, illico omni ratione refrigeremus, ante
 quàm progressi, in marasimum perueniāt. Nam quem
 iam occuparit marasmus, hunc neutiq; sanare tentaue-
 ris. Ipsum tamen in alterum transferre marasimum,
 quem appellāt ex morbo senium licebit: ac sic super-
 ſtitem, non tantum plures dies, sed etiam menses, ser-
 uare. In cæteris autem febribus, quas vel phlegmo-
 ne, vel putrescentes succi accenderunt, nihil offendes,
 etiam si in frigidam ægrum ipsum non merſeris. At in
 hecticis, id quod remedium affert, calidæ solium non
 est, sed frigidæ. Quicumq; igitur hectica febre laborāt,
 atq; ex iis præcipuè, qui iam marasimode tenentur,

Exercitiorum
 usus.

Hecticos, dum
 ad balneū ac-
 cedunt, nihil
 iuuari, nisi i fri-
 gidam sint di-
 missi.

Siccitatē sum-
 mā solidarum
 particularū ef-
 fe insanabilē.

Hecticos sta-
 tim esse oī ra-
 tione refrige-
 randos.
 Marasimum ef-
 fe incurabilē.

Seniū ex mor-
 bo.

Balnei partiū
descriptio.

Hectici quō
sint p quatuor
partes balnei
tractandi.

modō his nulla alia febris, vel ex solo putrescente hu-
more, vel cum phlegmone, sit adiuncta, eos omnes au-
dacter lauabis: sed prorsus citra omnem laborē: ne re-
soluantur vires. Sint ergo tres domus balnei: in quarū
primam, quæ satis esse calida debet, in lectulo cubans
ducatur: in ibique nudetur. Illinc autem valida sin-
done in secundam portari debet: quæ non tantum si-
tu sit media, sed etiam temperie: tanto scilicet prima
calidior, quanto est tertia frigidior. In ea itaq; oleo te-
pido super sindone perfundatur. Hoc facto, ad tertiā
ducatur domum: ubi nimirum est solium. In cuius qui-
dem moretur aqua mediocriter: idq; sustentus sindo-
ne: nulla q; infusione aquæ, cuiusmodi in aliis vti sole-
mus, adhibita: immo nec capiti eius quicq; infundi ve-
lim: quum sit satis id quoq; bis, ter'ue vnā cum toto
corpore, in aqua mergi: demissa mediocriter deorsum
sindone: ac rursū per quatuor iuuenes, qui cum por-
tant, leuata. Mox hinc eductus, in frigidam semel tot'
tingatur: ne vel breuissimo quidem spatio illic mora-
tus. Protinus verò alter paratam habens calentem sin-
donē, ipsi iniiciat. Dein æger suo in lectulo collocatus,
primum spongiis detergeatur: dein mollibus linteis,
quoad fieri potest, blādisimē. Postea verò unctus, ami-
ctusq; vestibus, rursus super lectulo redncatur ī aliquā
aliam domum vicinam, vbi cibari cōsuevit: in ibiq; nu-
tritur. Porro humidum esse, ac frigidum, quod hec-
ticis febribus sit conducturum, nemo nescit. Eiusmodi
verò sunt tum cremor ptisanæ, quum frigidus sumit:
tum alica, similiter ptisanæ cremori condita: id vero ē
ex aqua, & exiguo porri, & anetho: tum sale, oleo, &
aceto. Cōmodus præterea iis, q sic laborant, est & exi-
guus in aqua frigida panis. Cæterū nullius horū pu-
ra frigiditas esse debet, sicuti potionis: Quippe hæc
maturē tum incalescit, tum per corpus digeritur. Illa,
quū plusculum tps in vētriculo moreatur, ipsum for

Hecticis requi-
ri humidum et
frigidum nutri-
mentum.

Hecticorum ui-
tus ratio.

tas refrigerant, si fuerint immodicè frigida. Vbi autem febris iam traxerit, dandum quoque asininū lac est, sed diligenter obseruato, ne in ventre concreascit. Cauebitur autē id, si mel illi admisceas: aut salis, quo uestimur, exiguum. Abstinentium tamen in hecticis, quoad fieri poterit, à melle est: atque iccirco etiā à mulla. Quippe protinus in bilem conuertitur, & siciores, acriorisque; caloris febres reddit. Dandum itaque principio asinini lactis est non plus cyathus: sed inducta in ipsum cubiculum asina: quo nullum tempus interponatur: æger autem id protinus bibat. At verò si corruptū in uentre lac fuerit, pulsus paruos atque inæquales inuenies, quales accidunt in compressione ventriculi. Sin autē non sit corruptum, & maiores & ualētiores eos, quā pro consuetudine inuenies. Qua ratione obseruata, licebit tum lactis, tum aliorum ciborum omnium modū sensim augere. Qui igitur iam marasmo vexantur, eos, sicuti dictum est, lauabis. Quos verò hecica premit, nōdum tamen marasmo tentantur, eos licet et laues, sine subiecta sin donec: utpote viribus adhuc ualentes. At qui ex his infirmi sunt ualentes, eos non tutum est permittere in frigidam natationem descendere, sed foris ipsos potius perfundere: primum tepida: secundo frigida: qualis fontana est. Ac si quidem omnia curiose administrentur, utique sanandi iam eius quem marasmus consumit, spes est. Sin error uel in uno committatur, is, reliqua subuertit omnia. Quippe quum exitialis horum effectus sit, ne leuissimum quidem errorem tolerat. Ac si quis talium est seruatus, huic carnosam tamen portionem marasmus iam occupauerat. Ipsi verò solidis resiccatis, fieri nequit, ut homo prorsus sanetur. Etenim primum eiusmodi febris propriam partium humiditatem, ex qua nutriunt, depascit. Hinc transit ad genus carnosum. Deinde solidas populas particulas. Vocatur autem caro tamen ea quæ in musculo est. Nam quæ in uisceribus conspiciunt, non carnes, sed parenchymata

Lac asininum cum melle sumptum non coigitur.

Mel esse inimicum hecticis.

Lactis in uentre corrupti, nota.

Hecticas feb. ne leuissimum quidem tolerare errorem. Hectice feb. species.

Caro quæ dicitur.

Parenchymata.

nominantur. Porro singularum particularum substantie moles, ex tali maximè completa est natura, quæ & perire, & regigni possit. At verò nec fibrosa, nec nervosa, membranosa ue natura, eandem generationem habere cernitur: nec fas est eiusmodi singularum partium fibras, à febribus malignis liquari, perinde vt carnes: quando aial ipsum, prius q̃ hæc prorsus sint exiccate, iteremerint. Sanè sunt & quas marasmodes febres vocant, vniuersæ ex earum genere quæ colliquant: sed in eo differunt, q̃ in his, quæ portio carnis colliquatur, ea semper vaporis vice digeritur: in illis defluit in ventrem. Nam quemadmodum quo magis animal vel adipe, vel carne abundat, eo, quod ab ipsius carnibus, dū in craticulis torrentur, defluit, copiosius cernitur: ad eundem modum in calidissimis febribus, si carnes humidæ ac molles, cum adipis copia fuerint, ea sensus liquari deprehendas. Sin absq̃ adipe & siccæ sint, insensibiliter absumentur, & in febres marasmodes transeunt. Hæc præmonitus, colliquantium febrium iisdem methodis curam ages: tum ad frigidam exhibendam, q̃ primum properans: tum iis quæ refrigeret & humectent, nutriend. Mulsam uerò inimicissimam illis esse censebis.

GALENI PERGA

MENI DE MEDENDI

METHODO. LIB. XI.



ODVM Igitur curandatum ephemerarum, in octauo huius operis commentario: cōtinentium, in nono: hecticarum deniq̃ in decimo, satis accuratè exposuimus. Nunc verò, quæ admodum quæ ex putrescētibus huius

Marasmodes
a colliquanti-
bus febribus
quō differant.
Colliquantium
febrium cura-
tio.

moribus excitantur, methodo sint sanandæ, aggredi-
 est animus. Duo autem sunt scopi curationis in vniuer-
 sum: affectus nempe ipse: atq; ægrotantis temperies.
 Affectus quippe, ex iis quæ sibi contraria sint, adhiben-
 da esse remedia indicat. Laborantis verò temperies, si
 mul cum ipso morbo, mensuram contrarietatis defi-
 nit. Potest etiam ambiens nos aer (qui ex coeli statu,
 anni tempore, ac regionis natura suas mutationes sor-
 titur) unam efficere indicationem: ac vel ægritudinis
 causis, uel sanitatis, annumerari. Porro auxilium, quo
 ad morbos tollendos utimur, prima & vltima dicitur,
 sanitatis causa: diuersis tamen rationibus. Dicitur quip-
 pe vltima tempore: quando quidem & natura, & ars,
 & fortuna, priores, secundū tempus, eo sanitatis exi-
 stunt causæ. Prima uerò est, quatenus id primò laborā-
 tis corpus tangit, alteratq; eius affectum. Ars siquidē
 artifexq; & fortuna, non per se primū, sed per auxi-
 lia morbos profligant: materiq; interuentu operant:
 quemadmodum per seipsam natura. Quæ nimirum
 ex tum spiritus, tum solidarum particularum (quæ ex
 semine genitali oriuntur) tum carnosarum substantia,
 constat. Quarum trium substantiarum singule propriā
 pro natura sua tum qualitatem, tum quantitatem ha-
 bent. Ac qualitas quidem earum, ex cōgrua temperie
 humidi, sicci, calidi, & frigidi efficitur. Quantitas verò
 solidarum partiū, par semper manet: sed iis qui adhuc
 in augmentum, numero duntaxat: qui verò absoluti iam
 sunt, etiam magnitudine. Carnosæ uerò substantiæ ma-
 gnitudo uariatur, etiam si iam non augeatur animās.
 Pari modo & suba spiritus * propemodum quolibet
 memento tum maior, tū minor aspici. Ergo ad duos
 illos scopos prius traditos, etiam vnica uirt^{us} addetur,
 iuxta earum trium substantiarum enumerationem: aut
 temperies per se distinguetur: quæ & ipsa rursus bifa-
 riam scinditur: nempe & in originalem naturam, & in

Curationis sco-
 pi sunt duo: af-
 fectus, & ægri-
 temperies.

Affectus quid
 indicet.

Temperies qd
 indicet.

Aer unde suas
 mutationes sor-
 tiatur.

Auxilium cur
 prima & vlti-
 ma sanitatis
 causa dicatur.

Fortuna p au-
 xilia morbos
 profligat.

Natura ex qui-
 bus constat.

Solidæ partes
 ex semine ge-
 nerantur.

Virtutem esse
 unum ex cura-
 tionis scopis.
 Temperies est
 duplex.

Indicationes re-
 mediorum un-
 de sumantur.

Intemperie p
contrariā aliā
sanādam esse.

Custodiā fieri
per similia.
Sublatio mor-
bi sit per con-
traria.

Partium singu-
larum per quæ cu-
stodiendæ sunt.

Tēperies opti-
ma, semper ser-
uanda.

Intemperies
vitiosa quā ser-
uanda, & quā
sit alteranda.

acquisititiā dispositionem: sic nimirum ut ex istis, & aliis quæ prius dicta sunt, propria quædam cuiusq; remedium sit indicatio. Ex ætate etiā, uitæ studiis, consuetudineq; remedium indicationes sumuntur. Proponatur igitur nobis intemperies quædam curāda. Ea utiq; per contrarium intemperiem sanabitur. At quoniam vniuersi febrium generis intemperies, est calor: utiq; per frigiditatem curabitur. Quemadmodum autem ab affectu ad materias præsidio peruenimus, eodem etiam modo à singulis reliquorum generum primorum, ad eas est descendendum: veluti à uirtute, quæ morbo, ceu aduersatrix opponitur, & cui omni ratione opitulari & subuenire est consilium. Quare virtutis quidem ipsa erit vnus ac primus scopus: alter aut, atq; secundus, quod ab ea significatur: nempe custodia ipsius. Pari etiam ratione, morbus quidē dicitur esse primus scopus: secundus autem, sublatio ipsius. At verò custodia, similitudinē indicabit exhibitionem: sublatio, contrariorum. Quoniam uerò vitium substantia tum ex spiritu, tum ex carnosa specie, tum solidis ipsis completur: ex iis quæ similia sunt, moliri cuiq; suam custodiā oportet. Spiritui, ex respiratione, transpiratione, & uapore qui ex sanguine attollitur. Solidorum uerò generi, ex solido nutrimento. Carnoso generi, per eam naturā, quæ in medio humido ac solido corpore est. Porro cuiusq; horum modum ex seruandæ substantiæ modo inuenies: qualitatem uerò, ex ipsius temperie. Quā autem horum cuiusq; temperies, vel optima sit, uel aliquatenus vitiosa: quæ quidē optima ē, semper seruari debet. Quæ uerò omnino vitio non caret, hæc in sanis quidē, uel seruanda ē, uel alteranda: in ægris uerò, seruanda. Quā autem diuersitas non parua sit, in partium aialis temperamento, propriā cuiq; mensurā, eorum quæ ipsi similia sunt, oportet accommodare. Nempe ei quæ terrea est magis, eorum quæ magis sunt terrea: & ei quæ humidior est, eorum quæ sunt humidio-

rata: sic de cæteris cõstitutionibus. Hinc verò iã matè-
riæ particulares oēs in cibis, potiõc, aere, & oib; per-
agi solitis, inueniendæ sunt. Quòd si mutuo inter se pu-
gnēt aliquæ indicationes, ppendenda * indicantiũ sco-
porũ tũ magnitudo, tũ dignitas est, efficiẽdumq; id, qd
tũ maiores, tũ digniores scopi admonent. Quorũ digni-
tas quidẽ iudicãda est, vel vitæ, vel sanitatis respectu.
Magnitudo autẽ est duplex: vel propriæ substantiæ ratio-
ne, vel declinationis à naturali habitu. His igit pmissis
methodis, iã i febrĩũ genere exercitemur, qd ex putre-
dine nascit. Ac primũ ab illa febre exordiamur, quæ ex
putredine humoꝝ in maximis vasis, vel i oib; simul,
cõputrescentiũ, oritur: quãq; necessum est synochon,
hoc est p̃inentẽ, existere. Fieri autẽ neq, vt talis febris
sanet, nisi inhibita prius ipsa putredo sit: quæ sanẽ inhi-
beri, causa manente, nõ potest. Quare submouẽda ipsi
us causa est, si mō putredo ipsa prior: mox post ipsam,
febris sanari debeat. Ostensum autẽ est, illa tm̃ putresce-
re corpora, quæ quũ calida humidaq; natura sint, neq;
p̃flata, neq; uentilata, in calido humidoq; loco includũ-
tur. Quòd si in motu sint, ventilenturq; ac p̃flẽtur, pos-
se ea nõ putria, integraq; seruari: potissimũ quæcunq;
corpora sua ipsoꝝ natura regũtur: vt aialiũ, stirpiũq;.
Ea nãq; ab initio cõgenitos secũ motus habẽt, qbus su-
perflua excernãt. Nec minus et est demonstratũ, q̃ra sit
tum respirationis, tũ pulsuũ vtilitas, ad p̃flatũ, vẽtilatio-
nẽq; corporis, atq; eius natiuũ calorẽ tuẽdũ. Itaq; si qd
in eo manifestẽ putrescere debeat, dictas trãspiratiões
esse ipeditas oportet. Fieri autẽ nõ potest, ut illæ per to-
tũ sistantur aial, nisi vel finibus vasoꝝ stipatis, vel tota
cute. Porrò accidere in finibus vasoꝝ stipatio potest,
vel ex vehementi extrinsec⁹ refrigeratione: vel ex suc-
coꝝ, q extrorsum in ipsos pfertũ ruerint, crassitudine,
multitudine, vel lentitia. Accidit hoc illis & ex iis exer-
citatiõib⁹, quæ i palæstra, vel aliàs obeunt, & itinere la

Indicantiũ sco-
porum digni-
tates esse ex-
pendendas.

Synochos feb-
quæ dicatur.
Synochorum
curatio.

Putrescent ca-
lida & humi-
da, quæ in simi-
li loco conclu-
sa, persflari nõ
possunt.

Transpiratio-
nes vnde pro-
hiberi contin-
gat.
Stipatio in fin-
ibus vasorum,
vnde contin-
gat.

borioso: uel ambientis statu, quā ex rigore in æstū mutatus est subitō. Nonnullis uerō seruentes ex ira succi, ac foras simul impetu ruentes, effecerunt dictas stipationes. Quisquis igitur propositam sanaturus est febrem, hic simul causam eius oportet adimat: simul calorem qui in animali excitatus ab ea ē, refrigeret. Ac quemadmodum quidem ille refrigerādus sit, prius est dictum. Causam uerō adimi oportebit, propria cuiusque naturæ inuenta cōtrarietate. Vtiq; si ex frigida causa stipatum, densumq; redditum corpus est, relaxato eo, omniq; ratione rarefacto. Sin ex obstructione ita ē affectum, hac reclusa. Quod uerō recludet, hic quoq; ad contrarietatis indicationem attentus inuenies. Vbi namq; abundantia humorum est, hos vacuabis. Vbi crassi, glutinosiq; sunt, eos tenues & fluxiles reddes. Si plures causæ aliquando coibunt, omnibus per contraria occures. In eiusmodi aut dictarū causarum cōplexu, cœpisse à sanguinis missione conueniet: ac abundantia vacuata, tum ad extenuādos humiores venire. Ab hoc ad remittenda quæ sunt constricta, & rarefaciēda quæ sunt densata. Atq; hæc quidem à morbi affectu indicationē sumenda sunt. Quum autem ciborum atq; potionum, nec non spirituum decens quātitas, qualitasq; uirtutem ipsam custodiant: ac modus quidem quantitatis ipsorum, à uirtutis substantia inueniatur: qualitatis uerō, à temperie: nimirum estimari debet, quemadmodum vires quæ corpus regunt, se habeant. Quæ quidē si sint valentes, audacter vacuantibus præsidis uteris. Sin infirmiores sint redditæ, vacuantia remedia cauti⁹ administrabis. Sed & nutrimenti modus hinc tibi desumendus est. Quippe quum vires legitimum robur suū habent, & morbi summus vigor breui expectatur futurus, tenuissimo cibo uti licet. Vbi uerō infirmiores fuerint, non licet sine graui noxa. Sed adicere ad nutrimenta tantum oportet, quantum est de robore vi-

Stipationis causa.
ratio.

Nutrienti quæ
titatem, a uirtute
qualitatē, a temperie
sumendam esse.

Tenuissimo cibo
quando sit
utendum.

riuni detractum. At nutrimenti qualitas, ex morbi affectu, unà cum solidorum corporum temperamento præsentī, sumenda est. Tempus autem nutriēdi, quod quidem ad reliquas febres pertinet, quæ ex putredine oriūtur, in progressu sermonis dicetur. Quæ uerò unicam tantum à principio ad finem usq; accessionem habent, synochiq; dicuntur (de quibus impræsentiarum est sermo) in iis tunc offerēdus est cibus, dum ægri melius se habent: eoq; potissimum dici tempore, quo in sanitate prius cibari erant sueti. Est autem frigida quæque iis propinanda, quum succi & iam concoquantur, & crassitudo eorum est extenuata. Cæterum iam operæpretium est explicare, quot sint febrium, quas putredo accendit, in vniuersum differentiarū. Dein, quænam sit ipsius generis earum communis vtilium auxiliorum indicatio. Mox, quæ sit singulatim cuiusq; propria. Quod igitur ad differentias pertinet, prima sanè ex eo est quod causæ ipsius putredinis vel adsunt, vel non adsunt. Secunda ex eo q; per totum animal, aut eius partem aliquam diffusa putredo sit. Tertia, quatenus cum phlegmone, aut citra hanc. Ergo ordiamur ab humorum putredine, quæ primum indicans in diuisione fuit. Cuius quidem natura, ad curationem erit inuentionis principium. Porro natura putredinis est mutatio totius putrescentis corporis ad corruptelam, à calido externo. Non enim profectò à proprio calore corrumpitur quicq;: immo prorsus cōtra, quicquid in rebus subsistit, id augetur, roboratur, sanum est, ac uiuit, dum proprio calore regitur, veluti nimirum ipsa animalium corpora, quādiu seruaturs proprius eorum calor: in cordis quidem corpore, per respirationem: in reliquis omnibus partibus, tum per communitatem quam habent cum corde: tum per aliam quandam respirationis speciem, quæ per totam agitur cutē, & trās spiratio, perspiratio uē dicitur. His uerò læsis, unà etiā

Nutrimēti qualitas ab affectu & temperamento est sumenda.

Nutriēdi tempus quale sit i synochis aptū.

Frigida quæ sit propināda iis qui laborant synocha.

Puridarum febrium diffinitio.

Putredo est mutatio corporis ad corruptelam à calido externo facta.

Calor naturalis auget atq; conseruat omnia, illisq; uitam largitur.

Calor naturalis quo conseruetur in corpore.

Putredo quō
sit sananda.

Putris humor
quō sit vacuū
dus.

Vacantiū me
dicaminū ma
ior pars febres
ipsas adauget.

Vacantiā mo
dice quæ sint.

Rarefaciēdum
nō ē corpus,
prius q̄ sit va
cuatum.

Vinum aque
sum & mouet
omnes euacua
tiones.

calor natiuus læditur. Alter verò quidam alienus, ut p
ter naturam in corporibus excitat^r, primū quidem
ipso succo propter humiditatem putrefacit, corrup
pitq; . Spatio verò, tum adipem inuadit, tum etiam car
nem. Putredinem in corporibus ortam sanabimus, id
quod iam corruptum est, omni ratione vacuantes: qđ
reliquum est, moderatis motibus, & refrigerante per
spiratū ad exactam symmetriā reducētes. Ac vacua
tionem quidem illius per vrinam, deiectiones, sudores,
vomituūq; moliemur, si putridus humor, ad os ven
triculi aliquando sua sponte impetum fatiat. Post hāc
dimotiones mediocres, vnā cum ambientis bona tem
perie adhibebimus. Causam verò putredinis, si adhuc
perseueret in corpore, per contraria tollemus. Itaq;
quoniam transpirationis prohibitio fuit occasio putre
dinis, hanc submouere oportet. Quia verò ea (quæ ad
modum exposuimus) à variis causis est orta, ipsarum
singulis contraria medendi ratione occurrēmus. Sciē
dum tamen est, non easdē omnes partes vacuationes,
medicamenta ue requirere: quum & temperamentis,
& posituris, & forma, & omni deniq; cōstitutione, na
turaq; inter se dissideant. Quū aut maior pars medica
mentoꝝ vacuantium, febrem ipsam adaugeant, ut po
te facultate calida & sicca: deligēda medico sunt, quæ
citra calfactionē, siccationēq; valentē, ipsas vacuatio
nes moliātur. Cuiusmodi sunt cremor ptisanæ, aqua
mulla, oxymeli, aponioli, & apii radix, i aqua, quæ po
tui datur, incocta. Hæc aut ipsa ventri sunt quoq; ido
nea. Qui si nihil reddat, iniicienda per clysterem mulla
cum oleo est. Sanè totum corpus, prius q̄ id vacuaris,
rarefaciendū non est. Vbi vacuatum sit, utiq; licebit
id medicamento aliquo, cui calor tepidus insit, rarefa
cias: cuiusmodi est qđ ex chamænielo conficitur. Hoc
tpe si vinū quoq; aquosum bibatur, id omnes vacua
tiōes promouerit. Idem faciat & temperatū dulcis

aquæ lauacrum. Cæterum, vbi magnitudo febris obstat, sicuti in continentibus, nec vino est vtendum, nec lauacro, nec iis, quæ habitum rarefaciant, vnctionibus. Iam verò id genus ardentissimis febribus, potus frigida confert: nisi subsint putrescentes humores, per aluum, vrinas, vel sudores vacuandi. In vniuersum autem, dum plura simul coeunt symptomata, id quod maximum omnium est, aggredi oportet: atque ei vel soli, vel magis quam cæteris, subuenire. Porro ad corrigendos putrescentes humores, non tantum requirimus vires ipsius pulsus firmas: sicuti nec eius facultatis quæ volutarium motum largitur: sed multo magis ipsius concoctricis. Ergo si & vires cunctæ valentes sint, & ardentissima febris, & concoctionis notæ planè euidenter, frigida intrepidè propinabis. Quod si etiam æger bona corporis habitudine sit, tum status cœli calidus, ac siccus, etiam si in frigidam natationem hunc dimittas, haudquaquam lædetur. At si mediocris est febris, & vires non validæ, sed cum notis concoctionis, iis qui ita se habent, balneum prodest, & vini potio: tum verò ex vnctionibus eæ quæ rarefaciunt: idque multo magis, quum ambiens est frigidus. Neque enim aut frigidam in balneo lotionem, aut frigidam potionem in eiusmodi cœli statu ferè expetunt, vtpote inspirationibus assidue refrigerati: quum si quando in frigido ambiente vehementer vri ægrotum contingat, exigua salutis eius habenda spes est. Si vero nec concoctionis habeat signa, nec vires validas, seruari is planè non potest. Quo minus aut idem lauandus in balneo est, aut medicamentis iis quæ rarefaciant, vngendus, aut vinum illi dari dandum, frigida uero offerenda. In quo enim desperata omnino est salus, imprudentis consilii fuerit apud vulgum infamare præsidia, quæ multis fuisse salutem, Febris igitur, prout febris est, aqua frigida est perpetuo remedium. Quod verò ad alia pertinet, non perpetuo. Veluti quum ex obstructione glutinosi & crassi humo-

Continenti febre detentis, nec balneo, nec uino, nec vnctionibus rarefacientibus esse utendum.

Frigida quando sit propinanda intrepidè febri syncho afflicti.

Frigida natatione quando uti possimus in continetibus feb. Vinum quando exhiberi possit per continentes febres.

Lætalia signa in synochis. Infamanda salubria medicamenta non esse ubi salus est deplorata.

Febris, vt febris, aqua frigida est perpetuo remedium.

Obstructio
quid.

Putredo est an
recedēs ipsius
febris causa.

Obstructa nō
esse apenēda,
prius q̄ pleni
tudo vacuetur.
Obstructionū
curatio.

ris putredo nascitur. Ponatur autem cum hoc, & reddantiam in toto esse corpore: tum uirtutem non imbecillam. In eiusmodi etenim complexionibus, quum multa præter naturam in corpore sint, quædam corū præcedentes causæ erunt: veluti redundantia cum glutinosis & crassis humoribus. Horum namq; vitio obstructio est orta: quæ morbus instrumentalis est, corū quæ obstructa sunt corporum. Hanc symptoma sequutum est, ipsa transpirationis cohibitio: quam rursus putredo humorum excepit, antecedens quædam ipsius febris causa. Ergo qui febrem curare vult, necesse est inhibeat putredinē. Ac sic duæ indicationes se exhibent: altera à febre: altera à putredine. Atq; à febre rursus duæ: scilicet ut portio febris, quæ iam accensa est, percuretur: quæ verò etiamnum gignitur, inhibeatur. Aliæ autem duæ rursus à putredine erunt indicationes: ut & quod putredinis iam factum est, sanes: & qd̄ in generatione adhuc est, sistas. Porro quod in generatione est, id perspiratio impedita facit. Ita ab hac rursus aliæ duæ indicationes nascentur: tum ut quod retentum est, vacuetur: tum quod retinendum est, prohibeatur. Prohibebitur sanē, si obstructioni medeamur. Cuius quoq; ipsius, quod iam occupauit, sanandum est: per ea quæ obstructa liberant, quod futurum est, propulsandum: per ea nimirum, quæ affluxum obstructiuum succorum compescunt. Ergo quod vltimū in ipsa methodo resolutiuum est inuentum, id primum omnium in curatione tibi est peragendum. Etenim si iis auxiliis, quæ obstructiones eximant, uti, non vacuata prius abundantia, uelimus, non modò nihil proficiemus, sed maiorem etiam reddemus affectum. At si vacuata prius multitudine ad curandam obstructionem accedamus, medicamentis iis utemur, quæ citra calorem obstructiones expedire sint apta. Vbi autem quæ obstruunt deterfa, dissectaq; sunt, per aluum, vrinas, atq; sudorem

atq; sudorem, ea uacuare tentandū, idq; medicamen-
tis quoad licet, minimè calfacientibus. Hoc verò tpe,
ētvires roborare, quo & putredinē superēt, & succos
concoquant, studebimus. Quod aut febris ipsius iam
accessum est, refrigerabimus. Itaq; in auxiliorum in-
ueniendox ordine, vltima est quæ ab hac sumitur indi-
catio, quæ alia ratione sit prima: quum à febre videli-
cet cœperit inueniendorum præsidiorum methodus.
Ac si nullum quidem interim vehemens symptoma
incidat, prohibeatq; quominus auxilia ab initio mor-
bi ad finem ita procedāt, celerrimè febris finietur. Sin-
tale quippiam inciderit, quod totam ad se curationem
reuoce, producet & curationis finis. Expendere au-
tē oportet medicamentorum tum usum, tum no-
xam. Quippe aqua mulla, quatenus crassos succos ex-
tenuat, glutinosos deterget, atq; excretionē promo-
uet, optimum in iis synochis medicamen fuerit, quos
habitus coarctatior, & putredo excitauit. Quatenus
verò calorē febris adauget, est noxia. Quare si hic ini-
modicus sit, parcendum mullæ est: vtendūq; cremore:
ptisane. Quod si difficiles & cōtumaces iudicaueris esse
obstructiones, ēt oxymelite. At hoc ipsum rursus, si i-
modicè vtare, & intestina radit, & tussim excitat, &
neruosa lædit. Perpetuò aut dogma illud existit verū,
contrariox contraria esse remedia. Quāquidē fieri non
potest, vt eox quæ p̄ter naturam sint, quicq; per aliam
vllā remediox speciem curetur. Non tñ ex vsu est seni-
per oibus quæ p̄ter naturā sint, mederi: sed quum sola
per se subsistunt. Nā si cū aliis vnā incidant, aliis sæpe
est ante illa medendū: sicuti in cauis vlceribus, vbi ea
simul cū phlegmone sunt coniuncta. Siquidem verū in
his quoq; manet, q; per ea quæ carne implent, curan-
tur. Ceterum his vti non licet prius q̄ curaueris phleg-
monem. Quæ itaq; præter naturam sunt, omnia ab
is quæ ipsis sunt contraria, curantur. Quum autē eo-

Mullæ faculta-
tes.

Oxymelitos
noxæ.

Contrariorum
esse remedia
contraria.

Rerum præter naturam differtentia duplex.

Contraria quorum dicantur esse.

Cōtraria quæ.

Alia: 3 vbi

Oppositio q.

Medicina est appositio & detractio.

Cārū genera præter naturam.

rum quæ præter naturam sunt, duplex prima sit differtentia, aliis per se subsistentibus: utputa affectibus: aliis in generatione suam essentiam habentibus, ac umbræ ritu affectus concomitantibus: nempe symptomatis: utiq; sanatio quidem, affectuum sublatio est. Hanc verò symptomatum amotio sequitur. Quare affectuum ipsorum, qui verè & primario curantur, potissimum dicuntur esse contraria remedia: symptomatum autè, ex accidenti. At verò contraria dicuntur, quæ sub vno eodèq; genere, plurimum inter se disident. Si aut in illo genere quod mediocriter est, hoc est medium inter duo extrema, intellexeris, infinitam quandam contrariarum rerum multitudinem, quæ maioris minorisq; ratione, inter se disideant, ex eo inuenies. Non enim in corporum modò qualitate, verùetiam in quantitate, eiusmodi contrarietatem inuenias. Quam utiq; Aristoteles non cōtrarietatem, sed oppositionem nominat. Verùm Hippocrati, omnia id genus contrariorum habent appellationem: sicuti etiam Platoni, qui ex cōtrariis esse dicit generationes. Contemnere tamen nomina oportet: minimè autem scientiam rerum. Cuius nō ignarus Hippocrates ait, Medicina appositio est, & detractio: deficientium quidem appositio: redundantium autem detractio. Porro deficiunt, redundantq; nōnulla quidem in quantitate: quædam autem in qualitate. In quantitate, quum sanguis immodicè est auctus: aut rursus minor redditus. In qualitate, quum vel calidus, vel frigidus, vel crassus, vel tenuis, plus iusto, minus ue, est effectus. Verùm ad medendi indicationes propositi nobis febrium generis reuertamur. Genera causarum quæ in nobis præter naturam oriuntur, sunt multitudo, crassitudo, & lëtor humoris. Causa simul atq; symptoma est transpirabilis excrementi retentio. Simili mó causa pariter & affectus est ipsa putredo. Morbus verò tū obstructio, tū febris ipsa. Symptoma est, trāspi-

rabilis excrementi retentio. Ergo indicabit præcedentium causarum quælibet proprium aliquid, poscens nimium ablationem sui per opposita. Nempe multitudo ipsa, quæ ex eorum est numero, quæ sunt ad aliquid, in prædicamento quantitatis, vacuationem. Lætitia verò & crassitudo, quæ sunt in qualitatis affectu, incisionem & absterisionem. Obstructio autem, qui morbus instrumentalis est, reclusionem. At transpirabilius retentio, excretionem eorumdem. Sicuti & humorum putredo, excretionem, refrigerationem, ventilationem, & concoctionem semiputridorum: quæ omnia illi ex aduerso respondent. Ipsius uero febris, refrigeratio oppositio est. Singulæ itaque res semper unâ indicationem exhibent. Ac si præter naturam ipsum indicans sit, semper indicabit contrarium: sicuti non contrarium, sed simile, si secundum naturam se habeat. Igitur si vires eius qui ex putredine humorum febricitat, valentes sint, mittendus statim morbo incipiente est sanguis: si cruditas ventris non adsit. Sin vires infirmæ sint, aut ætas dehortetur, incidenda vena non est. Eiusmodi tamen febris in virtutem imbecillam non incidit. Quippe synochos bene habiti corporis, & calentis ætatis est propria. At si infans incidat, qui quartodecimum annum hactenus non attingerit, mitti illi sanguis non debet: propterea quod tætilis, quum præsertim calidi & humidi sint. plurimum corporis substantiæ quotidie defluat, ac digeratur. Ita quod ex incidenda vena moliendum nobis fuerat, id ultro nobis ex curandi corporis natura præstat. Quod si corpus quartodecimum excoierit annum, æstimandum est, qualis eius natura sit: num gracilis, & spissa, & dura, & copiosi sanguinis, an contra. Atque ita in priori missionem sanguinis adhibebis: in secunda, nequaquam. Quin etiam modus vacuandi sanguinis ex iisdem sumetur indicationibus. Si enim cui sanguis mittitur, triginta annos sit natus: sed laxus, & mollis, & pinguis, & albus, & gracilibus venis: huic aut planè sanguinem non mittes: aut parum

Causarum præcedentium febrem putridam, quid singule indicent.

Sanguis in principio statim mittendus est, si putrida febre laborans validis viribus sit, nec cruditas subsit.

Synochos, non incidere in imbecillas vires.

Pueris ante quartodecimum annum cur non sit sanguis mittendus, vel si laborant synochos.

Pueris post quartodecimum annum quum mittendus sit sanguis, & quum mitemur.

detrahes. Et omnino quidem non mittes æstiuo tempore, regione æstiuosa, & cœli statu calido & sicco. Parum detrahes in reliquis tum anni temporibus, tum regione, tum cœli statu. Iam verò, si neq; obstructio, nec putredo subesset, sed sola redundantia succorum, protinus à missione sanguinis, pro naturæ sue ratione homo se haberet. Verùm quoniā nec obstructio, nec putredo per solam curari missionem sanguinis potest, reponi sanguinis aliquid ad spatium curationis debet: quo minus itepestiuè nutrire necessitate vlla cogamur. Quantum nāq; ad huiusmodi pertinet febrem, prorsus nutriendum non est. Siquidem ostensum prius est, solum virtutis respectum esse, qui nutrimento præbeat indicationem. At uero euacuationis ratione, nutrire oportet. Ita necessum est duorum alterum: aut febre, si nutris, augere: aut vires, si non nutris, deicere. Satiùs itaq; fuerit, aliquid sanguinis, quod propriū partibus animalis nutrimentum sit, relinquo: ac ipse paucissimas sorbitiones, potionesq; exhibere contentus sis: quibus utiq; ceu medicamentis, potius quā nutrimētis egemus. Porro quum ars ipsa tota sit magna, non leuissima eius pars est, scientia ordinandi victus.

Synochā feb. regere tenuissimā uictus rationem.

Vires indicāt formam nutriendi.

Sanguis cur non sit in synochis detrahendus immo dicitur.

Victum instituens pars artis, ex quibus constat.

Præcordiorū perfusibiles qñ sunt perniciose.

Diuites q̄ pauperes cur inter dum solent de ceteris curari.

Quæ utiq; ex his maximè remediis constituitur, cibo, potione, perfusione, cataplasmatibus, & clysteribus. Cæterum calfacere præcordia cataplasmatibus aut perfusionibus, non est perpetuò tutum: sed in iis tantum ægris, quibus in toto corpore nullum errat superfluum. Cæteris omnibus extrema est perniciēs. Nam siue redundantia vtrius sit, vel ad vasa, vel iuxta vires: siue etiam in vna parte pluribus uel vitiosa excrementa habeantur: omnia ad partem excalfactam trahuntur: inibiq; sæpe phlegmonas excitant. Quare in eiusmodi morbis diuites potius q̄ pauperes perperam solent curari. Nempe, & quod raro illis mittatur sanguis, vel si maximè tali egeant auxilio: & q̄ medici, ut agere ali-

quid semper videantur, de pfundendis præcordiis maximè sint solliciti. Itaq; accidit, vt illo ipso tpe phlegmonæ incipiant diuitibus, quo iā pauperibus, morbus propemodum perductus ad finem est. Saluberrimum igitur est in febribus venam incidere, non synochis modò, verum etiam aliis omnibus, quas putrescēs humor concitat: vbi præsertim neq; ætas, nec vires prohibēt. Leuata enim quæ corpus nostrum regit natura, exonerataq; eo quo veluti sarcina premis, haud ægrè quod reliquum est vincet: concoquens quod cōcoqui est habile: & excernens qd potest excerni. Porro vbi humor ad locum affectum confluit, remittere repellereq; hunc expedit: nō ad ipsum trahere. At repellentia remedia, quæ certè astringendi vim obtinent, in principiis idonea sunt duplici ratione. Et q; robur affectis particulis inserant (unde minus prōptē affluxum excrementorū in se recipiunt) & q; eorum quæ in iis iam recepta sunt, tenuissimū extrorsum exprimant. Quòd si tum fluxio humorū per ea remedia cōpescitur: tum densitas quæ in affecta particula relicta est, crassiora detinet: iam tempestiua relaxatio est, quo ea quæ retēta sunt, vacuēs. Præcipuè aut astringentibus est vtendū, ubi in iecur aut venter, superuacuum aliquid profluit: qñ & è primoribus admodum hæ partes sunt: & ut mun^o suū obeant, vel in ipsis morbis, est necessariū: quū alimentum corporei uniuerso conficiant. Quare ciborū cōcoctio, siue ea in iecinore, siue in ventriculo sit in prospera, febres intendit: ac succi vitio exacerbatur. Quo magis in oī febre, ciborū concoctionis prospicere magnopere oportet. Atq; eius rei gratia, roboris qdq; instrorū qbus perficit, non leuis habenda est cura. Si ergo vel minima sit suspitio iecur aut ventriculū laborare, absynthiū protinus oleo incoquemus, ac eas particulas pfundemus. Quā aut duplex in oī absynthio facultas sit, vtq; in pōtico astringendi facultas nō parua

Sanguinē mittere i omnibus putridis febribus, qñ sit saluberrimum.

Repellentia remedia eē idonea phlegmonis incipientibus.

Relaxantibus qñ sit nobis vtendum.

Astringentibus qñ vtendum.

Cōcoctioni ciborum magnopere pspiciendum eē in singulis febribus Absynthiū hepati opitulatur. Absynthiū duplex facultas.

**Abſynthiū pō-
ticiuſſe eli-
gendu ad ſe-
coris & uſtris
phlegmonas.**

**Amara quali-
tas viā aſtrin-
genti facit.
Olei ſpecies
diuerſe.**

**Myrtinū oleū
eſſe craſſiorū
partiuū, q̄ ut
alte deſcende-
re poſſit.**

**Phlegmonis
hepatis cōmo-
diſſimu cata-
plaſma.**

eſt. In reliquis omnibus amara quidē qualitas eſt vhe-
mentisſima: aſtrictio verò, aut planē obſcura, aut pror-
ſus nulla ſentitur. Proinde ponticiū ad iecinoris & ven-
tris phlegmonas eligi pōtat. Eſt autē id tum folio, tū flo-
re lōgē q̄ cætera abſynthia minore. Odor quoq; huic
nō modò non inſuauiſ, verū etiam quid aromaticū re-
ferens. Reliqs oībus planē eſt fœdus. Quare hæc fuge-
re oportet: vti autē ſemper pontico. Eriā reliquorū me-
dicamentorū, in quibus miſta cū amaritudine aſtringē-
di vis eſt, aliqd in oleū conlicere, atq; ad eūdem modū
vti, licet. Amara ſiquidē qualitas præit, viāq; aſtringē-
ti facit. Ac ſi quidē intendere aſtrictionē ſtudes, oleum
ipſum ēē aſtringendi vim habeat: cuiuſmodi eſt, qđ Hi-
ſpanū vocant, & quæcūq; cum oleæ frondibus pparā-
tur. Sin leuiore vti aſtrictione placet, aliud olei genus
pparabis, p̄cipuē qđ tenuiū ſit partiū: quod genus Sabi-
nū eſt. Optimum tū vbi aſtringere vehementius expe-
dit, eſt hiſtricū oleū. In penuria vō abſynthii iter initia
vel melinū, vel maſtichinū, vel lenticeinū ſatiſfecerit.
Quod ſi exigua febris ſit, ēē vnguentū nardinū: qđ uti
q; valentius iis oībus calfacit. Quare ſi aliorū copia nō
eſt, iualeſcēte febre, roſaceū illi admiſcebis. Sanē myr-
tini aſtrictio idonea nō eſt: quū craſſior ſit partiū, q̄ ut
altē deſcendere poſſit. Ad eundem verò modū & cata-
plaſma cōpoſitā vim obtineat, ex ea quæ tenuiū ſit par-
tiū, ac relaxet: tū ēē, ex amara, aſtringentēq; . Superet
autē in iis, vbi ſcilicet tū reprimere, tū robur addere ſtu-
demus, qđ aſtringat. Vbi tenuare ac digerere, amarū.
vbi euocare, quæ ex relaxantibus tenuiū maximē ſine
partiū. Siquidem quæ craſſæ ſubſtantiæ ſunt, ea pus mo-
uentibus ſunt accommoda. Cataplaſmate autē qđ ſequi
fuimus nos ſœliciter uſi, contra iecinoris phlegmonē.
R. Olei in quo abſynthiū decoctū fuerit, & cydoniorū
decocti, ſing. ꝑnc. 2. myrobalanorū & rad. ircoſ, ſing.
drach. 2. Cere quod ſit ſaris. Fiat emplaſtrum pulue-

rizatorum, iuxta artis præcepta. Coquitur & in uino austero cydonium: ex ipsiusq; carne aliquid eiusmodi cataplasmatibus inditur: ubi uidelicet & quod conluit copiosum est, & particula ipsa infirmior. Tunc siquidem astringentem vim in augemus. At verò nec colo laborante, nec reliquorum intestinorum quouis, nec musculis qui in præcordiis habentur, aut ipso peritonæo, miscenda astringentia sunt. Sed nec quum vesica male habet, uterus ue: modò nihil ultra ad locum fluat, nec sanguinis redundantia, nec excrementorum copia, in toto sit corpore. Porro renes & pectus in media prædictorum conditione consistunt: quantum scilicet à ventriculi iecinorisq; sollicitudine absunt, tantum reliquis antecellentia. Siquidem in ventriculo iecinoreq; resolui robur perniciosissimum est: minimè in illis periculosum. In his verò est quidem periculosum, nò tamen perinde ac in illis: nisi pus educere ex pectore, aut pulmone, aliquando sit opus. At in liene curado, si vel æger ex iis sit, qui atræ bilis excrementum naturaliter congerant: vel etiam eo tempore succus is in eo redundet, necesse est reliquis astringentia permisceas: quo visceris robur custodias. Ita enim & excrementa ad se trahet: & quum corpus expurgarit, ipse rursus per ventriculum excernet. Sin atræ bilis sit omnino excrementum nullum, aut prorsus astringendum nò est, aut parcissimè. Adhæc, si in quauis phlegmone obsessa particula, calor tumorem superet, agendum, ut sensim per ea quæ repentem calorem obtinent, digeratur: qd genus est tum lini semen: tū chamæmelum. Quibus adiici vel hordei, vel fabarum farina debet: quippe quorum neutrum ex calfacit. Sæpe verò & artomelite ad eiusmodi phlegmonas utimur: cui aquæ aliqd admiscemus. Ad lienem verò èt aceti aliqn aliquid. Si uerò laboratis phlegmone partis calor nò multum à natura recesserit: tumor autem ipse fuerit notabilis, digerere haud timidè sine

Astringentibus.
in quarum par
tiu, affectibus
nò sit utendū.

Phlegmonas
quarum calor
tumorem supe
rat, quibus cu
rare medica
mentis debea
mus.

Artomeli.

Phlegmonas
quarū tumor
calorem supe
rat, qua ratio
ne curadè sint.

Acetū qñ mī-
scdum phleg-
monarum me-
dicamentis.

LIIIIII 1

Lieni affecto
quæ medica-
menta conue-
niant.

Putrida febre
detentos, nec
lauandos, nec
relaxandos ef-
se, anteq̃ cor-
pus uacuatum
fuerit.

Hepatis cata-
plasmatis esse
miscēda astrin-
gentia.

Pectore affe-
cto, parcius mi-
scēda esse ca-
taplasmatis a-
stringentia.

Pulmone inflā-
mato, abstinen-
dum ab astrin-
gentibus.

Pulmonis inflā-
mato, applicā-
dā cucurbitulā
ēē, si prius fue-
rit corpus ua-
cuatum

Cerebri & mē-
brarū eius
inflammationi-
bus, qñ cucur-
bitulæ conveni-
ant.

aqua debetis: etiam fœnigræci aliquid supradictis imi-
scens. Si veluti scirrhusa duritie phlegmone sit, pp hu-
moris queni continet vel crassitudinem, vel lentorē,
tum acetū aliquid, tum anīara medicamenta, simul imi-
scēda curabis: potissimū in liene. Etenim viscus hoc,
propterea quod ab iecinore crassum humorē trahit,
eiusmodi humoris occasiōe plerūq̃ laborat. Quo ma-
gis cataplasmata quæ ex oxymelice, & absynthio, &
cappari fiunt, illi sunt idonea. Catex nec eorum qui ex
putrescente humore febricitant, quēq̃ ipse lauabo:
nec relaxantibus cataplasmatibus, prius q̃ supuacua pur-
garim, utar. His uacuatis, non solum audacter laue, sed
etiam cataplasmatibus utar: in aliis quidem membris, iis
quæ relaxent: in iecinore uerò ac uentriculo, additis
etiam quæ astringāt mediocriter. Parcius autem ad pe-
ctus, q̃ ad ea, utendum astringentibus est. Qñ talia hu-
mores qui phlegmonem excitant, in pulmones & cor
nonnunq̃ reprimunt. Ac cibis potius horū firmitudini
est consulendum. Neq̃ enim sicuti in iecinore & uētri-
culo phlegmone laborantibus, ita hic tenuissimo victu
est utendum. Ac longē quidē magis in pulmonis phleg-
mone abstinentiū ab astringentibus est. Qñ in eo ipsis
quoq̃ relaxantibus admiscendum aliquid acrium quo-
dāmodo, & euidenter calfacientium est. Quippe foras
trahere, potius q̃ reprimere, i eo debemus. Itaq̃ ēē cu-
curbitula, in iis qui sic laborant, si prius sint vacuati, ap-
plicabitur. Si uerò abundantia succorum adsit, nō ma-
gis ex pulmone in pectus aliquid excrementi transfe-
ret, q̃ ex toto corpore attrahet in utronq̃. Eadem ra-
tione, neq̃ in cerebri & eius membranarum phlegmo-
nis, cucurbitulis in morbi initio utemur: verū ubi nec
influit adhuc quicq̃, & totum corpus prius ē vacuatū.
At reprimētibus in his q̃q̃ inter initia utendū. Sed quā
per cranii ossa mediā occupātia regiōē, in altū descen-
dere reprimētū vim cupimus, corū quæ præire, ac de-

ducere ea possunt, aliqd reprimētibz admiscebimus. Ea sunt, quōz substantia ex tenuibus partibus constat. Sanē acetū nō mō tenuiū partium est, sed ēt nō mediocrē reprimēdi vim obtinet. Quo profectō rationalius in principiis affectuū ipso utimur, rosaceo admiscētes. Procedente verō tpe, ēt spondylii & serpilli, aliquid miscent: quo scilicet tpe transire ad ea quæ cōcoquant, ac digerant, conuenit. Sanē ad eum modum & castoreo utimur: quum tñ ipso in aliis phlegmonis minimē utamur, quīs ēt in summa inclinatione consistāt. Est nāq; calidius id, q̄ ut phlegmonis sit idoneum. Soleo autē ipse singulaz particulaz meat⁹, qui iis ad excrementoz emissionem sunt destinati, fluxiles reddere. Intestino, ventriculo, mesenterio, & iecinoris concauis, intestinum rectū. Renibus, uesicæ, iecinoris gibbis, uenæ caue, arteriæ magnæ, & oībz quæ i lumbis habentur, eum qui uesicæ inseruit. Pulmonibus & pectori, arteriam asperā, atq; fauces. Cerebro & eius inuolucris, eum qui per palatū & nares descendit. Paraf fluxibilitas iis quidē quæ per sedē excerni debent, mulsa, & cibis iis qui uentrē liquāt, & pharmaciis, quæ modicē proritare possunt. Ad uētriculū uerō, iecur, & lienem, si qñ phlegmone sint uexata, nec mulsa ipsa ē utilis: qm̄ illico in bilem transit, ac uiscēz phlegmonas auget. Excrementa autē, ut cum urina excernantur, diureticis promouebis: quēadmodum quæ in pectore, & pulmone hærent, iis quæ tussini excitant, euacuabis. Porrō balneū in remissione febris administratum, corpore iam medio critē transpirante, nō exiguū cōmodum affert, oīa ex eo tum fuliginosa excrementa, tñ humida educens. Curādum tñ est primò, ut citra horrorem administretur. Secundò, ut nullum primæ notæ uiscus sit imbecillum. Tertiò deniq; ne multitudo erudi humoris in primis uenis contineatur. Horror siquidem & auget, & gignit febrem. Partes uerò ibecillæ,

Tenuia qñ ostēscenda sunt astringentibus, Aceti facultas

Castoreum esse calidius, q̄ ut conueniat phlegmonis. Partium singulaz meatus esse reddidos fluxiles.

Fluxibilitas meatuum quibus medicamentis patetur. Mulsa quibus non sit conueniens.

Balneū quādo conducat.

Balneum quō administrādū.

per balneū liquatos humores multo facilius alliciunt;
 & q̄ succi liquati sint, & q̄ uia dilatata. At crudoꝝ hu-
 moꝝ copia in totum corpus digeritur. Hōrum si nihil
 obster, ex balneis duo hæc ægro cōpendia accedent; et
 q̄ redundantiz humoꝝ vacuabitur aliquid, & q̄ mul-
 tum transpirabit caloris febrilis. At uerò quum parti-
 cula, quā obstructio, aut putredo, aut phlegmone obse-
 dit, febris ipsius ueluti focus sit, si ei pp calorem sua
 sponte trahenti, alia quāpiam occasio extrinsecus, ex
 iis quæ potestate excalescant, accesserit, necesse est af-
 fectum intendi. Si quis aut prius toto vacuato corpo-
 re, relaxantibus curet, ubi scilicet maxima febris non
 adest, utiq̄ prodesse aliquñ potest. Quo tpe etiam lau-
 re circa noxam licet. Cauendum tñ à frigido solio iis
 est, qñ & crudi & putrescentes succi, minus apti sic ad
 exhalandum redduntur. Itaq̄ in progressu morbi, ubi
 & absumpta iam superuacua sunt, & tum cruda, tum
 putrescentia concocta, & cataplasinatis relaxantibus,
 & balneis sine periculo utare. Porro aptissimum in fe-
 bribus quæ intermittunt & repetunt, tempus est, quū
 exhalare febrilis calor iam cōeperit. Statim siquidem
 corpus ad nutrimentum præparant; huius quoq̄ op-
 portuno tpe ex duplici coniectato respectu; nēpe sum-
 mo præcedentis accessionis vigore, & futuræ princi-
 pio. Ad hæc nanq̄ spectantes, operā dabimus, ut q̄ lon-
 gissimè ab utroq̄ nutriamus. Vex si febris ipsa sit cō-
 tinens, constat eam breui finiendam. Si igitur ultra se-
 ptimum neutiq̄ progressura videtur, prorsus continē-
 dus à cibo æger est, si uirtutem non defuturam conii-
 cimus. Sin ad nonum, aut undecimum, aut quartūde-
 cimum usq̄ progressura uideatur, aut etiam finienda
 septimo, cæterū æger vires infirmiores habere, q̄ ut
 in tantum tempus sufficiat; necessum erit nutrire, ac
 deligere id, quod minus sit noxium. Etenim ubi uel ie-
 cur, uel ventriculum phlegmone prehendit, perni-

Balnei usus
duplex,

Balneo aptissi-
mū tempus in
featribus inter-
mittentibus,
quodnam sit.
Nutriendi tē-
pus unde sit cō-
iectandum.

Continente fe-
bre detentus,
q̄diu absq̄ ci-
bo seruari de-
beat.

eliosissimum est ante accessionem cibare. Vbi hæc ab-
est, quibus infirma est uirtus, utilissimum. Porro sum-
mum vigorem febrilis accessionis expendes, an cir-
ca magnitudinem febrilis caloris sit siccus, squallēs q̃;
an citra siccitatem vrens. Priorem nanq̃; humectante
victu quàmprimùm madefacere oportet. In secundo,
dum plurimum sese calor remittat, manere. In prin-
cipii verò accessionis more æstimabis, an corporis ex-
trema refrigeret, & magnam sanguinis reuocatiōem
ad interna corporis faciat: an omnino corpus non pre-
mat. Quippe secundum hoc, ceu facile mansuetum,
contenines. In priore distinguas oportet. Nam si absq̃
visceris phlegmone, aut succorum redundātia motus
ad interiora in accessionibus pollet, nihil offendes pau-
lo ante cibans. Sin vel phlegmone, vel redundātia sub-
sit, cauenda est ante accessionem cibatio, ceu res ma-
ximè noxia.

Phlegmone af-
fligente ven-
triculū, hepar-
ue, perniciosi-
simum esse an-
te accessiōem
cibare.

GALENI PERGA

MENI DE METHODO

MEDENDI. LIB. XII.



VAE cum symptomatis consistunt
febres, non sunt ad febrium genus vl-
lū, aut species, aut dñia distincta. Por-
rò grauior̃ symptomatū, & quæ ra-
renter febrilentibus incidunt, primæ
dñiæ sunt tres. Aut enī in læsiōe actio-
rum cōsistunt: aut in retentor̃ uacuatorū ue imodico
excessu: aut in corpor̃ ipsor̃ affectu. Ex quibus duæ q̃-
dē dñiæ priores, si p̃stiterint, ad se totā curationē puer-
tunt, affectūq̃; elerere cogunt. Tertia verò, alterius
tuidem, quem curare oportet, affectus, est signū: nullā

Symptomatū
grauiorū tres
differentiæ.

Symptomata
ex se nec cura-
tionis ratio-
nem indicant,
nec primū in-
mutant.

Vires a quibus
laedantur.

Symptomata
submouere, quā
neglecto mor-
bo, cogamur.

Dysenteriam
grauissimā cu-
rari maxime
mordentibus
medicamentis.
Doloris expu-
gnandi ratio
duplex.

Medendum tu-
to esse.
Vires esse ser-
uandas.

tñ seorsum curationem exigit: utpote cum affectu, vñ
de nascitur, vñ cessans. Nullum autē symptoma, quā
symptoma est, nec curationis rationē indicat, nec pri-
mū immutat: licet ex accidenti interdum id faciat: vbi
scilicet causæ locum sortitur. Porro eorū omnium, vbi
veluti causæ curationē immutat, vñ caput est, ipsa læ-
sio, siue virtutis sit, siue dispositionis. Laedunt autē vires
vigiliæ, dolor, atq; vacuatio immodica. Affectui neruæ
dem, non utiq; semper, ceteræ magna ex parte, nocent
ac potissimum quā fuerint immodica. Qua de causâ,
quicq; cogimur prius submouere symptoma, q̄ morbum;
mutato videlicet instituto. Ergo si labant vires, non tñ
vehementer sint resolutæ, sed adhuc resistunt, at sym-
ptoma tñ sumus attenti, atq; id q̄ primum tollere in-
tendimus. Sin iam resolutæ vehementer sint vires, non
modò symptoma sedare, sed illas etiam firmare con-
dimus. Vbi verò virium roboris fiducia est, adeo nunq̄
contra symptoma pugnamus, ut (quod prorsus con-
trarium est) per ea nonnunq; praesidia, quæ dolorem af-
ferunt, morbos ipsos curemus: veluti profectò dysen-
terici ipsi mordentibus maxime medicamentis, tñ po-
tissimum medemur, quum utiq; est grauissima. Est autē
duplex medicis contra dolorem instandi ratio. Altera,
qua delitiis cubantium subscribunt: altera, ex artis ra-
tionē. Quippe si licet ægrum doloribus obmūtētem va-
lentibus remediis vno die per sanari, qui tota curatiōe
neglecta dolori tantum intensus est, non ex artis ratio
ne, sed in gratiam ægrotantis id facit. At si ex dolore
vires soluantur, atq; ex eo impendet periculum, miti-
gari dolor, & roborari vires debebunt: quo & morbo
resistere, & curationis spatio sufficere valeant. Esto igitur
terminus in ægrotantibus, quem non transibit is,
qui ex arte generalē contra morbum pugnat, vt tunc
mediceretur. Ei verò qui dolorē mitigat, vt vires custo-
diat. Porro dolorē mitigant, quæ ex papaueris succo,

vel alteri semine, vel radice inādragoræ, vel deniq; sty-
race cōstant: Cæteræ si fas sit, iis remediis quæ morbū
sanent, vtendo, qđ o prauus efficere, cauendū ab id ge-
nus soporiferis medicamentis est. Sin verò ex vigiliis
& iuribus resoluēdis, æger ad mortis discrimē tendat,
tū profectò ipsi tēpestiuē vtare: nō ignarus scilicet cor-
poris habitū nōnihil ex eis lædendū: eligendā tñ potius
laxationē ipsam, q̄ mortem. Hac nimiz persuasione ipse
quoq; tametsi oīum maximē ab usu grauius sopiētū
abhorrens (q̄ rebellē valētēq; in corpore frigiditatē
relinquant) aliquñ tñ ea & colicis exhibeo: & iis qui vel
oculorū, vel aurīū, vel aliarū partium vehementissimo
dolore cruciantur. Interim uerò, & quū eger ex tenui
destillatione, vigiliis, & uehementi tusli uerget, pauxil-
lū eiusmodi medicamenti offero: faciliē noxā eius, si q̄s
semel sit vsus, spatio emendatū iri ratus. Oīa tñ id ge-
nus magis salubria sunt, si post annū à cōpositione su-
mantur: veluti qđ ad Philonē refertur. Quod ad dolo-
res * stupefaciendo sedādos, nullo minus est celebre.
Id uerò et si duorū, triū ue, aut quatuor annoꝝ sit, mul-
to sanē fuerit pstantius: sed neq; inutile tñ sequentibus
annis, ad decimū usq;. Ergo sicuti cauendus est, quoad
fieri pōt, eiusmodi medicamentorū vsus: ita si necessitas
urgeat, nec admodū recentia sunt offerēda: q̄ frigida
quæ in his sunt, pualentes vires adhuc habeant: nec ita
antiqua, vt spem nostrā frustent: sed tādū dimittenda
sunt, quoad violētia refrigeratiū, ab eorū quæ calfaciūt
vi mitigetur. Et taliū quidē medicamentorū vsus, eorū
qui aduersus symptoma pugnāt, ē proprius: potissimū
vbi ex frigida causa dolor est excitatus. Obsunt enī
talia plurimū toti affectui, curatiōi q; cōtumacē eū red-
dunt. At sanguinis missio, quæ scilicet vires nō dēicit,
symptoma spectātis medici opus nō est, sed eius q̄ totū
affectum adimere studet. Ad eūdē modū & balneū, &
purgatio, & fomēta calida, & vini potio. Quæ omnia,

Dolorem quæ
mitigent.

Soporifera, si
fieri possit, vi-
tanda.

Soporiferis qñ
utendum.

Stupefacienti-
bus medicame-
tis Galenus v-
tebatur inter-
dum in dolori-
bus acerbissi-
mis, & i tenui-
bus destillatio-
nibus.

Stupefaciētia
medicamenta
tutiora esse, si
post annum a
compositione
sumantur.
Philonium stu-
pefaciens.

Stupefaciētia
medicamenta,
cur nec recen-
tia nimis, nec
vetera impen-
se exhibenda
sint.

dum affectus sanant, vñà cum ipsis, etiam dolores sedant. Eodem modo & nutrimentum exhibitum, vbi sicco & squalente morbo os ventriculi afficitur, dum affectum ipsum sanat, hominem prehendi syncope prohibet. Porro qui ex copia crudorum humorum, vñà cū oris ventriculi offensione, febricitant, il neq; missionē sanguinis, neq; purgationem tolerant: quum tñ vacuationem desyderent. Quare eis vacuatio per frictionem solam administratur. Ergo linteis mediocriter asperis statim in ipsis aspiciis morbi fricandi sunt, à cruribus supernè deorsum. Debet enim radi ab his cutis, quum simul & calferi per eā, & digeri corpus postulet. Dein tota brachia, simili modo ab humeris supne deorsum. Vbi uerò artus omnes abundè calere tñ videbuntur, & metus fuerit ne quis ex multitudine frictionis, contusa iam carne, superveniat lassitudinis sensus, oleo relaxante vteris: quod genus est Sabinum. Ab astringente verò abstinebis, cuiusmodi Hispanum existit. Hyems verò si fuerit, nihilo deterius sit, si ad digerentium aliquod transieris, quale sicyonium est, aut etiam chamæmelinum. Vbi igitur oleo membra ipsa abundè fricueris, oleum est detergendum, atq; ad spinam dorsi transeundum: quā totā pariter fricare, primū qdē sicca frictione: post oleo, expedit. Ab hac rursus ad crura te cōferes: & ab his ad brachia: denuoq; dein ad spinā: sic totū diem agens, ī domo & lucida, & tēperata. Sanè multa, in qua coctū hyssopum fuerit, his est aptissima. Quā sola primis tribus diebus vtenē. Ipse verò eo tñ tpe dictā intermitte frictionem, quo somnus hominē occupauerit. Ad quem ēt alliciendū, & frictio vberior facit. Cæterū somnus vberior his minimè est salutaris: quū nec crudos succos digeri sinat: & viscera reddat graviora. Sed si quis ali⁹ affectus est, q somnū & vigilias modicas postulet, hic profecto ī his est. Quippe somnus pcoq̃t. Vigiliæ digerūt. Quorū utroq; est opus iis qui ex multi

Vacuatio per frictionem solam, quibus cēbeat administrari, & quo modo.

Oleū Sabinū.
Oleum hispanum.
Oleum sicyonium.
Oleum chamæmelinum.

Frictio vberior allicit somnū.
Somnus diuturnus, crudos succos digeri prohibet, & viscera reddit grauiora.
Somnus cōcoquit.
Vigiliæ digerunt.

tudine crudorū succorū egrotāt. Ac si pulsus his paruus admodū, infirmusq; sit, aut ēt supra hæc vehementer inæqualis, extremum periculū indicat: nec quicq; p̄ter iam dicta, molendum est. Sin verò mediocriter sit robustus, nihilq; intercisus videatur, si sua quidem sp̄te alius cōmodè non deiciat, soluenda est, mulsā iniecta. Quod si maior iusto superfluoꝝ impetus ad aluum ciētur, p̄ncipio quidem percoquere mulsā amplius oportet. Ea nāq; sicut minus aluum subducit, ita magis nutrit. Post hæc, si supuacua largius descendant, nē sic qdem sistenda: sed exhibendus pro aqua mulsā p̄tisana cremor est. Si verò fluere p̄gant, alicæ sorbitione ægrum nutries. Si pulsus interim ad imbecillitatē, vel inæqualitatē, vel paruitatē mutent, panē ibutū diluto vino porrigere puenit: utiq; si nec vētricul⁹, nec iecur laborēt phlegmone. Qñ si hac infestent, corpore crudis succis referto, salus deplorata est, pulsib⁹ sic imutatis. Minimè autē vtendum cataplasmatibus aut perfusionibus est, prius q̄ superuacua magna ex parte partim vacuata sint, partim concocta. Interimq; sola mulsā, in qua coctum hyssopum sit, vsq; ad septimum diem vtatur. Siquidem longissimam sic affecti cibi abstinentiam ferunt: corpore scilicet ex crudis ipsis, quos continet, succis concoquendis alto. Verū si aluus ipensē fluat, vel æger mulsam fastidiat, ad p̄tisanae cremorem est trāseundū. Sin hunc quoq; auerſetur, alicā ad eundē q̄ p̄tisana modū ei p̄parabitur. Neq; enim eis qui sic sint affecti acutum incōmodū est. Immo sicubi crudos affatim succos eē adauerteris, oxymeli assiduè pro mulsā dabis: si qdē æstas sit, & æger frigide assuetus, frigidū: sin hyems aut, oib⁹ calidū. Maximè nō pulsus paruus, tard⁹, & rar⁹, frigidus subeē succos oñdit. Sanē p̄positis aduersissima sunt tū balneū, tū aer ambiēs: q̄ triēs vel nimis calid⁹ ē, vel frigidus. Itaq; ut lauandi hi nō sunt, sic, & reclinādi in domo sunt: æstate qdē, quæ frigenti

Mulsæ exhibitio.

Cataplasmatibus utendum non esse prius quā supuacua partim vacuata sint, partim cōcocta.

Inediam longissimā ferūt, quibus corpus crudis succis redundat.

Oxymeli conguere illis qui crudis succis redundat.

Frigidos subesse succos quis pulsus indicet.

Syncope a
cruditate, cura
tio.

Syncope labo
rantibus om
nibus quale vi
num sit exhi
bendum.

Vinorum ge
nera uaria.

hyeme, quæ caleat. Læduntur nāq; nō parū ab vtrōq;
excessu. Atq; hæc quidem agenda sunt tibi, vbi à pri
mo die curationē suscepseris. Si autē ad eos quos iā pmit
tē syncope accit⁹ fueris, si ea quæ retuli loca phlegmone
vacent, panē exhibebis non multū, eūq; ex vino aliq;
quod celerē in corpus digestionē adiuuet: statiq; ad fri
ctiones venies, quas vt diximus ministrabis. Ac si q
dem cœli status sit vehementer calid⁹, cū frigida vinū
dabis; cū calida autē mediocriter, si temperatus. Quæ tñ
secundò & tertio dabitur potio, oīno calidam exhibē
dam curabis: ut quæ succorū crudorum concoctionem
adiuuet. At quibus ex flaua bili, quæ os ventriculi infe
stet, syncope incidit, iis frigida exhibēda potio est. Vi
num tñ quod & calidum natura sit, & deductionem in
corpus promoneat, oībus quos syncope malē habet,
offerre conuenit. Constat autē ex vinis ea deligenda es
se, quæ & flauo colore sint, & substantia tenui, & ætate
vetera. Talia nimirū & boni odoris continuò fuerint.
Quinetiam si paululū vbi mista sunt, gustes, senties ca
lorem per totū corpus trāsmitti. Cæteræ amara præ ue
tustate vina ne sunt, præsertim quæ iis exhibebis, q
bus stomachus flaua bile urgetur. Cōmodissima igitur
his vina sunt, quæ quū naturaliter sint austera, sensilē
iam astringendi vim, pp̄ uetustatē nō amplius exhibēt:
calorem tñ admodū euidentem habent. Huius igit
generis vinorū optima sunt, Surrentinū, Signinum, Sabi
nū, Tiburtinū, & Marsum: oīa quidē Italica, astringē
tiaq;. Quibus tñ ex crudis humoribus syncope pericu
lū imminet, sanē Falernū tanto iā memoratū est, q
to tñ melioris est succi, tū et calid⁹: vtpotē quod & ve
locius illis digeretur per corpus: & crudis succis conco
quendis auxilio erit. In summa verò, quibus ex abun
dantia crudorū humorū syncope incidit, iis crassa vina,
ceu noxia: aquosa, ceu paucē efficacia, fugiēda sunt. Deli
gēda autē eorū sunt media, quæq; flaua existāt, & calida.

Necq; enim

Necq; enim inuenias ex albo vinorum genere calidum ullum: quando etiā aūstera, & mediocriter alba, quū inueterauerit, quodammodo fuluiora reddunt. Quot quot autem in ipsis calidissima sunt, omnia profectō sunt flaua. Reliquorum vini generum, aūstera quę mediocriter alba, crassaq; sunt, certē nullum ad digestionem in corpus est idoneum. Si tamen abundē inueterarint, nec aliorum copia sit, vti illis licebit: quōd stomachum roborent. Cæterū vina quę calfaciunt in modicē, iis offerenda non sunt, quibus caput est imbecillum, facileq; ab id genus vinis repletur. Porro vina quę odora, fuluaq; sunt, quantū ex ipsorum est natura, omnia caput grauāt. Eoq; tum Falernum, tū Tmoliges, tum Lesbium, infirmo capiti noxia sunt. At vina aūstera ventriculum roborant, caputq; inter omnia vina minimē tentant: digestionē tamen in corpus non promouent: quo magis fugienda tibi in syncope præhensis sunt, non secus quā aqua. In penuria verō vini quod accomodum vtriq; syncope sit, ei inquā quę ex multitudine crudi succi oritur, & ei quę ex bile incidit, coactus vti vino, vtēris aquosis, magisq; si antiqua fuerint. Talia namq; tametsi non valenter excalfaciant, facile tamen deducuntur in corpus. Quō nomine vrinās præter cetera omnia promouent. A quibus secundum locum obtinent, quæcūq; fuluorū maximē sunt tenuia: quę etiā ad syncopas præcipuē sunt deligenda. Est autem syncope præceps virium lapsus. Quum autem essentia virium, quibus regitur corpus, tum in spiritu, tum in solidorum corporum temperamento consistat, hæc nobis, & ubi integra sunt, seruari: & vbi corrupta sunt, ad integrum reuocari omnino debent. At verō substantia spiritus, ipsaq; solida corpora, sic nobis sunt custodienda in morbis, vt tum qualitate, tum quantitate, quoad fieri licet, se naturaliter habeant. Curandum itaq; est, vt quę substantiæ por-

Vinum album quod calidum sit, reperiri nullum.

Vina impense calida, iis offerenda nō esse, quibus caput est imbecillum.

Vina aūstera uentriculum roborāt, caputq; minime tētat: syncope tamē præhensis non conferunt.

Syncope est præceps viriū lapsus. Essentia viriū in quibus consistat.

tio ab eis defluit, hanc per appositionem sarciamus: quod in ipsis verò alterascit, in debitam temperiem per contrariam alterationem restituamus. Si igitur tū vacuatio, tum alteratio sensim, paulatimq; fiat, etiam correctio vtriusq; sensim administrabitur: quod munus ad artem sanitatis tuendæ pertinet. Sin confertim & semel, ac magna aliquando vacuatio, vel etiam adiectio incidat, sic sanè & efficietur morbus, & medendi methodum ad eorum sanationē desiderabimus. Porro animalis spiritus, à cerebro, veluti à fonte, nascitur. Qui partim ex inspirando, partim ex eo quod reticularis plexus suppeditat, irrigatur, aliturq;. At vitalis spiritus cōtinetur in corde, & arteriis: nutriturq; tum ex aerē inspirato, tum ex sanguine halituoso. Quod si naturalis quoq; aliquis spiritus sit, vtrq; continebitur is in iecinore & venis. Virium igitur lapsus, qui quidē solidorum corporum substantiæ resolutæ succedit, in longissimis morbis subinde incidit: animante ex frequenti atrophia extenuato: præterea in colliquātibz febribus. Qui verò ex substantiæ temperie mutata provenit, is, vel vbi immodicè ipsa fuerint calfacta, frigidacta, madefacta, vel exiccata, vel horum aliquibz copulatis affecta, provenit. At alteratio spiritus, tum ex vitiosis oritur succis, tum ex ambiētis aeris malitia: præterea venenatis facultatibus, aut animalium quæ virus eieciunt, venenis. Ipsius verò essentiæ spiritus corruptio (quæ tum ob animi affectus, cuiusmodi sunt timor subitus, vehemensq; nec non mœror, ira, curæ, atq; summa voluptas, tum ob ingentem dolorem: præterea ob plures motiones, vigiliasq; obq; immodicam ipsius tenuitatem, & continentium eum vasorum raritudinem, atq; adeò ante hæc omnia, ob respiratum prohibitum, & nutrimenti defectum incidit) diligentius corrigi postulat. Sciendum autē est, in omnibus perturbationibus, ipsam p se ipsam moveri ani-

*Spiritus anima
lis a cerebro
nascitur.*

*Spiritus vitalis in corde &
arteriis consistit.*

*Spiritus naturalis si quis sit
in iecore contingebitur.*

*Lapsus virium
quibus succedere solet.*

*Spiritus a quibus
alterari solet.*

*Spiritus quæ
corrumpant.*

*Animam per se
ipsam moveri
in perturbationibus.*

nam: quæ nimirum in aliis actiuis functionibus mouet etiã & ipsa corpus. Ob idq; resoluitur eius robur, utroq; motuum suorum generum, si modũ excedat. Ergo nec rarefaciendũ immodicẽ ægrotantis est corpus, si spiritum retineri in ipso studes: sed nec quẽ in eo sunt, per comesta & bibita valẽter extenuãda. Est etiã ad virium robur tuendum, ciborum atq; potionũ habenda ratio, vt sint tum quantitate modici, tum qualitate exquisiti. Aer præterea quem inspiramus, debet esse vt optimẽ temperatus, sic ab omni corruptela & inquinamento alienissimus. Curandum similiter est, ut ipsa corpora solida, in quibus vel maximẽ consistere virium substantia videtur, sint sano temperamento. Quippe ad conseruandum virtutis robur, & syncopalem accessionem prohibendam, singulare præsidium est temperamenti custodia: ante omnia quidem, trium principiorum: mox verò reliquarum partium, quæcunq; in consortium affectus, principia secum ex facili trahunt. Cuiusmodi est os ventriculi, quod propter exquisitũ sensum, accersit syncopas. At verò si humores crudi vires sua copia premãt, ac propter multitudinem simul & crassitudinẽ exiguos aialis meatus obstruant, is affectus multis noĩbus exitialis est, ac syncope opportunos reddit. Quippe succi crudi nutrire priusq; sint, & cocti, nequeũt. Quod si nec obstruãt, nec onerẽt, syncopẽ ii certẽ non inferũt, sed deliqua animi. Siquidẽ resoluunt ægrotantes huiusmodi, nisi frequentius nutriant. Sunt autẽ nutriendi hi extenuãtibus, calfaciẽtibusq;: idq; nõ copiose, nec semel. Medicamẽta similiter sint extenuãtia, calfaciẽtiaq;: sed moderatẽ. His & aquosum vinũ idoneũ ab initio est, nisi tñ vehementer febricitẽt. Etenim q laborant ex huiuscemodi succis, hos quotidie accessiones exercẽt, præcipueq; ad vespẽram, noctuq;. Qui verò ex tenuissimis succis vrgentur syncope, diuersa à iã dictis rõne curãdi sunt. Illos nãq;

Virium robori custodiendõ quæ requirantur.

Synopes ab ore ventriculi ortæ, curatio.

paulatim & assiduè vacuam⁹. At qui sic se hñt, hos paulatim & assiduè nutriemus. Quòd si virib⁹ ibecillis, aliqd his viscus phlegmone obsessum sit, eor⁹ salus est deplo-
rata. Quādo nec ipsos licet assiduè nutrire, sed tātū in remissionibus: & seruari non pñt, si non nutrant. Non

*Vires resoluti
etiā ob excre-
tricē uim imo-
dicā, concitatā.*

solum autem extenuatis ad eum modū spiritu & san-
guine solent sæpe viris resolui, sed etiam facultate ex-
pulerice per vniuersam corporis molem immodera-
tius concitata: id quod accidere maximè solet, ob re-
tentricis imbecillitatem. Ergo nutrire, quicquid horū
inciderit, est necesse, sicuti etiam corporis summa den-
sare: non secus q̄ priorum rarefacere. Frigidum itaq̄

*Vires imbecil-
liores redditæ
ob excreticis
motus immo-
deratos, quō re-
ficiendæ.*

iis aerem astringentemq̄; cōparabimus. Vngendi præ-
terea sunt astrictioris vnguentis. Tum cibi iis dandi,
qui non admodum promptè diffuāt. Cuiusmodi sunt
panis, sorbitio ex alicā, fructus austeri, & qui non faci-
lè corrumpantur, ouorum vitelli (quandoquidem al-
bum ægrè concoquitur) gallinaceorum, qui lacte alti-
sint, testiculi, ac deniq̄ suillum cerebrum, diligenter as-
sum, vel in albo iure legitimè elixum, porro & anetho
iniectis. In summa, omni ratione agendum, vt & suc-
corum materiam crassiorē reddas, & cutim densas,
& exhalationē inhibeas. Vinum verò ipsis aquosum,
necessarium inter initia est, sumptū post cibos. Quòd
si ex sententia nobis omnia responderint, etiam car-
nei iis aliquid nutrimenti post alia dabimus: potissimū
post quartum diem: succis qui febrem excitauerunt,
iam ad concoctionem venientibus. In omnibus autē
eiusmodi curationibus, si iam adsit syncope, omnis so-
licitudo medentis ad symptoma vertetur. Sin expec-
tur, vtriusq̄ curam habebit, & vt symptoma non inci-
dat, & vt paulatim discutiatur morbus: quem celerius
discuteremus, si nullus symptomatis subesset metus.
Quippe qui multitudine crudi succi grauatur, hunc si
modo iustam semel vacationē ferre posset, nec me-

*Albumē ore
ægre cōcoqui.*

tus aliquis syncopes impenderet, seniel, arbitror, vaneatum explicaremus à morbo. Eum verò, cuius spiritus & succi facillè exhalant, si ante accessionem cibare non cogeremur, longiorem illi morbum certè non redderemus. Sunt & aliæ quinque occasiones quibus succedunt syncopæ: nempe dolor vehemens, vigiliæ, inmodica ventris inanitio, motus in delirantibus, ac denique principiorum intenperantia, vel nuda, vel cum humorum affluxu. Si igitur causam ipsam unde excitatur dolor, adimere possis, ita utique contra symptoma non pugnaveris, sed curaveris ægritudinem. At si qua occasione prohibitus, affectui submouendo intentum esse non licet, vehementiâ mitigabis doloris. Dolent porrò tantum particulæ sensibiles, idque vel ob cōtinuitatis diuortium, vel ob aliquam alterationē, non sensim, sed confertim & violenter factam. Quippe videntur corpora, non solum quum in non naturalem habitum confertim aguntur, tristem mutationem sentire, sed etiam in ipso ad naturalem statum suum reditu, nisi is sensim fiat, torqueri. Ac ex alterantibus quidem dolore afficiunt, oia vehementer calfacientia, atque refrigerantia. Ipsam autem solutionem continui, necesse est, vel ruptionem, vel contusionem, vel erosionem existere. At ruptio ex distentione quadam, contusio ex grauante aliquo, erosio ex mordēte prouenit qualitate. Ergo quum nihil extrinsecus sit, quod vel distendat, vel grauet, vel erodat, sed ex seipso horum aliquod corpus sentiat, neminem latere potest, distentionem ab aliqua intrinsecus substantia, quæ multitudine sua corpus se cōtinens distendat, aut immodica siccitate, prouenire: contusionem, ex eo quodd aliquod corpus occurserit extrinsecus, quod vel durum, vel magnum, vel graue, vel simul ambo exitit: erosionem verò, ex succo aliquo, cui mordens natura insit. Qui quidem si sit in tunicis intestinorum imbibitus, commodissime

Syncopæ quibus succedat causas.

Doloris causas.

Solutio continui quatuorplex sit.
Ruptio.
Contusio.
Erosio.

Distentio spontanea unde accidat.

Contusionis causa.
Erosio unde fiat.

Hiera picra expurgat humores acres tuniceis intestinorum imbibiros.

Dysenteriae qualis uicius conueniat.

Distentionis a sanguinis copia, curatio.

Reuulsionem esse in contrarium molientiam.

Deriuatio fit per propinqua. **Doloris** a flatu scito spiritu orti, curatio.

Doloris a mordente humore orti, curatio.

Intestinorum tunicae esse duplices.

Stupefacientia medicamenta obryndunt quidem dolorem; affectum tantum maiorem reddunt. **Dolores** intestinorum a crassissimis succis productis, quae sunt ratione curandi

hiera picra expurgatur. Quod si aliquam exulcerationem pepererit, nutriendus certe aeger est calente alica, sed iniectis mali punici granis. Potus autem illi offerendus est mali punici cremor. Porro si sanguinis abundantia sit quod distendit, protinus sanguis mittendus est, modo vires aegri non sint infirmæ. Sed si is vel sanguinis missionem timeat, vel viribus sit imbecillis, tunc reuellendus in diuersum est sanguis: tunc per propinqua deriuandus. Quod si his peractis dolor etiam persistat, patet profectio in aegrotante particula impactum esse quod contristat. Patet verò non minus, & quæ curatio ipsa per digerentia medicamenta molienda sit. Similiter etiam curantur dolores à flatulento spiritu orti: magis tamē ii extenuantia remedia desyderant. Si moles aliqua grauando, contundendo uel dolorem excitet, moli ipsi est medendum. Sin mordens humor, aduersissima huic sunt, quæ extenuant, & calfaciunt. Postulat namque huius generis affectus ut ea quæ contristant vacuent, aut alterentur, aut medicamentis torpore inferentibus retundantur. Ea quippe minus hos affectus lædunt, quam alios, qui à crassis glutinosisque humoribus proficiuntur. Huiusmodi tamē succos, dolor vehemens non comitatur, nisi aliquis eis halituosus spiritus copuletur: qui ex iis corporibus quibus continetur, erumpere prorsus non possit. Nam sic, grauissimi solent excitari dolores. Etenim quum tunicae intestinorum sint duplices, si in medio ipsarum spatio frigidus ac viscidus humor collectus sit, à calore liquidus, in flatulētum mutatur spiritum: qui crassus frigidusque quum sit, acerbissimos dolores inducit. Ac ad tempus quidem, post bibitum medicamen stupefaciens, prorsus indolentes redduntur aegri: cæterum affectus iis variis modis fit maior. Nam & intestinorum tunicae medicamentorum frigiditate densiores, minusque flatui transmittendo habiles, redduntur: & humor ipse tum crassior, tum ad motum ineptior euadit. Quare id ge-

nus dolores omnes, per ea quæ incidunt, & concoquant: præterea flatus discutiant, desiccantq; citra valentem calfactionem, curandi sunt. A nullo autem in eiusmodi succis tam est metuendū, quàm à calore qui & eos liquet, & in flatum vertat, sed non valeat discutere. Porro agrestis quidam, allio comesto, vinoq; ad vesperam meraciori bibito, à dolore colico fuit liberatus: neq; id iniuria. Allium siquidem flatum discutit, ac minimè sitim infert. Quam ob rem ipse allium theriacem agrestium appello: estq; commodissimum iis omnibus, qui regionem frigidam incolunt. Quos igitur ex supra dicta causa vehemens intestinorum dolor citra febrem exercet, iis & allium esse licet, & theriacem bibere. At si cum febris vnà talis dolor aliquando incadat, principio quidem, si id ferunt, fomentum siccum ex milio adhibendum est. Si ab hoc non quiescant, semē aliquod, quod flatum dissipet, in oleo quod tenuium sit partium, coquere, mox per linteū, quo purum sit, oleum colare, dein anseris, aut gallinaeuni seuuni, nec salsum, nec admodum vetus, in ipso oleo liquare, & per sedē infundere, oportet. At si neq; ex hoc remittantur dolores, secundò rursus iniiciendum est idem, adiecta etianimum castorei & papaueris succi, vtriusq; fabæ non amplius magnitudine. Olei verò hemina modus esto. Excipitur & lanula ex hoc medicamento aliquid: quæ appensa forti filo, quāpenitissimè in rectum intestinum inseri debet: quo vtriq; & quum libet, id facillè recipiatur, & euidentem vtilitatē conferat. Similiter & oculorum, & aurium dolores, qui ab iisdem causis in febre excitantur, sedare conueniet fomēto ex milio. Sed infundimus etiā aurib^{us} medicamentū id quod ex castoreo & papaueris succo conficitur, sapa liquatū. Quod sanè auri instillatū, oculorū etiā, ac dentiū dolores lenit. Iā verò, si cataplasma imponi aliquando res ipsa suadeat, papauerum capitibus

Alliū auxiliat^{ur}
dolori colico.

Alliū flatus discutit.

Allium dicitur
theriace rusti-
corum.

Theriace quibus
utilis
Colici doloris
cui sit iuncta fe-
bris, curatio.

Pessari confici-
endi modus,
ad leniendos
dolores colici-
cos.

Dolores oculorum,
& aurium
qua ratione leniendi.

Auribus instillatum medica-
men ex castoreo: succo papaueris,
& sapa confectis, oculorum atq; dentiū
dolores lenit.

Dolori mitigā
do cataplasma
optimum.

Opiū recipien
tia collyria, ue
hemētissimos
oculorū dolo
res laxant: tam
etiā imbecillio
res ex frigidi
tate ipsas relin
quant particu
las.

Cucurbitula
admota, dolo
rem a flatu ex
citātū soluit.

Rutaceū oleū
auxiliari iis,
quos dolor co
licus a frigido
succo ortus, dis
trahit.

Doloris a te
nui humore ex
citati curatio.

in aqua coctis, ac fœnigræci, vel hordei, vel lini semi
nis farina aquæ immixta, cataplasma conficies. Porro
collyria ex opio confecta, vehemētissimos oculorum
dolores laxant: utendumq; his est, quum maxima ne
cessitas vrget. Nam tametsi Imbecilliores ex frigidita
te in reliquam vitam ipsas reddant particulas, occur
runt tamen præsentī discrimini: ac postea frigiditatē
ab opio relictam, licet nobis corrigere, tum oleis cali
dis, tum etiam collyriis. Nempe aurib⁹ oleum id quod
solum castoreum recipit, instillamus: oculis verò, ex
cinnamomo collyrium. Qui à solo spiritu flatuosocru
ciantur, illico cucurbitula admota, tum à dolore libe
ri, tum omnino sani redduntur: in quacunq; corporis
parte dolor sit excitatus. Quib⁹ verò non spiritus mo
dò flatuosus, sed etiam humor quispiam, vnde is orit,
uētris dolorē excitat, iis illico ad tempus dolor sedat:
reddit tñ vel in sequenti nocte, vel postridie, vel etiā
tertio die similis dolor. Quare in his primū doloris
accessio est curanda: admota scilicet cucurbitula. Po
stea vacuandus humor, infuso per sedem aliquo medi
camento calfaciente simul & attenuāte. Ego verò oleo
quopiam tenuis substantiæ uti assueui, rutā in eo præ
coquens. Quo injecto, nonnulli ægri paulo post excer
nunt humorem vitreum: atq; ex hoc protinus simul
& à dolore, & ab affectu liberantur. Si dolor ex tenui
acriq; excitetur humore, qui conuulsiones vehemen
tes etiam inducere solet, si quidem in ventriculo talis
humor consistat, vomitu expellendus est, aqua tepida
propinata: sin autem in intestinis, iniicere per sedem
oportet aliquod medicamen, quod blandē eluere, de
tergereq; eiusmodi humorē possit. Commodissimus
itaq; ad id fuerit crenior ptisanæ. Cibi verò exhiben
di his sunt, qui & boni sint succi, nec facilē corrūpan
tur. Qui ob siccitatem vehementem distenduntur, &
discrutiātur, si curari ii debeant, humectationem desy

derant. Cæterum si affectus is, sit febris occasione con-
tractus, percuratu est difficilis, vel potius curationem
non recipit. Quippe conuulsiones quæ ex plenitudine
neruorum partium, vel ex humore mordente, vel
denique ex ingenti frigore oriuntur, curari possunt. Quæ
verò ex neruorum particularum ariditate proue-
niunt, nullus certè iis ad sanitatem est locus.

Conuulsiones
a plenitudine
quidè orræ, cu-
rari pñt: a ner-
uorum autè par-
tium ariditate,
minime cura-
tionem admis-
tunt.

GALENI PERGA- MENI DE MEDENDI methodo. Lib. XIII.



N HOC TERTIODECI-
mo commentario acturi de tumori-
bus præter naturam, primo quidem
tractemus de phlegmone, quæ hæc &
frequentius incidat, & febres infe-
rat, grauissimaq; iducat symptoma

Phlegmones
generatio.

ta. Gignitur autem omnis phlegmone ob confluxum
sanguinis, copiosioris scilicet, quam pars postulet: quo
tumore obfessa particula, auctior, quam pro naturali
habitu, calidior, & rubicundior, redditur: tenditurq; ac
tendenti renititur, cum dolore ac pulsatione sensibili.
De phlegmones tamen generatione, varii vario mo-
do opinantur, licet ipsa curandi ratio omnibus cõmu-
nis existat: nempe vacuatio sanguinis, in particula in-
flammata contenti. Cæterum phlegmones quæ etiam
num gignitur, est duplex curationis scopus. Quippe,
quod ex ea generatum iam est, id profligare oportet,
præsidio illius medicinæ partis, quæ morbos curat:
quod verò superest generandum, inhibendū est pror-
sus, beneficio alterius, quam præcautricem vocamus.
Porro sanguis copiosior influit, alia quapiam, aliis ue
particulis aliquando eum mittentibus, ac ea quæ phleg

Phlegmones
generalis cura-
tio.

mone laborare incipit, recipiente: aliquando particula quæ affligitur, ipsum ad se trahente. Sanè quæ mittunt partes, alias vt copia superuacuum, vel qualitate molestum: alias vtroq; nomine succum propellunt. Quæ attrahunt, ea morboſo calore trahunt. In doloribus, incipit quidem cauſa ab eo quod affligitur: ſed quicquid eſt phlegmoneſ, id ſuperpoſitæ partes efficiunt. Atverò tumorum omnium, qui præter naturam ſunt,

Tumor præter naturam natiuitas pro diſſerentia fluentium humorum naſcitur.

Phlegmonem curatur quæ ſint conſideranda.

Superuacanea expelli ſemper a ſeuerioribus ad imbecilliores particulas. Glandule cut ſint maxie obnoxie fluxionibus.

Struma quid. Bubonis curatio.

varietas, ex eius quod inſluit, natura naſcitur. Vbi enim flatulenta materia vberior accedit, flatuofa magis tumores ſunt. Phlegmone magis ſimiles, vbi ſanguis: ſicuti eryſipelati, vbi ſaua bilis: & œdemati, vbi pituita. Similiter ſcirrhoſi, vbi vel craſſus, uel vehementer lentus humor parti fuerit inſixus. Cæterum craſſus humor quodammodo iam melancholicus eſt. Lentus autem, ex glutinoſis prouenit cibis. Vbi igitur particula aliqua, phlegmone vrgeri cœperit, videndum eſt, an propter calorem aliquem, qui in illa præter naturam ſit ortus, an propter dolorem vel ipſius, vel propinquæ alienius partis, hanc ipſam cōtraxerit: quo ſcilicet adempta cauſa, phlegmone non amplius increſcat. Dein proximè expendendum eſt, nūquid vicina aliqua pars languinem largius ad particulam phlegmone obſeſſam tranſmittat. Poſtea verò, num totum corpus plenitudine ſuccorum labore. Siquidem ſuperuacanea, quæ expelluntur à valentioribus, ea ſemper in imbecilliores procumbunt. Vnde accidit, vt glanduloſa corpora, imbecillima omnium quæ ſint, facile fluxiones ipſas recipiant, tumoribusq; præter naturam (quos bubones appellant) celerrimè corripiantur: quum alias, tum vel maximè, vbi propter magnam arteriam, aut venam, fuerit vlcus aliquod ortum. Quod ſi ſcirrhoſior earum partium phlegmone aliquando fuerit, hæc & curationi renititur, & ſtruma vocatur. Ergo ſi vel totum corpus plethoricum ſit, vel prauo ſucco redun-

det, difficilis bubonum curatio redditur. Sin sanū planē sit, facilis. Quippe excalfacere & humectare modicē totum membrum, quo dolor mitigetur, oportet: lana quidem imbuta calente oleo, id circundantes: ipsi autem vlceri tetrapharmacum liquatum oleo rosaceo, calidum, aut etiam Macedonicum pharmacū (quod solo thure tetrapharmaco præstat) ex linicinio imponentes: atq; insuper calidū cataplasma ex farina vel hordeacea, uel triticea, uel ambabus, aqua & pauxillo olei cōfufis constans, extrinsecus applicātes. Non secus verò, ipsi adeni, qui phlegmone vrgeri cœpit, prima quidē die imponi debet lana oleo calēte madēs, sed citra salē. Cuius postea nōnihil indeniū, ubi & tumor per totū membrum remissus fuerit, & vlceris dolor sedatus. At si uel plethoricū corpus sit, vel vitioso succo redūdet, curatio per ea quæ sic calent, fluxionē ad membrū citat: cogimurq; aliās sanguinē mittere, idq; aut vena incisa, aut membris iis, quæ læsa nō sunt, scarificatis. Manu etenim laborante, scarificabis crura. Altero crure malē habente, reliquum. Has nanq; vacuationes indicat ipsa copia: sicuti etiam succorum vitium, redundantis succi purgationem. Sed quæ etiam Græcē dicuntur phymata, glandulis, sicubi fluxio in eas procubuit, citra vlceris occasionem accidunt. Vbi ergo distentæ vehemēter glandulæ sunt, aut alia quæuis particula, quam premit phlegmone, cogimur, toto corpore prius vacuato, ipsam scarificare. Sanē vacuamus totum corpus, etiam quum mediocritatem succorum continet, si morbi magnitudo id suadeat. Siquidem dolor, & membri inflammati calor, etiam si purum ab excrementis sit totum corpus, fluxionis causæ sunt. Tunc tamen parcius vacuare expedit: idq; habita ratione ætatis, naturæ, anni temporis, regionis, ac deniq; consuetudinis ipsius ægrotantis. At vbi iā phlegmones ipse vuluti feruor subsedit,

Manu laborāte scarificanda esse crura.

Crure altero affecto, reliquū scarificandum esse.

Phymata.

Phlegmone affectas particulas qñ scarificare cogamur.

Vacuare qñ solemus corpus etiā si mediocritatem succorum contineat.

Fluxionis causæ sunt dolor & membri calor.

Phlegmone qñ sit digerenda.

Phlegmones
curationi ad-
uersari dura
medicamenta.
Phlegmonem
suppurantē, nō
esse incidendā
protinus, sed di-
gerendā medi-
camentis ad id
valentibus,

Abcessus qñ
secandus sit, &
qua in parte.

Sectionis for-
ma qualis esse
debeat in sup-
purante parti-
cula.
Inguinis sup-
purati sectionē
transuersum
esse ducendā.

mitigatoriis emplastris dimissis, ad ea quæ digerunt,
paulatim est transeundum. Ac primum cum mitigato-
riis ipsis paulum mellis miscendum. Mox triticea fari-
na in totum est auferenda, contentis hordeacea cum
melle vberiore. Deinde ad aliquod eiusmodi digeren-
tium medicamentorum veniendum, quæ vel humida
consistentia sint, vel cerati specie. A duris autē est ab-
stinendum. Nam & phlegmonarum reliquias contra-
hunt, & rursus phlegmonem in ægra particula exci-
tant. Quòd si pus aliquod notabile in suppurante par-
ticula sit contentum, non expedit incidere protinus,
sed digestionem moliri medicamenti ad id valentib⁹.
Quum autem quod ex phlegmone ipsa relinquit, scir-
rhosum effectum videtur, fidenter iam valentib⁹ me-
dicamentis vtēris. Si quando ergo ægram partē medi-
camenti acrimonia irritatam videris, mitigabis eā in-
terea fomento, quod per spongiam administrabis. Id
autem aliquando ex aqua dulci esto: aliquando etiā sal
habente, vbi scilicet scirrhosiores sunt phlegmonæ.
Sin aliquando puris copia medicamenta superet, nec
ea videantur tibi totū digerere posse, quod sic abscēs-
sit secare, eo potissimum loco oportet, quo est editissi-
mum: obseruata interim effluxus indicatione. Quip-
pe tenuissimam illic etiam cutim inuenies. Post sectio-
nem verò, medicamentum aliquod, eorum quæ sine
morsu siccent, impone. Quòd si computruisse portio
aliqua suppurantis partis videbitur, excidi eam est ne-
cesse. Sectio igitur qua vtemur in suppurante particu-
la, myrti imitetur folium, sitq; planē non magna: qua-
li nos semper contenti fuimus. Cæterum quum in tali
incisione longitudo maior q̄ latitudo sit, esto in ingui-
ne longitudo per transuersum ducta: non autē per re-
ctitudinem membri. Quippe ita dum membrum infle-
ctimus, naturaliter cutis sibi applicatur. Post excisam
cutim, medicamento, quod mannam vocāt, affectam

partem implebimus. Est enim ea purgamentum thuris leui astringitione prædita. Quo nomine etiam thure ipso ad nonnulla vtilior. Thus siquidem, puris tantum mouendi facultatem obtinet: vtpote nullam astringendi vim habens. Magis quæ id facit, quod pinguius ex eo est, & magis albicans. Sicuti quod magis est flauum, potèntius siccatur. Mannæ verò, etiam corticis thuris paululum est admistum, vnde astringentiam vim habet. Ipse autem cortex thuris, tum astringit, tum siccatur insigniter. Itaque eo solo vtimur ad sanguinis perfusiones. Quin etiam mitigare prius incisam partem oportet: fomentis primum: dein cataplasmate: mox humectante aliquo medicamine, aut non siccante: singulis scilicet extrinsecus impositis. Nam in ipso vlcere tum mannam, tum pus mouentia, dein quæ expurgant, sunt imponenda. Post quæ si cauitas etiamnum adsit, quæ impleant adhibenda sunt. Sin minus, ea quæ cicatricem inducant: veluti quod ex cadmia conficitur. Vtendum verò medicamentis id genus est, prius quam vlcerus ad æqualitatem prorsus impletum fuerit: ne ipsa fortè cicatrix circumposita sit cute eminentior. Porro vbi æquabiliter inter se succi omnes sunt aucti, plethora, siue plenitudo is affectus vocatur. Vbi verò vel flaua bile, vel nigra, vel pituita, vel serosis humoribus refertum corpus iam fuerit, eum habitum cacochymiam vocamus. Ergo plethora, tum sanguinis missione curatur, tum balneo frequenti, tum exercitatione, tum frictione: præterea digerentibus medicamentis, atque etiam inedia. At succorum vitium, purgatione, quæ redundanti succo sit accommodata, corrigitur. Cæterum si iam æger febricitet, nec exercitatione vacuare licet exuperantiam, nec vnctione quæ calefaciat, sed nec multa frictione, nec balneo: imò sanguinis missione, vna cum inedia, vel purgatione aliqua. At si non febricitat, omnibus iam dictis vtare, optimū quodque ad id quod

Mannā thuris
buboni secto i
spargendā esse.

Thus puri mo
uendo idoneū,
nullā astringen
di vim habet,

Thuris cortex
astringit & siccatur.

Incisas partes
esse aliquo fo
mento circa in
cisionem leniē
das.

Vlceris in par
te secta relicti,
curatio.

Cicatricē indu
centibus medi
camentis uten
dum esse, prius
quam totum vlcer
prorsus imple
tum fuerit.

Plethora quid,
Cacochymia
quid.

Plethoræ cura
tio.

Cacochymia
correctio.

Crura phlegmone oblecta quomodo sint curanda.

Phlegmone super narum partium quomodo sit curanda.

Reuulsio debet fieri in contrarium earum partium, quae phlegmone urgetur.

Phlegmonis incipientibus, frigida & astringentia magis quam digerentia conueniunt.

Phlegmonem quando sint digerendum.

Phlegmones a punctu mortuae animalis excitatae curatio.

Virus a bestia relictum, quae ratione vacuandum.

instat, diligens. Verum cui crura laborant phlegmone, ambulatione vel cursu exercitandus non est: sed nec stare iubendus. Satiuste quippe est, ut sedens fricetur plurimum: moxque manuum motu exerceatur. At si quae ex supernis partibus urgeri videatur phlegmone, huic motus ex inambulatione aut cursu est admodum salutaris. Similiter & frictio ea tunc potior est, quae cruribus adhibetur, illis quae in supernis partibus administrantur. Siquidem in omnibus talibus reuulsio debet fieri in contrarium. Neque igitur quum vel circa sedem, vel aliquam huic partem vicinam, initium phlegmones incidit, alium deities. Neque quum in vesica, uel cole, vel renibus cepta est, pharmaca quae urinas prouocent, bibenda dabis. Nec si mulieri in utero, vel pudendo insedit, menses huic prouocabis, sed ad partes quae maxime longinquae sint, semper reuulsionem molieris: aestimata tum phlegmones magnitudine, tum corporis totius statu. Nam si plurima succorum abundantia sit, nec exercitatione, nec balneo sine periculo utare. Sin exigua sit, licet & per haec vacues. tam vero, si phlegmone oborta sit ab affectu partis quam vexat, primo quidem affectus ille sanandus est: mox quicquid ex phlegmone est genitum: Quae ambo interim iisdem praesidiis tolluntur. Caterum ad incipientes phlegmonas, frigidis astringentibusque magis utendum est, quam iis quae digerunt: atque etiamnum magis, ubi crassum quod confluit non est. Sed si sanguis in inflammata particula vehementer impactus fuerit, non est amplius utendum repercutientibus: sed tunc digerere est tempestiuum. Quod si ex animalis punctu, mortuae uel dolor incidit, a quo exorta sit phlegmone, duplex sanandi doloris ratio est, vel virus ipsum vacuando, vel quod dolorem excitat, alterando. Ac vacuabis sanum id, eorum medicaminum ope, quae vehementer attrahunt. Alterabis iis quae sunt contraria. Vacuant itaque

tum calfaciētia oīa, tū quæ ad se citra calfactionē all-
ciunt: vt cucurbitulæ, & cornua quædam. Sunt qui &
ore suo virus extrahant. Huc pertinet & cauteriū, &
medicamenta quæ cauteriis similiter escharā efficiūt.
Alterum auxiliorum genus est eorum, quæ qualitatē
per contraria alterant. Variantur autē medicationes,
pro laborantium particularum diuersitate. Vna quip-
pe indicatio ex similaribus sumitur partibus. Altera ex
instrumētariis. At ea quæ ex similaribus sumit, modū
calfaciendi, refrigerādi, siccandi, & humectandi deter-
minat. Quæ verò ex instrumētariis, tum locū ipsum, p-
quem vacuare oportet, tū vacuationis rōnem, tum ve-
rò in similis spēi medicamentorū vsu ipsum pluris mi-
norisq; modū. Porro vacuationis indicatio in phleg-
mone, refrigerationis indicationē vincit: contra q̄ in
erysipelate. In hoc nāq; refrigerationis indicatio ma-
gis urget, q̄ vacuationis: etsi vbi refrigeratū erysipelas
est, ad ea quæ digerunt medicamenta conuertimur. At
in phlegmone tantisper refrigerandum est, quatenus
& ad incrementum eius sistendum, inhibendumq; est
commodum. Quippe refrigeratio repercutit id quod
affluit, & ex eo quod in laborante continetur particu-
la, aliquid in proximas partes repellit. Simili modo &
quæ modicē excalfaciunt, utraq; interdum rōne pro-
sunt, q̄ & dolorem sedent, & contenta in parte ægra
digerant. Siquidem mitigando dolorem, augeri phle-
gmonas vetant: digerendo, quod earum iam con-
ceptum est, sanant. Si iecur inflammationem con-
trahere cœperit, ac totum corpus egeat inanitione,
virtusq; valida sit, atq; æger pubertatem at-
tigerit (puer enim, quæ per dissectam venā fit,
vacuationem non feret) pariter tum reuellendus,
tum educendus qui ad ipsum fluit sanguis est, interna
in dextro cubito insecta vena: propterea quod & è
directo, & ampla via, cum vena quæ caua dicitur,

Medicationes
uariari pro la-
borantiū par-
ticularum di-
uersitate.

Erysipelatis
curatio.

Refrigeratio-
nis usus ī phleg-
mone.

Calfacientia
modice dolorē
sedāt, & contē-
ta in parte in-
flammati dige-
runt.

Hepatis inflam-
mati curatio.

Pueri sectionē
venæ nō ferūt.
Sanguinem ua-
cuari & reuelli
ab hepate, se-
cū interna de-
xtri cubiti ue-
na.

Vena interna
non apparēte,
mediā, aut hu-
meralem secā-
dam esse.

Reuulsione ēē
moliendam q̄
lōgisime a tē-
tata fluxione
particula.

Apophlegma-
tismos fugen-
dos ēē, ubi par-
tes oris sunt in
flammatæ.

Pilegmone oc-
cupāte oris par-
ticulas, diuertē-
dum ad nares
esse, secandāq̄
humeralē i ma-
nu uenam, aut
mediam.

Venæ secandę
ratio i iccoris,
pulmonis, pe-
cticis, cordis,
fauciū, occipi-
tis, renum, uesi-
cæ, pudendi, &
uteri affectib⁹

societatem habet. Hac non apparente, media secanda est. Quod si nec illa se ostenderit, reliqua & tertia incindenda venit. Ac modum quidem vacuationis, ex redundantia modo, etate, natura, anni tempore, regione, consuetudineq; atq; ante hæc, ipsa laborantis virtute, inuenies. Venæ autem secandæ electio à parte laborante indicatur. In vniuersum autē, quàm longissimè à tentata fluxione parte quod redundat reuellere, nequaquam ad eam trahere cōuenit. Hac ratione, nec si hepar, aut ventriculum, aut intestina phlegmone occupare iam cōeperit, medicamine quod aluū deiciat, vti conueniet. Eandem cum his indicationē & vterus sortitur, sicuti cum vrinæ vasis pudenda. At vomitu vti pudibundis laborantibus, in diuersa reuellens auxilium est. Eadem ratione in omnibus quæ circa caput accidunt, alui subductio, in contrarium auertit. Si quæ verò circa fauces, & palatum, aut linguam, aut deniq; in ore phlegmone laborare cōeperint, in his omnibus cauenda sunt, quæ pituitam per os euocant; Greci apophlegmatismos appellant. Satiùs nāq; tunc fuerit deriuare ad nares; incidereq; humeralē in manu venam: vel, si ea non cernitur, mediam. Vbi iecur, pectus, pulmo, aut cor sic afficiūtur, internam. In angina primas in manibus: secundas eas quæ sub lingua habentur. At iis quæ in occipite sunt afflictis, etiam eam quæ in cubito est, nec non eam quæ habetur in fronte. Renibus verò, & vesica, & pudendo, & vtero sic habentibus, eas quæ in cruribus sunt sitæ, ac potissimum quæ sunt circa poplitem. Sin nuquā, eas quæ sunt iuxta malleolum. Ac perpetuò quidem in omnibus, eam quæ è directo est. Vbi iecur phlegmone inuadit, quæ in dextra sunt manu; vbi lienem, contra. Itaq; statim prima vacuationis diuersitas pro particularum diuersitate variatur: constatq; communem, q̄ sit vacuandum, indicationem, non magis esse vtilitatis q̄ noxæ causam.

Porrò

Porro ubi pectus, aut ventriculus, aut partes circa col-
lum caput ue laborant phlegmone, etiam excogitatu
est artus vincire. Quippe ipsum quod infestatur phleg-
mone, haudquaquam vincendum est. Sed si in mani-
bus sit phlegmone oborta, crura. Sin in cruribus, ma-
nus. Iam vero nec refrigerare inter initia, aut astringe-
re, citra laborantis particulæ indicationem, vtilitatis
magis quam noxæ sunt causæ. Nam particulis quidem
quæ iuxta artus sunt sitæ, tuto ministrare possis frigi-
dam aliquam fomentationem. Iecinori vero, si phleg-
mone infestari cœperit, non licet imponere actu frigi-
dum, aut fomentum, aut cataplasma. Rursus astringens
oleum, nec oculis, nec oris partibus admouebis, sicubi
hæc tentari phlegmone cœperint. Auri vero, etiam si
acetum cum rosaceo infundas, nihil offendes. Victus
etiam, pro partium ratione variatur. Quippe iis quib⁹
glandulæ, aut aliquid circa artus tentatur phlegmone,
tot & talia exhibenda sunt, quot & qualia facillimè cō-
coquantur. At si iecur ventriculus ue infestetur phleg-
mone (quum munus eorum sit toti animali commune)
victu exquisitissimo est opus: qui videlicet mea-
tus aperiat, detergeatq; citra rosionem: ac breuiter om-
nis tenacitatis sit expers: qualis utiq; in cibis est prisa-
na, & in pharmacis oxymeli, aqua distemperatū. Cæ-
terum dulcibus omnibus tum iecur, tum lien intume-
scit. Iam vero astringentia omnia mala, iccinoris phleg-
monis sunt incōmoda, præsertim iis, quæ in cauo eius
consistunt. Similiter ea quæ mordet, phlegmonas quæ
in cauo sunt visceris, q̃ quæ in gibbo consistunt, magis ir-
ritant. Iis quippe quæ in gibbis sunt, mutata iam ve-
niunt quæ assumpta fuerunt: & q̃ prius concocta sint,
& q̃ sanguini, qui in iccinore prius erat, admista. Cauo
autem iccinoris, phlegmone obfesso, protinus etiā ve-
nas quæ in mesenterio sunt, vnâ phlegmone laborare
est necesse: quū ex vena portæ exoriantur: protinusq;

Vincula nō es-
se inficienda in
flammatæ par-
ticulæ: sed illi
quæ opposita
est.

Iecinori, si phle-
gmone infesta-
ri cœperit, ni-
hil actu frigi-
dum esse ap-
plicandum.

Auri inflamma-
tæ nihil noce-
bis, uel si ace-
tum cum rosa-
ceo infundas.
Victus p par-
tium ratione
uariatur.

Victus iccort
uētriculoq; in-
flammatō con-
ueniens.

Dulcibus intum-
escit tū iecur
tum lien.

Cauo hepatis
phlegmone ob-
fesso, uenas
meseraicas si-
militer inflam-
mati.

Iecur phlegmo-
ne obsessū, cur
mediocriter a-
stringendū sit,
per cataplas-
ma mistæ ma-
terię.

Hepatis partes
per quas vias,
& quibus pur-
gandę remedia

etiam, quęcunq; oculis earum incidunt, vim suam
ostendere. Porro vbi iecur phlegmone obsessum est,
mediocriter astringi per cataplasmata mistæ materię
debet, q̄ altricis facultatis principiū animalibus sit, &
venosum ab hoc exoriatur genus. Vt autem iecino-
ris cauum per aluum purgatur, sic gibba eius, per ea
quę modicē vrinas mouent. Cuius generis apium exi-
sit. Procedente autem tempore, vbi phlegmone iam
concoquitur, etiam valentioribus vti licet: ut assaro,
celtica nardo, phu, petroselino, smyrno, & meo: sicuti
etiam per ventrem vacuare, si cauum afficitur, cnico-
cibis admisso, & vrtica, & mercuriali, & epithymo, &
filicula: omnibus præterea quę modicē aluū deiiciunt.
Magis q̄; in remissionibus, cum his ipsis audacius quā
ante vtendum: cum verò quę iis sunt valentiora, par-
tim in ptisana incoctis, partim tunsis, ac in mollissimū
puluerem reductis. Exhibenda verò & hæc sunt vel ex
ptisana, vel ex aqua. Ego nanq; etiam filiculæ aliquid
in ptisana aliquando incoxi, & nigriveratri corticem.
Sed clystere etiam ipsos vacuare expediet: inter initia
quidem, vel sale, vel nitro, vel aphronitro cum multa
distemperatis contentis: in remissione verò, potissi-
mum q̄; si quid scirrhum relictum ē phlegmone est,
etiam valentiora medicamenta miscantibus nobis.
Quippe hyssopum eo casu aquę incoquimus, & origa-
num, & colocynthida, & minus centaurium. Oppor-
tunissima nanq; ad scirrhum sunt iecur, lienis q̄; si quis,
parum habita de his ratione, glutinosi cibis vtatur.
Etenim substantia lienis, tameti rarior quā iecino-
ris sit (est enim illius substantia lutosa) crebrius tamē
scirrhis vitiis affigitur, propter nutrimenti, quo ali-
tur, speciem. Siquidem crasso nutritur sanguine, q̄ ve-
luti limus purioris est, facillime q̄; nigra bilis efficitur.
Renes etiam facilē scirrhis deprehēdi, atq; iccirco ne-
phritidas alias omnino solui non posse, alias ægrē solu-

Scirho eē op-
portunissimū
hepar lienēq̄.
Lienis substā-
tiā q̄ hepatis,
esse rariorem.
Lien crasso nu-
tritū sanguine.
Renes facile
scirrhū con-
trahunt;

biles esse, ratio docet: quum & crassa substantia sint, & non careant excrementorū vitio. Quo fit, vt qui crassi succi cibis vescuntur, calculi vitio vexentur. Medicina igitur horum affectuum, ea esse constat, quæ dissolcent, dissoluant, & frangant. Quæ utiq; ex eorū sunt genere, quæ obstructions eruant, atq; detergent: cæterū viribus valentiora. Curationem autē vnā coincidat, virtus, natura, ætas, anni tempus, regio deniq; cōsuetudo q; . Iecinore itaq; laborāte phlegmone, quæ extrinsecus applicant, ea mistæ esse facultatis debent: idq; non in gñatione phlegmones mō, sed etiā quum nec affluit amplius quicq; , nec repelli qd in laborante particula continet, potest. Quo quidē tempore duplex nobis indicatio suggerit: altera quidē à phlegmone, sui euaporationē poscente, nimirū digerentia: altera verò ab affecta parte, quæ per astringētia robur eius seruari iubet. Quare coeuntibus vnā cōtrariis indicationibus, compositū quoq; esse medicamentum oportet: nēpe astringens simul atq; relaxans. Verū tuendi roboris indicatio, in iis tantū partibus est cōis, quarum munus ex vſu est vniuerso corpori. Igitur nec lienem tantū relaxantibus curare oportet, quū hic quoq; ex iecinore qcqd liniosum & melancholicū est expurget, propterea scilicet, qd ex eo humore nutritur. Iccirco quoties obstructio aut phlegmone, sed præcipuē scirrhusa, in eū incidit, tum ea quæ obstructions eximāt, tum quæ dissolcēt, uehemētiora exigit. Nam quale medicamentū iecinori absynthiū est, tale est lieni capparis cortex. Quale rursus iecinori est eupatoriū, tale scopolendrium lieni. Siquidē similia genere medicamenta, quemadmodū & nutrimenta, ambo viscera postulant: cæterū tanto valentiora & acriora, lien, quāto crassiore vitur alimento. Iamverò quum gibba iecinoris expurgari per renes oporteat, sicuti caua per inferiorem ventrem: lieni sanē per renes nulla admini-

Calculos qd
leant gignere.
Calculis quæ
medicamenta
congruant.

Hepatis inflā-
mati curatio.

Lien nutrit ex
melancholico
sanguine, quē
expurgat ab
hepate.

Lien obstructū,
aut inflāmatū,
qualia medica-
mēta postulat.
Lien hepateq;
similia nutri-
menta & me-
dicamenta re-
quitunt.

Lien crassiori
uitur alimēto
q̄ hepate.
Hepar per quā
regionē vacuat-
tur.

Lien per intestina uacuatur.

strari potest vacuatio: sed tantummodo per intestina. Proinde ubi phlegmone premitur, deiectionis ipsum medicamentis tum detergemus, tum lacesimus, quo demittat, deponatque; superflua. Est autem duplex ratio eiusmodi medicamentorum usus. Nempe, ubi partes superius sitæ laborant, per ea quæ eduntur, bibunturque. Quum inferiores, per id quod sit per clysterem infusum. Quandoquidem quæ eduntur ac bibuntur, eorum vis, antequam ad inferiores partes perueniat, resoluitur. Quæ infusa sunt, ea omnino ad ieiunum usque ascendere nequeunt. Porro gula (quæ stomachus proprie vocatur) affecta, cataplasmata super dorsi spinam imponimus: non autem in anteriori parte: quod facimus, ubi phlegmone os ventriculi vrgetur. Siquidem spinæ gula superiacet, per collum & pectus deorsum usque ad ventriculum exporrecta. Iam quemadmodum lien & iecinoris caua, per intestina: gibba illius, & renes per vrinas purgantur: sic pectus, ubi interna eius tentantur phlegmone, per succingentem membranam, aliquid in medium sui pulmonumque spatium transmittit. Id autem expurgari per eandem qua pulmo viam debet. Propinanda igitur iis qui sic affliguntur sunt, quam diu quidem ipsa inualescit phlegmone, medicamenta quæ mediocriter vias aperiant, & crassos humores dissoluant: ut ptisana & mulsa: in exquisita autem declinatione phlegmones, dum educi iam excrementa postulant, quæ id valentius moliantur: ut vrticæ semen, & mulsa; in quam fuit coniectum paululum acrium herbarum: quales sunt origanum, hyssopum, calaminthe, pulegium, & illyricæ ircos radix. Oxymeli etiã quod ex marrubio conficitur, crassiora pectoris pulmonisque excrementa incidere potest. In vniuersum autem quæ in alto corpore affliguntur phlegmone, eæ partes paulo acriora, quam pro phlegmones natura, medicamenta desyderant. Resoluntur siquidem eorum vires, dum

Clysmos non posse usque ad ieiunum ascendere.

Gula affecta, cataplasma, esse applicandum super spinam dorsi.

Pectus per quam regionem purgetur.

Pectori phlegmone obfesso quæ medicamenta conueniant.

Inflammationes altius sitæ, cur paulo acriora medicamenta postulent, quam pro ipsarum ratione.

altè descendunt. Hac ratione & cucurbitula (strenuū planè auxilium) est inuenta, tum vt foras euocentur, quæ sunt in alto, tum vt eximantur & eruantur, quæ iam in scirrhum abeunt. Verùm vtendum cucurbita in ipsa parte quæ phlegmone vrgetur, inter initia non est, sed postea q̄ vniuersum corpus vacaueris, * atq; ex vsu iam esse videatur, eorum quæ in inflāmata partícula continentur, aliquid aut vacuare, aut versus exteriora reuellere. Proinde vbi affectus * etiamnum in generatione consistunt, minimè ipsis membris quæ laborare incipiunt, sed iis quæ continua his sunt, cucurbita imponi debet, auellendi in cōtrarium causa. Sic namq; ad mamillas cucurbitas imponimus, quum sanguis ex vtero profluit, defixo maximè in ipsis communibus pectoris & vteri vasis, eius ore. Sic si è naribus sanguis profunditur, præcordiis maximas cucurbitas affigimus. Sic & omne aliud sanguinis profluium, ad contrarium per communes venas auertimus. Quemadmodum rursus & sanguinem (si ita est opus) attrahimus. Siquidem quum menses euocare in animo est, pubi & inguini cucurbitam affigimus. Ad hæc, in occipite cucurbita defixa, efficax est remedium ad oculorum fluxiones. Vacuari tamen prius totū corpus expediat. Nam si refertur sanguine corpus sit, in quacunque parte capitis cucurbitam defixeris, totum ipsum implebis. Aduerte autem, vbi dicimus astringere incipientem phlegmonem esse opus, nō quodlibet astringens in iis quæ deuoranda sunt, exhibendum esse: sed ea tantum, quibus nulla corruptrix adnixa vis insit. Nam chalcanthus inter præcipua astringit, sicuti etiā misy, & fori, & chalcitis, & diphryges, & æs vstum, & squama eius, & flos. Verùm hæc medicamenta noxia deuorata sunt. Quocirca stomaticis ea miscere tutum non est. Defluit namq; interdum ex his aliquid ad ventriculum. Sed nec aloen probè miscueris iis medicamentis,

Cucurbitula
quotū inuēta.

Cucurbitula
quā utendum.

Cucurbitula
quotū ad mē-
mas affigi so-
leant.

Cucurbitula
sanguinem a
parte reuellere
atq; ad ipsam,
si fuerit opus,
attrahere.

Cucurbitula
bi affixa, mē-
ses euocat: ocu-
lorū aut fluxio-
nes reuellit oc-
cipiti admodum.

Cucurbitula
non esse uten-
dum, prius q̄
uniuersum cor-
pus vacuetur.

Aloen miscen-
dam non esse
medicamentis,
q̄ gratia phle-
gmones propi-
nātur: nisi aliu
uelimus deici-
ere.

*Aluum tuto e.
mollientia.*

*Leihargus est
affectus cōtra-
rius phrenitidi*

*Animā rōnālē
cōsistere in ca-
pite.*

*Prīcipis animę
facultatis sym-
ptomata singu-
la unde profici-
scantur: & qua
ratione sint cu-
tanda.*

*Oxyrhodinū
quibus conue-
niat affectib⁹.
Affectuum qui
cum peruigilio
& delirio infe-
stant, curatio,*

quæ phlegmones alicuius causa, quæ intus constiterit, deuoranda sunt. Quando huic quoq; purgandi uis quædam inest. Cæterum ubi phlegmone prorsus inclinauerit, si quis paululum aloes admisceat, deiciendi vētris gratia, qui prorsus non deiecerit, nihil lædet. Quāquā satius fuerit mercuriali, aut vrtica, aut cnico, aluū sic laborantium subducere. Admodū itaq; necessaria est indicatio quæ à particulis sumitur. Quæ nec ipsa sat est ad curandos morbos, nisi etiam methodos de medica mentis didiceris. Vt autem ad affectus capitis iam nostra reuocet oratio, oxyrhodinū, quo caput phreniticorum pfundimus, sanē vniuersos redarguit, quicūq; principem animæ partē in corde statuunt. Siquidē per id genus affectus, nō capiti, sed pectori præsidia admodū uenda essent. Atqui non in phrenitide modò, sed in lethargo etiā (quod vitiū illi contrariū quodāmodo secundum spēm existit) vniuersi applicant ipsa remedia capiti, in quo scilicet princeps animi pars residet. Ergo quum humor qui in capite redundat frigidus est, insensibilitas imobilitasq; hoīem opprimunt: quū uerò calidus est, perpetuus potius motus, vnā cum rōnis noxa. Accidit enim segnitia ex frigore: ex calore imodicus motus: ex humoris uerò vitio, detmentia. Igit in eiusmodi affectibus, si virtus valida sit, ac nihil aliud prohibeat, ut crudi humoris copia, vel ætas puerilis, uel anni tēpus, vel regio in qua sit extrem⁹ calor, vel frigus, statim ab initio uena tūdenda est. Atq; hoc quidē cōmune utriq; uitio, & ei quod cū sopore, & ei quod cū uigiliis incidit. Cōmune præterea utriusq; est, ut oxyrhodinū in principio admoueas. Nam repellendus à capite humor est, quisquis is fuerit. Quæ sequunt, cōtraria sunt. Nā quæ cum uigiliis coniuncta sunt, ea lenire expedit: quæ cū imobilitate, excitare. Iure ergo quū in summo incremēto sunt, iis uitiis quæ puigilio & delirio infestāt, perfusiones ex papaueris capitibus appli-

cabimus. Odorē quoq; naribus obiiiciemus: ac narium alas intus, uel frontē ex similibus medicamentis illinemus. Quippe sopire, ac stupefacere principē facultatē oportet: cerebrū scilicet, quod supra modū icaluit, refrigerando: in cōtrariis autē uitiis excitare: ac noxii humoris, q; citra putredinē, & citra febrim, altos sopores iuehit, crassitudinē icidere, excalescereq;. Tales nimirū altos sopores, Græci apoplexias, caros, & catochas appellāt. Quod si qñ humor putrescat, utiq; cum febris incidunt ea genera: vocaturq; morbus Græcē lethargus. Incoquentes igit in aceto thymū, & pulegium, & origanū, aliaq; id genus, naribus sic affectoꝝ admouebimus, quo uapor sublatu ad cerebrū, humoris crassitudinē dissecet. Mox etiā palatum ualentibus & acris medicamentis ungemus. Ab his uerō etiā sternutamentis utemur: tū capiti similes præsidiorū facultates imponemus, adaucta semp̄ eorum, etiā ad ipsum vsq; sinapi, uehementia, si uitiū diu p̄seueret. Quinetiā cucurbitis ad utrūq; uitium, si diutinu sit, utemur: itemq; castoreo: q̄ppe quod ipsum probē cōcoquit, debitē admiñistratū. Quoties autē medicamenti alicui⁹ vim exactē ad cerebrū descendere uoles, ad coronalē uocatam situram (cuius plurima diuersitas in hoibus est) id applicabis. Nā præter reliqua, tenuissimum, & rarissimū eo in loco est craniū. Cōmodius etiā fuerit, si & cū infractione id facias, aut tōsis capillis, aut etiā planē abrasis. Quod si humidū sit quod applicandū est, si id ex alto effundas, ac ueluti fontis ritu illidas: q̄ppe penitus intrō ab ictu magis impellit. Sicuti autē hīc uehementior humoris casus p̄ducit, ita i oculis aduersat. In capite nāq; insensile os est quod ferit: in oculis mēbranosa quædā & ibecilla, maximeq; sensilia corpora. Et i capite qdē, aliud est quod ictū excipit: aliud quod curatur: quodq; ut ictum non sentit, ita facultate, quæ ex incussu ad ipsum peruenit, fruitur. At in oculo, quod est curan-

Affectuum qui cum sopore in uadit, curatio

Lethargus qd.

Coronali situra esse applicanda medicamenta, quoru uim exacte ad cerebrū descendere uolumus. Capiti instituta fomenta humida, esse illudēda ab alto.

Oculorū phlegmonas iuuat albumen cui.

Oculorū dolor unde exoriat.

Oculorū morbus curatio.

Oculorū inflammacioni qñ, & cur balneū cōducatur.

Oculorū distentionis a plenitudine curatio.

Oculorū a flatulenta substantia extensorū curatio.

Foenigræci decoctū oculorū tñsioni cōfert.

dum, idem valenter feritur. Quare infundere huic sensim medicamenta, liquata humoribus mitissimè facultatis, oportet, attollentes palpebram superiorem blandissimè. Meritò autem commendatur ad phlegmonē oculorū, ex oui humore, id quod tū glutinosum est, tum minimè mordens. Cæterum quæ terrea corpora oculariis medicamētis miscenda sunt, ea læuigari exactissimè debent. Dolent porrò vehementer oculi, aut ex vehementi acris confluentis humoris morfu: aut q̄ eorum tunicæ plenitudine distendātur: aut propter crassorum humorum, flatuosiue spiritus extensionē. At morsum quidem, tum purgantibus medicamētis, deorsum nempe reuellendo, & vacuando, curare conuenit: tum ipsi particulæ oui humore infuso, quo per eum acris fluxio sine offensa eluatur. Vbi autem concocta iam ipsa phlegmone fuerit, & simul corpus vacuatum, tum utiq; lauaciones in balneo his sunt aptissimæ. Nam & dolorem statim sedant, & fluxionē quæ ad oculos fertur, sistunt, maxima quidem eius parte inter lauandum per totum corpus excreta: reliquo verò contemperato. At distentionem quæ ex repletionē prouenit partis, missione sanguinis, & alui deiectione, & inferiarum partium frictione, curare conueniet. Quod si necessitas aliquando vrgeat, etiā ligandis artubus: mox fomentis ex aqua dulci modicè calida, laboranti particulæ adhibitis. At humorum, vel flatuosi spiritus extensiones curabimus, vacuato prius in his quoq; toto corpore: sed & humorum momento auerso deorsum. Mox localibus remediis vtendum: nō tamen medicamentis iis quæ repercutiant, ac reprimāt, sed potius iis quæ discutiant. Igitur fœnogræci decoctum iis infundendum est: quod omnium maximè sine offensa digerat. Verū tum reliquos morbos, tum phlegmonas, sicubi curas, nullo euaporante auxilio prius fidenter vtēris, quā totū corpus, aut pars quæ

excrementum transmittit, vacuetur: aut contrariis qualitatibus alteretur, si aliquam intemperantiā fortiat, quæ ipsius fluxionis existat causa. Sic enim diutinas oculorū fluxiones curam⁹, oculis ipsis dimissis, atq; ad capitis custodiam conuersi. Plurimum autē vel frigida intemperies caput vitiat, vel humida: nec dubium est, quin etiam ambæ congregiantur. Rariores sunt, quæ propter calorem, ac rem oculis fluxionē immittunt. In quibus oleo crudo & Hispano, & rosaceo, uti expedit: tū frequenti ex aqua dulci in balneo lauatione. Quod si arteriæ, venæ uel quæ iuxta oculos sunt, imbecilliores sint redditæ, adeo ut aliorum vasorū su peruacua recipiant, aliqua earum parte excisa, aut etiā totis abundē altè præcisis, dura cicatrice quod interest intercipientur. Cæterum in reconditis vasis hoc fieri nequit: ac proinde eorum vitia ægrè curationem recipiunt. Vasa verò conspicua, vel absq; chirurgia, licet corroborare: illitis medicamentis, quæ robur inserāt. Est & quando calidus sanguis, ac vaporum plenus, ad caput ascendit, ac maximè in arteriis redūdāt. Cui vitio saluberrimum est remedium, ut eæ incidantur arteriæ, quæ circa caput & calidiores apparent, & maiorem exhibēt pulsum. Quæcūq; verò & paruæ, & prope cutem resident, harum vel si partem aliquam excideris, veluti facere in varicibus crurū solemus, aptius erit. Quod si inter nudandū appareat tibi vas magnū, aut magnum exhibere pulsum, tutius fuerit vinculo id prius excipere: mox quod in medio est, præcidere. Sunt autem eiusmodi vincula ex materia aliqua nimè putrescibili. Potissimum si iis arteriæ sint excipiendæ. Etenim quæ caro in abscisis vasorū partibus coalescit, ea pro operculo est, atq; ipsorū oscula cludit. Quod quidē ubi factum iam cernimus, decidere tunc tutò vincula pōt. Ac sic etiam varices curamus quæ dilatatæ sunt ueng, potissimū circa crura & testiculos.

Digerentibus non esse utendum intrepide prius q̃ uniuerso corpori, aut parti quæ excrementū transmittit, consultū fuerit.

Oculis uasa adiacentia præcidenda tūc esse, dum imbecilliores redditæ, aliorum vasorum excrementa recipiunt. Vasa cōspiciā posse absque chirurgia corroborari, illitis medicamentis quæ robur inserant.

Vasa excidentia ratio.

Varices quæ tatione curentur.

GALENI PERGA MENI DE MEDENDI methodo. LIB. XIII.



Erysipelas unde gignatur.

Erysipelas quomodo a phlegmone differat.

Phlegmones generatio & symptomata.

Erysipelas quid.

Phlegmone erysipelatosam.
Erysipelas phlegmonosum.

AVD LONGE VERO AB-
est à phlegmone alius morbus erysi-
pelas dictus: qui quidem ex succo bi-
lioso ortus, tumore caloremq; cum
illa sortitur communem. Disident
inter se tamen affectus ii, primū ma-
ximeq; colore. Quandoquidem si is ruber sit, vitium
vocatur phlegmone. Sin pallidus, flauus ue, uel ex pal-
lido, flauoq; colore mistus, erysipelas. Præterea pulsa-
tio est magnæ phlegmones proprium symptoma: qu-
pe quæ copioso sanguine in aliquam particulam pro-
cumbente, orta, altè magis in corpus demittit: inibiq;
dolorem pulsatilem, cum tensione & renixu excitat.
Erysipelas uerò in cute potius consistit: ob tenuitatem
ipsius pallidæ bilis. Ac corpore quidē pro naturæ mo-
do se habere, amare bilis succus exhalat insensibiliter.
Vbi uerò is vel longè copiosior, vel crassior, q̄ pro mo-
do naturæ, redditus, vniuersus ad cutim cōpulsus fue-
rit, eam tum perurit, tum in tumorem attollit, aliquid
etiam subiectæ partis occupās. Hic itaq; affectus erysi-
pelas nuncupat. Qui quidē interdum cū exulceratione
supremæ cuticulæ accidit: vbi scilicet bilis ipsa crassior
simul atq; acrior existit. Interdum aut sine hac incidit.
Vbi verò nec planè biliosa, nec sanguinea fluxio est, sed
ex ambabus cōflata: utiq; ab eo quod in miscella exu-
perat, nomē tumori indatur: dicaturq; de eo id quod
præpoller. Sic ut uel phlegmonē erysipelatosam affe-
ctum ipsum vocemus, vel erysipelas phlegmonosum.
Cæterum vbi neutrum vincit, ibi vitiū phlegmones ery-
sipelatosq; medium vocet. Ergo oibus qui sic præter
naturam consistunt tumoribus, cōis indicatio vacua.

Euacuatio in
tumoribus præ
ter naturā, du
plex.

tio est: quæ nimirum administrat duplex: vna repellen
tium ad alias partes: altera per halitum digerentium.
At quoniam erysipelas non quantitate modò affligit,
sed etiam ob vehementē inflammationē qualitate ipsa
cruciat, requirit ampliorem refrigerationem quàm phleg
mone. Cauendū tñ est interim, ne in princeps aliquod
membrum ipsam bilem repellas. Ac proinde, quæ ad
modū in phlegmones curatione, post totius corporis
vacuationem auxiliis repellentibus vtimur, sic facies
in erysipelate: sed pro sanguinis missione, medicamē
to quod bilem trahat purgans: ipsam verò afflictā par
tem refrigerans. Cuius sanè refrigerationis terminus
esto ipsa coloris mutatio. Etenim quod purū erysipe
las est, statim cū hoc congescit. Quod nō purū, sed quo
dāmodo phlegmonodes, si plusculū refrigeres, liuidā
cutim præfert: nigricat quæ; si magis. Quā ob rē sati⁹ fue
rit, vbi laborātis particulæ alteratū colorem uideris, à
refrigeratib⁹ astringētibus quæ; ad cōtraria trāsire: prius
quàm uel liuida, uel nigra prorsus fiat. Refrigerat porro so
lanum, semperuiuū, portulaca, vmbilic⁹ veneris, psyl
lium, altercū, lactuca, intybu, palustris lenticula, cera
ta ex aqua admodū frigida, & alia id genus. Vbi verò
inflāmatio ægrotātis mēbri iam desit, cataplasma illi,
prius quàm liueat, ex hordei farina imponendū. Quòd si li
uor iā occuparit, id incisa prius cute imponat: perfun
dendus quæ; locus plurimū quidē ex aqua calida. Sed &
marina aqua, & muria cōducet interim. Quin etiā ipsi
cataplasmati eiusmodi aqua, uel acetū, vel oxalme mi
sceatur. Nullum aut valenter calfacientiū est in medela
erysipelatis, prius quàm id quod mutat, desinat esse quod an
tea fuerat, atque alterum iam, illi quæ; cōtrarium, euaserit.
Interdum etiam erysipelas miscetur œdemati: dici
tur quæ; erysipelas œdematosum: quæadmodum ubi ex
nimia refrigeratione durum ægræ quæ; solubile est reddi
tum, erysipelas scirrhum vocabitur. Quod igitur ad

Erysipelatis ca
ratio.

Erysipelatis re
frigerandi ter
minus sit ipsa
coloris muta
tio.

Erysipelati res
frigerando me
dicamenta ido
nea.

Erysipelas œ
dematosum quæ
accidat.

Oedema est
humor laxus
& indolens, ex
tus a pituita.

Oedematum
curatio.

Alumen oede-
mata discutit.

Glaciū &
diaglaciū, oede-
mata, erysi-
pelata, & phle-
gmonas sanat.

Scin his non
conueniunt me-
dicamenta ue-
hementer cal-
facientia & sic-
catis.

Calculi quōge-
nerentur.

curationem pertinet, potissimum contra exuperans
est pugnandum: non neglecta interim alterius indica-
tione. Sicuti autem ex biliosa fluxione erysipelas, ita
ex pituita constat oedema, existens laxus quidā tumor
& indolens. Qui quidem in aquæ inter cutim disposi-
tionibus, nec non in phthoe, solet etiam pedes afflige-
re. In illis tamen affectibus, quū talis tumor sympto-
ma sit, nullam seorsum propriam curationem requi-
rit. Nam satis erit tunc perfricare crura, aliàs oxyrho-
dino, aliàs oleo cum sale, aut etiam oxyrhodino sal ha-
bente. At si ex pituitoso humore in particulā influen-
te oedema constitit, abundē aliquando satisfacit spon-
gia recens, potabili oxycrato madidata. Deligare ve-
rò ipsam debes, ab inferiore parte incipiens, ac supra
desinens. Si recentis copia non sit, antiquam deterge-
bis, expurgabisq; nitro, aphronitro, & aqua lixina.
Quod si sic oedema non subsidat, vbi rursus deligabis,
pusillum aliquid aluminis coniicies, ac nouam spon-
giam admovebis: atque etiā elychion molle, madensq;
ex posca, quæ aluminis nonnihil receperit. Sit autem
arctatio mediocris, veluti in ossis fractura. Ac primæ
quidē fasciæ iniectiones, quæ scilicet infernè incipiūt,
magis arctandæ: quæ deinceps sunt, sensim remitten-
dæ. Idoneum etiam medicamentum ad hæc est glau-
cium ipsum, liquatum in posca: nostrūq; medicamen-
tum, quod ex eo conficitur: quodq; non oedemata modò,
verū multo etiam magis tum erysipelata, tū phleg-
monas incipientes sanat: ac potissimum calidas. Por-
rò scirrhis affectibus (qui à glutinosis, aut crassis,
aut vtriusq; rationis participibus humoribus trahunt
ortum) nullum vehementer excalfaciens, siccans ue-
medicamentum est aptum. Nam quæ eiusmodi sunt,
digerunt quidē subtilia: quod verò reliquū est, mul-
to magis impingunt. Qua ratione etiā calculi gignunt
in renibus: asse scilicet in his crasso glutinosoq; succo.

Quare ea tantum sunt adiuuenda tumoribus induratis, quæ molliendo digerere possunt: cuiusmodi sunt, cum ceruina medulla, tum vitulina, tum seuum hircinum, taurinum, & leoninum. Ad hæc, Ammoniacum Thymiam, & bdellium utrumque, sicuti etiam styrax. Sed ex his, humilia sunt præferenda. His igitur attentus indicationibus, etiam complicatos affectus sanare poteris. Ceterum si tendones & ligamenta indurata fuerint, aliquid incidentium emollientibus admiscere oportet: cuiusmodi vel imprimis acetum est. Equidem pyriten lapidem, aut molarem, sed candentem, in aceto quam acerrimo extinguere soleo: dein scirrhosum ligamentum, vel tendonem exponere, ut calentem vaporem excipiat, in eoque dimoueatur. Postea verò medicamentum quod emolliat impono: oleoque aliquo tenui, à principio curationis, particulam laborantem perfundo. Itaque curatio quæ per acetum administratur, utilis est uitio iam adulto: & quum præparata iam sub mollientibus pars fuerit. Ad ligamenta autem & tendones, nec sæpe, nec inter initia, nec longo tempore, medicamentis quæ ex aceto componuntur utendum est. Quamuis in liene & carnosus musculus partibus tutus eius sit usus. Ac Ammoniacum quidem thymiam liquatum aceto, ad luti scilicet crassitudinem, complures lieni imponunt: idque solum ei curando sæpe fuit satis. Induratis etiam musculis, ubi emolli per alia medicamenta iam fuerint, Ammoniacum aceto liquatum maximum usum præstat. Sufficit autem eo uno altero uel die usus, rursus ad emollientia reuerti. Ego verò medio tempore cataplasmate ex althea sum usus. Cuius radix seuo anserino, aut gallinaceo, aut suillo liquata, salutare ad emolliendos scirrhos medicamentum existit. Siluestris quoque malua, quæ passim nascitur, folia, cum supradictorum aliquo tunsa proficiunt. Meliora tamē crudis sunt, quæ modicè ante sunt cocta. Variatur itaque cura-

Scirrhis sunt adiuuenda, quæ molliendo digerere possunt.

Induratos tendones qua ratione oporteat curare.

Acetum usum quæ induratis conueniat.

Ammoniacum aceto liquatum lieni indurato conducit: nec aliter induratis musculis.

Altheæ radix seuo anserino liquata, salutare ad emolliendos scirrhos medicamentum existit.

Curatioⁿis mo-
dus variatur p
differentiis par-
ticularum.

Scirrhus quid.

Ligamēta esse
insensilia.

Inflatio ab œ-
demate quō
differat.
Inflationū sco-
pi.

Inflationes vi-
scerum quō di-
scutiantur.

Cucurbitula
flauti discutie-
do est idonea.

Lixiuum ex
spongia appli-
citū, extrema-
rum partiū fla-
tus discutit.
Musculorū cō-
tusioni quę cō-
ferant.

Ocypus.

tionis modus pro differentiis particularum. Quippe laborantibus precordiis œdemate, nemo ex polca frigida applicuerit spongiam: nec absynthium oleo incoquens, genu quicquid perfudit. At iecinori ægrotanti & lieni, cum in maxima utilitate adhibetur. Vocatur igitur scirrhus impræsentiarum tumor durus & indolens, non tamen omnino absque sensu. Talis enim non est sanabilis. Reliqui omnes, sicuti ægrius sensibile ipsam partem affectam reddunt, ita omnino insensibilem non efficiunt: utique si sensibilis sit natura. Ligamenta namque scimus insensilia esse. Sed iam ad inflationes nos cōuertamus: quæ quidem ex statuofo spiritu in aliqua cavitate collecto oriuntur. Differt autem inflatio ab œdemate, quod ille tumor sit laxus & digitis cedens: utpote à pituita exortus. Inflatio autem maximè renitatur tangenti, sonitumque; veluti tympanum reddat. Scopus autem omnium inflationum communis est, ut quod præter naturam est, vacuetur, in quoque id contineatur. Proprius verò, ut tenuissimis & calidis potestate medicamentis. Atque in ventriculo quidem, inflatisque visceribus, oleum quod tenuium sit partium, quodque rutam habeat incoctam, aut semine cumini, aut apii, aut petroselini, id præstabit. Aliquando verò & cucurbita magna bis retere sine incisione medio ventri affixa. At in artubus & musculis, qui sub cute, aut etiam membranis quæ ossa vestiunt, sunt, inflatione orta, si citra dolo rem sit, lixiuum nova spongia exceptum, abundè fuerit. Sin dolor quoque urgeat, ungenda pars est oleo, quod relaxandi, remittendique vim habeat. Musculi verò simul & inflati & dolentes ob cōtusionem, satius est, ut in principio sapa cum vino & aceti pauxillo, mediocrique olei portione, oibus una modicè calfactis, atque lana succida exceptis, foveant. Quod si succidæ facultas non sit, ipsius œsypus iniiciendus supradictæ miscellæ est. Ceratum etiam quod ex œsypo componit, ad idem

non inidoneū fuerit. Debent enim cōtusi musculi leni
ri medicamento, cui mista facultas sit, quæ simul cōco
quat, digerat, & modicè astringat. Quandoquidem si
nihil astrictionis sortiat, augeat aliqñ phlegmonas, præ
cipuè in iis corporibus, quæ sunt plethorica. Igit si do
lor vehemens vrgeat, mitigatiua magis medendi rō
ne vtēris. Sin uerò ille absit, maiori vi cōtra inflationē
instabis, per valentiora medicamēta. Cuiusmodi sunt
lixiuuium, acētū, & posthēc, vinū. Quoties ergo de mi
tigando nō laboras, illorū plus in misturam coniicies.
Rursus ubi repellere studes, vini nigri, austeri q; plus q̄
ipsorū, immittes. At si digerere malis, lixiuii plus ides.
Acetum uerò si his miscebis, ad ambo erit vtile, pro
pterea quòd mistas habet facultates. Quòd si muscul^{us}
prorsus sine dolore sit, licet in lixiuii penuria, pro illo
aphronitrū imittere, id q; minimè lapidosum, sed spu
mosum magis. Inflationes aut inueteratas, primò qui
dem aliquo ex iis quæ ex lixiuio constant, fouebis. Se
cundò verò strigmentis gymnasiorum feruefactis, &
mox colatis, pollinem calcis viuæ inspergito, vsq; ad
crassitudinē luti: ac tandem cataplasma id, affectæ sedi
admoueto. Salutare etiā his medicamen est, quod ex
sycomoro conficit. Est & alius inflationis affectus, pria
pismus dictus: quo detentis, vel inuitis, pudendū arri
gitur. Etenim quū neruus propriā colis substantiā con
stituens, naturā cauernosus existat, vbi halituoso spiri
tu implet, eiusmodi affectū excitat. At halituosus spūs
in animalis corpore gignitur ex succis sensim excalfa
ctis. Imprimis ergo ea vacuatione vniuersum vacuan
dum est corpus, quæ maximè videbit ex vsu fore ægro
tanti. Dejn verò imponendum ipsi laboranti particu
læ medicamentum est, si ea calidior sit effecta, quod ad
portionē caloris abundantis refrigeret. Sin aliter, in
ter initia quidem, omnino quod modicè refrigeret:
postea verò, id necessum non est. Pari modo & quæ

Contusis mu
sculis medica
menta qualia
nā esse debeāt

Acetum mistas
facultates for
tuitur.

Inflationes in
ueteratæ qua
ratione curan
dæ sint.

Priapismus qd

Halituosus spi
ritus gignitur
ex succis sen
sim excalfa
ctis.

Priapismi cura
tio.

circa lumbos sunt particulæ omnes, eiusdem facultatis medicamento comprehendendæ sunt. Etiam reliquus victus exhibendus, qui & flatui aduersetur, & siccet. Equidem quendam adolescentem sic affectum curavi, primum quidem sanguine misso: dein cerato, facto ex rosaceo simplici, imbutoq; aqua frigida, pudendo ac lumbis imposito. Simili modo & alium, qui post missum sanguinem, humido medicamento, quod ex chamæmelo conficitur, est usus. Porro istis etiã nymphæ aliquid potandum exhibeo, saltem in principio. Mox viticis semen: ac si traxerit adhuc vitium, rutæ semen copiose comedendum. Est enim illud cõmunẽ præceptum oĩum fermẽ, quos vitiosus succus creat, morborum, quod in fine calfacientibus & siccantibus sit utendum. Quippe hæc quod reliquũ humoris est, prorsus absument. At verò maximẽ tumefactam cuiusdam linguam curauimus, catapotis ex aloë, scamonia, & colocynthide, vesperi datis, illum purgãtes: lactucæ autem succo ipsam linguam colluentes. Quod autem in priapismo vomitoriis medicamentis potius quàm subducentibus sit utendum: in linguæ vitio contrariid ex partiũ situ indicari perspicuum est. Nã auersionis in contrarium, non à substantia, sed à curandi membri positu, inuentio præstat. Porro ex tumoribus rubeus quidem, subesse humorem sanguineum indicat: sicuti flauus & pallidus, persimilem ipsis bilẽ. Subalbidus verò & laxis pituitam. Sunt & alii tumores fusci, liuidiue, tactui admodum renitentes. Quod si membrum sortiatur euidentiores venas, exaltatas eas iuxta hosce tumores à crasso & nigriore quodam modo sanguine videre licet. Qui humor, vbi incaluerit impenius, aut propter putredinẽ, aut febrẽ phlegmonodem, nigram efficit bilem, quam ne mures quidem ipsi gustauerit. Terra quoq; ab ea raditur: ac partes, quæ raduntur, omnes attolluntur in altum: vocaturq;

Nymphæ.

Viticis semen.
Rutæ semen.

Linguam maxime tumefactam qua ratione curari? Galen.

Auersionis est morbi lienda in contrarium.
Color tumoris humoris a quo est ortus, declarat.

Atræ bilis generatio, & faculta.

turq; is affectus tum feruor, tum fermentatio. Est nāq; is humor talis, quale esse acetum docuimus: ī vomitionibusq; non raro percipitur acidus: vt amarus, qui palida dicitur bilis. Quæ igitur verè dicitur atra bilis, acida certè est, atq; terram fermentans, omniq; animanti inuocunda. Quæ uerò vt talis fiat est atra, ea dicitur melancholicus humor; vel nigra etiam bilis: ita tamen ut distinguatur ab altera quæ ex assatione oritur. De nominibus tamen anxia disceptatione neglecta nonnulli præter naturā tiores, ex eiusmodi naturæ succo proueniunt, cuiusmodi est fæx in vino, & amurea, in oleo. Qui quidem spatio temporis putrescente humore, propterea qd sit impactus in vasis, exulcerantur. Atq; huiusmodi sanè affectum communiter omnes cācrum appellant. Quod vitium, perinde vt reliqua omnia, plurimam habet in maioris minorisq; ratione differentiam. Igitur communis cancri curatio, est melancholici succi vacuatio. Mox prohibitio, ne de cætero talis humor colligat in venis: particulæq; , ne aniplius redundantem succum recipiat, corroboratio. Soluemus autem melancholicum succum, drachmis quaternis epithymii, ī sero lactis, aut mulsa, exhibitis: aut propinato medicamine nostro, quod ex duobus & triginta simplicibus constat. Post purgationem dictum iam de omnibus eiusmodi affectibus est, qd uel repellere humorem qui in membrū procubuit oportet: vel ipsum digerere: præterea qd in principio quidem, tam in ipso purgationis tempore, q̄ ante id, repellere: vbi iam totum corpus exquisitè purgaueris, digerere. Vbi tamē mediocris tantū purgatio præcesserit, nūstum esse quod applicabitur pharmacum, ex repellente digere teq; facultate conueniet. Cæterum ad discutiendos cācros, mediocrium virium medicamētis est opus: quæ nec propter imbecillitatem vincantur: nec propter effectus vehementiam, ipsum sanguinem crassent. Quia

Melancholicus succus.

Cancris generatio.

Cancris curatio

Melancholicus succus purgatio.

terò ipsius vitii malignitas, ab iis quæ mordent irritatur, & efferatur, ob id utiq; non modò mediocria uiribus, sed etiam minimè qualitate mordentia, cuiusmodi affectibus sunt idonea: materia quorum, ex vltis, elotisq; metallicis desumetur. Quippe quæ medicamenta ex his componuntur, ad sanandos incipientes càcros, magnam uim obtinent. Maiores verò sat fuerit, si his prohibeantur augeri. Cæterùm si quando cancerum p-chirurgiam curare audebis, cœpisse quidem ab euacuando per purgationem melâcholico humore oportebit. Vbi verò quod vitiatum est, totum prorsus excideris, sic vt nulla supersit radix, fines effluere sanguinem: nec propere eum inhibebis: imò premendo potius quæ circum sunt, venas, exprimes ex his crassiorē sanguinem: mox aliis vlceribus similiter curabis. Est aliud vitium, carbunculus appellatus, quod ex humore crasso, feruenteq; nascitur. Incipit hoc plerūq; à pustula: aliquando verò & sine hac. Cæterùm inter initia, quibus hoc instat, scabūt omnino particulam. Mox oritur pustula quædam, modò cineris colorem referens: modò etiam nigrior: qua rupta, vlcus cum crusta gignitur. Omnibus præterea his circumposita raro in summam peruenit inflammationem: colore, magis q̃ phlegmone, nigricans. Necessariò autem sic affecti febricitant: quare ab incisa vena incipienda curatio est, detrahendusq; sanguis ad animi vsq; deliquit: nisi aliud aliquid obstat. Imponi verò sibi ægra partecula, quod ad humorum inflammationem spectat, refrigerantia desyderat: pp crassitudinem tñ humoris, atq; èt maliciam, nec fluxionē auertere vnq̃ poteris: & si qñ id feceris, aliud quippiam, quod in alto sit corpore, offendes. Atqui nec affluere is permittendus est. Quin potius inquirenda remedia sunt, quæ cum modicè reprimendo, èt digerere possint. Tale profectò est tum cataplasma quod ex plantagine conficitur: tum

Metallica medicamenta, sanandis incipientibus canceris idonea.

Canceri per chirurgiam curatio.

Carbunculi descriptio.

Carbunculum absq; febre nō reperiri.

Carbunculi curatio.

Carbunculo cataplasmata idonea.

quod ex cocta lente: scilicet miscentibus nobis his teneram micam panis, & miscellanei, & i clibano cocti. Etenim panis omnino puri substantia in cutis meatibus hæreere est apta. Furfuraceus autem, crassiorum est partium. Super ipsi verò ulcus valēs aliquod imponendum est medicamen: cuiusmodi est Andronis, Pasionis, vel Polyidæ. Liquariq; id cum vino aliquo dulci ad sordium crassitudinem debet. Quæ autem pharmaca reliquis adhiberi vlcerebus solent, nempe quæ concoquant & pus moueant, ea nunc adhibenda non sunt: quando ita particulæ putredinem auxeris. Scarificare etiam eiusmodi tumores post sanguinis missionem alienum non est: Sunt autem incisiones altiores mediocribus, propter instantis humoris crassitudinem. Inflammatione cessante, vlcus ad cicatricem similiter reliquis, est perducendum. Atq; hætenus de carbunculis. Nunc verò de strumis disseram, quas chceradas Græci vocant: quæq; sunt, glandulis in scirrhum affectum mutatis. Est autem duplex ipsa glandularum natura. Quippe nonnullæ earum in quorundam vasorum medio, diductorum in varios ramos, aduendum eorum robur, sunt constitutæ: quarum haud magnus vsus animantibus est. Aliæ verò, ad excipiendam saliuam, vel lac, vel semen, vel aliquem humorem alium gignendum, sunt fabrefactæ. Atq; harum sanè maior est vsus, nec aliter sanandæ sunt, si contraxerint scirrhum, quàm cæteræ omnes corporis partes. At quæ mediū vasorum spatium implent, in iis alia curationis indicatio præstat: qua simul cum vitio etiam pars ipsa tollitur: idq; dupliciter, vel excisione, vel medicamento quod putrefaciat. Sed tempestiuum mihi iam est, vt nonnihil de abscessu etiam dicam: cuius duplex est genus. Vnum, quum phlegmone in pus versa pus ipsi tanquàm in aliquo est sinu collectum. Alterum, quum

Panis puri substantia in cutis meatibus hæret.

Carbunculos post sanguinis missionem esse scarificandos.

Chceradas

Strumarū ortus

Glandularum natura est duplex

Abscessu duplex genus

Atheroma.
Steatoma.
Meliceris.

Nulla præcedente phlegmone, humor aliquis acris
isq; aliàs specie alijs, statim ab initio in aliqua par-
te colligitur, circumposita corpora excorians. Fre-
quentissima verò huius morbi sunt tria genera: nem-
pe Atheroma, Steatoma, & Meliceris: à similitudine
contentarum in tumoribus substantiarum, sic appel-
lata. Est enim aliud eorum veluti seuum, aliud veluti
mel, aliud puliculæ, quam atheram vocant, simile. Cu-
rationis ipsorum indicationes sunt communes: nem-
pe id quod continetur, vel digerere, vel totum putre
reddere, vel excidere. Aliqui igitur eiusmodi tumorū
triplicem curationis rationem admittunt: quotquot
scilicet ex tenuiore humore constant: vt meliceris. Alii
qui duplicem tantum, veluti Atheroma: quippe quod
tum excidere, tum putre facere licet. Steatoma verò,
sola manuum opera curatur: quum nec putrescere pos-
sit, nec digerere. In ijs porro abscessibus, qui in alto cor-
pore delitescunt, ac potissimum in visceribus, medica-
menta quæ ex aromatis componuntur, maximè sunt
ex usu: utpote quorum vis collectum humorem tum
in halitum resoluat, tum digerat. Theriace etiam,
Athanasia, Ambrosia, medicamenq; nostrum, ex Cre-
tica calamintha confectum, vnicè commendantur.
Quicunq; igitur ex tumoribus toto genere existunt p-
ter naturam, ii sui ablationem indicat: vt exempli gra-
tia, myrmecia, acrochordon, calculus in vesica, hypo-
chyma, & mola in vtero: hoc est, caro quædam in for-
mis. Siquidem omnia eiusmodi summouere in eorum
contendimus. Quorum verò etiam locus ipse, affectus
vnà quæpiam naturalium est partium, prima indicatio
est, ut affectus sanetur. Secunda ab hac, si is insanabilis
sit, ut vnà cum vitio pars quoq; ipsa excidatur: sicuti
in cancro, & ulceribus omnibus, quæ curationem re-
spuunt. Econtrario verò in suffusione, quod hypochy-
ma vocant, uicti in prima indicatione, ad alium cam

Abscessibus q
in visceribus
delitescunt, me
dicamenta quæ
ex aromatis cō
ponuntur ma-
xime sunt ex
usu.

Tumores om-
nes præter na-
turam, sui abla-
tionē indicāt.

Hypochyma
est trāspositio.

locum, qui minoris sit momenti, transferimus. Non
desunt tamen, qui hanc quoque euacuare conentur. Iam
verò humor qui in hydrocelis visitor, alienus à corpo-
ris substantia, tota natura est: sicuti etiam quæ in asciti-
tis hydropibus continetur aqua. Quarum cerè vacua-
tionem vel medicamentis quæ digerât, molimur, vel
chirurgia: in hydrocele quidem, immisso siphone: in
ascite verò, punctione adhibita. Quemadmodum au-
tem in iis quæ ante comprehensa sunt, cum affectu ipso
exciditur etiam affecta pars, sic & in herniosis aliquid
peritonæi. Pari modo & columella aliquândo vnâ cum
vitio, amputatur: itidemque in cruribus & in testiculis
vnâ cum varicibus ipsæ venæ. Adhæc tunica in naso
cum polypo, & foratus dens cum foramine. Verùm
ex his nullum est, quod ad naturalem habitum reduci
possit. In columella verò id omnino est conadum: nec
properandum ad eam excidendam: sed quando ad lo-
ri videtur tenuitatem redacta, tunc auferenda est. Si-
militer & excrescentias carnis reducere ad mediocri-
tatem oportet. Danda autem i hisce semper opera est,
ut tum breui tempore, tum citra dolorem, tum quàm
tutissimè cures. Verùm vt tutò cures, tribus sis inten-
tus oportet. Vnum primumque est, vt omnino absolu-
tionem operis consequaris. Alterum, vt sicubi hanc
non psequaris, saltem cubantem non lædas. Tertium,
vt vitium non facillè reuertatur. Ex horum autem cõ-
sideratione facillè cognitu est, quâdo ipsius chirurgie,
& quando medicamentorum ope pugnandum sit. At
chirurgiæ quidem studium, in iis præsertim quæ nunc
sunt proposita, ad interemptionem eorum festinat.
Quod verò ex medicamentis petitur, primò huc ten-
dit, ut quod præter naturam est, tum uacuet, tum di-
gerat: aut si per membri naturam, aut rebellionem vi-
tii non licet, vt id tum in pus vertat, tum putrefaciat.
Similem curationem desyderant iis quæ comprehen-

Hydroceles cu-
ratio.

Ascites curatio
Partes, quæ una
cū affectu am-
putentur.

Columella quæ
sit excidenda.

Medicis dandæ
operæ: esse vt
cito citra do-
lorem, et quæ tutis-
sime curent.

Chirurgiæ stu-
dium.

Naturæ opera
quæ.
Obesitatis cu-
ratio.

Extenuandis
corporibus, ui-
tiisq; articula-
ribus commo-
da medicamē-
ta, quæ sint.
Sal Theriacus
extenuat cor-
pora.
Obesum iuue-
re qua victus
de medicinz
ratione extenu-
uit Galenus.

sa sunt, etiam ea quæ in numero & magnitudine con-
uenientem naturæ modum excedunt: quæq; in iis arti-
culis deficiunt. In quibus amputare quidem conue-
niet quod magnitudine redundat vel numero: refice-
re autem & fingere, quod deest: ubi videlicet fieri id li-
cet. Quintum namq; digitum non licet medico gigne-
re, sed unius naturæ opus sunt omnia talia. Ut autem
à prodigiosæ corpulentæ curatione auspicemur, si q̄s
adeò obesus existat, ut nec incedere, nec respirare pos-
sit, ei calidior sicciorq; temperies (quâdoquidem hæc
corpus exile reddit) est procuranda: adhibitis nimirū
acutis exercitationibus, tenuate victu, & id genus me-
dicamentis, ac deniq; cogitationib⁹ animi. Porro quæ
ad articularia vitia medicamenta adhibentur, quæ sci-
licet valentem incidendi facultatem habet, iis tu q̄q;
quum nimiam obesitatem curabis, utitor. Sunt autē ta-
lia, rutæ sylvestris semen, aristolochia rotunda, minus
cētaurium, gentiana, & polium. Præterea ex urina ciē-
tibus, ea quæ pollentes habet vires, ut petroselinum.
Sed & sal quod ex combustis fit viperis, potenter etiā
extenuat. Ego verò iuuenem quēdam quadragenariū,
oppido q̄ obesum percuravi, usus tum antidoto, quæ
aduersus articularia vitia est composita: tū sale theria-
co, ipsaq; theriace, ac reliquo extenuante victu, & pro
exercitatione, cursu veloci. Præparavi tamen hominē
ad cursum, perfricando primū linteis asperis, quoad
cutis ruberet: dein statim cū oleo, quod in se digerens
aliquod medicamētum habebat: qualia sunt sylvestris
cucurbitæ radix, althea, gentiana, aristolochia, pana-
cis radix, polium, atq; centarium. Per hyemem autem
etiam à balneo reuixisse hominem iam dicto oleo pro-
fuerit. Verū cibum exhibere nō statim à balneo, sed
interposito somno, expediet. Quod si velit rursus etiā
ante cibum lauari, permittes. Magis etiam ad rem per-
tinebit, si aquæ ipsi digerendi facultas, aut insita, aut

etiam adquisiticia insit: Verisimile autem est, aliquādo ex multo simul obito motu febris hominem corripere: quæ tamen ad rem propositā neutiq̃ erit aliena: vtiq̃ si medicus rectè omnia peregerit. Sanè fugere in obessis curandis conueniet vina quæ multum nutriunt: cuius generis crassa sunt: vti uerò, uel aquosis, id est colore albis, & substantia tenuibus: uel quibus aqua marina sit mista. At ubi eos qui extenuati sunt, reficere in animo est, iis vinum exhibebimus crassum, cibum uerò, qui succum efficiat crassum, exercitationes paucas, frictionem mediocrem, ac breuiter omnia iam comprehensis contraria molientur. His uerò etiam picari est commodum, * idq̃ tribus aut quatuor diebus. Hoc quippe ad carnis generationem optimum est præsidium, quum humectet & calfaciat, sanguinis multitudinem accita. Ergo nec assidue picari corpus ægrotans oportet: nec quum oportet, sæpe illinire: uerum i hyeme bis: in æstate semel id fecisse est satis. Itaque quibus cunque particulis bonam habitudinem reddere cupimus, has & fricare, & perfundere, & percutere, & picare oportebit, tantisper dum intumescant. Hoc ubi factum est, protinus desistere conuenit, prius quàm digeri cœperint. Etenim quæ calfaciunt omnia, sicuti attrahere, sic sunt etiam digerere apta. Iam uerò, quibus totum corpus est extenuatum, iis lauari quoq̃ post cibum est congruum: quanquàm timendum sic est, ne iecur eis obstruatur, potissimum propter ciborum speciem: quum nimirū aliter quoq̃ obstruere soleāt, quæ speciem crassam gignunt, si quis his liberalius utatur. Incidit etiam ex tali victu diutius exhibitō, calculi inter renibus generatio. Quod si is qui dicto mōe cibatur, grauitatis sensum in dextris præcordiis aut circa lumbos percipiat, protinus cappari ex oxymelite in principio curationis, donec p̃stiterit grauitas, dabit. Ad membra uero quæ ægrè reficiebātur, ac plusculū iā refrigerata erāt,

Vina extenuanda corpori apta quæ sunt.

Extenuata corpora reficiendi ratio.

Picatio macilentis cōducit.

Frictionis terminus, dum reficere est animus, sit tumor partis.

Cappari ex oxymelite cōfert obstruicōni iecunoris,

Thapsia sanguinem attrahit ad partes quibus fuerit applicata.

Præputii reficiendi ratio:

Præputii inflaurandi duplex ratio chirurgica.

Colobomata

Angulorum diminutiones in oculis quomodo sunt curandæ.

usus aliquando & thapsia sum: aliàs ea ex melle membrum illinens: aliàs etiam ex cerato. Si quidem attrahit ea quoque partibus quibus superposita fuerit, sanguinis copiam. Quibus autem exiguum aliquid pudendi præputio de naturali deest quantitate, iis non raro, sola tensione debitum modum restitui, membranulâ mollem, firmamq; * ex charta, cuti gummi illitæ extrinsecus circumuoluens. Ex interna tamen parte præputio ipsi rotundum aliquid ac mediocre aut ex plumbo, aut ex charta, veluti fulcrum, supponi prius oportebit: quod videlicet, postea quæ agglutinata membranula fuerit, facile eximas. Porro imminutio præputii, duplici chirurgiæ rationi subilicetur: interim in superna pudendi parte circulo incisa cute: quo videlicet eius vnitate soluta, eatenus deorsum trahatur, quoad glandem cooperiat: interim verò scälpro ex interna parte, qua glandis initium est, excoriata, mox deorsum tracta: ac deinde molli vinculo deligata. Similiter quæ in labiis, aut narium alis, aut aure deficiunt (Græci colobomata vocant) curantur: primum quidem ex coriata vtrinque cute: dein adductis, iunctisq; iter se cutiû oris, atq; vtriusque, quod callosum est, detracto: mox quæ reliqua sunt, assutis, agglutinisq;. Eiusdem generis sunt, & quæ in maiori oculi angulo rhædas Græci vocant: utique vel impensus minuto, vel prorsus perduto ipso angulo. At prorsus quidem perduto eo, omnino insanabile relinquitur vitium. Minuto uerò, iis quæ modicè astringunt curatur, si tamē totum corpus primum ante purgaueris: dein caput. Sunt mediocriter astringentia medicamenta, quæ ex glaucio componuntur, & croco, & quæ nardina vocantur: item imprimis & quæ ex vino sunt confecta. In summa verò, quibus aliquid perit substantiæ, maximè quidem curandum est, ut ei quæsimillima substituat. Si id fieri nequeat, saltem aliquid quod eundem præstet usum machinabimur:

ut, exempli gratia, producentes callum pro offe. Por-
 rò venas sensibiles regeneratas aliquando vidimus: ve-
 rum has, non tam similes iis quæ antea perierāt, quæ cas-
 dem renāsci dixeris: veluti in cauis vlcēribus carnem.
 Cicatrix uerò quæ i hac, calli modo durata, gignitur,
 ea cuti quidem est quāmillima: cutis tamen non est.
 Nunc autem ad alia transcamus morborum genera.
 Serpens vlcus, qui herpes dicitur, eiusdem est generis
 cum exulcerato erysipellate. Ramex uerò (quam sarco-
 celem vocant) cum scirrhis. Etenim herpetas biliosus
 procreat succus, sub cute hærens. Quo fit, ut eatenus
 affectus is, eiusdem sit cum erysipellate generis: atque hu-
 ius quoque magis etiam cum eo quod exulceratum est.
 Differt autem ab erysipellate; humoris tenuitate. Est
 enim admodum tenuis qui herpetem excitat. Ex eo au-
 tem quod alter humor altero sit tenuior, crassior uel, vlcē-
 rum differentie, quæ ex profunditate spectantur, pro-
 ueniunt. Huius certè generis est, & quæ phagedæna
 Græcè dicitur, & exulcerati cancri. Quorum omnium
 communis curatio est, ut inhibeatur primum humo-
 ris confluxus: post sanetur vlcus. Propria uerò cuiusque
 tum ex membri inuenitur natura: tum ex humoris non
 solum specie, sed etiam quantitate. At tenuissimus qui
 dem in eiusmodi humoribus est is, qui exulceratum
 herpetem excitat: crassissimus, qui cancerum. Proxi-
 mum ab his locum occupat, quod ad crassitudinem at-
 tinet, qui phagedænas producit. Harum species quæ-
 dam sunt, quæ Chironia, & Telephia dicuntur. Si quis
 igitur, toto prius purgato corpore, mox quæ influen-
 tem humorem reprimant, regeantque, medicamentis
 utatur, iam curauerit herpetem. Sin neutrum horum
 fecerit, sed tantum ea quæ cicatricem inducunt, adhi-
 buerit, utique exulceratam cuticulam sic sanauerit: pro-
 xima tamen illi, quo minus exulceretur, non consu-
 luerit. Postmodum uerò, illa quoque cicatrice inclusa,

Venas sensibi-
 les regeneratas
 vidit Galenus.

Cicatrix adna-
 ta vlcēri non
 est cutis.

Herpes eiusdem
 est generis cum
 exulcerato ery-
 sipellate.

Ramex.

Herpes ab ery-
 sipellate quomodo
 differat.

Phagedæna.
 Cancri exulce-
 rati.

Chironia ulce-
 ra.

Telephia vlcē-
 ra.

Herpetis cura-
 tio.

Herpetis miliaris descriptio.

Humores qui facilius & qui egri vacuent. Acrochordos Myrmeciaz. Verrucarū curatio.

quæ ipsi continua est, exulceratur: idq; longo spatio, ceu malo ipso serpente, sit, donec humor, vnde oritur, sit inanitus. Vacuandus itaq; est per eiusmodi affectus semper is qui redundat humor: aliquando medicamentum quod flauam purget bilem: sæpe eo quod nigram: modò eo quod miste sit facultatis: quodq; simul bilem & pituitam educat: veluti in miliari herpete: qui non protinus vlcus facit, quemadmodum alter: sed admodum exiguas pustulas, ad speciem milii: quæ ipsa, interposito spatio in vlcus etiã degenerat. Adeò non absq; ratione quibusdam est visum, in eiusmodi vitio bili esse aliquid pituitæ cõmistum. Cæterum ad generationem vlceris, in his quæ extrinsecus admouentur, exuperare debebunt, quæ repellendi facultatem habent. Vbi verò non amplius confluit in ægrotatem particulam vitiosus humor, quæ digerunt. Siquidem exiguum vitio si humoris etiam si quis ad viscera reprimat leue dānū cõmitter. At si eius quantitas sit momētanea, in princeps aliquod membrum aliquando procumbit. Ac repellunt quidem, non solum ea quæ astringunt, sed etiã quæ sine astrictione refrigerant: digerūt verò, quæ cal faciunt. Porrò flauæ quidem bilis vacuatio est facilis: pituitæ verò, & nigræ bilis, difficilior: quo magis purgantis medicamenti ope indigent. In herpete aut, quoniam tenuis est humor qui ipsum creat, abunde est et alium soluisse: vel vrinas, per ea quæ id modicè efficiūt, citat se. Quod verò ad acrochordos & myrmecias curandas pertinet, non deest Romæ qui eas apprehensas pri moribus dentibus exterat. Sed & scalpro ad myrtacei folii specie formato, & ferramēto qd scolopomachæ, riō dī, eas faciliè quispiã excidere possit. Acquē verò & valente aliqua pinna circulo myrmeciaz iposita, ipsam educimus. Debet tñ pinnæ fistula esse myrmeciaz crassitudini par, ut eam undiq; prorsus constringat. Quæ postea circumacta, ac simul deorsum impulsā, celerrimè ita

myrmeciam totam etiam cum ipsa radice educet. Iam
 verò, quæ uehementer attrahentibus sursum myrmecia
 velletur, & putrefacientibus enecabitur, ratioe ab ali-
 quo inuentum est. Quum igitur interdum quædam partes de-
 ficiant, quæ adesse debuerant: quædam verò redudent;
 quorum non erat opus: adinire quidem quod superuaca-
 neum est, sanè haud difficilè fuerit: aliud verò produce-
 re, quod simile ei sit, quod desit, id in quibusdam quidem
 est facile: in quibusdam difficile: in aliis planè fieri non po-
 test. Si namque carnosum sit quod deest, haud magno ne-
 gotio id reficias. Sin os sit, ipsum quidè instaurare non
 licet: cæterum aliud pro eo durum efficere. Diximus
 autè uidisse nos venas alias sensibiliter generatas. At si
 digitus desit, is restitui non potest. Cæterum quæ in na-
 so, vel aure, vel labio sunt curta, ea quidem ut refecis-
 se non licet, sic decorem aliquem his adicere licet, si
 quis diuisam vtrinque cutim, mox in vnum conductam
 queat agglutinare. Porro quemadmodum in sinuosis vl-
 ceribus generatio carnis, sic in capite & palpebris pro-
 ductio pilorum, opus naturæ existit. Etenim ex succis
 qui per cutim transpirant, quod limosum est, id pilos-
 tum à principio gignit, tum de cætero ueluti succe-
 scendo auget. Hoc igitur, quoties vel prorsus periit,
 vel redditum est vitiosum, toties pilos corrumpi est
 necesse. Corruptuntur namque & stirpes ipsæ duplici
 de causa: aliàs nutriente succo destitutæ: aliàs non
 idoneo vsæ. Ac prorsus quidem perduto eo qui pi-
 los alit succo, caluities oritur. Eodem vitiato, ophia-
 ses & alopecie proueniunt. In quibus & inhibere
 quod influit, & absumere, & digerere, quod iam oc-
 cupauit languentem locum, conueniet. Ergo ceu in vl-
 ceribus illis purgationem nocentis succi primum ad-
 hibuisti, eodem modo in pilis ipsis ab hac primò exor-
 dienda curatio est: scilicet æstimato prius cutis colo-
 re, cuius cernis corruptos pilos. Nam si is albidior

*Carnosa resti-
 ci facile.
 Os instaurari
 non potest.*

*Naturæ opera
 quæ.
 Pilorum genera-
 tio unde.*

*Pilorum corru-
 ptela unde ac-
 cidat.
 Stirpes dupli-
 ci de causa cor-
 rumpi.
 Caluities.
 Ophiasis.
 Alopecia.
 Pilorum vitiis
 quomodo suc-
 currendum.*

quod pro naturæ habitu sit, pituitosi humoris purgationem molieris: sin pallidior, eiusmodi bilis purgationem: non secus quam si nigrior conspicitur, quæ nigram detrahunt bilem offeres. Quum autem iam planè purum ex purgatione corpus aestimas, cum qui in cute continetur humorem digerentibus medicamentis discuties: sic tamen ut in his caueas, ne adeò calida, acrisque admouearis, ut cutis exulceretur. Quineriani ea quæ valenter siccant, cauere conueniet: ne videlicet cum vitiato humore, vitilem etiam absumas. Ego verò iis medicamentis quæ alopeciam sanarent, exiguum thapsiæ admiscui. Cæterum ubi vel tumefactum plusculum, vel exco-
 riatum ex ipsius usu, pericranium conspexi, illo quidē die, à medicamento abstinui: illeui autem particulam, vel galli, vel anseris liquato seuo: deinde postero die, sin nihil tale apparuerat, rursus eodem medicamento sum usus. Iam eos quibus periere ciliorum pili, simili-
 bus genere medicamentis sanabis: neutiq̃ tamen com-
 mitteres, ut medicamentum intra oculorum tunicas cō-
 fluat. Quare sicca longè tutiora existant. Porro ptery-
 gium, tametsi à sanitatis habitu sit alienum, non tamē
 substantiæ ratione, quemadmodum atheroma & meli-
 ceris, à natura alienum existit. Eius verò sanatio, si q-
 uodam paruum et molle sit, per ea medicamenta quæ de-
 tergent, perficitur. Vbi magnum, durumq̃ euasit, chi-
 rurgiam postulat. Simili ratione & æquularū quæ ma-
 gnæ sunt, chirurgia curabis. Quæ parvæ existunt, sic-
 cantibus medicamentis curantur. At chalazion, quum
 toto genere sit à natura alienum, auferri postulat. Ad
 eundem modum & oculorum pus. Verū id plerumq̃
 medicamentis digerit. Hypochyma verò iā incipiens
 digeritur: ubi diu constitit, non potest. Iustus medicus
 ætate nostra concussione capitis multos hypopios sa-
 nauit. Mansit enim horum pus deorsum, propter gra-
 uitatem substantiæ. Hypochyma autem leuius quum

Thapsia vte-
 batur Galenus
 ad alopeciam
 curandam.

Pterygi cura-
 tio.

Aquularum cu-
 ratio.

Chalazij cura-
 tio.

Oculorū pus.

Hypopios sa-
 nabat Iustus ca-
 pitis cōcussio-
 ne.

fit, nebulæq; similis q̄ pus, haud ita dehiscere potest. Cæterum quod serosioris naturæ est, id punctione ad præsens discutitur: interposito tamen haud longo spatio, ceu vini fæx quædam defertur. At quâdo pus oculorum digerere est animus, collyriis quæ myrrham habent, maximè utemur. Quæ verò vehementer siccât, ad præsens certè valenter uacuât, sed quod reliquum est, ita cogunt, ut ægrè resolui possit. Multum autem puris vacuabimus, diuisa tunica ceratoide, paulo supra coronam. Sunt præterea ex genere eorum quæ tota substantia præter naturam dicuntur, & ascarides, & elminthes: siue eæ rotundæ sint, siue latæ. Quocirca expelli prorsus eas è corpore expedit. Expelles autè, si prius enecaueris. Enecabis amaris medicamentis. Ac teretes quidem absynthium perimere potest. Latæ vehementiora medicamenta desyderât, sicuti & quæ ascaris Græce vocatur.

Hypochyma
semel discussū
punctione, re-
uertit.

Oculorum pus
colliria ex myr-
ra discutunt.
Pus oculorum
vacuari diuisa
tunica ceratoide
de paulo supra
coronam.
Ascarides.
Elminthes.

Vermes perī
mūtur ab ama-
ris medicamē-
tis.
Teretes.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E A R T E C V R A -

T I V A A D G L A V C O -

N E M. L I B E R. I.

C A P. I.



N O N Communem tantum oīum hominum naturam medicū cognoscere oportet, sed etiam vniuscuiusque propriam. Non tamen proprium singulorum naturam; æquè atq; communem, possibile est scribere. Quum igitur ad rectè medendum plurimum conferre temporis occasio, & quantitas auxiliorum, uideatur, hæc autē propria in vnoquoq; ægro se contemplanda obiciant, nec quicq; proprium possit sermone explicari: ob id nō

Naturā cuiusq;
propriā, medi-
cum agnoscere
oportet.

mirum quod commune est, scribere cogimur, quis id sit usu secundum. Etenim, quantum quisque à naturali recessit habitu, ad tantam morbus magnitudinem peruenit. Distantiam verò recessus, facile deprehendet is, qui naturalem vniuscuiusque ægri statum exquisitè cognorit. Quod quidem quum nobis non liceat, confuginus ad cōes notiōes: in quibus artifex plus aliquid, quam inertes, assequitur. Porro qui omnia quæ secundum naturam & præter naturam sunt, diuisione artificiosa complexus fuerit, atque ab iis omnibus, quæ sufficiēter diuisa erūt, indicationes sumpserit, solus is, quantum humanis permittitur uiribus, minimè errabit medendo. Atque illos quidem quorum habebit notitiam, melius curabit, quam cæteros. Ignotos verò, proximè illis, quoad fieri poterit ad sanitatem perducet. Si quis enim primum distinxerit differentiam ætatum: postea eam quæ secundum temperaturas, potētias, colores, calores, habitudines, pulsum motus, assuetudines, industrias, animique mores habetur: atque his quoque adiunxerit maris fœminæque discrimen, expenderitque regionum, temporū, atque adeo ambientis aeris temperies, hic ad propriam laborātis naturam agnoscendam proximè accedet. Nunc verò de his solum ægrotis dicere proposuimus, quorum natura, ante quam morbum contraherent, nobis erat exquisitè perspecta. Cum quibus tamen & reliqui omnes intelliguntur, qui nobis erant ignoti.

De febribus ephemeris.

Cap. I I.

Ephemerarū
causæ.

Febres cum bu-
bone, si absque
ulcere oriatur,
sunt suspectæ.

Primò igitur de ephemeris febribus, utpote simplicissimis disseramus: quæ nimis ob lassitudinē, ebrietatem, iram, excandescētiā, mœrorē, atque alias vehementes animi sollicitudines excitantur. Ex quarum genere sunt, quæ ab inguinum inflammatiōibus trahunt ortū, præter quam si absque ulcere fiant manifestæ. Tunc siquidem & suspectæ sunt, minimeque mites apparent. Vigiliæ plerumque induxerunt simplicem fe-

brem: sicuti frigefactio, & exustio quandoq. Atq. hæc omnes febres soluuntur facillimè, in hunc modum. Oportet enim ipsos cōfestim ducere ad balnea: deinq. ad cōsuetam victus rationem. Nam qui triduanum terminum absq. cibo expectāt, sæpius actiores febres efficiūt. Quum igitur ad ægrum accedes, primū à maximis quæ circa ipsum sunt, est cōsideratio inchoanda: deinde & ab aliis: ad eū vt nec minimū quicq. omit-
 tas. Nam ut magis aut minus ei quæ sit ex maximis indicationi credamus, ex aliorum sit adiunctione. Maxima quidem in omnibus febrientibus signa in pulsibus atq. vrinis consistunt. His verò addere oportet, quæcūq. alia circa faciem scribit Hippocrates: accubitu quoq. & respirationem. Itē ea quæ ab ore excernuntur, atq. alui sedimina: & si quid aliud accidere circa aliquā corporis partē, aut operatiōem videris. Quæ omnia cōia sunt omnibus febribus. Postq. itaq. ex pulsib. atq. vrinis febris naturam perceperis, quum pulsus nullū inflā-
 tionis signū habuerit, neq. oīno inæqualitas in aliqua arteriæ cōpulsione se ostenderit, aut si hoc adfuerit, omnino sit imbecille: vrinæ autē, aut prorsus similes iis quæ secundum naturā se habent, aut non multū à naturali statu recesserint: tunc sanè & ad oīa illa, quæ nuper à nobis exposita sunt, accedere oportet: & quū veluti chorus quidā oīa pinnè loquuntur, tunc certè fidere oportet, ac, si libeat, interrogare, nūquid aliqua manifesta antecesserit causa. Siquid enim huiusmodi æger fateatur, expectata prima febris solutiōe, statim oportet lauare: quū tūc certior sit tibi facta cognitio, ex ipso solutionis modo. Nam arteriæ motus in hoc in totū assimilāt ei, q. in sanis deprehendit: quū i nulla alia febre ad naturālē habitū reuertat. Iā hōd plurimis ephemerarū humidī qdā vapores, & quibsdā ēt sudores viles aspiciunt, accessione cessante. Quo tpe ēt vrinæ multo meliores, q. circa febris initia, videbūt: & si ca-
 Ephemerarum curatio.
 Inedia tridua-
 na ex epheme-
 ris reddit actio-
 res febres.
 Signa maxima
 in omnibus fe-
 bribus a pulsi-
 bus & vrinis
 petuntur.
 Ephemerarum
 signa.
 Pulsus in natu-
 ra febris in-
 termissione ad
 naturalem sta-
 tum reuerti p-
 terquam in e-
 phemeris.

Diarrhœa solo
tione quæ ac-
cidant.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

CHIL.

pitis aut alteri⁹ partis dolor, simul inuaserit, neq; hic ant
pius p̄sistet. Aegrotantis q̄q; in tolerādo facilitas, ma
gnū & ipsa signum, febris suauitas ē tibi indicabit. Et si
dum lauantur, nec horror aliq; insolitus molestauerit,
nec alia tristitia adfuerit, post balneumq; & deinceps
benē se habere perseueret, tunc ne uerearis offerre cū-
hum, & vinum: adhibito tamen pro tempore modo.
Communiter autem omnibus detentis ephmera, urī
næ rufæ excernūtur. Adiungitur verò his qui propter
tristitiam febricitant, acritudo potius q̄ abundantia ca-
loris: quemadmodum ē diuerso iis, qui propter furo-
rem. Sed & extenuatio corporis in iis quos tristitia aut
cura vexarunt, cōspectior existit: oculorum præterea
canitas, & quædam inconsueta decoloratio. Hæc qui-
dem sunt & iis qui quouis modo aliter cogitarunt, cō-
muniā. Maxime itaq; ex oculis distinguere oportet.
Nam ex his etiam in sanis animæ mores conicere pos-
sumus. At eos qui diu vigilarunt, arguit quædam pale-
loris forma, faciesq; subtrumens, * nec non ipse ocu-
lorum mot⁹, quo vix palpebras, humore quodam im-
bitas, attollere possunt. At qui tristantur, aut cogita-
tionibus detinentur, iis exiccantur palpebræ. Cautas
est commune accidens omnibus, mœrori, vigiliis, co-
gitationibus, non tamen furori. In hoc enim, nec ocu-
lorū canitas, nec manifestus pallor: & plus caloris atq;
celerius ex imo prorumpit: nec pulsum magnitudo
destruitur, quemadmodum in vigiliis, tristitia, & cogi-
tationibus. Eorum etiam qui ex lassitudine in febrem
inciderunt, cutis est sicci⁹, q̄ in aliqua alia epheme-
ra. Quæ autem ex densata cute accidunt febres (densa-
satur enim aut ex frigore, aut ex aliqua qualitate astri-
gente) hæc quidē, solæ inter omnes febres, passio astri-
cta existunt: ac vel solo tactu noscuntur: tum ob densi-
tatem cutis, tum ob differentiam caloris, qui mitis qui-
dem in primo tactu sentitur, acris autem, si plusculum
tendemus.

Ephemeræ a
densata cute
discernēdi rō.

tardem⁹. Non tamen & his vrinæ sunt ruffæ: neq; moles corporis concidit: neq; oculi redduntur aut caui, aut aridi: sicuti nec pulsus minores, quemadmodum in mœrorib⁹, curis, vigiliis, aut exercitiis imoderatis.

De febribus ex inflammationibus inguinum. C. III.

Febres quæ ex inguinum inflammatione fiunt, pulsus habent maximos, veloces, atq; frequentes: plurimusq; illis calor inest: ac postq; febris constiterit, statim ex profundo quædam emergit humiditas, calida quidem, sed mitis. Atq; in totum facies rubicunda illis, & magis tumens, vrinæq; subalbida. Communis autem omnibus huiusmodi febribus est pulsus æqualitas. Curare igitur omnes quidem oportet balneis. Cæterum qui ex cutis densitate, aut inguinis inflammatione febricitant, si in aere balnei immorari iusseris, haudquaquam nocebis. Reliquos omnes quicquid sit oporret ab aere semouere. Si uero diutius in aqua immorari uoluerint, permittere. Oleo autem multo, & tepido, & manibus mollibus perfricare quæ plurimum, sed eos præsertim, qui ex labore febricitant. Secundo autem loco, quæ meatus habent astrictos: ac tertio, qui inguinum patiuntur inflammationem: quos nimirum sæpius lauare expedit. Cibum autem cōcoctu facilem assumere qui ex labore febricitant, possunt multoties: non æquè tamē, qui ex densitate cutis, aut inguinis inflammatione laborant: quorum est uersisq; tenuis victus est utilis. Sed & vinum potare quantum possunt convincere, sunt permittendi, quibus labor febris occasio extitit. Mensuræ autem ratio, ex uiribus & ætate sumitur ægrotantis: necnon ex naturali temperie, consuetudine, anni tempore, & regione, aliisq; id genus. Qui uero ex inguinum inflammatione febricitant, arcendi sunt à vini potu, donec inflammationes soluantur. At, qui cutis foramina habent astricta, aut refrigerati sunt, si quidem non multum hoc affectu laborent, nec plenum corpus ha-

Ephemeris ex inflammatione inguinum, quæ accidunt.

Ephemerarum curatio.

Ephemeris uictus ratio conueniens.

Mensuræ ratio in exhibitione alimēti per ephemerarum febres, ex quibus sumatur.

GAL. PERG. DE AURT.

**Vini potus qui
bus cōueniat
ephemeris.**

beant, non sunt à vini potu prohibendi. Quj autem su-
pra modū refrigerati sunt, aut pleniore corpore, pro-
hibere vtile est. Rursus, qui ex vigiliis, aut aliquo ani-
mi affectu feбриunt, postq̃ balneaueris, cibo humido ac
boni succi reficere oportet: vinum verò omnibus iis
qui vigiliam passi sint, intrepidè offerre, nisi capitis do-
lore premantur, aut pulsū venarum in temporibus
sentiāt. Sed & iis qui ex ira aut micore aliquo, aut co-
gitatione febricitant, vinum est exhibendum: sicuti et
illis, qui furore perciti fuerunt, quando omnino per-
turbatio fuerit refrigerata: nam prius sanè vsus vini
erit periculosus. Tētare autē oportet semper adfer-
re contrarium ei quod infestat: labori quidem, quietē;
vigiliis somnum: irā, furori, & tristitiā, sermonibus,
actionibus, spectaculis, enarrationibus, animi iucundi-
tatem. Sic qui ex cogitatione laborat, omnino ratioci-
nationes omittat. Et qui ex inguinum inflammatione
febricitat, eius curationi intendant: ac multo prius vlce-
ris, vnde originem habuit. Atq; hactenus de epheme-
rarum indiciis, remediisq;. Reliquę verò febres, nōnul-
lę ex inflammationibus: nonnullę ex humoribus ac-
cenduntur. Et quę ex inflammationibus fiunt, sunt velu-
ti symptomata quędam partium inflammatarum.

De febribus putridis.

Cap. IIII.

**Februm putri-
dum differētię.**

AT quę ex humorum putredine accenduntur fe-
bres, eę & dicuntur putridę, & sunt non mor-
borum symptomata, sed ipsę morbi. Ex his ve-
rò nonnullę quidem absq; accidentibus accidunt, &
mitissimę sunt: nonnullę item, cum accidentibus ur-
gent. Earum igitur, quę accidentibus carent, paucę q̃-
dem ad exactā sui cognitionem, diē quartū desyderāt.

De signis februm intermittētiū.

Cap. V.

QVę igitur cū rigore inuadunt, non ab re ex-
carum esse numero iudicabis, quę per circui-
tus infestat. Tertianę enim atq; quartanę,

In totum cum rigore accessiones faciūt. Sed tertianæ quidem in primo insultu cum nimio sæpe rigore incipiunt: quartanam autem non vidimus cum vehemēti rigore incipientem, sed procedente tempore magnitudo ei supuenit, præter id, q̄ nec statim ab initio hæc febris vt plurimum solet inuadere, sed aliis quæ antecesserint, subsequi. Quartana itaq; solet errabundis febribus supuenire. Quotidiana verò, raro accedit absq; læsione oris ventriculi. Rursus quartana ex male affecto splene gignitur: vt tertiana ex affectu iecinoris. Quæ verò cum valido rigore incipit, magis febris tertiana, q̄ aliqua aliarum febrium fore speratur. Quòd si reliqua etiam signa attestentur, hanc dubio procul in prima statim die tertianam esse cognosces. Etenim calor multus & acris adesse debet: pulsus autem magni, calidi, vehementes, veloces, atq; frequentes, omnisq; inæqualitatis, præter quàm febrilis, expertes. Rigor porrò, veluti si à re aliqua acuta, pl^o quàm frigida, corpus perpungeretur: quum ii qui quartanam aut quotidianam intermittētem patiuntur, potius frigidum rigorem percipiant. Tempus autem anni æstiuini: sicuti & locus, & præsens status calidus. Sit autem & ægro tantis natura calidior, & biliosior, & ætas adolescētis: & exercitationes potius quàm ociositas antecesserint: magisq; deustio, q̄ frigefactio, & parçitas cibi, potius quàm crapulæ. Vigiliæ quoq; mœrores, atq; labores, & intensæ cogitationes, ad eundem affectum perducunt. Quòd si multos alios eodem tempore laborātes contigerit tertianis corripi febribus, hoc quoq; maximum aliquid, præter ea quæ nuper diximus, signum erit. Si igitur hæc omnia adfuerint indicia, aut saltē quæ maxima sunt, & sitis quoq; vehemens adiūgatur, vomitusq; bilis, aut sudor, vel vtracq; superuenerint, tunc nulla dubitatio relinquitur. Quòd si inter hæc a febre quicuerit homo, hæc inquam quæ ex suo motu

Quartana nō solet ut plurimum statim a principio inuadere, sed aliis subsequitur. Intermittentiā singulæ, quartū partium comitentur læsio ca.

Febrē tertianā q̄ arguāt.

ant. lib. 1. c. 10.

est omnibus nota, propria verò febrium inæqualitas, in arteriarum motu relinquatur, tunc firmiter poteris esse tertianam febrem ostendere, ac si tertio iā die accessiōnem fecisse vidisses.

De signis quartanæ.

Cap. VI.

Quartanarum
indicia.

Dum rigent qui quartanā tenentur, pulsus habēt satis tardos & raros. Quum autem consistit febris, atq; etiam augetur, necesse quidem est, vt velocēs fiant, atq; frequentes. Seruatur tamen & tunc propria ipsius tarditas, raritasq; si additam velocitatem atq; frequentiam in accessiōnibus mediteris. Iam quæ omnibus cōmūnis est febribus, in vno pulsu inæqualitatem, in hac manifestissimè licet comprehendere. Multo namq; velocius principium, finemq; motus inuenies, q̄ medium. Præterea æstus, & deussionem, & quendam veluti feruorem, qualis in tertianis videtur, in quartanis haudquā inuenies. Sed & ægrotantis natura inspiciunda est, an atra in ea bilis abundet: & tēpus quoq; anni, an sit autumnus; & præsens status, an inæqualis. Sic verò & loci natura, & morborum peruagantium vulgariter, & an lien incumuerit, febrisq; antecesserit inordinata, & ætas senior q̄ cōsistentium: & an cum sudore febres desinant. In his verò bilis fluxus vomitus minimè expectādus est: quemadmodum nec in quotidianis intermittētibz. Hoc etenim tertianarum est proprium signum. At quum febris cessauerit, si adhuc vestigium febris remāserit, pulsusq; iis, qui secundum naturā, rariores atq; tardiores fuerint, quartana proculdubio erit huiuscemodi febris.

De signis quotidianæ intermittētis. Ca. VII.

Quotidianarum
indicia.

Quotidianæ intermittētis calorem humidiorē cum quadam acrimonia esse oportet: non quum primum manus admouetur, occurrētem, sed per moram. Nam quædam fumosa caliditas cum multo vapore cōmixta perspirare videbitur. Sed

& his longè minores sunt pulsus pulsibus quartanarū,
 q̄ istarum pulsus pulsibus tertianarum. Rursus verò tā-
 to rariores sunt in quotidianis intermittētibz pul-
 sus, his qui in tertianis, quanto illis pulsus quartanarū.
 At tarditas in vtriscq̄ eodem modo se habet. Minus ve-
 rò siticulosa hæc febris est: tantūq; eā quartana ex-
 cedit, quantum istam tertiana. Humidissimum etiam
 totum corpus in his febribz est, & vomitus pituitosi.
 Quæcunq; autem excernuntur per ventrem, frigidio-
 ra, humidiora, crudiora, et pituitosiora existunt. Et qui-
 dem ætatibus, naturis, anniq; statibus & temperaturis
 humidioribus hæc febres accidunt. Nam adolescentem
 biliosa & sicca temperatura, nunq̄ vidi quotidiana cor-
 ripi febre. Pueri autem, præsertim minores natu, et ex
 adultis pituitosi, & habitudinis crassæ, atq; ocio pluri-
 mo dediti, necnon crapulis, ebrietatibus, balneis as-
 duis, post cibum præsertim, vtentes, facillè à quotidia-
 nis capiuntur. Loca etiam humidiora, atq; ex anni tē-
 poribus hybernum, ex statibusq; humidiores, hanc p̄-
 cipuè conciliant febrem. Quod si populariter etiam
 grassetur, hoc quoq; non parum ad eam dignoscendā
 conducet. Non tamen harum febrium declinationes,
 quemadmodum tertianarum & quartanarum, sudori-
 bus terminantur. Quare neq; ad integram quietem,
 exceptis paucis, perueniunt. Quotidianarum vrinæ
 sunt albæ, & tenues, vel crassæ & turbulentæ, vel rubi-
 cundæ. Tertianarum rufæ, vel surrufæ. Quartanarum
 variæ quidem, sed crudæ omnes.

De signis febrium continuarum. Cap. VIII.

Febres autem continuas hinc cognoscēs, q̄ nullum
 eis adest signum ex iis quæ adesse intermittētibz
 diximus: & q̄ intra quatuor & viginti horas nō ces-
 sent. Si uerò inæquale incrementum habuerint, hoc q̄
 dem, præter alia signa, longius etiam tempus ostendit:
 p̄tenon si proprium febrium signum in pulsibus ma-

In angustis
 Quotidianæ
 quos præci-
 pue solent cor-
 ripere.

Quotidianarū
 declinationes
 non terminant
 sudoribus.
 Urina intermit-
 tentiū singulis
 propria.

Febrium conti-
 nuarū indicia.

nifestum adfit. Quòd si inordinatio etiam ac inæqualitas ipsis vel inconcinuitas insit, & hoc etiam indicium simul magnitudinis atq; continuiraris. Si verò in hoc statu permanentes, tertio die maiorem accessionem ostenderint, aut excrementa & vrinæ omnino crudæ apparuerint, non possunt huiuscemodi febres ante septimum diem terminari. Ad hæc si quarta die, tertiæ diei similis fuerit, & febris veluti deurens, nec facies, aut reliquum corpus collabatur quicq; huiuscemodi febris ad longius extendi tempus consuevit. Ac tales quidem sunt differentiæ earum febrium, quæ accidentibus carent. Curatio autem cuiusq; earum

Tertiana est breuissima, mitissimaq;.

Quartana est longissima, mitissimaq; periculosa.

Quotidiana est plura, neq; vacons periculo.

Acuti & veniosissimi morbi, tenuissimæ dictus ratione postulant: ubi magis longiores.

Tertiana exquisita ad maximum septem circuitibus iudicatur.

Quartana ad maximum octo circuitibus iudicatur.

Quotidiana ad maximum decem circuitibus iudicatur.

deinceps scribetur: primum tamen intermittentium: dein continuarum. Ex intermittentibus igitur breuissima mitissimaq; est tertiana. Longissima autem, & quantum in ipsa est, haudquaquam periculosa, quartana. Quotidiana verò, & longa, & non sine periculo. Porro * ubi morbi existunt acuti, celeriter q; ad statum perueniunt, & si valde tenuem victum exhibeas, non multum lædes. Vbi verò sunt diuturniores, nisi ab initio cibo vberiore reficias, hominem simul cum morbo perimes: aut intempestiuè victus modum commutabis. Neq; enim oportet statu accedente offerre largiorem cibum quàm prius: sed contrà, potius tenuissimum victum, qui in toto morbo exhibeatur, in statum reservare. Distinguendum autem est, num exquisita, an minimè exquisita sit febris. Etenim exquisita tertiana, ad maximum, septem circuitibus iudicatur: estq; minimè periculosa. Alteram verò non exquisitam, quandoq; vidi, quum in autumno incepisset, in uere desuisse. Quantum autem hæc natura inter se differunt, tantum rationabile est & rationem victus mutare. Ergo si quæ in principio sermonis tertianarum febrium indicia scripsimus, omnia adfuerint, exquisitâ reddunt tertianam. Cuius accessionis tempus breue;

quatuor, aut quinque, aut sex: at longissimum, vnde-
cim aut duodecim horas complectitur. Atque huiusmodi fe-
brium vrinæ, tertio die, aut ad summum quarto, co-
ctionis signum ostendunt. Quibus sanè indicia exquisi-
tam, à non exquisita tertiana distingues. Eadem quoque
ratione exquisitam quartanam & quotidianam. Cui
enim omnia insunt indicia, quæ in quartanis febribus
antea descripsimus, hæc vera & exquisita est quartana.
Cui verò minimè, spuria & non exquisita existit. Quo-
tidiana etiam cui omnia quæ diximus insunt, exquisi-
ta est: quæ autem eam naturam non habet, spuria. *
Non igitur quemadmodum exquisitæ quotidianæ &
quartanæ, sic etiam non exquisitæ, sunt longæ. Nam
quemadmodum exquisita tertiana est brevis, sic & quo-
tidiana & quartana diuturnæ. Cæterum non licet no-
bis bene prænoscere, nisi quantitatem morbi atque vi-
rium accuratè expendamus. Etenim si vires adeò vali-
dæ fuerint, ut morbum vincere possint, necesse est æ-
grotum euadere. Sin verò contrā, omnino morietur.

De cura exquisitæ tertianæ.

Cap. I X.

Exquisitam ergo tertianam, ut quæ ex flaua bile
commota inualescat, quæ maximè fieri potest, refri-
gerare, atque humectare oportet. Nam contrario-
rum contraria remedia sunt: quæ quidem quod super-
fluum est, reprimant: quod verò deficit, suppleant. At
flauæ bilis humor, omnium qui in corpore sunt, aridissi-
mus, calidissimusque existit. Hunc igitur, quum ad ve-
triculum repit, per vomitum educere oportet. Quum
verò vergit ad inferiora, eodem modo per aluum: id
quod fieri solet sponte, in exquisitis tertianis. Per vri-
nam quoque & sudores oportet ipsum vacuare. Ac ven-
ter quidem, mollibus clysteribus inaniendus est: uri-
na verò, potionibus, in quibus apium, aut anetum ma-
duerit, promouenda. Quod si tibi coctionis signa mon-
strentur, iam cum fiducia aliquid absinthii exhibebis:

Tertianæ ex-
quisitæ accessio,
duodecim ad
summū horas
complectitur.
Exquisitæ in-
termittentes
non exquisitis
quomodo di-
stinguantur.

Præcognosce-
re illi non licet
qui morbi &
viriū magnitu-
dinem non ex-
penderit.

Tertianæ ex-
quisitæ curatio.
Contrariorum
contraria reme-
dia sunt.
Flaua bilis qua-
lis sit humor.

Vrina quæ
uocatur.

Absinthii esse
rem edii sum-
mum, contra bi-
lis molestias.
Balnea dulcia
cur tertianę fe-
bris auxiliant.

Alterare inua-
lescentes quali-
tates febriles,
q̄ uacuare, ma-
gis conducit.

Vini correptis
tertiana propi-
nandum nō ef-
fe anteq̄ appa-
reant signa co-
ctionis.

Tertianis ex
quiritis quę vi-
ciis ratio con-
ueniat.

Suum pedes &
cerebra cōfer-
re tertianis nec
non assas por-
culi carnes.

quod alioqui summum est remedium, vbi infestauerit bilis, si præsertim ex ipsius coma, quantum sit satis, accipiens, mellificato intinxis. Balnea verò calida, ex aqua potabili profunt: tum quia aliquid bilis educunt: tum quia sua qualitate & humectant, & potentia refrigerant. At marinæ aquæ salæ, nitrosæ, & sulphuræ, plus quidem bilis educunt, sed magis sua qualitate nocent, quàm euacuationibus iuuent. Sæper autem oportet contrarias qualitates, illis quæ inualuerint præternaturam, opponere: quò hoc multo plus iuuet, quàm quomodolibet euacuare. Hic itaq̄ in balneis scopus sit, vt corpus madeat, vtq̄ humectetur. Vbi igitur plurimum olei calidi infuderis, ad aquam perducere, ac madefacere oportet. Quòd si in ea natare voluerint, quantum id facere possunt, permittendum. At qui balneis admodum delectantur, si etiam bis in die lauari permiseris, non aberrabis. Sed illud semper habeto in memoria, vt tempestiuè id faciant. Si verò etiam coctionis signa ostendantur, si sæpius laueris, nihil deliquis. A vino autem, ante quàm morbus coquatur, prorsus est abstinendum. Verùm vbi concoqui is cœperit, dandum est ab initio tenue, aquaticum, atq̄ paucum. Vbi verò iam prope est, ut morbus solvatur, amplius est offerendum. Cibi autem quicunq̄ humectant, atq̄ refrigerant, omnes viles sunt exquisitis tertianis. Cæterum quantitas in ipsis sit tanta, vt bene concoqui possint. Ex oleribus quidem, acrisplex, blitum, lappathum, malua, lactuca, & cucurbita. Ex aliis verò, prisanæ succus, sorbitio ex alica, ex piscibusq̄ saxatiles. Ex uolatilibus deniq̄ ea, quæ mollibus cōstant carnibus. Quæ autem talia non sunt, eorum alæ: testiculi quoq̄ gallorum, & suum pedes, & cerebra. Paruorū, però si etiam dederis carnes assas, nihil nocebis. Sed & qua ad sorbendum sunt offerenda: & præsertim vitelli corum: nam hi facilius quàm pars alba coquuntur.

Ex fructibus aut illos tñ degustent, qui nō sunt oīno
difficiles coctū. Oportet abstinere à melle, sinapi, sali-
tis, & acribus omnibus: sicuti & à vinis sātis vetustis &
calidis.

De cura tertianæ nothæ. Cap. X.

In iis verò quæ non aded̄ exquisitæ sunt, prouiden-
dum est, ne morbus augeatur: ne ue ægrotātis vires
corruant, quæ laborare longiori tempore debent.

Tertianæ no-
thæ curatio.

Quare operæpretium est scire, ad quantum magnitu-
dinē morbus ipse sit peruēturus: & q̄tæ sint ipsius ægri
vires: vt ad ea ispiciēs quæ mains auxiliū postulant, ine-
dia quidem, in valentioribus utaris viribus, & morbo
cōcoctū difficili: largiori autem cibo, vbi vires sunt in-
firmiores, nec morbus admodum ad concoctionem
contumax. Iam verò in tertianis non exquisitis, nec
statim circa initia balneare expedit: sed quum primum
coctionis signa apparuerint. Nec cibum quotidie offer-
re expedit, sed alternis diebus. Quies verò, & calfactio
circa præcordia iuuant, & sorbitiones quæ concoquū-
tur facilē, & clysteria non admodum mollia. Quòd si
sanguinem mittere oporteat, neq; hoc quoq; omittē-
dum est. Sed ab initio statim, tantum sanguinis detra-
hendum est, quantum præsens status exigit. Sit autem
totius victus ratio, non quæ humectet, atq; refrigeret
vniuersum corpus: sed quæ aliquem modum etiam as-
sumat, ad calfaciendum, incidendumq;: Plurimum igi-
tur eos iuuat p̄isanæ succ^o pipere adiecto. Adhæc hyf-
sopum, vel origanum, vel spicā nardi mulla infundēs,
& decoquens, ad bibendum propina, & quæcunq; alia
prouocantia vrinam, exceptis illis, quæ præter modū
calfaciunt, exiccantq;: Maximè verò post diem se-
ptimam danda eis iugiter est absynthii coma. Et quidē
oxymel potione plurimos iuuat: & aliquid ex iis quæ
molliter ventrem subducunt. Vomitus ē post cibum,
aded̄ his quibus hæc febris perdurauerit, vtilis est, vt
multos sciam solis vomitibus statim fuisse curatos.

Tertianis no-
this victus rō
conueniens.

Tertianis no-
this cōfert plu-
rimū uomitus
p̄uocatus post
cibum.

Quartanas in principio esse tractandas leniter: nullāq; tū moliendā esse fortem euacuationē.

Sanguinis missio I quartanis quatenus celebranda.

Quartanas ab initio mediocriter, ac leniter tractare oportet, nullū forte medicamen, aut euacuationem exhibentes: nisi forte sanguis vehementer superabundans appareat. Ceterū si vena incisa, is qui fluit, niger & crassus videatur (qualis in iis præcipuē visitur, qui liene laborant) audacius mittendus est. At si flauus, aut tenuis cernatur, subito suppressendus. Venam verò secare oportet, vel anteriorem, vel mediam, quæ est in sinistro cubito. Victū deinceps instituere sine statibus, ac optimum: ventremq; emolli-
re, iis quæ vtitata sunt, expedit. Qd si hæc nihil proficiant clysteribus vtendum est, à principio quidem molibus: postmodum verò acrioribus. Arcendi sunt autē à suillis carnibus, ab oībusq; eduliis, quæ tenacia sunt, & tardum habent exitum, quæq; tum refrigerant, tū siccant corpus. Vino verò vtendum est albo, tenui, & mediocriter calido, & volatilibus quæ boni sunt succi, nec in paludibus degunt. Pisces sunt adhibendi, qui facile concoquantur, ac molles carnibus, nihilq; tenax habentes. Vtendum est autem salsamentis, & sinapi: ac certis diebus medicamen diatrion pepereon, vel diospoliticum est assumendum. Quod si quotidie piper tantum cum aqua biberent, rectē etiam facerent. A frictionibus autem, ambulationibus, atq; balneis, nō sunt penitus prohibēdi. Quāq; si omnino possent à balneo abstinere, solis contenti frictionibus, inde plurimum iuuarentur. Iam si quartana ipsa sit brevis, nec admodum violenta, nihil noceuerit, si diebus interiectis ad cōsuetā exercitiā se transferant. Hæc igitur ab initio, & vsq; ad statū sunt pagenda. In statu autē subtilior vltus ratio adhibenda est, quā ante, vel post. Statim verò æger continendus in quiete est: ac visceribus prouidendum vnguentis & cataplasmatibus, quæ molli-
re & laxare possint. Deinde medicamentis vtendum, quæ

Quartanis vltus ratio conueniens.

Diatrion pepereon quartanis vtile.

Piper cū aqua singulis diebus bibitū, ad quartanas facere.

Quartana de-
rentis vngēda
esse viscera vngu-
entis, cata-
plasmatisq; &
mollientibus.

ciendi vrinam vim habeant. Vbi verò coctionis signa apparuerint, tunc sanè purgare oportet iis quæ humores atros inaniant, non semel tantum, sed sæpius, si videatur necesse. Utendum autem & vomitibus statim à cibo: & si nihil prohibuerit, elleborum album est exhibendum: primò quidem, permistum radiculis: quòd si nihil profecerit, ipsum per se. Cæterum qui nequeunt euomere, ille uehementius per inferiora purgentur: ac postmodum offeratur eis in potu, medicamen confectum ex viperis: necnon quod succum cyrenaicum recipit. Quicumq; verò ab initio aliquid ex hisce medicamentis exhibuerunt, aut omnino ante statum, quartanam quæ erat simplex, duplicem reddiderunt, aut omnino maiorem, atq; difficiliorem: ex duplici autem triplicem, aut omnino ambas difficiles.

Quartana de-
tentos esse plu-
ries purgandos
sed apparenti-
bus iam signis
coctionis.
Quartanis pro-
deesse vomitus.

Theriace in
quartanæ prin-
cipio exhibita
quid molietur.

De cura quotidiana.

Cap. XII.

Quotidianam autem quum volueris curare, oxymelite vitæ post primos dies: & illis quæ probe possunt vrinam ciere: vniuersumq; totius victus caput sit ad incidendum efficacius. Circa statum verò, de ventriculo est habenda sollicitudo, ac de ipsius ore præsertim. Deinceps iubendum est, ut post radulas & cibos assumptos vomant. His etiam quæ pituitam subducunt, utendum.

Quotidianæ
curatio.

De cura febrium continuarum, quæ carent
accidentibus.

Cap. XIII.

In continuis autem febribus, quibus non ultra septimum futurus status est, si vires validæ sint, & ætas consentiat, a modum exquisitus & tenuis victus est instituendus. In quibus verò vel status totius morbi longius abest à septimo, vel vires robustæ non fuerint, uberiori cibo ægri sunt reficiendi: quemadmodum prope statum tenuiori. Quum autem iam adest status, tenuissimum victum seruare oportet: deinde rursum semper uberiores. Sanguinem verò mittere

Febrium con-
tinuarum quæ
sole circa acci-
dencia infestant
curatio.

oportet, & ob morbi magnitudinem. Quibus autem rubor multo intensior, quam pro naturæ ordine, & maior, quam pro consuetudine, totius corporis moles, venæq; eminentes, extensæq; fuerint, iis et est auferendus, nisi vires, aut ætas, aut aliquid commemoratorum, prohibuerit. Quod verò humidus victus in febribus acutis omnibus inuat, rectè iam dictum est. Crémorè igitur prisanæ, iis quibus non acescit, exhibere oportet: & mellicratum quibus non bilescit: & sorbitiones ex alicâ: & panem ex aqua. Porro in febribus præter modum calidis, vrentibusq; quum primum cōctionis signa apparuerint, tunc audacter aquam frigidam propinabis. Modis verò in quantitate seruetur, quemadmodum tempus anni, regio, ætas, natura, consuetudoq; exigunt.

Victus humidus in febris omnibus acutis conducit. Aquam frigidam propinandum esse in ardentibus febribus, quum primum apparuerint signa cōctionis.

De curatione febrium cum accidentibus.

Cap. XIIII.

Febrium cum accidentibus infestantium curatio.

Quæ febres cum accidentibus vrgent, non æquè simplicem exigunt curationem. Sed pro viribus metiendum est, quanta sit ipsa febris, quantumq; ex accidentibus imminet periculum: atq; ad id quod vehementius fuerit, & difficilius, intendendum; non posthabita omnino etiam alterius cura. Etenim ubi simul cum ipsa febre sentitur circa os ventriculi anxietas, morsus, & imbecillitas, prius sanè vacuandi humores non sunt, quam os ipsum ventris corroboretur: etiam si cruditate aut cacoehymia æger ipse laboret. Sed nec si fuerit febris cum ventris profluuiò, alia est opus euacuatione. Verùm hæc sola sufficit, quâvis non sit pro ratione ipsius plenitudinis. Iam verò si quis simul & distensione neruorum laborauerit, & sanguinis egerit missione, neq; huic tantum semel mittere oportet, quantum exigit morbus, sed aliquid etiam accidenti est linquendum, cuius causa sæpe sudores euacuant, & vigilæ molestant, & vires ægroti debilitant.

Febribus quæ cum alui fluore infestant, non esse alia opus euacuatione.

Ita etiam si vehementes vigilæ, aut dolor intensus ægrotum cruciant, cauendæ sunt subitæ euacuationes, ac multæ. Ipsa præterea ambientis aeris temperies, loco accidentis cuiusdam habenda est, dum exquisitè calida & sicca fuerit: qualis est tempore medio inter canis & arcturi ortum. Si etiam valde frigida fuerit, tunc quoque sanguinem mittere formidandum. Ob hæc etiā neque in locis admodū calidis, aut frigidis, sanguinē mittere audemus. Quod si regioni temporis status consentiat, etiam omnino abstinemus: si verò non cōsentiāt, euacuamus quidem, sed multo minus, quā si neutrum prohiberet. Tolerantia etiam ægri, ceu quoddā accedens, expendenda venit: nec secus ipsa temperatura. Nam quicunque calidi & sicci natura sunt, hi omnes faciliē ab integris euacuationibus offenduntur. Cōsuetudo quoque non parui momenti est, quum ad omnia alia, tum præcipuē ad euacuationis indicationem. Quidā enim nūquam prius fuere vacuati, & multis cibis sunt usi. Nōnulli contra, nec multis cibis sunt usi, & euacuationibus assueverunt. Hos igitur intrepidè euacuare oportet, si reliqua etiam consentiant: alios verò, ne si reliqua omnia id suaserint. Eodem pariter modo & corporis habitus considerandus. Nam qui densa & solida carne constant, non offenduntur faciliē. Quare non oportet vereri ipsos vacuare ex toto, si quidem & alia id iubent. At qui mollem, & tenellam, & diffuentē carnē sortiuntur, si mirum in modum sunt ad patiendum habiles. Quare vel si reliqua omnia sanguinem esse mittendū suadeant, non tamen id facere audendum est, sed utendum aliis euacuationibus moderatè. Eodem modo & in iis qui supra modum crassi aut macilenti sunt, ab incidenda venā super sedendum, cæterasque integras euacuationes vereri oportet. His et ætas annumeranda est, veluti quoddam symptoma, quod prohibendi ingratam uacuationē vim habet. Neque enim pueri, neque se-

Euacuationes subitæ ac multæ, quando cauendæ sunt.

Sanguinis missionem prohibet aeris constitutio impense calida aut frigida.

Calidi & sicci offenduntur ab immodicis uacuationibus. Cōsuetudinē plurimū posse ad uacuationis indicationem.

Habitudines corporum que hanc facile missionem sanguinis ferant, & quod difficultes.

Pueri, senesq;
integras uacua
tiones nō ferūt.

niores hanc sine noxa tolerant. Hosce igitur omnes, si dispositiones hortentur, nō semel nec ex toto, sed paulatim oportet vacuare, inediis moderatis, frictioib^{us}, clysteribus mollibus, perfusioibus, atq; balneis. Quod si duo p̄traria symptomata, aut morbi, ceant, aduersus id quod magis urgeat instandum: nec interim alterum negligendum. Eas verò quæ habentur ex accidentibus & morbis indicationes, non simpliciter, sed secū dum causam à qua singula fiunt, cōsiderare oportet: qualia sunt defectus animi, & exolutio: quæ duo noīa de vnica re dicuntur, cuius plures existūt causæ. Siqui dem nō solum per varios affectus corporis, sed etiam in vehementissimis perturbationibus animi, nonnulli exoluti fuerunt: p̄cipueq; senes, & natura imbecilli. Etenim plures eorum trīstari, aut lætari, aut irati, aīo defecerunt. Qui aut magis robusto sunt corpore, ex immodicis euacuationibus idem patiuntur. Iā verò si ab scessus quispiā rūpatur, vires vehementer lædit, ac tū p̄cipue, quum materia simul tota ad uentriculū, uel ipsius os, aut thoracem defluerit. Quod si qñ etiā nos abscessus secantes, torum simul emittere pus voluerimus, animi defectum subsequi est necessariū. Nec verò laboratibus aqua iter curē, tota simul humiditas (quis ea p̄ter naturam sit) potest sine noxa vacuari: sed tunc quoq; necessum est, hominem deficere aīo. Ex doloꝝ etiam vehementia, similiter dissolutiones accidunt. Quin ēt nervus percussus, & musculi caput, & maligna in articulis vlcera, & immoderata quædā frigiditas, aut caliditas, vitalisq; roboris exolutio, p̄terea isignis crudititas, obstructioq; aut inflāmatio alicuius p̄cipuæ partis, aut os vētriculi malè affectū, aut improbæ euacuationes, aut deniq; alia multa, de qbus postea dicemus, inferre possunt defectum animi. Quæ sanè causæ singulæ propriam curationē desyderāt. Porro eos qui ex cholericis, & alui profusio, & aliis tū largē, tū vno īpe-

Animi vehementissimi affectus, senes p̄cipue atq; imbecillos exoluunt.

Pus per seōio nes abscessū, si totum simul vacuetur, vires deficit.

Hydropis aequam nō posse totam simul vacuari absq; deliquio animi.

Delor vehemens vires exoluit.

tu factis euacuationibus dissoluuntur, frigida spargere oportet, & nares comprehendere, & os ventriculi perficere; tubereque; ut vomat, stomachum irritando digito vel penae immissione, ac denique alligare pedes & manus. Oportet autem nexus fieri, plures quidem, ac fortiores, circa manum, quam per inferiorem partem sunt euacuationes. Nam si vacuatio per superiora fiat, plures ac vehementiores ligaturae cruribus admolenda sunt. Situm quoque aliquem parti fluxionem patienti expedire inuenire, in aduersum tendentem, sed moderatum. Nam si nimium tendat, atque ex hoc fatigetur, nihilo minus irritat, quam si inclinaret ad eundem. In vniuersum autem, aut ad cetera membrorum patientibus in aduersum trahere oportet: aut ad ea in quibus est fluxionis origo. Atque ideo vehementes euacuationes quae ex matricibus sunt, cucurbitulae iuxta mammam appositae, statim sedant. Quae vero ex naribus, hepatis, ac splenis, secundum nares patientem. Quod si ex ambabus naribus simul plurimum sanguis effluat, utriusque visceri applicandae sunt. Vinum est a quo frigida temperatum, curat eas, quae ex magnis sunt euacuationibus, dissolutiones: ac tunc praesertim, quando humores fluunt ad ventriculum. Ceterum si aliquid viscus sit inflammatum, aut caput doleat vehementius, aut aliqua alienatio animi affuerit, aut febris ardens in morbo crudo: magna & penitus insanabilis ex potu vini, huiusmodi affectibus nocumenta proueniunt. Id vero, quod frigidum potare non sunt assueti, aut manifeste ex ipso laedunt, quodque natura sunt frigidiores, & qui in extrema sunt senectute, & loco degunt natura frigidiori, & tempore hyberno, cauere a potione frigida debent. At qui contrario modo se habent, iis intrepidè illam offerre licet. Sit autem vinum, in fluxionibus quae ad ventriculum sunt, calidum simul & tenue, quale Lesbium. In sanguinis vero fluxibus, crassum, & nigrum, & acerbum. Ipsis autem locis imponere oportet, veluti ventriculo, matri, stomacho, & thoraci, quae corroborandi vim habent: capiti autem & fronti, propter haec, illa est quae refrigerent. Et quibus

Deliquit animi quod inducat.
Deliquit animi ab immodica
vacuatione curatio.

Profluvia multum
liebria sedant
cucurbitulae iuxta
mammam appositae.
Sanguinis fluxum
e naribus cucurbitula
per cordis admotionem
compescit.
Vinum frigida
temperatum, vires
exolutas ob immodicas
euacuationes
instaurat.
Vinum quibus
non dandum.
Frigida potio
quibus conueniat
minime, & quibus sit
propinanda.
Partes per quas
fit fluxus, corroborandas.
Caput esse refrigerandum,
ubi sanguis fluit
per nares.

Detiqui an-
ni ob sudores
curatio.

Exoluti a ple-
nitudine quō
sunt curandi.

Vteri suffoca-
tionis curatio.

Exoluti ob
ventriculi im-
becillitatem
curatio.

Ventriculum
roborantia.

vel in supficie, vel in naribus, vena aliqua disrupta est, medicamen aliquod, ex iis quæ sanguinem supprime-
re possunt, est imponendum. Porro balneæ in fluxioni-
bus ad ventriculum quidem aptissimæ sunt: at sangui-
nis fluxum acriter irritant. Et quicumq; ob sudoris co-
piam animi defectum patiuntur, his etiam plurimum
nocent: vt quas potius astringere oporteat, atq; refri-
gerare. His etiam vinum frigidum exhibendum est: ac
nihil omnino calidum. Sed nec etiam artus ipsorum li-
gare oportet, neq; cogere ad vomitum, neq; ullo mo-
do mouere. At ventis refrigerantibus aditum præparare:
aerem quoq; domus alterare frigida & acida qualita-
te, myrtorum frondibus, & virium capreolis, ac rosas
pauimentum consternentes. Nihil verò horum confert,
vbi fluxiones ad ventriculum sunt. At qui exoluitur
ob plenitudinem, eorum artus quæ plurimum perfricare
oportet, calfacere, ac deligare. A vino verò & cibis
sunt abstinendi, & à balneis, si febriant. Sufficit autem,
si eis dederimus mellicrati potum, in quo ebullierit thy-
mus, vel origanum; vel pulegium, vel hyssopus. Con-
uenit quoq; oxymel. Quæ ex matrice laborant, atq;
exoluntur, non aliter sunt curandæ, excepto oxyme-
lite. Fricare autē ac deligare magis earum crura o-
por-
tet, quàm manus. At quibus vterus aut sursum, aut ad
latus reuellit, inguinibus & coxis cucurbitulas appli-
camus: & naribus quidē, ea quæ foetidissimū hñt odo-
rem: matricibus aut odorata, & ea quæ laxare, calface-
req; possunt, medicamenta offeremus. Si verò ob imbeci-
litate ventriculi, animi sequat deliquiū, ea quæ roborā-
di vim habēt oportet emplastra adhibere, quale est quod
fit ex palmulis, vino, farina hordei, croco, aloë, & ma-
stiche. Madefacere autē iis quæ constant ex absinthio,
oleo melino, & mastichino: necnon nardo, uino, &
cænāthe. Quod si exuratur, miscere ex refrigerantibus
aliquid conuenit, veluti cucurbitæ, lactucæ, portula-
cæ, solani,

et, solani, intybi, atq; vuæ acerbæ succū. Aqua etiam frigida plerunq; iuuat malè affectos stomacho, si tempestiuè, hoc est in declinatione, exhibeas. Alioqui plurimum obest. Atq; his qui os ventriculi imbecillum habent, vinum calidū exhibere oportet, si nihil prohibeat. Plurimum verò iuuat eos qui sic laborant, etiam frictio extremorum. Quòd si ex iis remediis nihil melius se habuerint, eos quidem qui adusti sunt, quamprimum ad balneas ducere oportet. Qui verò aliquid frigoris sentiunt, medicamē diatrion pepereon, ipsumq; piper solum, atq; etiam absynthiū bibant. At qui exitiosis humoribus os ventriculi mordicātibus exoluuntur, hos post aquæ calidæ, aut hydrolei potum, fac vomere. Vacuatis humoribus, partē læsam oportet modis omnibus roborare: partim iis quæ admouent extrinsecus: partim absynthii potione. Ceterum si humores adhuc in ventre consistent, minimè sanè astringere, sed tantum concalfacere oportet. Vbi verò multa pituita in ore ventriculi acervata fuerit, fouere quidē plurimum oleo, in quo ebullierit absynthium: postea mellicratum exhibere, in quo hyssopum, vel quid simile infusum fuerit: item oxymeli, & piper, & diatrion pepereon, & diospoliticon medicamē. Victus ratio in summa, incidendi vim habeat. Quæ verò ex nimia frigiditate eueniunt exolutiones, eodem modo curandæ sunt, quo bulimi, oimodo calefacientibus. Vinum igitur eis exhibere oportet, calida temperatum: ac cibos qui calfaciendi naturam habeant: fricareq; & calfacere ad ignem simul. Quæ ex calore nimio accidūt deliquia animi, iis quæ refrigerandi & roborandi vim habent, curant. Statim igitur ipsos corroborabis, si aqua frigida sparseris, & flabellaueris, & os ventriculi perfricaueris, & agitaueris, vinoq; & cibo refeceris. At q ob inflammationis magnitudinem, aut vehementis febris malignitatem, animi defectū patiuntur, & in prin

Vinum calidū
propinandum
imbecillo ven
triculo.

Exoluti obpra
uos succos, ven
tris os infestan
tes, quō sint cu
randi.

Exolutiōis ob
refrigerationē
curatio.

Exolutionis a
calore ortæ cu
ratio.

Exolutiōis ob
febris, aut phle
gmones ma
gnitudinē, cu
ratio.

cipiis accessionum refrigerantur, iis artus fricare fortiter, & calfacere, cruraq; ac manus alligare, & vigilias, cibiq; & potus omnimodam abstinenciam præcipere oportet. Optimum verò in his, quid futurum sit, præcognoscere. Eos etiam qui ex siccitate in principiis accessionum, defectum animi sunt incursum, optimū est prævidere. Nam si duabus aut tribus horis ante accessionem exhibito cibo, concoctu facili, manus ac pedes constringi iusseris, non interibunt. Quòd si magnū imminere periculum suspicatus fueris, vinum in alicani elixam infusum, dare anticipabis: aut panem quoq; ex alica. At si mediocris expectatur defectus animi, parcendum est vino: sed sufficit tunc mala punica, aut pira, cibus ipsis miscere. Iis qui præter expectationem in periculum inciderunt, vinum calidum, & panis est exhibendus: parumq; aliquid cum eo alicæ calidæ. Qui ob præcipui membri obstructionem linquuntur animo, iis oxymel dare oportet, atq; ex hyssopo, origano, pulegio, & melle potum: cibosq; incidendi naturā habentes. Sed nec deterius fuerit artus perfricare, deligareq;. Prodest etiam hisce potibus uti, qui vrinam ciendi vim habent: veluti qui anethum, fœniculum, apium, petroselinum, ammi, daucum, & spicam nardi recipiunt. Quæ ubi manifestè iuuerint, iam vino albo, & tenui, nec admodum antiquo, est utendū. Fiunt verò & in huiuscemodi dispositionibus, quum vehementes fuerint, pulsus inæquales, intercidentesq;. Qui ex abscessus disruptione, aut sectione exoluntur, aut ex superflua aquæ inter cutim inanitione, ii quidē confestim optimis odoribus sunt fouēdi. Paulo autē post, sorbitionibus concoctu facilibus, sunt reficiendi. Si verò ob tristitiā, aut gaudium, aut timorē, aut iram, aut terrorem exolui videant, odoribus, & narium apprehensionibus reuocandi sunt: cogendiq; ad vomitum. Eodem pariter modo, qui ex vulneribus, aut purgatio-

Exolutiōis ob siccitatē summe, præcautio:

Exolutiōis præter expectationem aborti curatio.
Exolutiōis ob membri præcipui obstructiōnem factæ, curatio,

Exolutiōis ex immodica puris, aut aquæ inter cutem euatione, curatio.
Exolutiōis ob animi affectus ortæ, curatio.

nibus, aut doloribus qui in articulis, nervis, & musculorum chordis eueniunt, exoluuntur, reuocâdi statim ab eo affectu sunt: postmodû verò, cōueniens passioni cura afferenda. Defectus animi qui ex intestini laxioris doloribus, aut ilei, aut similibus cruciatibus sũt, ex patientium locorũ calefactione, frictioneq; extremorum curantur. At, quæ ex propria imbecillitate uirũ, quæ regunt corpus, eueniunt exolutiones, ex intēperie videlicet orræ, partium à quibus vires profiscuntur, contrariis intemperaturis curādæ sunt. Virtus ergo vitalis, quæ ex corde nascitur, ex pulsum imbecillitate cognoscitur. At quæ ex hepate oritur, & naturalis dicitur, ex sanguineis egestionibus, ab initio aquosis atq; tenuib⁹: postmodû uerò crassis, ad modũ fecis. Quæ ex cerebro originẽ ducit, quã animalẽ appellant, ex motuũ voluntarioꝝ imbecillitate deprehenditur.

De cura capitis à variis occasionib⁹ læsi. Cap. XV.

IGITVR symptomatum causæ, congruam curationem ostendunt. Veluti si quis doleat caput, simulq; fastidiat cibos, ex fameq; sentiat mordicationem, iubendus est, vt euomat: nam vel bilem vomet, vel pituitam, vel utrũq;. Porro qui cum grauitate dolores capitis fiunt, multitudinem indicant. Qui autem cum mordicatione, vaporis humoris'ue acritudinem. Cum pulsu verò, inflammationem. At cum tensione, si quidem sine grauitate ac pulsu, spiritus flatulenti & crudi multitudinem. Si verò cum pulsu, inflammacionem corporis mēbranosi. At si adsit grauitas, multitudo intra mēbranas contenta significatur. Quum igitur oĩa distinxeris, causam ex qua horũ singula fiunt, considerare oportebit. Veluti si multitudo vaporis atque humoris contineatur, aduertere oportet, nunquid ob magnitudinẽ febriũ humores diffusi, ac veluti efferuescentes, ad caput ascēderint: aut propter ei⁹ partis imbecillitatẽ: aut ob totius corporis plenitudinẽ. Hæc enim

Exolutiōis ob dolores intestinorũ, curatio.

Exolutiōis orræ a uirũ imbecillitate, curatio.

Facultas uitæ a uirũ imbecillitate, curatio. Facultas uitæ a uirũ imbecillitate, curatio. Facultas uitæ a uirũ imbecillitate, curatio.

Capitis doloris per consensum curatio.

Capitis doloris species uariæ.

Capitis doloris ob imbecillitatem contra cituratio. Reuulsiois modo diuersi.

totius corporis euacuationibus haud difficulter curabis. Eam verò quæ ex partis imbecillitate contingit, partim quidem in cōtrarium trahendo per totū corpus: partim ipsi capiti remedia adhibendo. Atq; in cōtrarium quidem trahes, clysteribus acribus, nexibus, frictionibus plurimis infernarum partium, & si expediat, sanguinis aliquantula detractio. Partem autem sanabis eo tempore quo ad vniuersum corpus retrahis, iis vtens asperginibus, quæ à capite vim repellendi habent: ac dein euacuantibus: postremò deniq; corroborantibus. Repellit autem oleum quod immaturum dicitur, ac tum oxyrhodinum, tum rosaceū, & quæcūq; ex capitibus papaueris, & teneris oliuæ germi-
nibus, & hederæ corymbis, menthaq; viridi, & sisymbrio fiunt. Vtendum verò ipsis, in multitudine crudiori & frigidiori, tepidis: in calidiori autem & biliosiori, frigidis. Euacuat etiam, dissoluitq; oleum calidum, ipsum per sese: & magis si antiquū fuerit, & sicyoniu, aut anethum feruefactum in ipso fuerit. Quod si spondylion, vel serpillum, vel pulegii comam, vel calaminthæ, vel menthæ, vel sisymbrii, intus decoxeris, ita etiā crassiores succos vacuaueris. Hæc uerò ipsa, viriū etiā aliquid membro imbecillo adiiciunt. Quòd si etiam ex vsu videatur, per nares atq; palatum expurgatio molienda est, sternutamentumq; excitandum. Si ad balneas hominem duxeris, siccis sindonibus caput est perfricandum, salq; & nitrum, & synapi, sine oleo imponendum. Hæc itaq; sunt ex particulæ imbecillitate, doloris capitis medicinæ. At quando ex magnitudine febris accidit, & medicamenta adhibere conuenit, frigidæ qualitates ac vires, & quæ ex hydrelgeo & oxyrhodino, & papaueris capitulis perfusiones constant, expediunt. In dolore autem capitis, qui sanguinis fluxum, aut vomitum decretorium significat, remedia inuestiganda non sunt: quum nō accidens, sed talis dolor bo-

Repellere humores a capite, quæ cōmodo possint.

Vacuare discereq; capitis humores q; cōmodo possint.

Capitis doloris ex magnitudine febris cituratio.

num existat signum. Siquidem ubi natura excretionē aliquam, ac præcipuē vomitum, aut sanguinis per nares fluxum molitur, horum inseparabile indicium est capitis dolor. Considerandæ igitur ad cognoscendam crisin, primū quidem sunt febrium species, an calidæ sint, * atq; vrentes: nam hæ per excretionem iudicari cōsueverunt: quēadmodum quæ molliores sunt, ac veluti * fumigantes, diu durant, & sæpius in abscessus contendunt. Secūdo loco, an morbus sit salutaris. Nam quis obsecro bonam crisin in morbo pernicioso expectauerit? Tertiō ad hæc totius morbi tempus considerandum. Nam si principii vel augmenti adsit signum, minimè autem status, nec concoctionis signa in vrinis, vel sputis, vel alui excrementis cernantur, non est quod bonam speres crisin. Porro difficilis tolerantia antecedere omnem crisin solet. Quæ quidem si in die accidat, crisis sequetur noctu. Si autem noctu, in die. Si igitur tale aliquid videas, cōsiderandum est, quotus sit ægritudinis dies. Etenim septimus dies, etiā ex paruo naturæ apparatu, ad crisin per excretionē mouetur. Sextus verò, magno apparatu indiget: & sæpe neq; vlla in eo fit crisis, nec sine periculo, nec fideliter accidit. Ergo si dolor capitis statim ab initio nō inuasit, sicuti quoddam ipsius morbi symptoma, sed * in ipsa ante crisin perturbatione: dein si collum etiā aliquid condolescat, & præcordia retracta sint, aut repente supervenerit difficilis respiratio, pulsusq; in tumore subito elati, non reciderint in parvitatem, neq; debiles fuerint, statim crisis per sanguinis fluxum ē naris, expectanda est. Si verò non modò non deciderit, sed etiam in altum attollantur, & vehementiā assumpserint, faciem iam ægrotantis inspicere oportet. Nā si quod in ea membrum * palpitet, aut venæ quæ sunt in temporibus pulsant, aut malum, vel nasus, vel oculus rubidior sit factus, magis etiā talis crisis est expectanda.

Capitis dolor, quæ excretio num sit signū inseparabile.

Ardentes febres consueverunt iudicari per excretionem.

Crisis omnē præcedit difficilis tolerantia.

Septimi diei natura. Sexti diei natura.

Sanguinis craticam excretionem per nares, quæ indicent.

standa. Quòd si etiam inuiti illachryment, vel imaginentur se splendores cernere, ac nares ipsas scalpant, tunc non iam fluxurū, sed iam fluentē conspicies sanguinem. Nec verò ex his perterrearis, si hominē desipientem, aut resilientē videris. Nam & hæc humorum repentium ad partes supernas indicia sunt. Præterea si ægrotus sit adolescens, aut alioqui natura calidus, aut multo sanguine abundans, magis adhuc de hoc sperandum erit. Quòd si sæpius etiā antea illi sanguis è naribus fluere est visus, hoc vel solū sufficit fluxus sanguinis spem confirmare. Si verò & tempus anni æstas sit, vel calidus cœli status, & si plures eo tēpore crīsim ex sanguinis fluxu habuerint, ægrīq; corpus plenum extiterit, & consuetæ excretionēs retentæ, hæc inquā omnia spem vehementius augebunt. Has itaq; & alias excretionēs omnes prænoscere licet, si hæc duo tantū explorauerimus, & vnde naturæ motus agatur, & in quam partem. Siquidem quæ deficiunt adiuuabimus, & quæ immoderatè feruntur, coercēbimus, si ista noverimus. Veluti confestim sanguinis fluxus ex splene magnæ cucurbitæ sinistris præcordiis superpositæ, facile retrahunt. At qui ab hepate proficiscitur, dextris. Qui ab aliis membris, eadem ratione.

Excretionēs prænoscet facile, qui unde naturæ motus agatur, & in quam partem inuestigabit. Sanguinē fluentem ab hepate & ab splene, cucurbitulæ illis admotæ visceribus, retrahūt.

G A L E N I P E R G A

M E N I, D E A R T E C V-
ratiua ad Glauconem. Lib. II.

C A P. I.



E IIS AVTEM QUAE in singulis corporis partibus sūt passionibus, deinceps sumus dicturi, ab inflammatione auspicati: quæ sæpius hæc accidat, plurimæq; ipsius sint differentiae, ex quarum singulis solēt febres

oriri. Cōmunis igitur in omnibus est immoderata caliditas, & veluti quædam efferuescentia, vnde & phlegmones nomen de ipsis efferre veteres consueverunt. Propriam aut quādam in singulis differentiam inuenies, ex qua eius speciem agnoscēs, & conuenientē assequeris medelam. Porrò prima inflammationis differentia est secundum quam, hanc quidem humidam, illam verò esse siccam contingit. Humidam quidē, quæ ex calida fluxione membrum occupante accidit. Siccam verò, quando nullo humore influente, calor naturalis efferuescit. Hæc autem, vsq; ad aliquid quidē, veluti febris est membri. Quum verò iam ad immoderatam caliditatem ac siccitatem peruenierit, corruptio atq; extinctio omnimoda fit. Rursus illius differentia quæ cum humorum affluxu accidit, multæ species existunt. Nam fluente sanguine, altera: flaua bile, altera: aurobus simul, alia tertia. Et quidem in earum singulis, vel iam putruit id quod influxit: vel in membro impactum putrescit. Præterea vel crassum est, vel tenue, vel optimum, vel deniq; acre. Sanguine igitur optimo ac mediocriter crasso ad particulam aliquam confluente, atq; ob multitudinem conculcato, vehemens dolor arripit hominem, nisi hebetis sensus ipsa fuerit particula: pulsusq; in profundo permolestus sentitur, tendiq; omnino & contundi membrum apparet, cum vehementi incendio, rententia, & rubore. Quæ sanè passio totius generis nomen recipit, inflammatioq; vocatur, ex omni ferè occasione proueniens. Quippe vulneribus, distentionibus, disruptionibus, contusionibus, scissionibus, exercitiorum laboribus, exarticulationibus, ac præterea fracturis, & spontaneis vlceribus aduenit. Quin etiam, si quando immodicam plenitudinem venæ ipsæ contrahant, tunc id quod superfluum est, effundunt ad aliquam partem, quæcunq;

Inflammationibus omnib' est eōs caliditas.

Inflammationis prima differentia.

Inflammationis quæ cum affluxu humorum infestat, multiplex differentia.

Inflammationis ortæ a sanguine indicia.

Inflammationis causæ.

Recipientes su
peruacua parti
culæ quales ne
cessario eẽ de-
beant.

Regiũ morbi, p
ductio.

Herpetis gene
ratio.

Herpes exedens
unde accidat.

Herpes milia-
ris unde exo-
riatur.

Erysipelas un-
de gignatur.

Erysipelas
phlegmono-
des quando ac-
cidat.

Phlegmone e-
rysipelatodes
quando fiat.
Erysipelas fo-
lius cutis est
passio.

eo tempore fuerit aptior ad recipiendum. Eadem nãq;
erit reliquis omnibus imbecillior, vel rarior, vel ad
motum procliuior, vel minus nobilis. Flaua verò bi-
lis, quando propriam naturam seruans, vnà cum san-
guine per totũ corpus defertur, morbum regiũ pro-
ducit. Quum autem secernitur sola, in aliquamq; de-
combit partem, herpetem gignit. Cæterum si sit consi-
stentia crassa, totam exulcerat cutim, vsq; ad carnem
subiectam: qui affectus herpes exedens vocatur. Si ve-
rò tenuior fuerit, id quod in superficie est tantum, ve-
luti deurit: quæ species generis sortitur appellationẽ,
quum simpliciter herpes dicatur. Nam ex reliquis spe-
ciebus duabus, * illa quidem cuius nuper mentionem
fecimus, vocatur herpes exedens: altera verò, milia-
ris, q; in ea pustulæ paruæ ac multæ, per summam cu-
tem, similes milio, excitentur. Fit autem herpes huius
modi etiam ex bile quidem, sed minus calida & acri, q;
* illæ species priores. Quod si ex sanguine & flaua bi-
le calidioribus quàm oporteat, mista ipsa fluxio fue-
rit: aut ex sanguine quidem, sed feruido, & substantia
tenuissimo: erysipelas hic affectus vocatur, multo in-
flammatione calidior, magisq; flauum colorem refe-
rens. Non dolet tamen affectus hic, quemadmodũ in-
flammatiõ: nec vt aliqua inflammationis species pul-
sum, aut compressionem, aut similem inuehit tensio-
nem. Cæterum interdum miscetur inflammatio cum
erysipelate. Si igitur in miscella ipsa exuperet propria
erysipelatis accidentia, affectus is erysipelas inflamma-
tionis particeps nominatur. Si verò inflammationis
accidentia præpolleant, dicitur inflammatio erysipe-
latores. At si accidentia vtriusq; esse appareant equalia,
tunc erysipelas & inflammatio ex æquo misceri dicun-
tur. Exquisitum itaq; erysipelas, cutis solius est passio.
Non tamen ipsa inflammatio pertinet tantum ad cuti
subiectas partes: sed ad has quidem præcipuè: nonnun-

quam verò etiam ad cutim. At verò, si sanguis influens calidus sufficienter fuerit & crassus, quodcunque membrum inuaserit, hoc exurendo, vlcus cum crusta excitat: quicquid autem circūiacet, in inflammationem at tollit efferuescentem, grauiusq; dolentem: qui affectus carbo appellatur. Similiter etiam, si sanguis influens niger extiterit, crassusq; & fœculentus, & feruens: simul autem & sanien quendam tenuem admistam habuerit, pustulas per summam cutis excitat, similes iis quæ ex igne fiunt. Quibus disruptis, crustosum sub ipsis vlcus inuenitur. Qui affectus etiam est carbo. Phlegmone itaq; in hæc species vniuersales distinguit, ad quas nimirum referuntur alię omneis particulares. Etenim bubo, phyma, & phygethlon, glandularum affectiões existunt: bubo quidem, inflammatio: phyma, quod statim augetur, atq; ad suppurationem festinat. Phygethlon autem erysipelas particeps inflammationis, aut inflammatio erysipelatis particeps nominatur. Sic etiā & ophthalmia, eius membranæ quæ corneæ inhæret, est inflammatio. Pleuritis verò, costas succingentis membranæ. Quemadmodum & synanche gutturis: atq; peripneumonia, pulmonis. Eas igitur quæ in partibus apparentibus cōspiciuntur inflammationes, promptum est quidē cognoscere. Quæ verò in occultis, & febres omnino afferunt, non æquē discerni possunt.

De causis inflammationum. Cap. II.

EST autem vna quædam apparentium inflātionum causa, eaq; non vsq; adeo occulta, quæ fluxio appellatur: nisi quandoq; eis coniungatur, quæ ali qua alia ex causa euidente, factæ videtur. Quum enim nulla ex his præcedente, repente membrum inflātionem patitur, ea quæ hunc affectum gignit causa, fluxio vocatur. Affectus autem ipse, dispositio rheumatica: In curatione cuius, duo magni committuntur errores, vbi statim in ipsis auspiciis, vel nulla de toto cor-

Carbunculi
generatio.

Bubo quid.

Phyma quid.

Phygethlon.

Ophthalmia
quid,
Pleuritis quid,
Synanche.
Peripneumonia.

Inflātionis
causa una est
fluxio.

Inflamationis
curatio.

Euacuatio
corpus q̄ sint
prius conside
randa.

Genu inflama
ti curatio.

Reuulsione flui
dum humorū,
esse in contra
rium moliedā.
Genu inflama
to emplastrum
commodum.
Genu inflama
ti dolorem ma
gnū leniētia,
hyeme quidem
calida: æstate
sunt admoen
da frigida.
Repercussio
esse applicāda
paulo supra pa
tientes particu
las.

pore prouidentia habetur: vel ipsum calit, atq; hūe
ctatur membrum. At qui rōnem simul & experiētiā
sequuntur, ii totum imprimis corpus vacuare quibul
cūq; euacuationibus consulunt: ipsam verò inflamma
tam partē, perfundere, ac superlinire eis, quæ id quod
influit repellendi vim habent: ac deniq; quod in mem
bro patiente continetur, educere: vimq; ac robur ad
iungere iis quæ iam affectæ sunt partibus. Verūm ut
rectē quis vacuatione utatur, ætatem, anni tempus, re
gionem, præsentem aeris statum, robur eius qui affi
citur, habitumq; & consuetudinē, nec non ipsius mor
bi naturam oportet consyderare. Ex his nāq; quando
vacuandū sit, aut minimē: & unde, & quomodo, inue
nitur. Si igitur ad genu fluxio feratur, atq; id plurimū
attollatur: præterea totum corpus sanguine plenū ap
pareat, & valida laborantis vis, tempusq; anni sit ver
, & temperata regio: æger verò sit adolescens, aut iuue
nis: is sanguinis euacuatione ex superioribus partibus
indiget: oportetq; eius incidere in cubito venam, aut
scilicet interiorem, aut mediam: quū semper fluxionis
motum ad contrarium reuellere oporteat. Ipsi autem
laboranti particulæ, si quidem non admodum doleat,
emplastrū ex semperuiuo, & corticibus punicorū ma
lorum in vino decoctis, & rhu, & farina hordei con
stans, est admouēdum. Hoc si quidem repellit quod in
fluit, atq; id quod continetur exiccat, & circūiacentia
membra corroborat. Cum magno autem dolore flu
xu incidente, sufficit vehemētiam doloris lenire, cum
aliquo ex iis, quæ ex vino dulci, oleo rosaceo, & pauca
cera, in utroq; liquata, constant. Oportet aut hæc la
nis excipere pinguibus, quæ plurimū habeant œsypis:
& æstate quidem, frigida: hyeme autem tepida appo
nere. Sic etiam cataplasmata ex arnoglossō, lente, pa
ne, & rosaceo oleo adhibere: paulo verò supra patien
tes particulas admoovere spongiā vino austero intin

etiam, aut aqua frigida, cui mistum parum aceti fuerit. Quod si ex hac medendi ratione magnus usus sentiatur, nec alicubi pus se ostendat, mollibus medicamentis ad fluxiones utendum. Optima verò ex his sunt, quæ exiccandi & repellendi quod fluit, sine dolore vim habent. Quæ admodum ea quæ vehementer contendunt, atque iccirco dolorem afferunt, plus doloribus obsunt, quàm exiccando proficiant. Tale igitur sit medicamen, quale est quod ex chalcitide constat, remissum oleo rosaceo. Si verò lanam mundam vino acerbo humectaueris, apposuerisque, plus iuueris. Quod si pus se in particula ostenderit, cataplasma offerre oportet semel aut bis. Plus verò ad pruritus inuat farina hordeacea. Adiungendum tamen aliquid vel aceti, vel vini. At postquam secueris, & pus euacuaueris, cauendum est deinceps, ne oleum, aut aquam imponas. Quod si quando vulnus ablucere oporteat, mellicrato, vel oxycrato, & vino, & mulso est utendum. Superponendum verò, si adhuc inflammatus, ex lente cataplasma. Si verò absque inflammatione fuerit, aliquid ex iis medicamentis, quæ emplastica nominantur: & præcipue quod ex chalcitide constat. Imponenda autem super hæc extrinsecus, spogia, aut lana vino acerbo infusa: ad quæ quidam opportunum est, quod aquam marinam recipit. Vulneri autem, nullum ex pinguibus medicamentis est admouendum: quoniam quidem exquisitè exicare expedit. Ac sic sanè sanare oportet inflammationes ex fluxione ortas. Quæ verò alia de causa fiunt, humectare, calfacereque, nihil prohibet. Quas quidem si perducere ad suppurationem volueris, cataplasma ex farina triticea, quæ in oleo, & aqua ebullierit, est apponendum. Quod si quando scarificare oporteat, ne hoc quidem verendum est. Si verò eas quæ ex fluxionibus sunt inflammationes scarificaueris, magnum adferes malum: ac per initia præsertim. Quæcunque autem ex ipsis iam inueteratæ existentes, post totius corporis euacuationem, quasdam durities atque ni-

Fluxioni discutiendæ quæ medicamenta conueniant.

Vlcus, electo pure, quibus sit abluendum.

Suppuratæ inflammationi congruere cataplasma ex farina triticea quæ in oleo & aqua ebullierit.

Inflammationes quæ scarificandæ.

Herpetis cura-
tio.

grities retinent, ab his per scarificationem sanguinem auferre nil prohibet: & emplastrum ex farina hordeacea, & ceratum, & aliud aliquod medicamen ex discutientibus ad mouere. Non tamē ex vena in talibus sanguis necessariō mittendus est: sed ventrem tantummodo expurgare sufficit, medicamine quod bilē flauam educat: vel solo clysteri acri, si affectus ipse sit paruus. Quæ verō ex vlceribus fiunt erysipelata, & quæcunq; adeō manifestas causas sortisunt, si statim volueris cataplasma apponere ex farina hordeacea, & præsertim si ante scarificaueris, nihil nocebis. At inflammationibus quæ cum erypelate sunt coniunctæ, & erysipelatis cum inflammatione, adhibenda mista curatio est: semperq; illi, quod magis præpollet, resistendum. Herpetes autem, quantum ad totius corporis euacuationem attinet, vt erysipelata curare oportet: quantum verō ad * eam quæ patienti debetur particulæ, non oībus similis cura adhibetur. Nam qui exedentes sunt, refrigerari quidem desyderant, quemadmodum alii herpetes, & erysipelata: non tamen ea ferunt medicamēta, quæ præter id quod refrigerant, humectare etiā sunt apta: sed sola admittūt refrigerātia, quæ maximē exicare possunt. Quare supimponere ipsis oportet, ab initio quidem ex vite capreolos, & folia rubi, & rubi canini, & plantaginis. Post hæc verō & lentem adiungere oportet, & aliquādo mel, & hordeaceam farinam, quodq; antea scripsimus ad inflāmationes quæ ex fluxione eueniunt cataplasma, dempto ab eo semper uiuo. Ipsas verō partes exulceratas inunge medicamentis, quæ ad herpetas in pharmaceuticis libris descripta sunt: quæ quidem, vbi vti volueris, ex vino dulci, aut tenui & albo, & subaustero, minimē tñ acri, liquefacere oportet. Quod si posca aquosa vice horum aliquando vsus fueris, nihil deterius feceris. At in longū tempus protractis vlceribus, ad id vina sufficienter austera

conueniunt: præcipuè verò nigra. Quo tempore ipsi, etiam medicamenta cōgruunt, quæ ad Polyidam, Passionem, Musam, & Andronem relata extant. Herpetas verò qui summa tantummodo exulcerant, nisi diu perdurauerint, nullo horum inungere oportet (adurunt enim fortiter, & vehementer exiccant) verùm istis sufficiunt, quæcunq; vim glaucii habent medicamenta. Quæ quidem aqua diluenda sunt: vel aceto, si nil ex aqua profecerint. Quòd si etiã solani succo intinxis, vel arnaglosi, plus etiã conferes. In summa verò, omne vlcus exiccari poscit, idq; medicamēto neutiquam irritatē, nisi vbi malignum, putrilaginosumq; ipsum vlcus fuerit. Talia siquidē, acriora medicamina postulant, & quæ igneas vireis possideant: quale est nisy, chalcitis, arsenicum, calx, atq; sandaracha. Sæpe verò vbi ista cesserint, admouemus ignem. Eadem ratione uocatis carbonibus, super ipsam crustam, huiusmodi medicamentorum est natura conueniens. Non tamen loca circūiacentia tangere expedit: alioqui dissolues ea, exulcerans quæ minimè expedit. Sed Andronis trochiscis potius vtendum est. Si quando verò inualuerit rubor, plurimaq; inflammatio, medicamentum ipsum dulci diluendum est, vel succo plantaginis: quemadmodum si magnus tumor simul infestet, vino quidem acerbo in principio: postmodum verò & aceto. Cataplasma etiã ex orobi farina & oxymelite confectum est apponendum: atq; ante hæc omnia, statim ab initio tantum sanguinis auferendum, quantum sit satis, nisi quid aliud prohibuerit. Hæc itaq; sunt passio num per genera curationes, quæ pro naturæ instrumentorum patientium varietate mutantur. Quatuor autē ab his indicationes sumuntur: ab eorum nempe temperie, à formatione, à situ, ac deniq; à facultate. Oportetq; in curationibus intentionem habere ad membri naturam. Hæc enim, quousq; infrigidandum, aut exic-

Vlcus omne exiccari posulat.

Vlcera maligna qualia medicamenta postulent. Carbonib⁹ qualia medicamēta conueniant. Andronis trochisci.

Indicationes, quatuor sumi ab affectis partibus. Natura partis affectæ qd indicet.

Partiū. inflāma-
tarum quęnam
magis, & quę
min⁹ sint exic-
candę.

Temperaturę
partiū curatio-
nes affectuū va-
riant.

Formationes
particulatum
quomodo cura-
tiones uariant.
Situs partis af-
fectę quā indi-
cationem exhibeat.

Reuulsio ē flu-
entis humorū
medela: ut deri-
uatio, eorū qui
iam obsederūt
partem.

Reuulsio & de-
ruiatio a malri-
ce quibus fiat
modis.

candum sit, docet. Nam si carnosę partes inflāmatio-
nem patientur, paulū sunt exiccandę. Venosę quoq;
quāuis sint carnosę longē sicciores, nō tamen & ipsę
multum exiccari desyderant. Sed quę cūq; natura ar-
teriosę sunt, magis venosis sunt exiccādę: atq; his am-
plius neruosę: & multo magis chartilaginosa, ossęq;
Etenim prius q̄ ad propriam naturā particula redeat,
nōdum curationi est impositus finis. Porro siccio-
rem temperaturam inducunt, quę siccissima sunt: & frigi-
diorem quę frigidissima: & secundum alias qualitates
eodem modo. Ad mediocrem verō habitum referūt,
quę sunt in vnaquaq; mediocria. Ac sic sanē partium
temperaturę curationes affectuū variant. At forma-
tiones hoc modo. Nam quędam intra sese habent ca-
uitates: quędam extrinsecus: quędam vtrobiq; quę-
dam neutra in parte. Quę igitur neutra ex parte cau-
itates possident, in quas fluxio recipi possit, eas partes
fortiter exiccare oportet, vel si nō fuerint natura sic-
ciores: vt neruos, & præcipuē qui in artubus sunt. At
quę intus & extra relaxare aliquid possunt inflamma-
tionis, non multum huiuscemodi fortiter exiccanti-
bus egent: si præsertim laxam carnē habuerint, quę
admodum pulmo. Indicatio autē ex positu, loca per
quę sit vacuandum, & quo pacto, demonstrat. Fluen-
tium ergo humorū, reuulsio medela est: deriuatio au-
tem, eorum quę iam obsederunt membrum. Vtrūq;
autem euacuationis genus per communes venas mo-
liendum est. Siquidem à matrice reuelles, si eam quę
in cubito est, venam secueris: aut * iuxta mamillas cu-
curbitas admoueris: vel manus concalefeceris, fricue-
ris, deligaueris. Deriuabis autem, si eas quę in popliti-
bus sunt, aut in talis, venas diuiseris: & * foeminibus
cucurbitas admoueris, & crura calefeceris, perfricaue-
ris, atq; vinculo exceperis. Et si quidē in parte dextra
matricis ipse affectus consistat, à dextra manu, vel cru-

re sanguis est detrahendus. Sin verò in sinistra, à membris quæ illi è directo sunt. Cæterùm interiores venas tunc incidere oportet: quòd viciniore, magisq; è directo sint patientibus membris. Siniliter si liene inflàmato sanguinè vis detrahère, interiores in manu sinistra venas secato: vt si hepate, eadem ratione in dextra. Si quid verò ex superioribus inflammationem patiat, vt in ophthalmia, & angina, in cæterisq; infestantibus caput, eas quæ extrinsecus sunt, atq; è directo, pertundito. Si verò artus patiant, à * coniugatis mēbris sanguis detrahendus est, siue reuellerè, siue deriuare sit animus: præter quàm vbi passio fuerit iueterata. Tunc quippe à membro ipso patiente detrahimus. Sic ergo in angina eas quæ sub lingua sunt venas incidimus, vbi totum corpus vacuum quum sit, * produciatur ipse affectus. Sic hepatis, spleniq; cucurbitulas applicamus. Sic aliud quodcunq; membrum affectum scarificamus, si non amplius humores influant (tunc enim magis irritaueris, ipsumq; duplicaueris malum) verùm vbi vniuersum corpus iam expurgatū fuerit, nec quicq; præterea influit, sed quod prius influxerat, iā hæret in mēbro impactum. Et quidem laborantibus conuexis hepatis partibus, quod per vrinam trahere oporteat: concavis autem, per subductionem alui, situs ipsius visceris indicat. Atq; etiā thoracem, pulmonēq; per tusses expurgari debere: ventriculum & stomachum, per vomitum: intestina per deiectiones: quemadmodum per vrinam & splenem, & renes: matricem autem, per mēstrua: cerebrum atq; eius membranas, per palatum, gargareonem, nares, & aures. Sed & quæ his quæ in superficie sunt partibus, talia medicamenta apponere oporteat, qualibus eget passio: iis autem quæ in profundo sunt sitæ, & quas per multa interpōsita debent eorum virtutes attingere, non qualia nūc sint, sed qualia futura sint, ex situ membrorum agnos-

Liene inflàmato interiores in sinistra manu uenas secandas esse: ut in dextra, si hepar affectum fuerit.

Supernis partibus inflàmatis, externas uenas directas illis secandas esse.

Artubus inflàmatis, à coniugatis esse mitterendum sanguinem: nisi passio fuerit inueterata.

Angina protracta, uenas sub lingua secandas esse.

Scarificatione quæ utendum.

Vacuari in quæmodum singulæ partes debeant.

Altius reconditi affectus ualentiora medicamenta postulant, si in superficie consistere.

scimus. Tantum quippe aduentitii roboris adiungere oportet medicamentis, quantum in transitu exoluitur: ut quod relinquitur, æquale remaneat ei, quod tactu iuuat. Ob id igitur in thoracis inflammationibus, quæ in superficie consistunt, ea quæ solùm laxare possunt, sufficiunt: intrinsecus autem, sicuti in costas cingente membrana, requiruntur acriora. In uniuersis autem visceribus eadem habenda est ratio. Sæpius enim ex medicamentis inpositis vlceratur cutis, quãuis durior, minusq; ad patiendū habilis sit, quàm viscera. Quòd si ipsis visceribus medicamenta applicare possemus, quibus frequenter indigent, tanto molliora oporteret esse, quanto ipsorum natura, ut afficiatur, est promptior. Quia verò hoc neutiquā nobis datur, ob id nimirum, quæ eduntur ac bibuntur medicamenta, conferentia affectibus viscerū, ea multo acriora & potentiora esse conuenit iis, quibus indigent ipsæ partes affectæ: exceptis tamē illis, quæ ventriculo, stomachoq; auxiliantur. Hæc siquidem sola talia exhibentur, qualia à passionibus exiguntur. Reliqua verò omnia, acriora & fortiora sunt, & præsertim quæ vel renum, vel pulmonis occasione sumuntur. Sed indicatio quæ à facultate sumitur, etiam curationem immutat. Nam ex partibus corporis nonnullæ ab influentibus virtutibus gubernantur: quædam verò à propriis atq; natiuis. Atq; ex iis ipsis, quædā sibi ipsis dūtaxat: quædam etiam aliis fons & origo sunt facultatum. Et aliæ quidem opus peculiare habēt: aliæ autem commune. Permutare itaq; opus est curationis formam, pro ratione harum omnium differētiarum. Nam pleraq; ex remediis dictis, morbum quidem finiunt, sed natiuas membrorum facultates offendunt: quæ quidem offensus ad totum pueniet corpus: idq; ratione duplici: vel quia membrū est alicuius virtutis origo omnibus partibus cōmunicatæ: vel quia ipsius opus vniuerso corpori

Ventriculo stomachoq; affectis, solis talia exhibent, qualia ab affectibus exigunt. Partium differentiarum,

iori est utile. Etenim hepar, cor, cerebrū, atq; testes, communiter vniverso corpori principia sunt facultatum. At ventriculo, matriciq; propriæ facultates insunt, nulli alteri parti communes. Opus tamē ventris quidem, toti corpori confert; matricis autem nequaquam. Quæ igitur immodicè laxant, exoluunt robur, quare & facultatem particulæ. Quæ autem supra modum refrigerant, natiuū calorem extinguunt, qui fortassis substantia facultatum existit: aut certè primum & maximè necessarium instrumētum ipsarum. Nonnullæ etiam aliæ qualitates * immoderatæ, facultates exoluere possunt. Ad hanc aut indicationem quispiam referre posset & facilè & difficile sensum. Etenim quæ facilè sentiunt partes, acria medicamenta non tolerant, sicuti neq; acres humores. Ob idq; os ventriculi, atq; eo magis oculus, infestatur ab erodentibus medicamentis. At quæ sensum obtusum habent, cataplasmata grauiā sustinent, atq; medicamēta mordacia. Qui igitur secundum solam, nudamq; intemperiem, absq; humorum affluxu fiunt morbi, per contrarias qualitates curantur. Vt exempli gratia, calida intemperies, per refrigerantia, siue primò, siue ex accidenti refrigerent. Perfusio siquidem frigida, calfacit ex accidenti, vbi caloris reuocationem fecerit: calidumq; refrigerat, vbi calorem naturalem discussserit. At quæ ob materiæ influxum laborant, si quidem fuerint optimè temperata, solam euacuationem desydant: si verò distemperata sint, vnà cum euacuatione, per contrarias qualitates alterationem postulant. Sed iam dicamus de œdemate.

De œdemate.

Cap. III.

OEDEMA Est mollis quidam tumor, atq; doloris expers, ex pituitosa substantia, vel spiritu vaporoso ortus: qualis in cadaueribus, & pedibus hydropicorū & rabidorum plerūq; cernitur. In hisce tamen

Tojmus. III.

MMm

Principia facultatum vniverso corpori sunt hepar, cor, ceterum, atq; testes.

Laxantia, imo dice, exoluunt robur, atq; facultatem particulæ.

Calor natiuus quid.

Sensu acutissimo prædita, acria medicamēta non tolerant: ut ea quibus sensus obtusus inest.

Intemperies simplices per contrarias qualitates curantur.

Frigida perfusio calfacit ex accidenti.

Calidum ex accidenti refrigerat.

Oedema quid.

Oedema in g-
bus sympto-
ma existat.

Oedematis ex
influxu or. i. cu
ratio.

morbis oedema symptoma est, propria curatione non indigens. Sola quippe frictio ex oxyrhodino, aut ex sale & oleo, compescit ipsum. Quum verò propter influxum pituitæ in aliquam partem gignitur is affectus, spongia recenti, imbuta oxycrato (quod possit bibi) eum sedat. Quòd si ex his non discutiatur oedema, aluminis parum est adiiciendum. Si verò in aliquo artuum tale fuerit oedema, inchoanda ligatura est ab imis partibus: finienda verò in altioribus: vniuersam iniectionem & compressionem facientibus nobis, veluti in fracturis. Quòd si morbus dictis remediis non cedat, aliqd fortiorum medicaminum adiacere oportet, cui discutiendi simul & constringendi facultas insit.

De scirrho.

Cap. IIII.

Scirrhus quid.

EXquisitus scirrhus est tumor præter naturam, insensatus, durusq;. Non exquisitus verò, non omnino insensibilis est: difficulter tamen omnino sentit. Porro insensibilis scirrhus minimè curationem recipit. Qui verò cum difficultate sentit, nec incurabilis est, nec facile curationem admittit. Fit autem ex humore viscido & crasso * tenacissimè partibus induratis infixio. Scirrhus itaq; interdum ab initio concrescit, atq; augetur paulatim. Crebrius verò inscitia medicorum paratur, vbi vehementer erysipelata & inflammationes astringunt, refrigerantq;. Quòd si quis fortiter discutiencia induratis medicamenta adhibeat, digeret quidam tenuiora: quod verò reliquum est, compactum, lapidis instar, relinquet. Non igitur curandæ sunt induratae particulae medicamento siccante immodicè, sed emollienti, quodq; calorem possideat tepidum, humidatè verò, nec multam, nec omnino minimam. Siquidem quod superfluum humorem habet, nihil omnino dissoluit: quod verò minimum, plus q; oportet exiccat.

Scirrhus insensibilis, minime curationem recipit.

Scirrhus unde contrahatur.

Scirrhus quomodo ob ineptam curationem gignatur.

Induratis quæ medicamenta conueniant.

Medulla cerebri.

ergo medicamenta idonea scirrhis sunt omnes medullæ atq; adipēs. Ex medullis primas partes obtinet cer-

uina: dein vitulina. Ex adipibus, anserinus, leoninus q̄s. At verò qui ex gallina sumitur, anserinum: qui ex par do, leoninum sequitur: postea verò vrsinum, atq̄ tau rinum. Cæterum qui ex capris accipitur, & crassior, & siccior prædictis est: idq̄ magis, si ab hirco capiatur. Porro tendonibus induratis oportet vnà cum præsi diis iis quæ simul & emolliunt, & digerūt. (Cuiusmodi sunt, bdellium, amaroniacum thymiana, solutum in q̄acerrimo aceto, opopanax, chalbanumq̄;) etiam pyritem lapideam candentē, aut (si eius copia non sit) molarem, acerrimo aceto aspergere: ac dein super ip sum dimouere partem affectā, vt à vapore sursum ela to, scirrhus dissolui possit.

De splene iecoreq̄ induratis. Cap. V.

INDVRA TVM splenem, non tantū foris, for tibus medicamētis curare conuenit: sed intus etiā po tionibus vehementissimis: nam eas sine molestia to lerat. Inter quæ sanè primas sibi vendicant partes, cor tices radicum capparis, & scolopēdrii, & myricæ tum radix, tum germina, omnia videlicet hæc in aceto & oxymelite cocta. At sæpenumero splen, quum tangit, reniti videtur, non ob scirrhum, sed ob flatulentū tu morem. Tunc igitur vbi ipsum absynthii decocto fo ueris, aliquod cataplasma mistis facultatibus præditū, superipones: quale est, quod ex sulfure & alumine con stat. Verum vbi lien in scirrhum obdūruit, præpollere vim digerentem oportet: parum autem eius quod a stringendi possidet facultatem, est admiscēdum. Mē ritò igitur salis flos induratos splenes sanat, si extrinse cus ipsis in vesica apponatur. Porro hepatis scirrhum, initio quidem sanauimus: inueteratū autem, neq̄ ipse potui sanare, neq̄ alium vidi qui posset. Quippe omni bus ita affectis omnino aqua inter cutem subsequitur. Nec verò perfert hoc viscus fortia medicamenta, vt splene. Quare si sit induratum, augere oportet ea quæ

Medulla vitu
lina.
Adipis differē
tiæ.

Induratorū tē
donū curatio.

Lien uehemen
tissimas potio
nes tolerat.
Lien indura
to congruentia
remedia.

Lienis ob fla
tum distenti cu
ratio.

Salis flos i uesi
ca appositus, in
duratos lienes
sanat.

Hepatis scir
rhus inuetera
tus est insana
bilis: quum ei
subsequat ne
cessario hy
drops.

Hepatis indu-
rati curatio.

Flatulenti tu-
moris curatio.

Natura pa-
tientum particula-
rum, auxiliorum
materias indi-
cat.

Doloris a cras-
so spiritu inque-
tre oborti, cu-
ratio.

Flatus discuti-
tia medicamen-
ta.

Dolores utris
mediocres ue-
extrinseca tan-
tum calfactione
sedantur.

Cucurbitula
umbilico ad-
mota utris do-
lores sedat.

ratione inflammationis illius apponuntur, in mistu-
ra emollientium: adhibita etiam congruente victus
ratione, una cum potionibus & dissipantibus, & ab-
stergentibus eum, qui in viscere continetur, humo-
reni. Admiscere autem oportet, & ex iis quæ ciere
possunt urinam, aliquid. Iam verò in omni flatulen-
to tumore, astrictum corpus est relaxandum: exte-
nuandus autem ipse crassus spiritus. Si igitur subtilio-
ri aliquo medicamine anodynoq; ubi dolor adsit, cal-
feceris, id quidem quod densatum est, rarefacies: ex-
tenuabis verò, quod crassius est redditum. At patien-
tium particularum natura, coindicabit convenientem
auxiliorum materiam: in ipsaq; maioris minorisq;
rationem. Ac secundum differentiam earundem, ma-
teria etiam curationis variatur, intenditurq; atq; re-
mittitur. Si igitur à crasso spiritu oboriatur dolor in
ventre inferiore, subtile oleum per ima, una cum me-
dicamentis quæ in ipso ebullierint, per clysterem ini-
ciens, statim dolorem sedabis. Quæ verò debent bul-
lire in oleo medicamenta, cum partium tenuitate cal-
facientia, sunt cuminum, apii, petroselinum, mara-
thrum, synonis, anethum, libyistici, feseleos, dauci, atque
spondylii semen. Quod si coniectura comprehenderis
frigidam esse dolentium partium dispositionem, ru-
tanum & marathrum, & grana lauri intus decoques:
miscabisq; asphaltum, ipsumq; oleum laurinum, &
si quæ similiter calfaciunt. At si inflammationem do-
lori adiunctam putaveris, auferes ea quæ admodum
acria sunt, quæq; calfaciunt impensius: ad relaxantia
verò, quæ vires illas mediocres possident, transibis.
In oleo itaq; anethum coques, miscabisq; adipem an-
serinum, vel gallinaceum. At verò mediocres dolo-
res extrinseca tantum calfactione iuvantur: ea præ-
cipue quæ ex miliis fit, vel ex sale calfacto, vel ex li-
ni semine crudo. Cucurbita etiam magna cum multa

flamma absq; cutis scarificatione, & prius statim dolorem amouit, vmbilico admota. Quod si etiam tum dolores permanserint, vti medicamentis ex opio ne dubites, quale est quod ad Philonē refertur. Sic enim hominem liberaueris à cruciatu, & sequentibus diebus noxam ex opio contractam, corriges. Auferunt enim id genus medicamenta dolorem, non tamē dispositiones sanant, sed vim sentiendi quodammodo stupefaciunt. Vti autem oportet Philonis medicamentum, omnibusq; ex opio confectis, non statim, sed post tempus compositionis annuū, aut omnino semestrem. Non modica verò sit virtutis distributio, & ex ebibitis ad inferiores intestinorum partes, dum afficiuntur: & ex iis quæ iniiciuntur per sedem, ad superiores, vbi dolore cruciantur. Porro discutiendo statui in partibus carnosissimis collecto (qui & nonnunq; vacat dolore, & longiori tēpore durat) ea medicamenta congruūt, quæ insigniter subtili constant substantia: cū quibus misceri debent, quæ molliendi facultatem sortiuntur.

De abscessibus.

Cap. VI.

DISPOSITIONES in quibus à se inuicē distant, quæ prius se contingebant corpora, communiter abscessus vocantur. Spatium igitur vacuum in medio fieri oportet, quod aliquam substantiam spirituosam, aut humidam, aut mistam ex vtriusq; comprehendat. Quæ substantiæ vbi diutius hærent, varias alterationes suscipiunt. Nam & lapidibus, & arenis, & testis, & lignis, & carbonibus, & limo, & amurcæ, & permultis aliis id genus similia in abscessibus corpora sæpe contineri inueniuntur. Transcunt verò in abscessum inflammationes quedam, atq; erysipelatosæ phlegmones, sicuti & erysipelata phlegmonosa non paucā: nimirum ab vno loco humoribus translatis in alterum. Quæ igitur per summa, sub cute consistunt, facillè dignosci possunt, neq; est sanatio ipsorum difficilis:

Opium redpiens
tiam medicamen-
ta dolorem tol-
lunt, ipsam in-
dispositionem
relinquunt.

Opio constan-
tibus esse uten-
dum post tem-
pus cōpositio-
nis ad min⁹ se-
mestre.

Intestinorū do-
lores ubicunq;
sint, iuari a bi-
bitis, & per se
dē infectis me-
dicamentis.

Abscessus qd.

Abscessibus
qualia soleant
in esse corpora

quum solis medicamentis quæ extrinsecus applicant, curentur: nec medicamentis intro assumptis indigeant, veluti quæ in visceribus accidunt. Curatio igitur earum quæ in superficie cutis abscedunt inflammationum, fit, incipiente quidem iam abscessu, per ea quæ dolorem sedant, relaxantque: procedere verò tempore, ad ea quæ concoquendi, suppurandique vim habere dicuntur, transferri oportet. Statim igitur aqua abundanti in qua fuerint decoctæ althææ radices, perfundere, atque oleo calido partem inflamatam conspergere, nec non ex farina triticea, quæ in aqua & oleo moderatè ebullierit, cataplasma imponere oportet. Si autem suppurationem prohibere sit animus, panem in oleo & aqua plurimè ebullire permittito: postea verò subigens admoueto. Sit tamen aquæ ad oleum proportio multiplex. Plus autem quàm hoc suppurationem prohibet hordeacea farina, similiter præparata. Si verò per summa cutis in parte inflammata tensio valida fuerit, multis ac mediocribus scarificationibus in superficie incidere oportet: ac postmodum ex farina hordeacea (ut diximus) elixata, cataplasma apponere. Cæterum in quibus difficulter ad suppurationem peruenit, nec faciliè discutitur tumor potest, sed suspitio est humores crassiores & tenaciores ibi impactos existere, in iis tantum dispositio nibus conuenit ea quæ sit per profundiores scarificationes curatio. Conuenit etiam id quod ex caricis pinquibus, dulcibusque & decoctis, conficitur cataplasma. Quarum sanè decocto, aliquando hordeaceam farinam adiicimus: aliquando panem syncomistum, hoc est miscellaneum: sed qui ex generoso confectus sit tritico. Porro farina triticea maximè ad suppurationem promouet. Hordeacea verò, resoluit plurimum. Si igitur resoluator tumor, minus tamè quàm optes, cum caricis hyssopum & origanum simul coquere oportet. Quod si vehementius exiccare tumorem volueris, sal decoctioni

Abscessu curatio.

Scarificationes profundiores quæ conueniunt. Emplastrum ex caricis.

Farina triticea quidem, maxime ad suppurationes promouet: hordeacea uero discutit.

adiicias: dein farinam hordaceam, detracto prius fure, insperge: & postq̃ plurimū ebullierit, appone cataplasma. Si verearis ne tumoris reliquie in scirrhu du-
rescant (quod contingit, vbi quis fortiter exiccanti-
bus vtitur) radicem agrestis cucumeris, aut bryoniae,
aut asari, in aqua decoque: sæpius quidem per se solas:
nonnunquam caricas pingues adiciens. Deinde aquæ
farinam admisce, iniiciens aliquid adipis anserini, vel
gallinacei, vel etiam suilli: Eædem quoq; radices, atq;
etiam quæ producit altheam, si post moderatam deco-
ctionem cum pane & adipe contundantur, huiusmodi
discutiunt tumores. Fortior autem hisce omnibus est
dracontii radix. Verum fortiter resoluentibus medi-
camentis semper sunt miscenda emollientia, ne tumo-
res ipsi in pertinaces scirrhos degenerent.

Tumoris i scir-
rhu abundantis
curatio.

Difficiliter
fortiter, cur se-
per sint miscen-
da emollientia.

De tumore suppurato. Cap. VII.

PORRO vbi suppurandi tumore amissa spes est,
ex farina triticea vtere cataplasmatibus. Dein ve-
rò postquam suppurata secueris, si videris ea quæ
circa sectionem sunt, omnino ab inflammatione libe-
ra, emplasticis medicamentis vtor, sed quibus exic-
candi, resoluendiq; citra morsum facultas insit. Equi-
dem sæpius in huiusmodi vsus sum medicamēto ex fer-
mento & ostreis combustis confecto. Si verò pars ali-
qua circa sectionem inflāmata videatur, quod ex chal-
citide constat, liquabis oleo: atq; vbi sensim refrigera-
tum fuerit, infundens vinum, in mortario emolles &
subiges: ac deniq; vsui accommodabis. Vbi verò cutis
per suppurationes plus quàm par sit, colliquata & ve-
luti lacerata fuerit, non facillè subiectis corporibus ag-
glutinatur: quare necessum est, vt per linicina latiora
vulnus ipsum curetur.

Tumoris sup-
purati curatio.

De sinu. Cap. VIII.

SIN autem amplius agglutinandi cutim subiectis
partibus creuerit difficultas (qui sanè affectus vo-

Sinus quid.

catur sinus) satius est fistulam directè perforatam, vel ex ære, vel ex cornu factam, habere in promptu: aut

Sinus curatio.

etiam aliquod ex iis instrumentis, quibus pus extrahi consuevit, quod foramen latissimū habeat: ac per id,

Medicamē ex charta combusta.

exiguum medicamenti nostri, quod ex charta combusta constat, liquatum oleo rosaceo in ipsum sinum

infundere: ac deniq; linamento concepto, ipsius os claudere. Cæterū quæ sic liquantur medicamen-

ta, oportet ut sint acriora, quā quæ linamentis excepta illinuntur: qualia nimirum sunt quæ omnibus

sunt in usu, colore viridi. Nam quum hæc ipsa oleo rosaceo non pauco soluere expediat, ut iniici possint

in sinum, necessariò certè ipsorum virtus exoluitur.

* Quæcūq; igitur medicamenta exquisitè emplastica, quale est Machæionis, Epigoni, & quod Isis co-

gnominatur, ubi ad emmotorum usum perducuntur, cerati indigent admistione, eadem etiam ad cu-

randos sinus sunt commoda. Siquidem qua ratione ipsis ceratum misceatur (nempe quod vires mordaces haberent, si per se sola liquecerent) eadem sunt

ad sinus utilia. Vbi verò sinus mediocriter fuerit op-

pletus carne, tunc agglutinantia medicamenta apponere oportet: veluti si recenti, & sanguinolento

vulneri medicareris. Sciendum autem est interim, omnia metallica medicamenta, subtiliorum partium

existere: sortiriq; maiorem vim exiccandi, ubi plusculum ebullierint. Quanto verò subtiliora medica-

menta fuerint, habuerintq; maiorem vim exiccandi, tanto plus in sinum operabuntur. Porro quum ad superiorem locum ipse sinus extenditur, facile per os

humor viciatus elabit. Si verò ad ima declinet, quum retineatur intus, partem aliquam continuam erodit.

Quare in huiusmodi sinibus, nisi prius ad effluxum sectionem feceris, nihil proficies: nec quum carnem gignere, nec quum agglutinare volueris. In aliis ve-

Sinui curando utilia medicamenta q̄ sunt.

Metallica oīa fortit̄ maiorē vim exiccandi, ubi plusculum ebullierint.

Effluxui puris esse faciendam sectionē aptā.

rò non est opus sectione, si modò conuenientem figuram in patiente parte seruaueris. Ex qua figura potes aliquando sinum ad partem superiorem vergentem, facere vt deorsum inclinet: sicuti & vergentem ad ima, cōuertere ad superiora. Aduerte autem mellicratum esse aptum ad conglutinandas penitiores ipsius sinus particulas. Post cuius vsum, prius quàm aliud glutinans medicamen adhibeam, aliquando vino solo, aliquando vino mulso, ipsum soleo sinu abluere. Etenim ad abstergendam, expurgandamq; adherentem saniem, mellicratum est præstantius: ad conglutinandum verò, vinum est melius, & efficacius: præcipuè quod in medio dulcis & austeri consistit. Et quidem post medicamenti agglutinantis applicationem, spongia recens ex mulso, aut vino, circumiciatur, quàm mollissimè fieri possit. Atque alligatio quidem incipiat à fundo sinus: desinat autem ad os. Linteorum verò circumductiones, cōstringantur quidem in fundo sinus, sed non ita vt dolorem iuferant: paulatim autem laxentur, vsq; ad os sinus: quod quidem habeat laxam alligationem, emplastrumq; quod ei extrinsecus admouetur, adedò discissum forficibus, vt ex ore ipso, humores vitiati, si qui excernantur à sinu, facile effluere possint: paruo aliquo alio ipsi imposito emplastro, vsque ad solutionem: quam tertia quaq; die faciens, auferes hoc ipsum, quòd veluti operculum hæret: id quod per totum sinum circumiectum est medicamentum relinquens. Iam verò, ex quantitate, & qualitate emanantis humoris, præterea ex dolore, vel indolentia, tumore, vel depressione partis affectæ, cognosces nuni pars ipsius sinus profunda, sit probè conglutinata. Siquidem si neq; in ipso sinu dolor sentiat, neq; tumor appareat, sed totus locus depressus, siccus, atq; expers doloris existat, viderisq; ad osculum pus exactè concoctum, nec non

Mellicratū esse aptum sinui conglutinādo Sinus qñ abluendus ex uino.

Vinum sinus glutinat.

Sinus quō diligendus.

Sinum glutinatum iri ex quibus signis colligi possit.

Medicamenta
sinui circūlinē-
da, esse debent
vehementē sic-
cantia.

Cutis lacere in
abscessib⁹ me-
dicatio.

quantitate paucum, bene sperandum est, de sinus gla-
tinatione. Si autem contraria se ostendant, nondum
sinus conglutinetur. Sit verò medicamentum quod cir-
cūlinitur sinui, vehementer siccans, citra tamen mor-
daciditatem: quale vtiq; nostrum existit, sine cera con-
fectum ex metallicis medicamentis elixatis, & oleo ci-
cino, & aceto. Quod nimirum vulnera cruēta conglu-
tinat, sinusq; sine molestia siccatur, si lixiuio prius sor-
des ablutæ fuerint. Porro vbi qui abscesserunt tumo-
res tardè secti fuerint, cutis ipsa admodum extenua-
tur, redditurq; laceræ vesti per similes. Quo tempore
utendum medicamentis est, substantia quidem humi-
dis: potentia autem siccis: quale est quod constat ex
lithargyro, & suillo adipe antiquo, & chalcitide, qui-
bus additum sit vetustissimum oleum. Confert etiam
in lacera cute non minus mel, si vsq; ad consistentiam
emplastri elixetur. Satius tamen fuerit ei myrrhā sub-
tiliter tritam, aut aloem, aut thus, aut aliquod ex his,
vel omnia simul aspergere: tum præcipuè, quum lin-
teo inunctum humidius apparet. Vtus etiam sum ali-
quando & tenui centauro, quod mirum est ad eiusmodi
medicamen. Post ipsum verò & symphytum utile
est: deinde ireos illyricæ radix. Postea farina ex oro-
bis: omnia hæc & per cribrum subtile transmissa, &
inspersa melli, dum ab igne amouetur.

De gangræna.

Cap. IX.

Gangræna qd.

Membru mor-
tificatum, qua-
ten⁹ sit absin-
dendum.

NVNC verò opportunum videtur de gangræ-
nis aliquid dicere. Sic enim vocant mortificatio-
nes eas, quæ ex magnitudine inflammationum fiunt,
nondum tamen absolutæ sunt factæ. Etenim quū ita
membrum effectum est mortuū, ut nec punctiōem,
nec sectionem, nec etiam vñtionem sentiat, statim ip-
sum recidere oportet, quia vicinam sanam partem at-
tingit. Ceterum quod sic affectū est, denigratur. Quod
verò in medio consistit, ut ad mortem proficiscatur.

appellatur gangræna. Curatur autem, euacuantibus: quidem nobis plurimū sanguinis, qui in patiente membro compingitur (cuius causa mortificationes fiunt) reliquo autem, exhibentibus transpirationem. Igitur aut cutem vniuersam multis sectionibus profundis scicare oportet, vnā cum subiecta substantia: aut plurimis scarificationib⁹ profundis incidere. Vbi verò sanguinem effluere permiseris, imponendū aliquod medicamen est, ex iis quæ ad putrescentia conducunt: cuiusmodi est ex oxymelite farina orobi, lolii⁹ ue. Si verò talia non adsint, fabarum farinam adhibe, atq; ipsum oxymel solum. Quòd si fortius medicamen apponere vis, adice sal, aut ex trochiscis aliquem exquisitissimè tritum, qualis Andronis, & Polyidæ, & Pasionis, & Musæ existit. Verū qui duras natura carnes sortiuntur, illi fortissima medicamenta desyderant: mollia verò, qui teneras. Ad maiorem autem securitatem, quando abscindis aut circūcidis id quod iam putruit, satius est ipsius mali radicem, parti sanæ coniunctā, adurere, vti sæpius consueuimus in pudendis facere: nonnunq̃ ipsis affectis partibus admoventes cauteria: nonnunq̃ linamentum interponentes. Facta verò adustione solemus vti succo porri, aut, si is nō adsit, recitatis trochiscis. Ad detrahendam autem crustā, medicamentis dicto Cephalico, ex melle vttere: aut pane ex hydrelæo decocto. Iuuat etiam hordeacea farina similiter præparata, aut cum ipsa triticea mista, illitaq; . Præterea, tetrapharmactum, & Macedonicum nominatum, sunt crustarum suppurationibus, atq; earū excidentis accommodatissima: & quæcunq; vim habent perducendi ad suppurationem. Panis etiam cum apio, vel ocymotus, optimè crustas dirumpit, & à sanis partibus eximit. Ex simplicibus autem medicamentis, iris, vel radix panacis, vel aristolochiæ, vel acori ex melle: In mollibus verò corporibus sat est farina orobi, cum

Gangrænæ curatio.

Putrescentibus apta medicamenta quæ.

Adurendā esse radicem putrescentis partitæ.

Escharam quæ detrahant.

melle, vel thure. Aufert etiam crustas Machæronis medicamentum. Quum verò exciderint crustæ, atq; huiusmodi vlcera idoneis medicamentis carne repleta fuerint, debet induci cicatrix.

De canceris.

Cap. X.

Canceri ubi & ex quo humore gignantur.

Atra bilis ex purgatur a liene, quem alit.

Atra bilis quos morbos excitet.

Cancer duplex curatio.

Canceri medicatio periculosa.

CARCINOSI tumores in omnibus consueverunt fieri corporis partibus, sed præcipuè in mamillis mulierum, * quæcûq; naturali sua purgatione priuantur. * Nam quâdiu hæc, ut oportet, adfuerit, tandiu mulier integra sanitate fruetur. Hi verò tumores omnes ex atræ bilis recremento gignuntur. Qui humor feci vinariæ similis, dum sanguis in hepate sit, ab splene expurgatur, cui est nimirum nutriendo. Quum igitur naturalis temperatura hunc humorem paucum genuerit, optimaq; victus ratio præcesserit, & ex ipso qui generatur, splen abundè satis attraxerit, nulla huiusmodi superfluitas coaceruatur in venis. Si verò contraria accidant, tunc succus is melancholicus multiplicatur in venis, à quibus nonnunquam, facultate expellendi extranea præditis, per hæmorrhoidas excernitur. Sæpius autem & ad varices decumbit. Quandoq; ad cutim vniuersam expellit, ubi gignit elephantiasim. Est quum ad alias corporis partes, quæ cæteris ibecilliores sunt, humor iste decubitat. Quo tempore euidenter apparêt quæ in loco affecto sunt veng, crasso & nigro sanguine ibutæ. Qui quidè quâto crassior fuerit & nigrior, tâto deterior est passio. In mamillis autem sæpe vidimus tumorem figura animali cancro persimilem. Hunc igitur morbum per sui initia sæpe sanauimus, medicamentis quæ atrâ bilem educerent. Vbi verò in molam insignem attollitur, curari sine chirurgia non potest. At scopus in huiusmodi curatione est, totum qui circumstat tumorem præter naturâ, qua partibus sanis adhæret, abscindere: ob vasorum tamen magnitudinem, præsertim si fuerint arteriæ, profluuii san-

guinis statim periculum imminet. Quòd si laqueis ipsa excipias, * per consensum afficientur continuæ particulæ. Si verò radices morbi exurere animus sit, neque huic rei maximum periculū deest, * si prope loca principalia insignis adustio fiat. Porrò in Alexandria, pluri mi, ob crassam victus rationem, atq; regionis feruorē, elephantiasi corripuntur. At in Germania & Mysia, rarissima hæc passio videtur: & apud Scythas lactis potatores, nunquā ferè apparuit. Huic igitur morbo melancholici succi conferunt purgationes. Quòd si ætas atq; virtus pmiserint, sanguis prius mittendus est. Sed neq; in cæcris inutile est, vbi nihil prohibet, primò sanguinem mittere, ac dein purgare: enocare q; mēstrua, si sint mulieres, nec attigerint quinquagesimū annum. Ipsi aut patienti particulæ, succus solani imponat, vel medicamen ex pōpholyge constans, quo vtor ad caneros exulceratos: vel etiam quod ex chalcitide fit, si copia illius non detur. Quod pertinet ad victus rōnē, succus ptisanæ abundanter est exhibendus, & serū lactis: at ex oleribus, malua, attriPLEX, atq; bletum. Cucurbitis etiam, si occasio ferat, vtendum, & piscibus saxatilibus, auibusq; omnibus, exceptis palustribus.

De elephantiasi.

Cap. XI.

AT IIS qui elephantiasin patiuntur, mirabile auxilium est viperarum esus. Quas quidem, vbi caput, caudamq; vscq; ad digitos quatuor abscideris, excoriarisq; ac deniq; interanea exemeris, in olla, prius ablutas coques, donec exquisitè molles reddant. Adicere tñ debes aquæ, in qua illæ elixantur, porrū, anethumq; & olei nōnihil. Ipsum etiā medicamentū confectum ex viperis, confert in potu exhibitum, iis qui huiusmodi morbo laborāt: vel cuti etiam illitū. Porrò ad sanandas strumas, optima sunt quæ astringere, & exiccare, & pus etiam facere pñt. Ad meliceridas autē, quæ ipsas dissoluendi vim habent, & quæ pus di-

Elephantiasis in Alexandria inuālescit plurimum. Elephantiasin i Germania reperiri rarissimè, falso Galenus affirmat.

Cancrī exulcerati remedia.

Cancris vīsus ratio cōueniēs

Elephantiasis conducit viperarum esus. Viperæ cōcinatio.

Theriace elephantiasis confert, comesta, illitaq;.

Hydropis cu-
rationis scopi
tes.

scutiunt medicamenta. At verò curatio hydropum,
ad has tres reducitur intentiones: vt sanemus du-
rum tumorem, quo viscus affigitur: & apponamus
ea quæ humiditatem dissoluant: & pro-
pinemus medicamenta quæ
moueant yrinas,

FINIS.

ILLVSTRISSIMO ET SAPIENTISSI-
mo Viro, D. D. Ioanni Furtado à Mendoz-
za, apud Venetos Oratori Casareo lon-
ge Dignissimo, Andreas Lacuna,
Secobiensis, Doctor Med.
Miles Sancti Petri.
S. P. D.



IX MAXIMAM IN-
gratitudinis notam, aut decli-
nare, aut eluere, semel iniustam;
possem; Vir Illustriss. si ex lucu-
bratiunculis meis, sub umbra
Amplitudinis Tuæ ad absolutio-
nem perductis, portionem ali-
quam tibi non impertirer. Nam quum ex mercimo-
niis singulis; quæcūq; inter subditos Caesaris in hac Ve-
netorum Vrbe splendidissima contrahuntur, ad egre-
gium & Consularem Virum Thomam Sornozzam,
uel Casareo decreto, nonnihil frugis pertineat, q; per-
petuò illis patrocinetur, eorumq; uniuersas lites com-
ponat: multo magis, mea quidem sententia, rationi
consentaneum uidetur, ut optima quæq; ingenia, qui-
bus contigit huc suos labores aduehere, ex meditatio-
nibus suis aliquod Dignationi tuæ literarium etiã tri-
butum pendant, à qua nimirum fouentur, aluntur, lo-
cupletantur: cuiusq; in studiosos omnes patrocinium
atq; benignitatē sum ipse omnium maximè expertus.
Consilium impræsentiarum est præterire silentio im-

mortales istas uirtutes tuas, prudentiā, temperantiā,
 continentiam, constantiam, animi magnitudinem, mul-
 tiplicemq; doctrinam, quibus totus splendes: ne aut ea-
 rum sublimitatem claudicante oratione non assequar:
 aut reluctari uidear singulari modestiæ tuæ, quæ ut po-
 pularem semper aurā contempsit, sic nihil magis exo-
 sum habet, quàm huiusmodi encomia. Amplissimum
 quippe integritatis tuæ, uel me tacente, argumentum
 est, q̃ Carolus. V. Imperator, te sibi accersendum du-
 xerit, ut in hac tam angusta Repub. uices suas gere-
 res, grauissimāq; administrares negotia. Quum igitur
 minimè contemnenda artis Medicæ pars, in ua-
 cuatione redundantium consistat: ac uacuatio quidem
 ipsa, partim per uenæ sectionem: partim per purgan-
 tis pharmaci exhibitionem: partim per hirudines, cu-
 curbitulas, atq; scarificationem soleat administrari;
 haud ab re me facturum existimaui, si Galeni tres com-
 mentarios de phlebotomia, quorum primo titulus est
 de uenæ sectione aduersus Erasistratum: secundo, de
 sectione uenæ aduersus Erasistratæos Romæ degentes:
 tertio, de curandi ratione per uenæ sectionem: ac præ-
 terea alios tres, unum de hirudinibus, cucurbitulis, &
 scarificatione: secundum, de purgantium medicamen-
 torum facultatibus: tertium deniq; in quo docetur,
 quos nam purgare, & quando, qualibusq; medica-
 mentis oporteat, offerrem Amplitudini Tuæ: hisq;
 etiam, ueluti auctariū quoddam, adiungerem libellum
 de ptisana, consiliūq; à Galeno conscriptum puero
 cuidam epilepsia laboranti. Nihil ergo iam superesse
 videtur,

uidetur, nisi ut ipse, Pater Observandis. hosce octo
commentarios, pusillos quidem, si chartularum tan-
tum ratio habeatur, sed mortalium uitae admodum sa-
lutaes, pignora quaedam officij erga te mei, quam be-
nignissime excipias, munerisq; tenuitatem non asper-
neris, memor eos qui thure carerent, fuisse olim Diis
mola salsa litare solitos. Vale, Musarum ho-
spitium Amplissimum. Venetijs: ex aedibus tuis,
tertio Idus Aprilis. M. D. XLVIII.

**GALENI PERGA-
MENI, DE VENAE SE-
ctione aduersus Erasistratum.
Liber vnus.**



IN QUIDEM
illud inquisitione q̄ diligē-
tissima dignū esse videt̄,
cur nā Erasistratus, quum
cetera quæ ad artem spe-
ctant oīa, etiam minima
quæq; satis superstitiose
tractarit, de venę tñ sectio-
ne, pūtaneo illo vnicoq;
remedio, & qđ apud uete-

Erasistratus ne
minimum quide-
m sermonē
fecit de sangui-
nis detractione.

res fuit maximi pōderis, ne minimū quidē, nisi obiter
& p̄ transennam, sermonē fecerit. Nam dum ait inflā-
mationes, exempli gr̄a, quæ vulneribus superueniūt,
vacuatione quæ per inediam fit, esse curandas, miror
sanē, q̄ auxilio expeditissimo omisso, ad tardissimū,
minimeq; tutum confugiat. Ego verò, quādoquidem

Phlegmonas
vacuari facili-
ne promptissi-
mè p sangui-
nis detraçtio-
nem.

inediæ ut eua-
cuât phlegmo-
nem, longû tẽ-
pus defyderât,
ex æquoq; uni-
uersum corpus
naniunt.
inediis longis
quæ incômo-
da soleant sug-
gerere.

inediam uacua-
re, sed lōgo tẽ-
pore, & cū pe-
riculo.

Natura pluri-
mos morbos
soluit p excre-
tionem sangui-
nis.

Naturam non
esse impediẽ-
dam, sed iuuan-
dâ, monet Hip-
pocrates.

per inflâationes necessaria vacuatio est (vel Erasistra-
ti testimonio) eam oïum facillimam, prôtissimamq;
venæ sectione p̄fici arbitror: vtpote p̄ quam ipsas etiã
phlegmonas solas, celerrimè curare possumus: quum è
diuerso inediæ, præter q̄ quod longû tempus regrant,
æqualiter etiã vniuersum corpus euacuant: id qđ cer-
tè nō est expediens: vt interim alia reticeã incōmoda,
quæ in dias *lōgas necessariò sequunt: cuiusmodi sunt
virtus defatigata, succi biliosiores atq; amarulentio-
res effecti, morsus cordis frequentes, inquietudines,
deiectiones suppressæ, ac breuiter, omnia recremen-
ta * mordaciora & acriora reddita. Quorum Eras-
istratus nihil animaduertens, cœcorum more, qui am-
plam, compendiosamq; & planam viam in propin-
quo habentes, sæpenumero angustã, prolixam, aspe-
ramq; errabundi incunt, & ipse propinquam admo-
dum, satisq; expeditam & amœnam semitam asperna-
tus, ad impeditam illã, salebrosam, & longam se con-
tulit. Quippe qui hoc tantum consyderauerit, num
quò ipse contendit, via eò vergat: non autem an com-
pendiosè, & sine periculo ducat. Nam quòd vel in-
edia ad plenitudinis vacuationem conferat, ego non
eo inficias: verum longo tempore, magnoq; cum no-
cumento, eam efficere id profiteor. Iam verò, quum
Erasistratus perpetuò admiretur naturam, ceu artifi-
ciosam, prouidamq; animalium gubernatricem, nus-
quam tamen eam imitatur. Aut cur illã plurimis mor-
bis sanguinis euacuatione medentem cernens, ne in
vno quidem, ipse tali præsidio vtitur? Itaq; mihi aut
modis omnibus demens, aut in naturæ operibus quã-
minimè versatus esse videtur. At omnium bonorum,
quæ ad medicam artem spectant, nobis author Hippo-
crates, nos monet accuratissimè (id quod etiam Eras-
istratus nos monere debuisset) vt quãdiu natura for-
tis atq; vegeta existens, sese ad crisum accingit, nō per-

turbemus qdē motū ipsius perficiamus aut ea, quæ superata morbosarum causarū vehementia, non pōt ad integritatem perducere. Quæ iudicantur, & iudicata sunt (inqt) integrè, nec mouere, nec nouare, sed sinere. Istud quidē habes proprium naturæ integrè mouētis præceptū. Quod verò huic succedit, naturæ & ipsum, verūm diminutè ad crīsim mouenti cōgruit: eāq; ob rē ut illi simus auxilio iubens, ait. Quæ ducere oportet, hæc quòd maximè natura vergit, per loca conferentia, ducenda sunt. Natura siquidē tumtemporis expellere aduersariū conatur: quum autē, præ imbecillitate imponere operi finē non possit, auxiliū nostrum implo-
rat. Propterea etiā laborantes dolore lateris, iugulum affligente, aut regiōnē quæ supra præcordia est, secta interna cubiti vena dicit esse vacuandos. Vbi verò dolor sub septo trāsuerso fuerit, vt subducatur aluus vel nigro ueratro, uel peplio, cōsulit. Similiter in quopiā renum affectu, uenam quæ in poplite est, incidendā censet. Idem etiā, Margei famulam, cui ob contortū ad vertebrae coxarum os uteri, purgatio suppressa erat post partū, atq; inde grauis dolor sequit^r, restituit, uenam prope malleolū secans: quīs tremores totū corpus iam occupassent. Sed neq; ex iis qui rōnalē, empiri camq; sectā amplexi sunt, quisq; à venæ sectione abstīnit. Vt autē naturæ opera producamus, an nō ipsa cūctas mulieres singulis mensibus, q; ob ignauīā & oriū, multitudinem humorū coaceruent, superfluo sanguine euacuat? An non etiā idem post partū molitur, quā uis foetura ipsa quædā spēs uacuationis existat? Ad hæc uerò, postq; foetus æditus est in lucē, lactis gñatio in mammillis nō pua & ipsa euacuatio plenitudini existit. Vna siqdē & lactis & mēstruorū substantia est: amborumq; (vt quispiā dixerit) riuorum fontes cōes, sunt uenæ. Quam ob rem, quibuscunq; per ætatem menses fluere cessarunt, iis neq; in mammillis lac amplius gignitur.

Plurimici quomodo sint uacuandi ex doctrina Hippocratis.

Menstrua cui mulierib⁹ profuant singulis mensibus.

Lactis & menstruorū una substantia est. Lactis nō gignitur, quibus menses cessarunt.

Lactantes non purgantur.

**Lac iis nō ad-
est quæ nō ge-
runt utero.**

**Menses cui p-
be fluunt mu-
lier qbus mor-
bis non infe-
retur.**

**Hæmorrhoides
fluētes suppres-
sæq; quorū ho-
norū, atq; ma-
lorum existant
causæ.**

**Contrariorum
eē cōtraria re-
media.**

**Bruta sibiipsis
natura ducē,
medentur.**

**Sanguinis de-
trahendī men-
suram, q̄ aliorū
auxiliorū, mul-
to facilius de-
prehendī.**

Quæcūq; etiam purgandi tempora adhuc habēt, atq; interea lactant, cæ non purgantur. Præterea quū lactanti mulieri sanguis per locos erūpit, illico huic lac euanesceat. Insuper quæ animalia non gerunt utero, iis neq; lac vnquam adest: rursus quibus id suppetit, illa etiam ad concipiendum idonea sunt. Porro si mulier per excretionem illam menstruatam probè expurgetur, nec podagris, nec articularū doloribus, nec pleuritide, nec peripneumonia, nec aliis deniq; ex plenitudine affectibus infestabitur. At mensuris retentis, eam cuilibet malo implicari facile est: huicq; rursus euacuationes medentur. Ex hominibus etiam, quibuscūq; pro consuetudine superflua per hæmorrhoides uacuantur, si omnes vitam morbis minimè impeditā agunt: quibus item supprimuntur inanitiones, hi in perniciosissima quæq; labuntur. Ac proinde, quum vel in tre morem, vel in hydropem, vel in alium affectum frigidum, mas quidem ob hæmorrhoidū, mulier verò ob mensium retentionem, inciderit, Hippocrates commendat meritò euacuationem sanguinis, per conuenientia loca: quum nimirum contrariorum contraria remedia existant. Natura quippe (quam ille Vir imitatur) in ediam adiectione, repletiones euacuationibus, frigus calfactionibus, caloresq; refrigerationibus curat. Nam (vt alia multa subtriceam naturæ miracula) frequenter conspexi canem sese prouocantem ad vomitum. Vidi & auem Aegyptiani, quæ clysmum imitabatur. Grues etiam, aquilasq; prælongo vsq; ad ultimos terrarum fines volatu, partim frigus, partim æstum vitantes, quo contraria cōtrariis propulsent, videre licet. Sectio itaq; venæ (vt eò vnde digressa est, nostra reuocetur oratio) ob causas dictas perperam ab Erasistrato omittitur. Quod autem mensura in venæ sectione multo facilius deprehendatur, quàm in cæteris quibusuis auxiliis, hinc declaratur. Nam & colo-

ris mutationem, nunc quidem in ipso fluente sanguine, nunc verò in ægrotantis corpore, dispicere licet. Animi quoque defectio in plurimis affectibus vacuationis terminum obtrinet: quemadmodum sanguinis fluentis vigor læguescens, & pulsus mutati. Adde quod & medicus huius solius euacuationis liberam habet facultatem sistendæ, quandoquæ illi placuerit: aliarum autem nullius. Nam ubi propinandum sit aliquod medicamen, prima exhibitio in tua potestate sita est: cætera verò, fortuna administratrice obtrungunt. Iugens præterea in propinationibus pharmacorum periculum est, quum vel non commouetur purgatio, vel quod in aluum attractum est, non facile excernitur, vel cum dolore, torminibus, refrigeratione, pulsuum evanescentia, ac defectu animi exprimitur: vel quum corpus vehementer perturbatur, interimque paulum admodum euacuatur, aut euacuatio modum excedit: id quod sæpius, ceu extremum malum, contingit. Neque enim ut venæ incisæ fluxum mox digito superposito sistes, sic sistere alui profluuium poteris. Cibi etiam cuiusque in mensura erratum grauisissima incommoda inducit: ut in hominibus extenuatis & imbecillibus constat. In quibus si quid minus, quam par sit, nutriat, virtutem tabidam reddet. Si verò modum exuperet, naturæ potius oneri, quam nutrimento, fuerit, illamque penitus & extinguet, & suffocabit. Ut autem funditus Erasistrati opinionem evertam, solam instituētis inediam, ad euacuandas omnes inflammationes, nemo ignorat, mea quidē sententia, inediam ipsam priuationem quandā existere, ac proinde nec nutrire, nec euacuare posse: quum inter inanitionem & vacuationem sit media. Nec verò existimandum est, aliquem vnquam periisse ob inopiam ciborum: alioqui animantia delitescerent: ia in latebris sine ciborum copia, perdurare nequaquam possent, quem admodum certè perdurant: quia nutrimento non in-

Sanguinis euacuationis sistendæ, medicus habet liberam potestatem aliarum autem nequaquam. Purgationi superuenientia discrimina.

Cibi in mensura erratum, grauisissima incommoda, inducit.

Inedia, priuatio quum sit, nec nutrire, nec inanire potest.

Lætia absque cibo durare.

Interiisse ob d
borū inopiam,
nemine absq
ea raritas cutis
euacuat.

digent: quandoquidem ob desidiam atq; torporem,
in quo versantur, necnon ob astrictam cutem, nihil
ab eorum corpore exhalat, quod cibo istaurari possu
let. Itaq; non inedia, sed raritas cutis euacuat: quam si
frigore & quiete densaueris, quid commodi fuerit ex
fame expectandum? Cæterum dum Erasistratus cuiq;
instituere inediam contendit, videtur mihi ipsemet af
fectuum qui inedia opus habeant, author & promo
tor existere.

GALENI PERGA

MENI DE VENAE SE-

ctione aduersus Erasistratos Ro
mæ degentes. Liber vnus.



Inflamationes
omnes sola in
edia euacuan
das esse cense
bat Erasistrat⁹.

Inedia, quæ in
ducere soleant
symptomata.

VVM ROMAM INITIO
venissem, incidi in medicos quosdā,
qui à venæ sectione rātopere abhor
rebant, vt quum aliquādo æger q̄
piani propter plenitudinē iam præ
focaretur, ne tum quidem hoc auxi
lio vti vellent: idq; secuti Erasistratum, qui nusquā ve
næ sectionem probans, omneis inflamationes sola in
edia euacuandas esse censebat. Qua in re quantopere
vir ille hallucinatus fuerit, quis non cernat. Etenim si
ob id inedias probamus, q̄ vacuatis per eas venis, affe
ctum minui contingat, multo hercle commodius fue
rit, vt semel adhibita euacuatione, potissimū quæ per
sectam venam administratur, ab inediis abstineamus:
vt quæ & ægrotos ingenti molestia soleat afficere, &
vigilias, & inquietudines, afflictionemq; oris ventricu
li, tum corruptionē succorum, necnō alui, atq; inter
dum vrinæ suppresionem inferant. Quamobrē non
nulli in Romanavrbē medici, præcipuē qui medebant
mulieribus, quū explorassent infelicē cuiusdam puellæ

ob non sectam venā, successum, in quibus sanguis ferebatur ad superiora, tempore quo eruptio menstruorū expectabatur, venæ sectionē iam vsurpabant. Nec verò quietem, nec inediam eis iniungebant: sed melicratum propinabant: victuq; humectante, ac lauacris affatim vti eis permittebāt. Ab his enim, si vel mediocri quantitate sanguis fuerit detractus, purgationes exoriri confestim solent: præsertim si infra poplitē, aut iuxta talum venæ sectio fiat. Sin autē quis vena secta iniunxerit ipsi mulieri inediam, menses prius fluentes cohibebit, inculpabilesq; reprimet purgationes. Sanguis nanq; ciborum inopia arefcit, ac densior seipso renascitur: eamq; ob rem, ad fluxum ineptus euadit. Quæ igitur tum lotæ fuerint, melicratumq; & cibos idoneos sumplerint, ac vinum neq; austerum, neq; crassum biberint, his purgationes proculdubio contingent: ob idq; ego inedias post venæ sectionē non frustra tantū, verū etiam adhiberi cum magno damno profiteor. Iam verò quum nostra hac tempestate mulieres quædam Romæ frigidissimam ex niue potarēt, ob idq; aut nullo pacto purgarentur, aut diminutæ: eas tamen medici sectione venæ ad eò incolumes seruauerunt, vt nec sanguinem spuerent, nec pleuritide, peripneumonia, aut angina vnquā corripenterent. Porro in auspiciis inflammationum, omnis sorbitionum, ciborumq; adiectio subtrahenda est: utendum verò venæ sectione. Siquidem inflammationes quæ febres faciunt, vt plurimum, ex plenitudine fiunt. Quam ob rem si vasa nutrimento impleantur, maiores ac vehementiores ipsæ inflammationes reddentur. Cæterum si adolescentes qui neq; de sanguis detrahēdi mēsurā, nec de venarū secandarum ratione quicquā audiuerint, ad presidium hoc sese accingant, ægros in exitiū perducant. Plures nanq; ob perperā sectā venā perierunt, q̄ quibus adhibitū id auxiliū nō fuerat. Quippe seniores medici tum

*Menses euocant
venæ sectæ in-
fra poplitē, iux-
taq; talum.*

*Inedias post ve-
næ sectionē cū
magno damno
adhiberi.
Menstrua qui-
bus suppressa
ob niuis potio-
nem fuerāt, ve-
næ sectione suc-
cursum fuisse.
Inflammatio-
num curatio.*

*Venæ sectione
perperam ad-
ministrata pe-
riisse plures, q̄
quibus adhibi-
tum id auxiliū
non fuerat.*

Febres cunctæ
in principio nõ
egent uenę se-
ctione.

Peccare qui
plus dicantur.

Inediam & ue-
næ sectionē si-
mul circa unū
eundēq; agrū,
minime eē u-
surpandam.

Plethorici oēs
non egent ue-
næ sectione.

Venæ sectione
pleriq; idigēt,
qui tamen ex-
tra plenitudi-
nem sunt.

temporis uenas secantes, utebantur aliis euacuatoriis auxiliis, quæ idem quod & venæ sectio, verum longiore tempore efficere poterant: nisi q̄ quandoq; ob principem partem affectam, aut ob plenitudinis exuperantiam, æger morte præoccupabat. Verum qui febres cunctas in principio venæ sectione indigere autumat, non mediocri etiam noxa ægrotos afficiunt. Itaq; minus aberrare eos consentaneum est (ut Plato ait) qui non aggrediuntur illa quæ ignorant, quam qui ea tractant, quæ didicerunt nunquam. Porro q̄ uas aliquod ruptum possit absq; inflammatione coalescere, dummodo nos cætera ritè administrauerimus, sanguinisq; quantum nobis visum fuerit, in tempore euacuauerimus, liquidò constat. Frequenter siquidem vidimus, quum quibusdam pugnantibus singulari certamine, * totum crus brachiumue dissectum esset, coaluisse tamen vulnus, antea quam inflammatiō oriretur: quod quidem multo magis cōtinget, si (ut Hippocrates ait) illico sanguis copiosus fluxerit. Sæpius etiā vulnus in cauas thoracis partes illatum, triduo conglutinatum vidimus. Quod autem Erasistratus nusquā fuerit vsus venæ sectione, hinc perdiscere licet, quod in plenitudine omni semper inediam iniungat: id quod neutiq; facturum esset, si eam sanguinis detractione vacuaret: quum minimè consentaneum rationi sit, ut quis circa vnum eundemq; agrum, utraq; auxilia, nempe inediam, & venæ sectionem, vsurpet. Nec verò existimandum est, plethoricos omnes sanguinis esse detractione vacuandos. Prius si quidem distinguenda natura plenitudinis est: habitudoq; & ætas ægri expendenda: tempus item, regio, & aeris constitutio consyderanda: nec non quæcūq; antecesserunt, quæq; ipsum agrum etiamnum infestant synptomata. E conuerso alios plerosq; tibi ob oculos ponam, qui absq; repletionē quā sint, nihilominus venæ sectione opus hnt.

GALENI PERGRATI

MENI DE CVRANDI RATIONE

per missionem sanguinis.

Liber vnus.



VI DE SANGVINIS MIS

sione speculantur, primò quidē inuestigare debent, quæ nam corporis affectiones euacuatione indigeant. Secundò, quæ illa, quæ per sanguinis sit detractionem. Tertiò, qui innoxie

Sanguinẽ de-
tracturo cõsy-
deranda.

hanc ferre possint euacuationem. Quartò, quo nam potissimum tempore ipsa inolienda sit. Quintò, quam ex venis secare oporteat: quum nimirum haud parua inter sit, hanc hē, an illam incidas. Porro hac quoq; cõtemplatione absoluta, succedit de scopis oratio. Quibus mentem adhibens quis, vacuationis modum facile per coniecturam inuenerit: nec non in quibus semel auferre præster: & in quibus repetitam ablationē moliri: tum in quibus nam inanire vsq; ad animi expediat deliquium: & in quibus id, ceu summum malum, vitare. Quum autem per omnē vitam, omnia quæ in quæstionem veniunt, duo inuentionis organa obtineant, nempe rationē & experientiam: necesse esse arbitror, & nunc quoq; me, aut ratione sola, aut sola experientia, aut iunctis amabamus, quæ proposita sunt, scrutari. Si quis ergo affectiones quæ vacuatione indigent, velit experientia collectas exponere, sola opus est ad explicationē memoria. At si via rationali id efficere instituat, necesse est, vt prius commune ac generale inueniat, ex illiusq; deinde in species differētiās; sectione vsq; ad species vltimas, affectuum numerum, vacuationem desyderantiū, inueniat. Etenim ratio ipsa, hæc quidem, ex communibus tantum progrediens notio-

Inuentionis or-
gana duo, ratio
atq; experien-
tia.

Ratio duplex.

nibus, inuenit & demonstrat: hæc autem, etiam quæ ex istis inuenta sunt, ad demonstrationem adhibet. Ac priori sanè ratione, omnes artes, omnesq; homines uti assolent. Secunda verò, non omnes homines: nam propriè ad artifices pertinet. Eam igitur nos impræsentiarum sequuti, utemur multis, quæ in aliis commentariis, sunt demonstrata. Nempe compfures esse facultates quæ animalia gubernant: quarum alias naturales, alias animales vocari. Generationis autem principiis pro materia, quatuor elementa subiici: eaq; tota per sese mutuo misceri: esseq; inuicem in se agere nata, idq; per qualitates suas effectrices, caliditatem, frigiditatem, humiditatem, & siccitatem: ex quibus utiq; omnium temperamenta constantur.

Facultates animales dispensantes sunt plures. Elementa quatuor, subiecti principis generatio- nis eaq; totap tota misceri.

Præterea dari duplicem plenitudinem, nempe secundum vasa, & secundum vires: primariasq; actiones, à similarib⁹ corporibus perfici: ut secundarias ab instrumentariis. Quum igitur plenitudo bifariam & fiat, & dicatur, vno quidem significato, ut ad vires: alterò iuxta laxitatem continentium vasorum: utriq; sanè opus est vacuatione: siue ea in homine valetudinario, siue etiam in valente contigerit. Voco enim plenitudinem

Plenitudo est duplex: nempe iuxta vires, & iuxta vasa: quarum utraq; eget euacuatione.

Plenitudo iuxta vasa quid sit.

Plenitudo iuxta vires quid sit.

iuxta vasa, magnam humorum colluuiem; ipsa vasa tendentium: iuxta vires autè, eam quæ vel si minimè vasa distendat, vires tamen grauatur, & premit, hominèq; reddit ad motiones pigrum, & tardum. Quòd si simul adsit vlcerosus etià aliquis sensus, ac potissimum dum mouemur, signum est affectum ipsum vitiosi succi esse sobolem. Quandoq; autè, & in partibus quibusdā corporis, nō in tota mole, plenitudines adsunt similes iis, quæ vniuersum corpus solèt opprimere. In omnibus igitur id genus affectibus, maximè ex usu sunt vacuationes humorum, aut vaporum, aut spirituum peccantium: minimè tamè semper sectio venæ desideratur: sed sufficit interdum purgatio, frictio, balneum, inun-

tioq; ex aliquo digerente medicamento. Quæ autem
 affectiones venæ sectione indigeāt, deinceps dicemus.
 Non solum nutrimentum animantis partibus præstat
 sanguis, sed calorem etiam naturalem cōseruat. Itaq;
 ipsius cordis calor interdum quidem, seipso minor ef-
 ficitur, aut propter sanguinis copiam, à qua nimirum
 extinguitur, aut propter ingentem inopiam, aut pro-
 pter frigidam qualitatem: interim verò maior, aut pro-
 pter calidam sanguinis qualitatem: aut propter exiguā
 inopiam. Quicquid autem cor in caliditate frigidita-
 teq; perpetitur, eius quoq; & aliæ corporis partes pro-
 tinus participes sunt. At, quæ membratim accidunt
 caliditates, aut frigiditates, eas quæ parti quidē af-
 fectæ vicinæ sunt, vnā alterant: in totum tamen exten-
 di corpus, prius quàm cor immutent, non possunt.
 Cæterum quandoquidem omnia simul calida & hu-
 mida * citissimè computrescunt, sanè si quod nutri-
 mentum suggeritur à ventriculo ad hepar, à natura
 non superetur, inq; probum sanguinem non conuer-
 tatur, aliàs aliam perpetietur putredinem. Quum au-
 tem quæ ex materia putrescunt calida, quàm antea
 calidiora reddantur, calidior profectò erit ipse san-
 guis putrescens: ac proinde etiam particula, in qua ei
 putrefieri contigerit. Quia verò ab insigniter calidis,
 simul quæ vicina sunt incalescunt, utiq; calor ille acris
 & mordax (qualis à putredine oritur) illis quæ vltè-
 rius sunt, communicabitur. Ergo si pars quæ hoc pa-
 cto incaluit, insignis sit, aut calorem suum in cor ex-
 tendere valeat, vnā & ipsum accendet, vt quod na-
 tura calidissimum sit. Quòd si semel illud accensum
 fuerit, facilè totum ipsius iam corpus simul exalfiet:
 qui affectus vocatur febris. Nonnunquam verò, prius
 quàm computrescat sanguis, ingens ipsius vis, decūbit
 in partem aliquam: quam aut extinguit omnino, ita
 vt actio ipsius pereat: aut illi certè noxam non con-

Sanguis nō so-
 lū alit animal,
 sed caloriē eius
 naturalem con-
 seruat.

Cordis calor
 unde minor at-
 que maior red-
 datur,

Cordis intem-
 peries p̄tinus
 cæteris parti-
 bus cōcitantur.

Putrescunt cl-
 tissime calida
 & humida.

Putrescētia red-
 di calidiora q̄
 antea.

Febris quid.

Apoplexiæ fi-
unt multo san-
guine incēben-
te in animā
principium.
Phlegmenes
generatio.

Scirrhus.

Oedema.

Erysipelas.

Plenitudo iu-
cta vires faci-
le in putredinē
abit.

Sanguinem de
tracturo q̄ sint
prius expēden-
da.

Plenitudinis
utriusq̄ quan-
titas, qualitas,
q̄ q̄bus signis
sit desipienda.

temnendam infligit. Hoc siquidem pacto apoplexiæ
proueniunt, multo nimirum sanguine incūbente con-
fertim in animantis principium. Quod si in aliam par-
ticulam ruat, tumorem inibi præter naturam excitat.
Cui⁹ generis phlegmone existit. Verūm si crassior sit,
atræ bilisq̄; magis naturam referat is qui decubuit san-
guis, scirrhusior tumor efficitur: sicuti si pituitosior sit
fluxio, laxis: & si biliosus, tumor erysipelas dictus.
Quum itaq̄ plenitudo (quæadmodum exposuimus) sit duplex, & ex ipsis, ea quidē quæ ad vires refertur,
facile in putredinē abeat, interdumq̄; in partes quas-
dam ingruēs, inibi tumores præter naturam excitet:
altera autem, quæ iuxta vasa dicitur, sæpe etiā in par-
tes quasdam decumbat, tumoresq̄; & apoplexias, ve-
narumq̄; ruptiones molitur: utrāq̄ celeriter euacua-
re tentandum, prius quàm aliquam perniciem conci-
liet. Si igitur qui plenitudine grauatur, aut tenditur,
nec puer sit, nec senex, an illi venam secare oporteat,
expendes, præ oculis habēs hosce principales scopos:
plenitudinis nempe tum quantitatem, tum qualitātē:
virium robur, atq̄ earūdem infirmitatem: naturalem
totius corporis habitum, tempus, regionem, antea actā
vitam: tum an cibi potusq̄; copia, & præcipuē affatim
nutrientium, qui sic affectus est, fuerit vsus: ad hæc cō-
suetudinem, & res præter consuetudinem actas: quo-
usq̄ mot⁹ exercuerit, quas excretionem habuerit, aut
præter solitum compescuerit. Præter omnia autē hæc,
num gracilior, aut crassior euaserit. Porro vtriusq̄ ple-
nitudinis quantitas, ex propriorum signorū magnitu-
dine definitur. Quanto enim grauior sibi homo vide-
bitur, tantū & plenitudinem quo ad vires creuisse con-
stat. Ad eundem modum, quantum auctus fuerit ten-
sionis sensus, tātum & auctam alteram plenitudinem,
quæ secundum vasa vocatur. At vtriusq̄ plenitudinis
qualitatem, partim ex coloribus iudicabis, minor co-

Color humores indicat.

lorem humorum esse: si quidem ab externo calore uel frigore totum corpus haud immodicè affectum fuerit: partim ex iis, quæ humorū naturæ coniuncta sunt. Etenim calidiores, calidior totius corporis sensus sequitur: ut frigidiores frigidior: tum eos qui in venis quidem aceruantur humores, vasorum tumor atque distensio: qui verò in carne, sensus in ea vel grauitatis, vel tensionis, vel etiam caliditatis. Porro dispensantiū nos facultatū infirmitas atq; robur, propriis indicatur functionibus: voluntariis quidem, illius quæ in neruis cerebroq; consistit: pulsificis autem, eius quæ in corde ac per arterias mouetur. Nam secundum bonam nutritionem aut abolitam, & colorem probum, aut prauum, tertia facultas, quæ nutritrix est, & à iecore proficiscitur, cognoscenda venit. Vbi ergo extantibus plenitudinis signis, valentes facultates extiterint, incidet venam: videlicet, si tensiua quidem sit ipsa affectio, nihil distinguens: magisq; etiam in phlegmonode: sin uerò degrauans sit plenitudo quæ infestat, haud semper sanguinis molienda detractio est. Nam fieri potest, ut crudus p corpus collectus sit humor, à quo talis affectio gignatur. Quem succum sanguinis missione vacuare nō expedit, sed frictionibus, vnctionibusq; mediocriter excalfacientibus: nec non potionibus cibisq; & humoris crassitudinem incidentibus, & calfacientibus modicè. Siquidē quæ valenter excalfaciunt, nimis subito vires deiciunt: sæpe etiā vires adaugent. At verò, qui sanguine reiecto ex pectore, in præsens quidem curati, cæterū eam sortiti sunt thoracis pulmonisq; structuram, ut uel pauculo plus collecto sanguine, protinus aut vasis alicuius osculū reseretur, aut ipsum rumpatur, iis, vel si nullum in corpore etiā dum adfuerit symptoma, ineunte tamen verè sanguinem mittere oportet. Similiter in iis qui promptè morbū comitalem, aut apoplexiam, aut peripneumoniā, aut

Facultatū nos dispensantium robur imbecillitasq; ex propriis indicantur functionibus.

Sanguinis detractione quando sit plenitudo uacuanda.

Crudus humor qua ratione uacuandus.

Sanguis detractione quibus sit prospiciendum ineunte uere.

pleuritidem, aut anginam icurrunt, eiusmodi affectus anteuertēdi sunt sanguinis detractiōe. Eodem modo quibus hæmorrhoides retentæ sunt, potissimum si natura sint atrabilia, quique quorannis æstate plethoricis morbis corripī assolent, & hos quoque veris initio vacuare expedit: nec secus eos, qui ipso etiam vere illiusmodi malis vexantur. Cæterum intemperantes & vinolētos, ventriq; & gulæ deditos, nec purgatione, nec missione sanguinis magnopere iuueris: nam per vitæ intemperantiam rursus crudorum humorum copiam quāocysimè colligunt. Quare iis ne manum quidem admoueas. Eis verò qui præceptis salutaribus obsequētur, summopere profueris, si principio veris primum quidem euacuaueris: dein autē ad exercitia, salubremq; victus rationem perduxeris. Sed nec tantum ubi adest plenitudo, siue ea secundum vires sit, siue secundum vasa, mirificè prodest venæ sectio: verum etiam citra plenitudinē initio phlegmones, quæ aut propter ictū, aut propter dolorem, aut partium debilitatem proueniūt: quippe dolor sanguinem ad se trahit, & sæpe partium debilitas phlegmonem, absq; corporis plenitudine, contrahit: quum videlicet partes fortiores, per venas, seu per canales quosdam, propria excrementa semper ad imbecilliores expellant: donec tandem ad partem imbecillimā omnium, defluerint, & quæ ex se amplius propellere quod in ipsa redundat, nequeat: id quod accidit illis partibus, quæ vini excrettricem vicinis omnibus imbecilliores possident. Quamobrem omnium primæ infirmiores partes corripiuntur excrementitiis morbis: queniadmodum glandulæ, quæ sunt fluxionibus excipiendis idoneæ, tum ob substantiæ laxitatē, tum quia inter omnes partes minimè robustas naturales facultates (excepta alteratrice) fortiuntur, sicuti & pinguitudo. Post glandulas sequit̃ pulmo, fluxioni recipiendæ promptissimus. Nam & hic

*Intemperanti-
bus cur meden-
dum non sit.*

*Phlegmone in
asipiente, etiam
si plenitudonē
adlit, expedit
sanguinis mis-
sio.*

*Dolor sangui-
nem trahit.*

*Imbecilliores
particulæ a for-
tioribus humo-
res recipiunt.
Imbecilliores
partes cur om-
niū primæ cer-
ripiant̃ excre-
mentitiis mor-
bis.*

*Glandulæ cur
prompte exci-
piant̃ fluxiones,
et pulmo.*

tres facultates infirmas possidet, corpusq; laxum. Deinde est lien. At cerebrū, aut perinde ut illi, aut etiam plus excipiendo fluxui est habile: constructionē tamen habet eiiciendis iis quæ recepit, appositissimā. Quibus ergo carnosō genere Pulmo, Lien, ac Cerebrum, natura sunt robustiora, in iis ad glandulas carnesq; perueniunt fluxiones, ubi totus nimirum habitus infirmus fuerit: veluti in rheumaticis affectibus accidit. Meritò igitur in his curandis scopus est, non euacuatio, sed totius corporis roboratio: quamvis tamen euacuationis initium illis oriatur à misso sanguine: & si excrementa prauam qualitatem habuerint, vnā etiam adhibeatur purgatio. Rectè autem admonemur, in libro de Victus ratione in acutis morbis, ut si magnus sit ipse morbus, & æger floreat ætate, adsitq; robur, sanguinem detrahāmus. Cæterū principes scopi mittendi sanguinis, sunt duo. nempe magnitudo morbi præsentis, imminētisue, & cum ea virium robur: quibus si adiicias etiam florentem ætatem, nihil sermoni defuerit: modò sub ætate florente, præcedens sequensq; illam intelligantur, excipianturq; distinctione, tantū senilis atq; puerorum ætas. Quamvis ætas senilis in virium verbo comprehendī potest, quum eorum nulli adsit robur. Si itaq; magnum fore morbum timeamus, aut iam præsens est, aut incipit, venam secabimus, virium habita rōne, tantūq; ex oratione exemptis pueris. Nec verò ubi tanta humorum crudorum copia accumulata est, ut secandam venam * prohibeat, sermo hic redarguitur: quum ipsis viriū robur non adsit. Estq; hoc indicium eos haud posse sanguinis missionem perferre, * q̃ præter colorem totius corporis, degenerantem in ipsis ab eo, qui solet sanguinis copiam ostēdere, etiam ipsorū pulsus inæqualis in vehemētia & magnitudine existit: præpollētibus secundum ipsam inæqualitatē, ibecillis simul & paruis.

Lien.
Cerebrum.

Sanguinis mittendi principes scopi qui sunt.

Senes oēs carent robore.

Pueris secandā non esse venā. Crudis succis refertos nō admittere venæ sectionē, quia carent robore.

**Vacuationis q̄
titas ex q̄bus
metienda sit.**

**Sanguis q̄bus
sit detrahendus,**

**Crudos succos
q̄n uacuate o-
pportet, & q̄n
minime.**

**Crudorum hu-
morū indicia.
Hæmorrhoidi-
bus, aut men-
struis suppres-
sis, sanguinem
detrahendum
esse.**

**Menstrua esse
euocanda per
crura: reuellan-
da per uenam
i cubito secā.
Scarificatio q̄-
bus sit adhibē-
da mulieribus:
& quibus se-
ctio uenæ.**

Itaq; ex morbo, ætate & viribus minuendus esse san-
guis cognoscitur. At vacationis quantitas, quum ex
istis, tum etiam ex plethorica vocata syndrone, acris
nos ambientis temperie (quæ in tempus & regionem
diuiditur) antea facta victus ratione, excretionibusq; fa-
ctis, aut impeditis, commodè deprehenditur. Igitur ad
hæc omnia respiciens, tum podagricis, tum arthreti-
cis, tum morbo comitiali obnoxiiis: præterea melan-
cholicis, quiq; sanguinem antea expuerunt, aut thora-
cis structuram: sortiti sunt ad id malum idoneam: ver-
tiginosis etiam, quiq; assidue corripitur solent angina, pe-
ripneumonia, pleuritide, hepatitide, ophthalmia vche-
menti, ac breuiter, morbo aliquo insigni, sanguinem
detrahere consueui. Porro in redundantia melancho-
lici humoris, sanguinē mittere oportet: aut certè me-
dicamento uti expurgante atram bilem. At ubi crudi
succu exuperant, anteq̄ morbus inuaserit, cautè eua-
cuabis: ubi verò iam corripuerit febris, nequaquam.
Iudicium autem crudorum humorum est color plum-
beus, aut albus pallefcens, omniaq; potius q̄ rubeus:
tum inæqualis pulsus. Verum si ob hæmorrhoides sup-
pressas cumulatius alicui sit sanguis in corpore, auda-
cter venam incides, etiā si antea expertus grauē mor-
bum non fuerit. Sed nec euacuatio iis proroganda est,
quibus restitit menstrua purgatio. Non tamen necesse
est, illis semper secare venam: quum malleolorum sca-
rificationes quandoq; superfluitati vacuandæ sint sa-
tis. Plenitudines tamē à suppressis mensibus ortas, om-
nino per crura euacuabis, siue venā secare oporteat,
siue etiā scarificare. Sectæ quippe in cubito venæ, mu-
liebrem purgationē reuellunt. Iam verò, quæ ex mu-
lieribus albidiores sunt, aceruare tenuem sanguinem
solent: quocirca scarificationibus malleolorum adhi-
bitis, maximè solent iuari. At quæ nigriores sunt, eas
vena secta curabis: quum tales crassiorē sanguinem,
ac magis

ac magis melancholicum gignant: præcipuè verò, si magnas habere venas appareant: id quod accidit illis, quæ graciliores simul atq; nigriores fuerint. Etenim carnosæ & candidæ parvæ insunt venæ, ac proinde ipsæ malleolos scarificare, quæ secare venam, præstiterit. Porro validam sanguinis eruptionem, venæ sectio solet sæpe compescere, tanquam reuulsorium auxilium. Secare autem in cubito venam, si ex dextra nate prorumpat sanguis, in brachio dextro expedit: sin ex altera, in sinistro: minimè tamen usque ad lapsum virium detrahendus est sanguis. Simul autem, quum agis, artubus vincula iniicito, aut ex lana, aut ex canabe: hypochondrioque directè supposito, cucurbitulâ adinoueto: quandoquidem his remediis semper erumpentem è naribus sanguinem compescuimus: quum antea quæ inferuntur in nares, atq; fronti illinuntur, infirma omnia compesciremus. Nihil autem equè artem medicam in agendo coniecturalem efficit, ut cuiusque remedii quantitas. Si quidem interdum exploratum habemus quid nam ægro, quale, & quando sit exhibendum: at quantum exhibere oporteat, non nouimus. Hoc tamen summum bonum in sanguinis missione habetur, quod potes sistere euacuationem, dum opportunum videtur: ac rursus si quando animus sit, sistere ut fluat: quousque videbitur tibi rectè se habere negocium: id quod non licet in purgantis pharmaci exhibitione. Nam quod semel in ventrem deuoratum est medicamen, quo minus omne sit deuoratum, fieri non potest: neque possibile est, ubi plus quam conueniat, purgetur homo, partem oblatis auferre. At verò, dum alicui sanguinem mittimus, nisi quid urgeat, præstat priori missione minus detrahere, iterumque illam repetere: immo, si lubet, tertio. Vbi igitur multa euacuatio est opus, sed vires sunt imbecillæ, in iis euacuationem partiri expedit, uti & me fecisse vidisti, in iis quibus crudorum inerat humorum copia. Nam de-

Venæ quibus late, & quibus exiguae insunt mulieribus.

Sanguinis eruptionem venæ sectio compescit

Sanguinis eruptio per nares qua ratione curanda.

Quantitas remedium præcipue reddit artem medicam coniecturalem.

Sanguinis detractioni quæ commoditas insit.

Purgatio pharmaci, ubi deuorata semel in ventrem sunt, reuocari non possunt.

Euacuationem quæ partiri expedit.

Sanguinis missio, in quibus adest crudorū humorū copia, quō celebrāda.

Sanguis quando mittendus ad animi vsq; deliquium.

Sanguis dum fluit, pulsus esse explorādos.

Reuulsio per se etiam venā, quę nam sit efficacior.

Sanguinis detrahēdi s. opi. Vacuandī qui sint liberalius & parcus.

Pueris ante quartūdecimū annū sanguinē non esse mittendum.

Vires robustas quis pulsus in dicet.

tracto pauculo sanguine, protinus exhibeo melicratum, probè coctum, cum incidentium medicaminum quopiam: veluti hyssopo, origano, nepita, pulegio: aut certè cū melicrato oxymeli, aut oxyglycy: ac sic rursus sanguinem minuo, vel ipso eodem nonnunq̃ die: interdum die postero: in quo rursus exhibito propositorum medicaminum quopiam, aliquid de sanguine aufero: ac rursus tertio die similiter bis. Cæterū ubi feruescentis inest sanguinis plenitudo, acutissimam febrem accendens, subitò ac simul vacuare expedit, eamq; prius q̃ in principem aliquam partem ingruat, inanire tentandum, vel ad animi vsq; deliquium: viriū tamen inspecto robore. Quare nec per noctem sanguinem detrahere verearis. Vtile autem fuerit, fluente etiamnum sanguine, expēdere pulsum diminutiōes: ne videlicet, nobis nō aduertētibus, pro animi deliquio mors hominem occupet. Quin etiam & reuulsionem, non leue & ipsam auxilium, quodq; sæpe secta adhibetur vena, quanto maiorem in numerum particulares auxeris detractiones, tanto efficaciorē effeceris. Ergo si magnitudo morbi, missionem sanguinis postulet adsitq; virium robur, nulla potest esse tanta crudorū humorum copia, quæ inhibere id auxilium possit. Cæterū quibus amplæ sunt venæ, quiq; modicè graciles sunt, nec candidi, nec tenera carne præditi, eos copiosius vacuabis: contrarios autem parcus: quum exiguum habeant sanguinis, carnemq; facillè transpirabilem. Qua ratione nec pueris pertundes venam, ante quartūdecimū annum: post quem, si multus cōgestus sanguis appareat, tempusq; anni sit uernum, & regio temperata, puerq; natura sanguinea, aut alicuius acuti morbi discriminē impendat, sanguinem minues, in primis quidem ad corylā vsq;: quod si postea vires validæ permanere videantur, dimidium eius adiicies iterata missione. At uehemens, æqualis, & magnus pul

sus, incorruptum virium robustarum est signum. Quare si in septuagenariis ad sit, affectusq; iubeat, etiam secabis venam. Proinde non tantum annorum numero, sed corporis etiam habitui animus intendendus est. Adhæc, ubi incisa vena effluit sanguis, mutationem eius, & maximè quæ adest phlegmone, labascensq; fluxionis robur, expèdere oportet: sed potissimè alteratione pulsum: quibus quidè alterascētibus, aut in magnitudine, aut in quavis inæquabilitate, continuò quiescendum est. In quibus aut iuxta sectam venam phlegmone est ingens, optimum est sanguinis & in colore, & in consistentia expectare permutationem. Id quod sentiens Hippocrates in curatione pleuritidis ait. Secāda verò in cubito vena interna. Nec verearis multum detrachere, donec rubrior, flaviore ue multo effluat: aut pro puro ac rubro liuidus. Vtrunq; enim accidit. etc. Eius si quidem trāssumptionis, qua nō nihil sanguinis à parte phlegmone obfessa rapitur i vulneratā venam, constituit signum, ipsius sanguinis mutationem. Quæ tamen non omni ex parte expectanda est: quæ aliquando, prius q̃ ipsæ sanguis mutetur, cessandum sit: nimirum duplici nomine: vel ob vires infirmas, vel ob malignitatem phlegmones, à qua interdum nihil emittitur, sed inibi fortiter impactus est sanguis. At si ex vacuatione vires minimè resolui videantur (id quod ex pulsu cognoscet) æger autem sit ætate florenti, expectanda mutatio sanguinis est, potissimum si ambiens sit temperatus. Minus autem detrahimus, q̃ plenitudo commonet, secundum ætates quidem, in pueris: secundum corporū habitus, in candidis, & carne mollibus, cuiusmodi Galli existunt: secundum tempora verò, sub cane: ac similiter secundum regiones, cōstitutionesq; in iis quæ calidiores iuxta & siciores existunt: quoniam nimirum hæc omnia, q̃ maximè ad resolutionem sunt apta. Alia autem ratione in contrariis, hoc est tempo-

Septuagenariis qñ mittendus sint sanguis.

Sanguinē fluxū ē p̃ sectā uenā supprimēdū esse, quū alteratur pulsus.

Sanguinē detrahēdū p̃ inflammationes esse, donec rubrior, flaviore ue, aut liuid⁹ cōspiciat. Sanguinis mutatio post sectā uenā, qñ expectanda non sit.

Gallis parum sanguinis detrahendū esse.

Sanguinem esse parcius detrahendū sub cane, & in regionibus calidis simut & siccis ut in frigidis etiā constitutis. Sanguinis sex libras tūc detrahitur fuisse Galenus meminit.

Saluatella vulgo appellata, si dissecetur, creditur curare lienem.

Sanguinis eruptiones e dextro factæ, sunt utiles alioquin non iuuant.

Sanguinis fluxus per nares, quod suppressendi.

Lienem afflictiū iuuari seclāvena in sinistra manu iuxta annularem digitum.

Vacuatio quæ sit in duos dies partienda.

Pleuriticis esse secundā venā incubito partitis affectæ.

ribus & regionibus frigidis, largam fugimus vacuationem, propter insequentem refrigerationem. Quare vnum vacuationis modum in dictorum singulis definire non licet. Memini enim quibusdam ad sex vsq; libras sanguinem fuisse detractum, ita ut febris protinus exstingueretur, citra vllam virium iacturam: quibusdam verò sesquilibrium tantum, nec id absq; insigni damno. Porro ex venis quæ ad magnos oculorum angulos cōspiciuntur, aut sub linguā, quod certè mentione sit dignum, effluere non tolet: sicuti nec si quis summa in manu, aut pede venam secet: quemadmodum putant ii, qui lienem curari aiunt, à sectione venæ sitæ iuxta secundum ex digitis paruis. Quod verò ad differentiam venarum pertinet, quibuscunq; ^{Mat.} ^{i. xi.} hoc est è dextro eruptio sanguinis accidit, summum id commodum laborantibus adfert. Quibus autem contra euenit, nihil iuuat: aut etiam interdum nocet: quæ vires scilicet, citra morbi leuamen, deiciat. Vt si liene turgente, dextrā nare sanguis efflueret: aut hepate, ex sinistra. Dextra igitur nare sanguis erumpens, ad dextrum hypochondrium fixa cucurbitula, clarè, celeriterq; sistitur: sicuti ad sinistrum, si ex sinistra profluat. Similiter si venam reuulsionis studio seces, secundum rectitudinem quidem secta, oppositis sanguinis eruptionibus citissimè cōspiciendam utilitatem adferet. At si contra seces, nihil sanè profuerit. Quare liene afflicto, perinde adiuuerit vena secta in sinistra manu, iuxta annularem digitum, ac si internā cubiti venam secueris. Plurimum namq; iuuat afflictiū lienem, sanguinis ex sinistra manu interdum vsq; ad libram vnam, detractio. Præstat autem non semel quantum conueniat, detrahère: sed in duos dies ipsam euacuationem parti. Pleuriticis etiam, quæ è dextro laborantis lateris adhibita fuit sanguinis missio, clarissimam sæpe utilitatē attulit. Quæ verò ex brachio opposito, aut om-

nino obscuram, aut certè post temporis intervallum. Adhæc, oculorum p[er]sæpe dolores grauisimos è directo venæ humeralis sectio, aut medianæ, quæ ab ea deriuata est, intra horæ vnius spatium compescuit. Conari autem in oïbus affectibus p[re]stat, post modicâ missionē sanguinis, iterato mittere: interim eo die: iterum postridie: nisi quando ad animi vsq[ue] deliquiū, vacuatio nem ducere oporteat. At dolente latere, aut pulmone, aut septo transuerso, aut liene, aut iecore, aut ventriculo, secta vena, quæ per axillas ad cubiti iūcturam pertingit, aut etiam quæ illi & humerali ē communis, luculentam utilitatem adfert. Sunt etenim eæ tres venæ, ex quibus in cubito mittitur sanguis, interior, exterior, & media. Inter quas sanè interior vtilis est, in iis quibus inferiores collo partes patiuntur. Exterior verò, in iis, quibus, quæ his superiores sunt, ut facies, aut caput. At media, medio genere ambigit: quum inter vtrinq[ue], versus anteriorem manum, suos ramos producat. Quare si vena quæ parti affectę propria est, aliquando fuerit obscurior, cogariq[ue]; ob id aliquā mediarum incidere, conare vt quæ à propria diducitur, eam potius pertundas. Interdum etiam, eas quæ inferiores flexura cubiti sunt, nempe quæ in vlna p[re]sistūt, nihil prohibet venas secare: sed tamen recto tramite particulis affectis correspondētes: idq[ue] vbi venæ quæ in cubito sunt, non appareant. Equidem diuitis cuiusdam œconoimū, oculorum maxima inflammatione, atq[ue] fluxione afflictum, quàm ocysissime in pristinā sanitatem restitui, detractis primum ex humerali vena, libris sanguinis ternis: ac dein, modico interposito tempore, alia. Qua ratione, soluta phlegmone, postea in palpebris relictam asperitatem absterfi, aliquo ex medicamentis mordacibus, quod neutiq[ue] æger ferre potuisset, nisi fuisset prius * euacuatus. Si quidem acria omnia medicamenta parti cuius admota, nisi vacuū

Oculorū dolores cōpesci se, cta humerali, aut media. Iterandū esse sanguinis detractionem.

Venarū cubiti quæ in quibus affectibus sint secandæ. Venæ in cubito conspicuuntur tres, interior, exterior (quæ humeralis est) & media.

Venis cubiti obscuris, posse nos in ulna ab eis diductas secare.

Oculorū maximā inflammationē quārōne curari Gale-nus.

Acria oīa parti cuius admota, fluxionem augent, nisi primum corpus re-pereant.

excrementis vniuersum corpus repererint, fluxionē attrahunt, phlegmonemq; producunt. Quemadmodum igitur supremæ omnes iam dictæ partes, secta in cubito vena iuuantur, sic iis inferiores, incisis quæ per poplites & malleolos decurrunt. Sunt autem inferiores dictis, coxendix, uterus, vesica. At renes, quarum collegio ascribi debeant, ambigūt. Quare misso excubito sanguini, interdum auscultant: si videlicet & recens ipsa phlegmone sit, & copia sanguinis adsit. Vbi verò propria nephritis infestat, eā quæ in poplite est, secare puenit uenam: aut certè, quæ in malleolis sunt. Sed vteri inflammationes, magis etiam quàm renum, à venis i crure sectis iuuantur. Nam quæ ex cubito sūt euacuationes, purgationes menstruas reprimunt, sanguinemq; retrahunt ad supernas corporis partes. At quæ sunt ex cruribus, tantum abest vt retrahant, vt etiam menses promoueant: si tribus quatuorue diebus, ante tempus consueti mulieri circuitus, administrantur: idq; aut vena incisa, aut scarificatis vnus cruris talis, atq; inde exiguo sanguinis euacuato: quod sanè postero die in altero crure similiter etiam faciendū est: sic tamen vt in ipsis diebus in quibus vacuas, atq; in aliis ante eos quatuor aut quinque, mulieri extenuatē victum instituas. Sed mulieribus abundè menses prouocant nepita, pulegiumq; si redacta in pollinem, cocta q; in melicato, propinentur. Conuenientissimū autem potui tempus est à balneo, adhuc inuolutis linteis. Valentiora medicamenta sunt Sauina, & dictamnium: quorum vsus est ante dictis similis. Datur autē hoc tempore & hiera picra, * illa scilicet in cuius compositione centum aloes drachmis, cuiusq; aliorum medicaminum senæ tantum miscentur. Quod sanè medicamentum optimum est, vbi cinamomum receperit. Porro ischiadas siue coxendices, vbi nō à frigore, sed impletis sanguine, quæ in coxa sunt venis, proueniūt,

Malleolorū poplitumq; venę dissectę quarū partiū affectibus auxiliē.

Renibus male affectis, quę uenę secandę sūt Vteri inflammationes a venis in crure sectis iuuantur.

Menstrua supprimūt secta in cubito vena Menses promouentur sectis in cruribus venis tribus quatuorue diebus ante ips consueti circuitus.

Menses prouocant nepita, pulegium, sauina, dictamnūq;.

Hiera picra menses promouet.

Ischias a sanguine orta, secta in poplite vena curatur.

secta in poplite vena curabis. Scarificatio autem nihil perspicuè eis prodest. Igitur, vt summam dicam, incipientes phlegmonas reuulsi euacuare oportet: quæ verò inueteratæ iam sunt, ex ipsis, si fieri potest, affectis particulis: aut, si id fieri nequeat, saltem ex vicinis. Etenim in incipientibus, auertere quod influit, expedit: in inueteratis autem, ipsum tantum, quod affectæ parti infixum est, euacuare. Atqui euacuabitur optimè per venas diductas ab iis, quæ in partibus ipsis sunt sitæ. Quocirca, quæ in gutture & aspera arteria, graui torquentur inflammatione, iis, in principio quidem, aperta in cubito vena: post principium autem, in ipsa lingua, magnificè prodest: iicis videlicet venis, quæ sub ea sunt, ambabus. Sic induratæ phlegmonarum in oculis reliquæ, incisa quæ ad magnum decurrit angulum vena, exoluuntur: sicuti capitis grauitates, & inueteratos in eo dolores ex plenitudine, leuare manifestè solet secta in fronte vena. At incipientes, aut etiam vigentes, per cucurbitam in ceruice procurata retractio: iterum quidem solam: interim cum scarificatione. Cæterum præuacuatam esse corpus vniuersum oportet. Eadem ratione incipientes in occipitio dolores, aut etiam vigentes, incisa frontis vena solatur. Quippe reuulsiones unâ cum euacuatione adhiberi magis debent, in fluxionibus incipientibus: eas verò, quæ sunt ex ipsis affectis partibus, aut illis vicinis, in phlegmonis, quæ veluti scirrhi naturam referunt. In quibus autem corporibus nulla dum particula affecta est, cæterum vacuatione Vere ineunte, auertimus: in iis, si quidem talis sit homo, vt quotannis æstiuo tempore corripiatur morbis febrilibus, atq; in eo exundantia euacuare studemus, æquè pars quæuis, vt ex ea detrahatur sanguis, est comoda: quemadmodum etiam, si arthriticus omnibus articulis affligatur. Quibus autem eximie pars quæpiam, ubi prius euacuati non fuerint, infestatur, haud pin

Phlegmonas incipientes, reuulsi: inueteratas ex ipsis affectis partibus euacuare oportet.

Venas sub lingua secandas esse in gutture & aspera arteria inflammationis, post apertam in cubito venâ.

Vena iuxta magnum oculi angulû, & quæ in fronte est, secta, quibus auxilientur affectibus.

Cucurbitula ceruici admodum, capitis sedat dolores.

Reuulsiones una cum euacuationibus in cipiètib; fluxionibus humorebus adhibendæ sunt. Sanguini detrahendo quauis partē eē equè appositâ i iis q; solus præcautionis gratia vacuationē desyderant: vt in illis qui ex quo omnibus articulis affligunt.

Podagricos et
vacuandos ex
cubito.

Epileptice ob
noxios esse va
cuandos ex cru
ribus.

Hæmorrhoi
des supprimū
tur sectis cubi
ti venis: pro
uocantur autē,
iis quæ i cruri
bus sunt ptusis.

Sanguinē de
tracturo, dierū
aut horarū nu
merus non est
consyderan
dus.

Sanguinē mit
ti debere fe
bres quidē, in
ipsarum decli
natione: per in
flammationes
autē absq̃ fe
bre ortas, dum
magis vrgent
symptomata.
Sanguinē mit
ti debere, vbi
nihil aliud vr
get, aut prohib
et, manē ha
ud protinus ex
somno excitis.
Sanguinis ite
rata vacuatio
quando faciē
da sit.

de licet ex quauis parte euacuationem moliri: verū
sicuti in iis, q̃ pati iā occipiūt. Quāobrem podagricos
euacuabis ex cubito: comitialibus uerò morbis, ver
tiginibusq̃; obnoxios, poti⁹ ex crurib⁹. At si retet hæ
morrhoides mittēdi sanguinis occasione p̃stiterint, si q̃
dē cohibere eas voles, quæ i brachio sunt: sin prouoca
re, quæ in cruribus consistunt venas, secare conuenit.
In iis verò quibus repres si sunt menses, semper in cru
ribus. Iam verò ad sanguinis detract ionem, dierū nu
merus consyderandus non est. Siquidem quocunque
die mittendi sanguinis scopus in laborante inueneris
(nempe morbum ingentem, & virium robur, exce
pta ætate puerili, & ambiente admodum calido) auxi
lium illud non prætermittes, vel si is vigesimus à prin
cipio extiterit. Nam exoluitur in plerisq̃ morbis, tem
poris tractu, virtus, ac proinde mittendi sanguinis oc
casio, numero dierum deperditur. Poterit etiam quis
sanguinem mittere, vel quacūq̃ die noctisq̃; hora, sco
pum sibi proponens, in febrientibus quidem, particu
larium (quæ expectanda est) circuituum declinationē:
in quibus autem aut ob oculorum lippitudinem, aut
aliud simile citra febrem, hoc est opus auxilio, magni
tudinem, aut doloris, aut phlegmones, aut totius affe
ctus, i quo secta vena desyderatur. Vbi verò nihil ei⁹
modi aut vrget, aut prohibet, præstat mane venam in
cidere, haud protin⁹ ex somno excitis: sed circiter ho
ram vnā iam antea vigilantibus. Atq̃ iteratæ vacua
tionis tempus, in quibus simpliciter quidem vacuare
conamur, eodem die esto: in quibus autem reuellere,
si vel post duos deinceps dies fiat, melius fuerit. Inte
rim tamen animus sit circa laborantis vires intentus:
manu iugiter arteriis illius adnota. Consueuerunt et
medici interdum secare arterias, quæ in temporibus,
& quæ secus aures consistunt, illas quidem, infestanti
bus oculos fluxionibus tum calidis, tū spirituosiss: has

verò, quæ secundum aures, in vertiginosis maximè, & iis qui calidis & diuturnis, spirituosisque capitis doloribus infestantur. Etenim ubi calidus, spirituosusque sanguis in arteriis coaceruatus infestat, illic communibus parti affectæ sectis arteriis est opus. Vex quia vulnera tæ arteriæ ægrè supprimi possunt, ob id ipsas medici incidere metuunt: quum si quis dum venâ secat arteriâ conuulnerarit, difficillimè cõpescere eruptionem sanguinis possit: aut si res optimè cedat, ad cicatricem producta dimissione, tamen aneurisima contingat. Quam possumus sanè arteriam vel magnâ, absque aneurisimate ad cicatricem perducere, totam transuersim secantes. Ego verò aliquando monitus per quædam insomnia, secui dextræ manus arteriam, iter indicem & pollicem sitam: permisiq; vt inde flueret sanguis, donec si steretur sponte: subitoq; diuturnus mihi extinctus est dolor, qui in illa maximè parte erat fixus, qua iecur septo transuerso committitur. Minister etiam Dei Pergami, à diutino cruciatu lateris, similiter liberatus est, arteria in summa manu incisa: idq; monitu insomni. Porro alteri, cui ex vulnere in malleolo inflicto, dissecta fuerat arteria, sanguinis quidem cursus haud quieuit, donec ipse dissecui totâ: ac medicamento ex

Arteriæ in quibus secetur affectibus.

Arteriæ vulneræ ægre supprimi possunt.

Aneurisima quæ accidat.

Arteriâ inter indicem pollicemq; quam secuiſſet Gatenus ab insomnio monitus, liberatus est diuturno præcordiorum dolore.

aloe, manna, ouorum albumine, & leporis pilis imposito vsus, absque aneurisimate vlcus ipsum curauit. Vir

autem ille prorsus sanus relictus est à coxæ do-

lore, quo iam

diu fuerat

exi-

guis tem-

porum inter-

uallis ve-

xatus.

Arteria in malleolo dissecta, diuturnum coxæ dolorē soluit.

GALENI PERGA

MENI DE HIRVDINIBVS,

reuulsione, cucurbitula, & scarifica-
tione, libellus,

DE HIRVDINIBVS.

Hirudines af-
seruandi, alēdi,
& applicandi
ratio,



VAE hirudines sunt recens ca-
ptæ, eas diem unum asseruare
oportet, pauculo sanguine in
pastum exhibito. Sic enim pror-
sus earum venenum exprimit.
Pars autem cui iam admoventi
debent, nitro prius perfricetur,
aut vnguibus scalpatur: nam sic

promptius eam apprehendent. Iniiciendæ autem sunt
in aquæ tepidæ vas purum, latiꝫ oris: deinde spongia
eas comprehendentes, viscositateꝫ ab eis detergen-
tes, tandem manu applicabimus. Vbi aut adhæserint,
infundendum particulæ oleum tepidum est, ne scilicet
refrigeretur. At si manibus aut pedibus admoventæ
sint, ipsam partem, aquæ cui insunt sanguisugæ, imer-
gere oportet. Quod si parum depascantur, fornice cau-
dam præcidito, secundum rectitudinem filamentorū.
Nam effluente semper sanguine trahere nō desistent,
donec salem, aut cinerem, ipsarum ori insperserimus.
Vbi verò deciderint, cucurbita uenenum est auellen-
dum, aut pars fouenda ex spongia. Quod si particula
emorsa lachrymet, cuminum, aut farinam ispergito:
superꝫ lana madidata oleo pauillio, iuoluito. Sin san-
guis erumpat, lintea ex aceto iniicito, aut gallam ustā,
aut spongiam liquidā pice madentem, posteaꝫ ustam
imponito. Sciendum autem est, hirudines haud cumꝫ
in profundo est, sanguinem, sed tantum, quo caro est

Hirudines vt
depascantur,
in explebiliter
præcidendas in
cauda esse.
Hirudines auel-
li, sale aut ci-
nere ipsarum
ori resperfo.
Hirudine iam
delapsa, cucur-
bitulā esse pri
admoventam,

imbuta, exugere. Vtimur eis pro cucurbitulis: detrahimusq; ipsas, vbi dimidiam sanguinis partem iam extractam coniicimus: prohibemus autem, & nō permitimus effluere, quousq; quod satis est, euacuetur: quandoquidem particula tum à sanguifugis ipsis natura frigida, tum ab aere nos ambiente refrigeratur.

De reuulsione.

Vehementissimos humorum influxus remediis reuulsoriis prohibemus. Qualia sunt, incumbente in pectus aut in ventrem humore, ad manus retractio. Vomitus, vbi deorsum decumbit. Sicuti in vomitu, p aciores clysmos reuulsio. Duo verò hæc momenta, quæ ad superiorem inquam vëtre, & inferiorem vergunt, ad vrinam, sudoresq; reuelles. Quin & vrina, ad sudores, & deiectionem trahitur. Reuulsoriū quoq; auxiliū est, * iuxta mammas cucurbitula admoda. Cæterum hypochondriis affixa, sanguinis ad nares impetum reuocat: sicuti & immodicum ex vtero effluxum. Porro vergentes ad caput, aut viscera humores, retrahunt acria in sinus imposita medicamina. In summa, reuulsio molienda est, humioribus sursum fluentibus, deorsum: deorsum verò, in contrarium. Rursus, itro vergentibus, foras: sicuti si foras ruant, ad interiora. Similiter si ad dextram inclinent, ad sinistram: ad sinistram verò abeuntibus, in partē aduersam. Sic quæ retrò pcedunt, ante: quæ verò ante, retrò reuocabis.

De cucurbitula.

Cucurbitulæ iis qui ante euacuti sunt, cōueniunt. Nam in plethoricis, minimè sanè ipsis vtimur.

Eadem ratione neque in cerebri aut meningum phlegmonis incipientibus vtimur cucurbitulis: sicuti nec alia in parte vlla phlegmone obfessa. Verum vbi nihil præterea etiā influat, fueritq; totum corpus ante vacuatum, atq; op^o nobis iam sit, aut mouere, aut amoliri, quod in phlegmone obfessa particula infixū

Hirudines sanguinē tantum carnis exugef. Hirudines natura esse frigidas.

Reuellendi modi diuersi.

Cucurbitula hypochondriis affixa, sanguinis ad nares impetū reuocat, immodicū ex vtero effluxū. Reuulsionem esse semper in contrariū molendam.

Cucurbitulis vtendum esse vbi corpus est abunde vacuatum.

Cucurbitulis vtimur dū euellere est anim^o quod in partes

phlegmōe ob-
fessa est impa-
ctum.

Inflāmatione
incipiente, re-
pellētibz est
vtendum.

Cucurbitæ fa-
cultas.

Scarificare
quas & in quē
usum ptes so-
leamus.

Scarificanda
crura, prius es-
se fouenda per
spongiā calen-
te aqua.

Venam sēpius
in anno inci-
dere, cur non
expedit.

Scarificatio q
bus morbis cō-
ueniat.

est: aut deniq; foras extrahere. Porro dū affectus etiā
num sunt, haud in ipsis iā laborare occipientibus par-
tibus, sed in eis quæ illis continuæ sunt, reuulsionis cā
est cucurbita imponenda: in principio autē, vtendum
repellentibus est. Cucurbitula potest euacuare mate-
riam, dolorem soluere, minuere phlegmonem, infla-
tionem discutere, reuocare appetentiam, ventriculo
infirmo robur recuperare, animi liberare deliquio, ab
alto fluxiones transferre, resiccareq; sanguinis eru-
ptionis cohibere, facultates mensium corruptrices ex-
trahere, ac deniq; menses ipsos leuare.

De scarificatione.

Scarificamus partes corporis aut phlegmone scir-
rho'ue tētatās, aut tenās, aut dolore vexatas, aut
fluxione affectas, sed quæ iam resistit: aut acrimini-
butas materia, aut vbi extrinsecus aliqua virulenta fa-
cultas in corpus incidit, aut vbi materiam ex alia par-
te in aliam traducere est animus. Veluti crura scarifi-
camos affecto capite: aut materiam in corpore exun-
dantem minuere statuentes: potissimum vbi exundā-
tia prouenerit à suppressā materia, quæ solenniter eua-
cuari consueuerat. Sic suppressis hæmorrhoidibus sca-
rificamus crura: prius ea per spongiā fouentes cali-
da. Nam sēpius venam incidere in anno, haud

expedire arbitror, quum vnā cum sangui-
ne vitalis exhauriatur spiritus. Pro-
dest autem scarificatio & oculis

diutina fluxione afflictis:

tū capitis affectibus:

quique pectori

atq; dor-

so eueniūt: ad-

hæc angina: atq; im-

paetis humoribus,

GALENI PERGA

MENI DE PURGANTIVM MEDICAMENTORVM FACULTATIBVS. LIBELLVS.



ADEM De causa medici
vetustissimi prauas opiniões re
liquisse irreprehensas videtur,
qua grauissima etiã delicta anti
quisissimi legum latores impuni
ta siuerunt. Quum enim eo tẽ
pore minor esset malitia homi
nũ, vt qui nec maxima crimi

Delicta grauiss
ima cur anti
quisissimi legu
latores impuni
ta reliquerint.

na perpetrare aggrediebãtur, nec manifestissimis im
pudenter cõtradicere, quomodo aliquis punitionem
iis quæ hõdum admissa erant, præscriberet, vel redar
gueret ea quæ nemo prorsus dixisset? At quia tempo
ris spatium eo creuit hõminum prauitas, vt nihil nõ aut
facere, aut dicere ausi sint, legum quidem latõres mul
tas punitionum rationes nõuas adinueniunt, quibus
facinorosos plectant: veritatis autem studiosi, vãrias
contra sophistas reprehensionum species excogitant,
quibus ipsos coerceant: id quod nos impræsentiarum
quodammodo facere cogimur, improbaturi eos, qui
medicamentis purgantibus, vini attractricem humo
rum quos euacuant, in esse negant: mutatricem verò
quandam omnium ex æquo illorum, quæ ipsis appro
pinquant, eis tribuunt. Quia nimirum facultate aiunt,
medicamentum quod flauum efficit bilem, quemcũq;
humorem contigerit, hunc in propriam sui speciem
mutare: vocariq; medicamẽ id cholagogum, quod bi
lem flauum & efficiat, & moueat: aliisq; similiter,

Præstatẽ idies
creuisse.

medicamentis sua esse indita nomina, non quidem ab humoribus quos naturaliter vacuant, sed ab iis, quos suo contactu efficiunt. Ex cuius sanè opinionis absurditate sequitur, siue bilem ducēs, siue pituitam, siue atrā bilem, siue serosam humiditatem, aliquis medicamentum assumpserit, vniuersos ex venis humores vacuari. Neq; alia ratione purgatio ab huiusmodi medicamento petita, differet à sanguinis euacuatione per venæ sectionem, q̄ q̄ in hac quidē, ille qualis prius erat, excernitur: in purgationibus autem, inalteratur, non colore tantum, sed etiam consistentia: id quod maxime ridiculum est. Siquidem per detractionem sanguinis equaliter omnes, qui in venis sunt, humores vacuantur. Per purgationem verò (quæ scilicet sanguinem ipsum purificat) non æquē omnes: sed vnus aliquis, præcipueq; is, ad quem naturaliter educendū medicamentum ipsum est aptum. Atq; hæc sanè existit optima Asclepiadarum sententia: cui etiam ratio simul & experientia patrocinantur. Nam si ex tribus absq; febris laborantibus morbo arquato, vni quidem sanguinem detrahas: alteri autem medicamentum quod atram educit bilē exhibeas: tertio deniq; propines pharmacum eliciens diffusam illam bilem per corp⁹, certè duo illi priores, longè deterius habebunt: tertius autem, cui exhibitū medicamentum fuerit familiaris succi attractiuum, naturā colorē recuperabit. At qui iuxta illoꝝ insaniam, perinde erit siue missione sanguinis, siue medicamēto quod bilem ducat, arquato morbo laborantem inanias. Idē etiam & in reliquis morbis est inecūdum iudicium. Igitur opinionibus ipsorum valere iussis, singula medicamenta purgantia, initio familiarē humorem trahunt: postea verò illum qui vt sequatur, habilior atq; aptior fuerit. Exempli gratia, medicamentum quod flaua bili ducendæ est, primo quidē illam expurgat: dein aquosam humiditatem: pituitam tertio mox atram bilem:

Sanguinis detractione vniuersi humores qui sunt in venis, ex æquo vacuantur.

Purgatio purificat sanguinē.

Regū morbi curatio.

Purgantia medicamenta principio quidē, familiarē humorem trahunt: postea vero illum, qui vt sequatur est aptior.

ultimò deniq; sanguinem: q; sit is naturæ familiarissimus. Reperiuntur tamen aliqua medicamina, quæ statim ab initio sanguinem ducât: cæterum iis nemo vte tur: quandoquidem hoc iugulare esset hominem: non purgare. Siquidem purgantia, hoc nomine talia dicuntur, q; repurgent sanguinem ab illis recrementis iam dictis. Quare inter deleteria, id genus omnia medicamenta annumerant, quæ sanguinis euacuationem, per venas ventris, & intestinorum, moliantur.

Medicamenta nonnulla statim ab initio sanguinem ducere.

G A L E N I P E R G A

M E N I Q V O S P V R G A R E,

qualibus medicamentis, & quando

oporteat.

Liber vnus.



QU I Sano sunt corpore, purgationes grauiter ferunt. Nam quum purgans medicamentum familiarem sibi humorem attrahere desyderet, sanè dum eo destituitur, sanguinem & carnes eliquat, consumitq; , ut quod illis proprium est, trahat. Porro qui sani quidem sunt, verum ægrotaturi, nisi fuerint vacuati, inaniri uere in eunte debent: idq; vel sanguinis detractiōe, si plethoricis corripiantur morbis: aut purgatione, si factis ex corruptione affligantur. At melancholia, cancer, elephantiasis, cæteri q; id genus affectus, qui ab humore atro profiscuntur, atræ bilis purgatione indigent: quam non vere tantum, sed autumno etiam ipse moli ri consueui. Iam comitiales morbi, apoplectici, suspiciosi q; , vacuationem pituitæ postulant. Articulares affectus, qui quidem vnà cum insigni caliditate affligunt, bilioforum: qui autem cum tumoribus frigidis,

Sani cur purgationes grauiter ferant.

Vacuandi qui sint vere inuete, & quomodo. Atræ bilis purgatione quæ affectus indigeat. Vacuatione pituitæ, qui morbi postulent.

pituitosorum vacuatione iuuantur. Quidam æstiuo tēpore tertianis febribus semper corripī solitus, iā multis annis non febricitauit, quōd bilis flauæ purgatione ad finem veris à nobis administrata, illi prospectum sit. Sic enim satius est tales vacuare: quemadmodum comitiales, articulares, melancholicos, quiq; ob humores crassos ægrotant, incunte verè melius vacuantur.

Crassos succos prius tenuandos esse q̄ euacuentur.

Vomitui qualiter præparari c̄gri debeāt.

Vomendo incepti qui sint.

Flaua bilis, per superiora pituita per inferiora maiori ex parte vacuari debet: vt atra bilis semper per inferiora.

Cæterum humores crassos & viscidos prius attenuare & incidere oportet: meatusq; per quos transmuntur, atq; trahuntur ii, aperire, ante medicamenta purgantia, si purgatio modis omnibus optima sit futura: præsertim in iis qui veratrum assumunt. At verò q̄ ægrè per superiora purgantur, ii, nisi prius reddantur habiles, præparenturq; ad vomitū, minimè assumant veratrum. Præparabuntur autem medicamētis uomitoriis mediocribus: nec non cibo vberiori, & quiete. Etenim nos radículas ex oxymelite propinauimus, quas arundine perforatas, ac ramulis veratri albi trāsfixas, per totum diem atq; noctem reliquimus. Atq; eiusmodi ex elleboro facta purgatio erit imbecilla. Verum q̄ angustum habent pectus, eoq; etiam compressum, ineptissimi ad purgationes existunt, quæ per vomitoria medicamenta fiūt: ac potissimum per album veratrū. Siquidem thoracis aliquod vas, ipsis rumpitur. At bilis supra, pituita per inferna vacuari debet. Est quando contrario modo accadat: si quidem in ventriculo pituitosus: biliosus autem in intestinis humor resideat. Melancholicum verò semper per inferiora vacuare oportet. Sic æstate quidem superiores ventres: hyeme verò inferiores mouere conuenit: vt author est nobis Hippocrates. Sed regionis etiam, anni temporis, ætatis, cōsuetudinisq; non exigua ratio est habenda. Siquidem qui, gratia exempli, uomere soliti sunt, facilius purgationes ferunt p̄ superiora: qui non assueuerunt, haud citra periculum: magisq; ex veratro. Morbi etiam species examinanda

Hydropicæ
evacuandi rō.

ties examinanda est. Nam in hydrope, leucophlegma-
tia, medicamento quod pituitam ducat, egenius: prius
sanè per inferiorem ventrem: dein per vomitum: ter-
tio per apophlegmatismos. Vbi enim id quod redun-
dat, per vniuersum corpus dispersum est, omnes va-
cuationes sumemus. Porro in ascite, medicamentum
aliquod, aquæ ciendæ idoneum, exhibebimus: sicut et
in arcuatis, quod bilem eliciat. Nam & in his etiam bi-
lem multifariam supra & infra, per vrinas, palatum,
& nares, purgare conuenit. Morbi itaq; dispositio &
vacuandum humorem indicat, & locum per quem de-
bet vacuari. Verbi gratia, iis qui in iecore habent inflā-
mationem, vbi tumor concoctus fuerit, eius expurga-
tionem molimur: per inferiorem sanè ventrem, vbi
cauas ipsius partes affectus occupat: per vrinas autem,
quum gibbas. Accedit his omnibus tenipus & occasio.
Per initia namq; serosos tenuesq; humores vacuabis:
in crassis autem & uiscidis, & expectabis coctionem.

Ictericos pur-
gandi ratio.

Hepatis partes
affectæ, qua
sint regione
vacuandæ.

Tenues humo-
res statim esse
vacuandos:
crassorū & vi-
scidorum esse
expectandam
coctionem.

Adhæc, in accessionibus quidem, per superiora vacua-
bis: in remissionibus autem, per inferiora. Atq; hæc sa-
nè, si sponte accidunt, iuuant: in accessionibus quidē,
dum multi & vomunt, & per nares sanguinē fundunt:
in remissionibus autem, dum vrinæ deiectionesq; ex-
cernuntur. At tempus dierum accessoriorum & decre-
toriorum, quum infra copiose purgare aggredieris, ca-
uere oportet. Vbi enim humorū impetus sursum ver-
git, medicamenti purgantis facultas impiedietur. Por-
ro in morbis diuturnis, semper eorum maturatio ex-
pectanda est: in acutis aut, quum turgent, ac pruriunt,
vel per initia uti medicamentis licet. Verum quum om-
nia purgantia medicamenta facultate calida existant:
febris autem sui ratione humectantia & refrigerantia
postulet: certè non ipsius caloris gratia, purgatio à no-
bis administratur, sed humorum causa, qui nimirum
illum accendunt. Igitur ut ii euacuentur, primum sa-

Vacuandum in
accessionibus
quidem, per su-
periora, in re-
missionibus aut
per inferiora

Dierum acces-
siorum, de-
cretoriorumq;
tēpus cauendū
esse, dū per infer-
na purgamus.

Maturatio mor-
bi ad purgatio-
nem qñ sit ex-
pectandæ: & qñ
minime.

Purgantia oīa facultate esse calida.

Purgationibus inepti qui sūt.

Humores esse tenues reddendos ad purgationem

Acuti morbi raro per initia indigēt purgatione.

Turgere qñ humores dicant.

Humores qñ vacuandi.

Crisis quando accidant.

Naturam adiuvandā esse medicamentis.

Cathartica medicamenta.

nē dispiciendum venit, num æger sit ad eiusmodi purgationem idoneus. Nam qui ex cruditatibus multis, aut viscosis crasis, ue cibis laborant, item quibus præcordia intenta sunt, inflataq; , aut supra modum calida & ignea, aut aliqua inflammatione laborēt, omnes hi ad purgationes inepti sunt. Proinde hæc abesse, & humiores q̄maximē licet fluidos facere oportet: hoc ē tenues, & nullius lētoris participes: meatusq; p quos purgatio futura est, ad apertos. In acutis autē morbis raro per initia purgantibus medicamentis egebimus: eo q̄ nec frequenter noxii humores p initia turgēat, pruriant, ue: nec, si hoc detur, æger sit ad purgationem idoneus: ac ne tempus quidem nobis præbeat pparādī idoneum. At humores prurire, seu turgere dñr, quum motu vehementiori agitati, & à particulis in particulas transfluentes, p morbi initia molestant hominē dolore afficientes, irritantes, & quiescere non permittentes. Tales igitur euacuare conuenit. Particulæ autem alicui infixos, nec alio quodam præsidio mouere oportet, nec medicamentis sollicitare, prius q̄ fuerint cocti. Tunc siquidem & naturam vacuationi opitulanti habebimus: quippe quæ post coctiones & discernere humores, & superfluum deponere apparet: quo tempore etiam crises accidunt. Quod si natura ipsa absolute moueatur, nihil tunc est opus medicamentis. Vbi verò imbecillius actionem obit, id qđ deest, oportet nos per medicamenta adicere. Sciendum autē est, transfluxiones humorum ab vna in alteram partē raro accidere: sed maiori ex parte ipsos ī vnico loco hærene, inibiq; per totum morbi tempus ad solutionem vsq; cōcoqui. Si non acutus modò sit ipse affectus, sed etiā cū febre vehementissima accidat, medicamentū purgans exhibendum non est: præsertim si quis nō habuerit naturam ægri exploratam. At si febris vehemens non fuerit, norisq; ægrotātis naturam minimē abhor

rere à catharticis, elleboro nigro vteris, aut hiera dia colocynthidos, quæ elleborem recipit, absq; scammo nio. Assumpto pharmaco, conducit mox super sorbere cremorem ptisanæ: ut qui id quod in transitu affixū applicitumq; est, abstergere, & deorsum trahere: qualitatē verò medicamenti, particulis insidentem, cōtemperare, & in alterare possit. At vbi purgatio fieri incipit, ptisanam amplius non dabimus: ne actio medicamenti exoluatur. Porro alius nonnunq; medicamēto purganti non cedit: vel ob ægri naturæ proprietatem, vel ob medicamenti exhibiti paucitatem, vel ob stercus durum, atq; in aliquo intestinorum impactum, quod clystere euacuari potuisset, ante pharmaci exhibitionem. Fieri etiā potest, vt natura inipetum ad vrinas faciente, pharmacum nihil proficiat. Ex ipsis autem catharticis quæ sua actione frustrantur, hæc quidem interdum non modò nihil offendunt corpus, sed alimētum illi etiā fiunt: hæc verò in corruptelā atq; exitium vertuntur. Quum autem omnia purgātia medicamenta ventriculum vitient, præcipueq; os ipsius, q; maximè sit neruosum & sensile, odoratorum mistura commodè excogitata est: ne videlicet sola, ac syncera ipsorum facultas, os ventriculi attingat. Conuenit itaq; ea quæ miscentur semina, eiusmodi esse, quæ & malignitatem possint obtundere, & actionem ipso rum non inpedire, extenuatoria & incidenti facultate prædita: qua crassos humores dissecent, & vias ipso rum aperiant. At purgantia quæ miscentur, sibi inuicem congenera esse, & nulla ex parte dissidere oportet. Dissident autem, non quum aliud bilem, aliud pituitam euacuat (ambo enim eodē modo vacuari possunt) verum vbi hoc statim: illud multo postq; assumptum est, purgatiōem mouere solet. Ita enim inæqualis sit euacuatio ex illis simul assumptis. Dico inæqualem, quum vna cessante, altera vacuatio incipit.

Pharmaco assumpto esse ptisanæ cremorē sorbendum.
Pharmaco alius cur interdū non cedat.

Odorata commode misce ri pharmacis.

Purgantia quæ mutuo miscentur, congenera esse oportet.

GALENI PERGA MENI CONSILIVM PVERO COMITIALI MORBO LABORANTI.



AMETSI Nec filium tuum viderim, nec ab initio quæ fuerit eius natura ante morbum cognouerim, nec etiamnum, vt in ipso morbo se habeat, mihi compertum sit, Ceciliane charissime, sed id tantum ex te intelligam, comitialibus cum accessionibus infestari: vt tamen obsecundem tuis votis, curabo quam dilucidè fieri poterit, eam tibi victus rationem præscribere, qua si (vt par est) vtatur puer, tum non parum iuuabitur: tum ab eis etiam quæ sibi inopinatè accidunt, minus lædetur. Etenim nonnunquam necesse est homines in frigus atque æstum incidere: adhæc inualidiores ventos, vitiosa balnea, alimenta stupescientia, reuolutiones vertiginosas, corruscationes, tonitrua, vigilias, cruditates, tristitiam, iram, lassitudinem, atque id genus alia, quæ vehementer commouent atque perturbant corpus: & morbi tum memoriam innouant, tum eius accessionem accersunt. Quare omnia id genus multo ante sunt præcauenda. Quod si quando, vbi illa præcesserint, subsequatur dein morbi accessio, tum temporis puer penitus ab omni se motu absteineat: domique sese contineat, ac victu valde tenui vtatur: quousque corpus exacerbationis molestia prorsus destituatur. Igitur inter veris initia (tunc enim prope cõtingit eos morbos moueri, qui per in-

Morbi q̄ p̄ in-
terualla redeunt
Vere præcipue
mouentur.

terualla redeunt) pueræ purgandū cenſeo, idq; purga-
 tione mediocri. Poſt purgationem autē, hac victus ra-
 tione utēſ. Mane quidē, vbi ē lecto ſurrexerit, priuſq;
 ad præceptores accedat, modicē inambulet, non ad-
 modum tamen citato grefſu. Dein verò vſq; ad palæ-
 ſtræ tempus, diſciplinis ex eius more icumbat. Quum
 primū autē illinc diſceſſerit, vbi ruruſ inambulaue-
 rit modicum, ſic ad prudentem pædotribam cōmeet.
 Quippe totiuſ curationis ſumma in hiſce duobus eſt ſi-
 ta: nempe vſu medicamenti olim tibi à me dati, & ido-
 neis exercitationibus. Reliqua verò, tanquā præpa-
 rationes quædam ad iſta exiſtunt. Cæterū exercita-
 tionum ſcopi, quoad earum modum ſunt hi: nempe
 vt priuſ quā fatigetur puer, quieſcat: vt q; corpus il-
 liuſ calſiat, necnon moderatē euacuetur. Quòd ſi vl-
 tra hoſ terminoſ producatuſ exercitatio, nōnihil iam
 attingit ſolida corpora, atq; habitudinem ipſam colli-
 quat: in articuliſ autem potiſſimum, atq; in muſculiſ,
 colliquationeſ congregat. Vnde viriuſ infirmitaſ ſe-
 quituſ: deinde vlceruſ ſenſuſ, quando æger cona-
 tuſ aliquam mouere particulam. Atque hoc eſt, quod
 laſſitudo appellatuſ. ſcopi autē exercitioruſ, quo ad
 qualitateſ, in eo præcipuē conſiſtunt, vt inde omneſ
 corporiſ parteſ, & caput præſertim, & ventriculuſ,
 roborētuſ: potiſſimuſq; illæ parteſ, quæ ad oſ ipſiuſ
 ptiuent. Quum igituſ vehementeſ exercitationeſ ca-
 put repleant, ab hiſ illum abſtinere præcipio. Quibuſ
 ſi quando ſit opuſ, erecto capite conſtitutuſ parteſ in-
 feriorēſ commoueāt, & potiſſimuſ crura. Verū
 à paruiſ tardiſq; motibuſ pædotriba orſuſ, ad vehe-
 mentioſ & celerioſ ipſuſ pueruſ conducat. Sed
 & fruſtio exercitatio quædam exiſtit, imbecillioſibuſ
 præſertim corporibuſ. Immo nonnunquā ſi ſola ea
 decenſerit adminiſtrata, nulliſ aliis præterea mo-
 tiſibuſ indigent. Proinde primū linteis corpus rube-

Epilepticos ef-
 ſe inter veriſ
 initia purgan-
 do
 Epileptico pu-
 ero uict^o ratio
 conueniens.

Exercitatio ex-
 cedēſ modum
 colliquat cor-
 pora.

Laſſitudo, qd

Exercitationeſ
 ve hemēteſ, ca-
 put replent.

Fruſtio eſt exer-
 citatio, imbe-
 cillioſibuſ præ-
 ſertim corpo-
 ribuſ.

Fricandi epilep-
ticos ratio.

facere oportet, à supernis ad inferiora sensim, manus detrahentes : à brachiis manibusq; sumpto initio : ita deinde ad pectus & ventrem est procedendum. Postea verò & crura exactius fricanda sunt, vt aliquid huc à superioribus defluat. Vltimò denique ipsum caput est perfricandum, si absq; aliqua pinguitudine administretur frictio. Nam ad ipsum statim accedere, admodum periculosum existit. Si verò oleum in frictiõe admoueris, nihil prohibet caput simul cum aliis membris fricari : ita vt hic quidem caput fricat; alii verò duo, pectus & ventrem : duo item alii crura : atq; eodem pariter modo post exercitationes : immo & tunc magis simul membra omnia fricare conueniet. Namq; citius hoc pacto conquiescit corpus, & minus refrigeratur : cuius est non leuis habenda cura. A lauacris autem vt plurimum abstinere conuenit: nec palæstrā confestim puer ab exercitatione egrediatur: sed vbi spiritus exactè conquieuerit, & quæ exercitationem sequitur perturbatio prorsus sedata fuerit. Tūc verò caput linteo diutius est confricandum: sæpiusq; pectine vtendum. His sic peractis, ad prandium debet accedere, in quo aliquid olerum ventrem mollientium, aut salsamentorum, aut ptisanæ, aut oliuarum, vnā cum tertia panis parte ipsi offeratur : in coenam tertias duas partes reliquas cum valentioribus opsoniis reponentibus nobis. Ex oleribus itaq; nec lactuca, nec malua, nec atriplici, nec blito, vt prorsus absteineat, iubeo. Verū non semper idem, sed modò hoc, modò illud, moderatè sumendum est : nec diutius eorum vsui assuescendum. Huius autem generis est & beta, & brassica. Nam & hæc modicè degustare opus erit : pariter & porrum, & apium, & smyrnium aliquando conducet attingere. Ita ex autumnalibus etiam fructibus, quicunq; nō omnino crudi, & natura coctu difficiles sunt. Igitur mora, & quæ præcocia appellantur, & ficus,

Epilepticos esse
se abstinendos
a lauacris.

Fructus epilep-
ticos dandi.

& si qua alia id genus sunt, citra molestiam descendunt: adhæc & sativa cucurbita, nulli mollissimorum olerum est inferior: pari modo & scyiopepones. Præterea & vuis maturis, & nialis, & piris, & palmulis potest vesci nonnunquam puer: parcè tamen, & rarò. Quos fructus & in arbore, & domi maturuisse prius quàm edantur, oportet. Pituitosa autem cibaria summiopere illi vitanda sunt. A fungis etiam ut omnino absteat, consulo: queniadmodum & à rapis, & à reliquis aliis, quorum radix est esculenta. Sunt enim hæc ex iis quæ crassos humiores gignunt, & perquam difficulter intra corpus elaborantur: exceptis quibusdam, quæ nonnihil acris & calidi in se ipsis continent: queniadmodum pastinacæ & raphani. Verùm raphanos ex aliquo dierum intervallo degustare non prohibeo: horror tamen, ut pro viribus à pastinaca absteat: & magis etiam à rapis. At eorum cibariorum copiosus usus, salubris erit, quæcunq; acris quippiam atque incidentis obtinent, citra insignem pravi succi notam, aut odorem aliquem, capiti adferre noxam valente. Sunt autem & in hoc genere, quæcunque ob caliditatem caput replent, sicuti vinum, sinapi, petroselinum, pastinaca, cæpa, & smyrnium. Hæc siquidem plus quàm par est, excalfaciunt, vitiososq; succos producant. At oxyinkelite audacter utendum est: ex quo etiam capparitis potest sumi: pauxillo olei istillato. Quòd si acetum ipsum scilliticum fuerit, oxymeli longè magis iuuabit. Cæterùm si oxymel bibere puer velit, temperetur copiosiori aqua: & hyeme quidem, calidum: æstate autem, frigidum offeratur. Sic siquidem præter cætera, maximè sitim sedat. Permittere autem ei palam & in tēpore conuenit, quæcunq; non insigni noxa ipsum possint afficere: ne clam atque intempestiuè eis potitus, multo magis lædatur. Quippe voracius & largius implètur iis quæ desyderant.

Cibaria epileptics apta qualia esse debent

Oxymeli epileptics dādū. Capparitis epileptics congruit.

Acetum scilliticum.

Pueris cum permittendum sit vesci illis quæ non insigniter lædunt.

rarunt, qui palam eis vti prohibentur. Porro à prandio, vbi modicum quid interquieuerit, priusquam ad studia literarum accedat, nonnihil ipsum lentè in ambulare præcipio. A quibus vbi redierit, rursus ante coenam deambulet modicè: ac deinceps panis offerantur portiones reliquæ: aliorum verò unumquodque.

*Epileptici qui
bus nesci car-
nibus debeant.*

Verum carnes omnium ferè volatiliū conuenient, exceptis iis quæ in stagnis degunt. A quadrupedum autem omnium carnibus abstinere debet. Quod si &

*Suis extremas
partes cōferte
epilepticis.*

quandoq; his opus sit vti, suis quidem domestici extremis, atq; ventre vescatur. Sed syluestris etiam suis carnib⁹ vti poterit. Hædos etiam gustare licebit, atq; nonnunquam lepores, probè tamen conditos, aut citra nidorem assatos. Simplex condimentum fit ex aqua, quæ anethum, porrum, oleum, atq; salem receperit. Quantum verò ad marina pertinet, omnia te-
stis interdicta sunt pernicioſa. Ex piscibus autem, saxatiles cæteris omnibus præstant. Torpedo autem sola ferè ex chartilagineorum genere illi conueniens est.

*Legumina cō-
gruentia epile-
pticis quæ.*

Inter legumina, ptisana quidem primum locum obtinet: deinceps lentes, alica, & pisa conueniunt. Reliqua noxia existunt. In vniuersum autem, quæcunq; glutinosa sunt, & crassi succi, quæq; inflant, & excrementa gignunt, necnon quæ ægrè coquuntur, ea prorsus vitare debet. At verò medicamento confectio ex scilla, post purgationem, quæ aduentante vere molienda est, vtetur singulis diebus, priusquam palæstram accedat. Et sanè, nisi valde rebellis sit morbus, spero quadraginta dierum spatio, ipsum, sola eius medicamenti ope, prorsus solutum iri. Post purgationem tamen, ante quam eo medicamento vtatur, absynthium & semel, & bis in potu accipere conuenit. Cæterum oxymel, quod acidissimum quidem est, quartam ad mel aceti portionem habet: quod verò dulcissimū, octauam recipit. At crassis & glutinosis existentibus

*Oxymelitos
differentiæ.*

succis, acidiori atq; meraciori est utendum. Sin autem minus sint tales, dilutiori, atq; dulciori. Quo pacto autem ipse scillæ succum excipiam, iam adiiciam. Primum vase melitero præparato, in ipsum scillam frustatim manibus comminutam iniicio: deinceps angusto operculo cooperiēs, & extrinsecus corium vniuerso corpori vasis circumducens, & diligenter ligans, in locum omnino ad meridiem conuersum repono: ita tamen ab aquiloniis flatibus communitum, vt nullatenus ab ipsis perfletur. Id autem eo anni tempore efficio, in quo exoritur canicula: nempe ante illius quidē ortum, viginti diebus: postq; ipsum etiam, totidem. Tunc igitur per aliquot dies paulatim situm uasis permuto, vt æquē quacunque sui parte incalescat. Quo tempore exacto, dissoluens vas, in eo scillæ corpus, perinde ac decoctum, inuenio, atq; adhuc ex ea humorem quendam effluere, quem excipiens optimo melle condio. Et huius quotidie plenum cochleare vnum, infantibus quidem paruum: adultis verò magnum exhibeo. Quin etiam quod totius scillæ corruptulentum superest, exquisitè contundens, & cum melle leuigans, eius quoq; cochleare vnum, vt prædictum est, porrigo: istud tamen viribus est longè inferius. Qui verò scillam in aqua coquentes subigunt, planè illius vires dissoluūt.

Quemadmodum quicumque ex aceto eam decoquant, calidum quidē medicamentum abundè efficiūt:

at nervis sanè non innoxium.

Scillæ succum
exci piendi rō

Scilliticum me-
dicamen opti-
mum epilepti-
cis.

Scillā aceto in-
coctā esse non
innoxiam ner-
uis.

GALENI PERGA

MENI DE PTISANA

LIBER VNVS.



Ptisana ex quibus constat.

Aqua optima qualis nam esse debeat.

Elementum nullum esse prorsus syncerum.

Aqua quæ sit leuissima.

Hordeum refrigerat, exiccatur.

VANDOQVIDEM composita quædam res est tum ptisana, tum eius cremor (ex hordeo enim probè decorticato, & aqua, & certa quadam coctione conficitur) prius de illius partibus summatum aliquid dicere est animus, quam de eius compositione atque usu differam. In primis igitur ad faciendam ptisanam, aquam optimam deligere oportet: quæ nimirum nec olfactu, nec gustu, ullam extraneam qualitatem referat. Præterea sit pellucida & pura, operæ precium est: minimeq; limosa, sed veluti exactè colata. Porro huiusmodi aqua, quoad usum quidem, satis erit accommodata: natura autem ipsa, neque hoc actio prorsus sincera fuerit, sicuti nec ullum aliud sensibile elementorum. Erit tamen tenuium partium, atque ad concoctionem, distributionemq; prompta: nec tantum à naturali calore alterabitur facile, verum etiam igni externo adinota, protinus calefiet: quod etiam testatur Hippocrates, aquam quæ calfit cito, & cito refrigeratur, leuissimam esse existimans: idq; non æstimatam pendere, sed quæ partium tenuitate præpolleat, facileq; contrarias qualitates, recipiat. Itaq; huiusmodi aqua, frigida & humida, proprieq; omnino aqua censenda est. Hordeum autem ipsum, refrigerat exiccaturq;. Habet tamen non nihil detergentis & flatuosi. Quod si inspiciatur particula-

tim, illius extremus cortex, furfuraceus, & siccior existit, & magis detergendo accommodus. Quod uerò intus, ceu carnis vicem gerens, atque nutriendo idoneum habetur, deterget quidem & id, sed fure longè minus: & pariter quippiam flatuosi in se continet. Quamobrem fure quidem abstergit minus: valentius autem hordeo. At verò, quod hordeū ad ptisanam conficiendam eligimus, esse plenum oportet, nec admodum recens, neq; antiquum valde, & quod omnis ascititiæ qualitatis sit expers: in tumoremq; dum coquitur, attollatur ingentem. Vbi aqua & hordeum delegeris, ipsum hordeum crudū in aqua præmacerato: deinde ita manibus versato, quousq; deglubatur tenuis membrana. Postea rursus valentius etiam manibus cōusq; confricato, vt quicquid paleaceum inest, decidat: nisi quis fortè velit eam magis detergentem efficere. Tunc siquidem satius fuerit ipsum vnā cum membrana decoquere. Ipsius autem decoctio sit talis, vt primum quidem ebulliat plurimum: posterius autem lento igne, quousque abundè in succum vertatur. Hac enim ratione percocta ptisana, quicquid inerat flatuosi, deponit, restinguit sicim, deterget, abluit, facillè coquitur atq; absq; astrictione aliqua humectat. Iam verò quum cætera viscida quo ad gustū nullā sanè suauitatem obtineant, ptisana gustui nescio quid suavis & blandi affert: & præsertim ægrotis. Facillè etiam in thoracis partes descendit: estq; ad deiectionem, atq; distributionem, accommodata. His de causis maximè ex usu est ardentibus febribus: quòd nimirum eis quacuncq; ex parte obsistat, refrigerans & humectans, necnon putridos humores detergens, & corpori non exiguum nutrimentum suppeditans: eos verò humores qui ex dimidio putruerunt concoquens, atque in optimam succum permu-

Hordeū conficiendæ ptisanæ aptū, quale nā esse debeat.

Hordeū decorticiandi ratio.

Hordeū haud quāq; decortiatum, ptisanā magis abstergentem efficit.

Ptisanae facultas.

Ptisana maxime ex usu est ardentibus febribus.

tans. Præter has itaq; vires omnes, nullam habet aut
 astrictiōem, aut stomachi subuersionem ptisana. Nā
 astrictio quantum ad ventriculum roborandum ido-
 nea est, tantum ad incrassandos humores prompta;
 at ea humiditas quæ quod crassescat non habet, facile
 subuersionem molitur. Ptisanæ sic confectæ, læues, æ-
 quales, atq; ex æquo omnes partes continuæ, & vni-
 tæ existunt. Cæterum nec eam iis qui in discrimine
 sunt, porrigere conuenit: nec iis qui venæ sectione,
 aut purgatione, aut clystere, aut fomento indigent;
 nec eis qui excrementa plurima in regione ventri-
 culi congesserunt: aut ingenti dolore vexantur. Sed
 neque in siccissimis etiam morbis eam dare conue-
 niet: quòd scilicet valentioribus egeant potionibus
 quàm sit ptisana, vt humectentur vberius. Tempus
 sorbitioni opportunum tunc fuerit, quando æquali-
 ter dispositum corpus redditum est: id quod tantum
 morbo inclinante accidit. Porro morbi sicci sunt,
 lateris pulmonisq; inflammationes, atque adeò qui-
 cunq; morbi in thorace sunt, si nihil per excreatum
 excernant. At morbi qui circa iecur, & ventriculum,
 & intestina accidunt, tunc sanè sicci dicuntur, quum
 nihil excernunt, aut dura, & non vt necesse est, neq;
 effatu digna. Siccitates verò quæ in venis & arteriis
 consistunt, ex lingua & exteriori cute noscuntur: pa-
 riter & affectus qui in capite sunt, si nihil per palatum
 excernatur, aut nares. Eadem etiam ratione, & in-
 flammationes & ulcera esse contingit sicca, ex qui-
 bus nihil per saniem excernitur. Igitur in huiuscemo-
 di morbis ptisanam minimè propinare conueniet: q;
 satis eos humectare non valeat. At uerò, quando cor-
 pus humidius extiterit, aut ex pulmone aliquid ex-
 creatur, tunc eis semper sorbitionem augere, atque
 adicere oportet. Verum neq; ipsam statim ptisanam

Ptisana quib;
 exhibenda nō
 sit.

Morbi sicci q
 dicuntur.

Siccitates par-
 ticulares qui-
 bus notis de-
 prehendantur.

Ptisana cur in
 siccis morbis
 non danda.

DE PTISANA

605

offerre expedit: sed prius sanè eius cremorem so-
lum: aut cremoris quidem plus, ptisanæ autem pa-
tum: mox vtriusque æqualiter: deinceps & solam
ptisanam: idq; non ignorantes, ad corporis ro-
bur & nutritionem, maximè conduce-
re ptisanam: ad facilem verò co-
ctionem, atq; in corpus distri-
butionem, cremo-
rem ipsius.

F I N I S.

SERIES CHARTARVM.

Aaa, Bbb, Ccc, Ddd, Eee, Fff, Ggg,
Hhh, Iii, Kkk, Lll, Mmm, Nnn, Ooo,
Ppp, Qqq, Rrr, Sss, Ttt, Vuu, Xxx,
Yyy, Zzz, AAa, BBb, CCc, DDd, EEe,
FFF, GGg, HHh, Iii, KKK, LLI,
MMm, NNn, OOo, PPp.

Omnes quaterniones.

VENETIIS.

Apud Hieronymum Scotum.

1 5 4 8.

325.17.75







